


# Steinvender *Arenaria interpres*



## Global utbredelse

Arten er utbredt langs kystene i nordlige deler av Europa, Asia, Amerika og Grønland. Den har hva vi kaller en typisk sirkumpolar utbredelse. Steinvenderen deles inn i to underarter *interpres* og *morinella*.

## Norsk utbredelse og habitatvalg

I Norge hekker underarten *interpres*. Steinvenderen finnes i Norge langs kysten fra Østfold i sør til Varanger i nordøst, men den mangler langs det meste av Sørlandskysten. Arten er knyttet til kysten, hvor den i hovedsak ruger på vegetasjonsfattige øyer og holmer ytterst i skjærgården. I de sørlige delene av landet hekker steinvenderen i betydelig lavere tetthet enn i de nordlige delene av landet. I Finnmark hekker arten også langs fjordene og den finnes delvis i innlandet på Varangerhalvøya (Götmark m.fl. 1978).

Atlas-kartet for steinvender stemmer godt overens med tidligere utbredelseskart, og den tilsynelatende flekkvise utbredelsen nordover langs kysten, må i hovedsak skyldes manglende Atlas-dekning.

## Bestandsstørrelse og bestandsutvikling

Steinvenderen hekker relativt fåtallig langs kystene av Sør-Norge, men den blir vanligere fra Møre og nordover. Den norske hekkebestanden er anslått til ca. 8500 par, med ca. 1000 par i Sør-Norge og 7500 par i Nord-Norge (Kålås & Byrkjedal 1981). Norge har den største bestanden av steinvender i Europa (Piersma 1986). I Finland har bestanden av steinvender trolig gått noe tilbake i perioden 1978-1987, mens bestandene trolig har vært stabile i de andre nordiske landene i den samme perioden (Koskimies 1992).

## Hekkebiologi

Steinvenderen er utpreget territoriell i hekketida. De samme individene ser også ut til å hekke på samme sted år etter år. Tegningene i strupe og bryst varierer

mye mellom individer. Disse tegningene blir trolig brukt i individuell gjenkjenning mellom naboer (Whitfield 1986). Reiret kan ligge både skjult og åpent, og er en sparsomt føret grop. Steinvenderen legger som regel 4 egg i slutten av mai eller i juni. Rugetiden er ca. 24 døgn, og både hann og hunn ruger. Ungene blir ca. ett døgn i reiret etter klekking før de forlater reiret. Ungene finner maten på egen hånd fra første stund, og foreldrenes ansvar er først og fremst å varme ungene og hindre at de blir tatt av predatorer. Hunnene forlater trolig ungene før hannene, men dette ser ut til å variere noe (Cramp & Simmons 1983).

Steinvenderne legger ofte reiret sitt i tilknytning til ternekolonier, og nyter da godt av ternenes aktive reirforsvar. Steinvenderen er også selv aggressiv når den har egg og unger. I ternekolonien kan steinvenderen spise av eggene til ternene.

## Trekkforhold

Utenom hekketida er steinvenderen en utpreget kosmopolitt som kan finnes nær sagt langs alle verdens kyster. De fleste av våre fugler trekker ut av landet i juni til september. Voksenfuglene trekker bort før de unge. I trekketida passerer også en del fugler fra arktiske (grønlandske) hekkeområder SV-spissen av Norge. Norske fugler overvintrer langs kystene av Europa sør til Middelhavet, Nord- og Vest-Afrika. En del fugler overvintrer også langs norsk kysten, men hvor disse fuglene kommer fra er uklart. Steinvenderen er utenom hekketida nesten utelukkende knyttet til marine områder, og finnes ofte langs sva-berg og steinete strender, men også i estuarier, på sandstrender og på tarevoller. Individuer ser ut til å komme tilbake til de samme stedene om vinteren år etter år (Cramp & Simmons 1983). Under trekket og i vinterkvarterene finnes steinvenderene i flokker. Ett år gamle fugler kan oppholde seg i vinterkvarterene også om sommeren, disse fuglene får ikke fullstendig sommerdrakt (Van Dijk m.fl. 1990).

Peder Fiske

# Steinvender *Arenaria interpres*



153 ● Konstatert hekking

141 ● Sannsynlig hekking

78 ● Mulig hekking

Detaljeringsgrad: 10 x 10 km

