

Trøndersk Natur

Årgang 37 Nr. 1 - 2010



TROND
HAUGSKOTT

Norsk Ornitologisk Forening
avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag



Swarovskipakke !

Fakta om Swarovski ATS 65 & 80

- * Robust gummiarmert teleskophus i korrosjonsbestandig lettmetall.
 - * Vann- og støvtett teleskophus og okularer med nitrogenfylling.
 - * Ypperlig optisk kvalitet med antirefleksbehandling.
 - * Modellene leveres i normal- eller HD glass, samt rett eller vinklet versjon.
 - * Beltefokusering gir godt grep.
 - * Kompakt og lett.
- 80 ATM HD er 35cm lang, vekt 1610g m/okular



Teleskoppakke med teleskophus, 20-60x zoom okular, original beredskapsveske og Swarovski stativ nr 1.

Pakke m/ ATM 80 HD glass	Kr 28.490	(Kr 32.670)
Pakke m/ ATM 80 normalglass	Kr 21.890	(Kr 25.070)
Pakke m/ ATM 65 HD glass	Kr 22.790	(Kr 26.170)
Pakke m/ ATM 65 normalglass	Kr 18.090	(Kr 20.770)

Ny Swarovski EL - Swarovision

Swarovski lanserer ny EL kikkert med økt kantskarphet.

Den nye EL Swarovision kommer foreløpig i 8,5x42 og 10x42. Fabrikken har teknisk sett gjort svært mange endringer det ytelsen er forbedret noe. EL har fått redusert nærgrense, større synsfelt og økt øyeavstand. For de fleste vil det være endringen til linser med "flat field" som gir økt kantskarphet som er mest merkbar.



Modell	Synsfelt	Vekt	Nærgrense	Vår pris
8,5x42	133m/1000m	795g	ca. 1,5m	Kr 18.790
10x42	112m/1000m	800g	ca. 1,5m	Kr 19.690



Nikon Monarch - bestselger TILBUDSPRIS!

Monarch 8x42

NÅ Kr 2.590
(anbefalt 3.440)

Monarch 10x42

NÅ Kr 2.890
(anbefalt 3.890)



Nikon Monarch 8x42 og 10x42 har vært vår bestselger i flere år og er trolig de mest solgte kikkertene i denne prisklassen i Norge. Modellene er gummiarmert, vanntette, har høy oppløsning, kort nærgrense (2,5m), god kontrast, lav vekt (610g) og lav pris. 8x36 modellen er den rimeligste av alle de 8 ulike Monarch modellene. Den koster kun 2.190 kr!

Doghouse pop-up kamuflasjetelt

Velegnet til naturfoto og som skjul til tur- og orrfugleik

Teltene fra Ameristep er pop-opp telt med selvberende konstruksjon, som det bare tar noen få sekunder å reise.

Bunnmål 160x160, vekt 6,5 kg, høyde 175cm.



TILBUDSPRIS!
NÅ Kr 895 (før 1.195)

Gyldendals store fugleguide



Behandler samtlige 900 arter som kan sees i Norge og Europa. Tegninger i flere drakter av hver fugleart. Boka er oppdatert på kjennetegn for vanskelige arter.

Ny revidert norsk utgave 2010 tilrette lagt for forholdene i Norge, med ny systematikk, mange nye bedre planser.

Boka som er det desiderte førstevalg blant fuglekikkere i hele Europa

NY UTGAVE

Pris Kr 398 - fri frakt

Norges sommerfugler NY



Er du interessert i å lære våre sommerfugler å kjenne, så er dette boken du skal skaffe deg. Norges sommerfugler er ny, faglig oppdatert og komplett!

I tillegg til en generell del om sommerfuglenes biologi og adferd, presenterer boka alle våre 872 arter dagsommerfugler og nattsvermere med planser, kart og beskrivelse.

152 fargeplanser, 872 kart og flotte fargefotos. Utgitt sommer 2009.

Pris Kr 390 + bokfrakt

Guide til Norges fugleliv



Endelig en guide til norske fuglelokaliteter! I denne boka presenteres rundt 330 av de mest interessante områdene i landet og alle de spennende artene.

Rikt illustrert med kart og fargefotos. Hele 672 sider, A5-format og softcover.

Andre fuglebøker forteller hvordan fuglene ser ut - denne forteller hvor og hvordan du finner dem!

NYHET

Pris Kr 398 + bokfrakt

TRØNDERSK NATUR

Tidsskrift for Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Redaktør: Trond Haugskott, Bekkasinv. 9, 7082 Kattem. Tlf.: 72 84 99 40 / 909 48 572.

E-post: trhaugs@online.no. Hjemmeside: www.haugskott.com

Tips til forfattere: Artikler og innlegg til TN sendes til redaktørens adresse, helst pr. e-post.

Hvis det er noe du lurer på - kontakt redaktøren.

Manusfrist: TN utkommer med to hefter pr. år. Frist for innlevering av manus er hhv. innen 31. mai og 30. november.

Adresseforandringer o.l.: TN sendes ut til medlemmene av NOF avd. Nord-Trøndelag og NOF avd. Sør-Trøndelag på grunnlag av medlemslistene fra foreningene. Endring av adresse, etterlysning av manglende blad o.l. må derfor rettes til respektive fylkesforening.

Opplag: 450 eks.

INNHold

- 4 Fugleriket Høylandet
- 11 Fugler i Nord-Trøndelag 2009
- 36 Småstykker
- 40 Spesielle observasjoner

Alle tegninger ved Trond Haugskott

Foto: Solnedgang over LInesøya, Åfjord. Trond Haugskott




Fugleriket Høylandet

Av Per Inge Værnesbranden

Revy og Høylandet er to begrep som henger sammen, og er kjent over store deler av landet. Kommunen har da også lansert navnet Revyriket om seg selv. Hva som kanskje ikke er så viden kjent, er at Høylandet også utmerker seg i ornitologisk sammenheng, om ikke i lands-sammenheng, så hvertfall i trøndersk sammenheng. Er du på farten på vei nordover til Namdalskysten eller Helgelandskysten, eller kommer nordfra på vei sørover mot sentrale strøk i Trøndelag, og har lagt kjøreruta gjennom Høylandet og riksvei 17, er det verdt å ta en rast ved en eller flere av de mange flotte våtmarksområdene i kommunen. Jeg vil i denne artikkelen gi en oversikt over de mest attraktive våtmarksområdene i Høylandet. Omtalen baserer seg på tidligere publiserte undersøkelser, LRSK-rapporter og egne observasjoner, samt verneplaner og andre lokalitetsbeskrivelser (se kildeoversikt). Flere av vatna har lenge vært kjent som

rasteplasser for sangsvaner, og det er gjennomført årlige tellinger av svaner i november måned fra 1978 til 1993 og i tillegg er det foretatt noen tellinger i området ellers i vinterhalvåret i samme periode (Georg Bangjord pers. medd). Vassdraget er også undersøkt i forbindelse med Verneplan II for vassdrag (Bevanger 1982). I 1998 foretok NOF avd. Nord-Trøndelag en kartlegging av hekkefugler i Flakkan og Øytjønna (Værnesbranden 1998). Utover dette er det gjort flere tellinger under tilfeldige besøk, hovedsakelig om våren. Tettheten av aktive fuglekikkere er dessverre liten i nordlige deler av Nord-Trøndelag i forhold til sørdelen av fylket, noe som medfører at disse utmerkete våtmarkene blir altfor lite besøkt. Jeg håper derfor at flere tar seg tid til noen turer hit i årene framover. Det siste året er det også gjort tiltak for bedre tilgjengelighet for fuglekikking ved de to verneområdene Flakkan og Øytjønna. På websidene til Høylandet kommune kan du også få mer informasjon om dette: www.hoylandet.kommune.no
Klikk på "Turist" i menyoversikten.



Høylandet, med de omtalte områdene merket med nummer.

Bilde øverst:
Sangsvaner i Øytjønna, oktober 2009.



må det understrekes at du må være spesielt oppmerksom på trafikken når du skal kjøre av eller på veien, da fartsnivået på mange av de passerende bilene på riksvei 17 er forholdsvis høyt.

Eidsvatnet (1)

Eidsvatnet er delt mellom Overhalla og Høylandet kommuner, og ligger bare 6 m.o.h. I sørvest renner Bjøra ut ved Gløymem, som ligger i Overhalla kommune. Utløpet og nedover langs Bjøra er nesten alltid åpent gjennom vinteren. Det er et svært viktig rasteområde for sangsvaner, trolig det viktigste i Høylandsvassdraget, og over 100 ind. er registrert på høst-/vintertellingene her. Øst for utløpet, ved Flasnes, finnes også attraktive områder for vannfugl. Området i og rundt sørenden av Eidsvatnet (1a) består av varierte biotoper, med dyrka mark, våtmark, løvskog og kantskog mellom de ulike biotopene. Uvanlige fugler som er sett her er sædgås, skjeand og musvåk. Den nordøstlige delen av Eidsvatnet som ligger i Høylandet kommune kalles Vassbotna (1b), og årlige vårflokker som går innover dyrkamarka skaper gode forhold for vannfugl. Brunnakke og krikkan er blant de vanligste andefuglene her. Her er det også gode forhold for vadefugler, og heilo, rød-stilk, gluttsnipe opptrer forholdsvis tallrik/vanlig. Sjeldne gjester er hvitkinngås, amerikablesand (juni 1997), knekkand, stjertand, taffeland, lappfiskand, svartterne (mai 1997).

Oversvømt dyrka mark ved Vassbotna, Eidsvatnet, er attraktive områder for mange vannfugler.

Naturbeskrivelse

Høylandet kommune strekker seg fra Eidsvatnet i sør og til Foldfjorden (Indre Folda) i nord. Det er et vannskille nord for Øyvatnet, hvor Kongsmoelva renner nordover mot Foldfjorden, mens sør for vannskillet drenerer Høylandsvassdraget mot Namsen, med et nedslagsfelt på 555 km². Det er flere større innsjøer i vassdraget, både i høyereliggende myr- og skogsområder, og i lavereliggende deler med jordbruksområder og mer kultiverte arealer. Høylandet omfatter også store fjellområder på begge sider av hoveddalføret, med de høyeste toppene på over 900 m.o.h. i nord, på fylkesgrensa mot Nordland. Hoveddalføret som strekker seg nordover mellom Skogmo i Overhalla og til innerste del av Foldfjorden ved Kongsmoen, ligger ikke mange metre over havnivå, og vassdraget bærer også preg av at det. Elvene er stilleflytende over lange strekninger, og svinger seg rundt i landskapet. Siden det ikke er noen fosser eller andre hindringer, medfører det også at laksen går opp i de store vatna. Den nederste elvestrekningen, Bjøra, er da også kjent som en storlakselv, hvor sesongen starter to uker tidligere enn fisket i Namsen. Vatna som ligger i jordbrukslandskapet i Høylandsvassdraget; Eidsvatnet, Grongstadvatnet, Flakkan og Øyvatnet, samt elveløpene mellom vatna, er svært viktige for våtmarksfugler, spesielt i


trekktidene. En viktig årsak til det er at de blir tidlige isfrie om våren og at isen legger seg seint om høsten som følge av at høyden over havet er lav. Som en kuriositet kan nevnes at kommunevåpenet til Høylandet består av en svane.

Fuglelokaliteter

Her følger en kort gjennomgang av de mest interessante lokalitetene, som alle ligger langs riksvei 17 med utgangspunkt fra Skogmo i Overhalla. På kartene er lokalitetene merket med tall, og anbefalte observasjonspunkter er merket med blå prikker. Siden flere av stoppeplassene ligger langs riksveien,

Horndykker i Øytjønna, mai 2010.





Eidsvatnet og Grongstadvatnet.

Elva som renner mellom Eidsvatnet og Grongstadvatnet i nord, Eida, er en viktig lokalitet for fossefall vinterstid, da den sjelden fryser igjen. På det meste er mellom 25-35 fossefall registrert, et høyt antall i forhold til at elva bare er ca 500 meter lang.

Tilgjengelighet: For å komme til utløpet av Eidsvatnet, ta av veien ved Flasnes mot Gløymen (skiltet). Veien går over Bjøra, og deretter første vei til høyre, som går langs vatnet på vestsida. Det er også mulig å fortsette nordover langs vatnet. For å få en oversikt over

områdene i sørenden av vatnet, ved Flasnes, går det an å stoppe ved rv. 17. og gå gjennom kantskogen mot vatnet. Ved Vassbotna kan en ta av Rv. 17 og over brua som går over Eida. Det er mulig å få oversikt over vatnet fra veien som går på nordsida av Eidsvatnet.

Grongstadvatnet (2)

Utløpet av Nordåa i nordenden av Grongstadvatnet (14 m.o.h.) er et viktig område for rastende våtmarksfugl i vassdraget. Sangsvane er en karakterart, og fra midten av oktober til isen har lagt seg kan opptil 80 individer holde seg i området. Storlom er en regelmessig trekkgjest. Krikkand, brunnakke, stokkand, toppand og kvinand forekommer regelmessig, til tider i forholdsvis store antall fram til islegging. Laksand og siland er regelmessige, men i mindre antall. Stjertand, bergand og svartand forekommer uregelmessig i små antall. Vade- og måsefugler forekommer ikke så regelmessig og heller ikke i så store antall. Uvanlige arter er bl.a. gråstrupedykker, storskarv, sothøne, taffeland og lappfiskand.

I nordenden av Flakkan ligger Flåttmyra, og utløpet av Flåttelva.



Tilgjengelighet: På rv 17, ca 3 km sør for Høylandet sentrum er det en vei som tar av mot Mevassvik. Denne veien kommer etterhvert ned til vatnet på nordvestsida, hvor det er mulig å se utover vatnet, og utløpet av Nordåa.

Flakkan (3)

Flakkan er et langsmalt vatn, 3 km fra sør til nord, og delt i to med et smalt sund ved Mjøsund. I nordenden av vatnet er det et større myrområde, Flåttmyra. Fra Øyvatnet kommer Flåttelva og svinger seg gjennom landskapet og danner et særegent og vakkert landskapselement med kantskog og stilleflytende elvepartier og loner før den renner ut i Flakkan. Fra det smale sundet midt på vatnet og sørover til utløpet, er det kraftige vegetasjonsbelter, hovedsakelig med takrør. Hele Flakkan er et naturvern-område, hvor nordenden, Flåttmyra og Flåttelva er naturreservat, mens resten av vatnet er vernet som fuglefrednings-område.

I forhold til størrelsen er det stor variasjon både når det gjelder arts-mangfold og antall blant våtmarks-fuglene. Flakkan har stor betydning som hekkeområde, spesielt for andefugler. I en kartlegging i 1998 ble ca 20 par med gress og ender påvist hekkende (Værnesbranden 1998). Brunnakke, krikand og stokkand er de vanligste



Langs Flåttelva har beveren satt sine tydelige spor.

hekkende endene, mens toppand, kvinand, laksand og siland er noe fåtalligere. Trane og storlom hekker også med 1-2 par hver. Sangsvane er siste tilskudd blant hekkefuglene, med et par som har hekket siden 2007. Vadefuglene finner også gode hekkeplasser i Flakkan, hvor Flåttmyra er en viktig lokalitet. Vipe, enkeltbekkasin, rødstilk og gluttsnipe er de vanligste, mens storspove, småspove og grønnstilk sannsynligvis hekker. Horndykker hekker sannsynligvis i Flakkan. Utenom hekketida er det mye fugl som raster i trekketidene vår og høst. Foruten de vanligste andefuglene, er sangsvaner en karakterart. Litt mer

uvanlige arter er dvergdykker, ringgås, snadderand, stjertand, stivhaleand (mai 1996), harlekinand (mai 1994) og konglebit. Av spesielle pattedyr kan du oppleve både bever og oter. Beveren har bygd flere hytter i Flakkan og Flåttelva, og spor etter den flittige tømmerhoggeren kan ses langs Flåttelva.

Tilgjengelighet: Rv. 17 går langs vestsida av Flakkan, og det er mulig å stoppe flere steder langs veien for å se på fugler. Når en kommer sørfra, går det an å kjøre ut på en liten rasteplass med det samme en kommer ned til Flakkan. Her har en god oversikt over søndre del av vatnet. Litt lenger nord,

Flakkan. Fugletårn merket med F.



Flakkan.





Øytjønnva.

er det nylig blitt anlagt en større rasteplass med utedo og benker, med en sti ut til en lav observasjonsplattform med tak over, i skogkanten ut mot vatnet. Herfra har du god dekning over midtre deler av vatnet. Plasseringa av observasjonstårnet ser ut til å være optimal, men skogpartiet langs stien og rundt tårnet er forholdsvis luftig og åpent etter skogrydding, slik at folk som går ut til tårnet er synlige for fugler som ligger i vatnet og kan skremme dem vekk. Forhåpentligvis vil det etterhvert bli etablert en leskjerm/ beplantning langs stien og på baksida av tårnet, for å unngå silhuettvirkning av folk. Du bør derfor bevege deg rolig


bortover mot tårnet når du er på besøk. Sør delen av Flakkan er både rikt på fugler og samtidig lett å få oversikt over, mens det i nord delen, nord for Mjø-sund og opp til Flåttmyra, ikke er like lett å få en god oversikt, da det ikke er noen tilrettelagte stoppeplasser. Det er imidlertid mulig å stoppe på landbruks-avkjørsler og gå ned til vatnet langs åkerkanten enkelte steder. Flåttelva og Flåttmyra er ikke så lett tilgjengelige, men det er mulig å stoppe ved campingplassen ved Flått, og gå ned til myra eller elva derfra. Det anbefales imidlertid å unngå å gå ut på myra, av hensyn til fugler som hekker der.

Øytjønnva og Øyvvatnet (4)

Det øverste vatnet i vassdraget, Øyvvatnet, er en forholdsvis stor innsjø (9,7 km², 63 m.o.h.). De mest attraktive områdene for våtmarksfugl ligger i nordre del, i første rekke Øytjønnva (4a), og strekningen mellom Bjørlielva og Fiskåa (4b). Øytjønnva er vernet (Øie naturreservat), og er ei avsnørt bukt på østsida av Øyvvatnet, hvor Øyelva meandrerer gjennom et frodig myr-landskap bevest med spredt bjørke-skog og vegetasjonssoner av varierende grad. Øytjønnva er et viktig hekke-område, og flere par med horndykker, andefugler, vadefugler (bl.a. brushane og grønnstilk) og måsefugler (fiske-måse, hettemåse og makrellterne) hekker, i tillegg til trane og storlom. Øytjønnva fungerer også som rasteplass for mange våtmarksfugler, bl.a. for sangsvane vår og høst (50-60 ind.). Vest for Øytjønnva er det også våtmarker som er verdt å besøke. Hele strekningen mellom utløpet av Bjørlielva og Fiskåhaugen utgjør et viktig rasteområde for mange vann-fugler, bl.a. horndykker og sangsvane. Her er det vegetasjonsrike bukter, og under vårfloppen går vatnet innover dyrkamarka. På vei nordover langs østsida av Øyvvatnet passerer du også utløpet av Kjølstadelva, hvor det kan

Nordenden av Øyvvatnet ved Bjørlielva.





Øyvatnet og Øytjønna. Fugletårn merket med F.

ligge en del fugl, bl.a. horndykker og ender. Uvanlige gjester i Øyvatnet/Øytjønna har vært skjeand, taffeland, islom (september 1991), sothøne og svømmesnipe.

Tilgjengelighet: Øytjønna ligger inntil Rv. 17, og det er mulig å foreta stopp ved veien, men anbefales ikke, pga. uoversiktelige svinger og stor fart på trafikken. Heldigvis er det nylig blitt laget en rasteplass med benker og toalett i nordenden av tjønna, og her kan man gå langs tjønna til en observasjonsplattform. Fra denne plattformen har du god oversikt over norddelen av tjønna, men dessverre ikke sørdelen av elveutløpet og tjønna. Det er heller ikke laget noen leskjerm bak plattformen, så du er godt synlig for fugler som ligger i tjønna, og kan skremme de som er nærmest. Alternative observasjonsplasser i Øytjønna er fra rasteplassen, og du kan også gå på utsida av rekkverket 50-100 m langs riksveien. Veien til Bjørlielva og Fiskåhaugen, tar av fra Rv.17 en km lenger nord, skiltet til Fiskåhaugen/Bjørli.

Kongsmoen (5)

Foldfjorden er i trøndersk sammenheng en uvanlig lang og smal fjordarm, ikke ulikt en vestlandsfjord, med stupbratte og utilgjengelige fjordsider. Innerst i fjorden, ved Kongsmoen, renner Kongsmoelva ut, og danner et forholdsvis lite berørt deltaområde. I utløpet ligger en sandbanke, og nordsida av elveosen består av et større strandengområde som er delvis oppdyrket. Deltaområdet danner omtrent det eneste større gruntvannsområde i indre Foldfjorden. I forhold til andre lokaliteter i Trøndelag, er utløpet av Kongsmoelva ikke spesielt rikt på fugler, men tatt i betraktning den forholdsvis fattige vannfuglfaunaen ellers i indre Foldfjorden, utgjør Kongsmoelva et viktig område, og er den mest fuglerike delen av fjorden. Fuglelivet er forholdsvis ordinært, men det kan være interessant å ta en stopp her i trekketidene. Uvanlige fugler har bl.a. vært stjertand og horndykker.

Tilgjengelighet: Like før Rv. 17 når fram til fjorden, går det en vei til høyre ned til et lite kapell. Følg veien ned til

fjorden, og ut mot elveosen. Dette er det beste observasjonsstedet, hvor en har utsikt til hele nedre del av elveutløpet. Det er også mulig å komme til på nordsida av osen. Kjør av rv 17 mot Aunet (skiltet), og videre ca 1 km til du kommer til ei bru, hvor det er mulig å parkere. Herfra går det en traktorvei ned til strandenga.

Hytte-/leilighetsutleie for fuglekikkere/ naturfotografer

Det er muligheter for overnatting på campingplasser i Høylandet, men er du interessert i å ha nærhet til gode fugleområder, kan Lauvåsen gård, nord-øst for Flakkan (se kart) være et godt tilbud. Her har grunneier Thomas Halbostad i flere år drevet utleie av overnatting til fiskere og jegere, men ønsker også å satse på fugleturisme. På østsida av Flakkan ligger ei hytte av god standard, ca 100 meter fra Flakkan, med utsyn over den mest fuglerike delen. På gården er det innredet en leilighet med TV, samt et bygg med ekstra rom for større grupper. Det er tilgang på WC og dusj. Totalt er det plass for opptil 12-15 personer, og egner seg bra til familier, både med og uten barn. Er du ivrig fisker, er det også mulig å leie båt. Dette er et unikt utgangspunkt for naturopplevelser i Høylandet. Her er det mulig å kombinere både fuglekikking, naturfotografering og fiske og samtidig bo bekvemt og med nærhet til det man søker etter. Foruten nærhet til Flakkan og våtmarksfugler, kan du også oppleve skogsfugler langs veien mellom gården og hytta, hvis du er tidlig opp om morgenen. Halbostad ønsker også etterhvert å legge bedre til rette for fuglekikking og fotografering, ved å lage observasjonstårn og fotoskjul.

Se egen annonse for priser.



Kilder

Bangjord, G. 1989. Svane- og vannfuglregistreringer i noen ferskvann i Nord-Trøndelag høst/vinter 1989. Arbeidsrapport utarbeidet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 40s.

Bangjord, G. 1991. Svaneregistreringer i noen ferskvann i Nord-Trøndelag vår 1991. Arbeidsrapport utarbeidet til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 28s.

Bevanger, K. 1982: Ornitologiske observasjoner i Høylandsvassdraget, Nord-Trøndelag. Rapport, zool. serie 1982-1. DKNVS, Museet. Universitetet i Trondheim. 57 s.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1981: Utkast til verneplan for våtmarker i Nord-Trøndelag fylke. Steinkjer 130 s.

Størkersen, Ø. R. 1985: Fuglelokaliteter i Trøndelag. Del 3: Innlandslokaliteter. Trøndersk Natur (2) 12: 36-43.

Hytteutleie ved Flakkan, Høylandet

Hytte, og leilighet på gårdsbruk, leies ut. Hytta ligger ved Flakkan fuglefredningsområde, med gode muligheter for å observere fugler, og fiske etter sjørret med båt. Fint som utgangspunkt for andre turer i Høylandet. Familievennlig, passer for 1 til 13 personer.

Priser utleie (pr døgn):

Hytte: 4 senger (2 dobbeltsenger), hems med 2-3 sengeplasser, utedo, tilgang til dusj og WC på gården.

med båt: kr. 500,-

uten båt: kr. 350,-

På gården:

Leilighet m. 4 senger + ekstra rom m. 3 senger. WC, dusj, TV.


Leilighet: kr. 350,-. Inkl. ekstra rom: kr. 500,-

Kontaktinformasjon:

Thomas Halbostad, 7977 Høylandet

Tlf: 95818140

E-post: thshalbo@frisurf.no



Fugler i Nord-Trøndelag 2009

Av Trond Sørhuus, Tore Reinsborg, Per Inge Værnesbranden, Terje Kolaas og Bård Nyberg



Rapport fra LRSK/Nord-Trøndelag (lokal rapport- og sjeldenhetskomité i Nord-Trøndelag)

Denne rapporten er en sammenstilling av uvanlige observasjoner og andre spesielle funnforhold av fugler i Nord-Trøndelag i 2009. Alle som har bidratt med observasjoner takkes herved.

LRSK's sammensetning og arbeid

Den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen i Nord-Trøndelag (LRSK/NT) er en komité underlagt NOF avd. Nord-Trøndelag, og har som oppgave å

registrere observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter i fylket. For 2009-rapporten har LRSK/NT bestått av Terje Kolaas, Bård Nyberg, Tore Reinsborg, Trond Sørhuus og Per Inge Værnesbranden. Alle observasjoner er hentet fra *Rapportsystemet for fugler* www.artsobservasjoner.no/fugler. Noen observasjoner er også hentet fra NOF's Hagefugltellingsprosjekt. Dessverre er det noen observasjoner fra 2009 som ikke ble ferdigbehandlet før rapporten gikk i trykken, og som ikke er tatt med i årets rapport, grunnet altfor mange andre arbeidsoppgaver hos enkelte av LRSK-medlemmene. Disse vil imidlertid bli inkludert i neste rapport når de er vurdert.

Rapportering

Ved rapportering av observasjoner er det Rapportsystemet for fugler www.artsobservasjoner.no/fugler som nå skal brukes. En detaljert veiledning om bruken er gitt i Trøndersk Natur nr. 2-2009, men en kort oppsummering av det viktigste kommer her: Art, antall, lokalitet og dato er helt nødvendig, mens alder og kjønn bør tas med for arter hvor det er relevant. Klokkeslett bør også angis, noe som kan gjøre det lettere å skille ulike individer som er sett samme dag eller over korte perioder. Husk å sjekke at datoen er rett hvis du legger inn observasjoner som er tidligere enn dagens dato, slik at

Bilde øverst: Tornskate Øfsti, Stjørdal
11. juni 2009.
Foto: Per Inge Værnesbranden.

en f.eks. unngår at reirfunn av sothøne blir registrert på datoen 25.12, hvis en sitter i mellomjula og legger inn sommerens observasjoner. En god regel er å legge inn observasjonene samme dag som de er gjort! Observasjoner i hekketida må angis med et hekketerium som aktivitet der det er relevant, og alltid med sterkeste indikasjon på hekking som er registrert. Det er viktigere å rapportere en fugl som "observert i hekketid, passende biotop" enn som "næringssøkende".

De aller fleste aktive fuglekikkere bruker nå systemet, selv om det er noen få som ennå har datavegring, eller ikke har tilgang på data/internett. Hvis du ikke har tilgang til datautstyr eller ikke er datakyndig, kan du selvsagt sende inn på papir, eller det beste er om du kan få hjelp av datakyndige personer. Artsobservasjoner er et unikt rapporteringssystem som har medført at mange flere legger inn sine observasjoner. Dette har også medført at det kommer inn flere observasjoner av enkelte arter enn det som tidligere har vært normalt. For å gjøre rapporten mer leservennlig vil vi prioritere å skrive mer utfyllende kommentarer, og heller oppsummere forekomster av enkelte arter enn å liste opp samtlige observasjoner.

Sårbare arter

Hekkefunn, hekkeindikasjoner eller observasjoner fra hekketida/i hekkesesongen for sårbare eller sjeldne arter vil ikke bli oppgitt med eksakt lokalitet, kun med angivelse av kommunenavn eller navn på et større geografisk område i kommunen eller fylket. Dette gjelder de fleste rovfugler og ugler, lommer, sangsvane og trane. Unntaket er av fugler som velger hekkeplasser som er allment kjente eller hekker på lokaliteter som ligger i områder som er lett tilgjengelige og mye besøkt.

Fugleåret 2009

Her følger en kort gjennomgang av de mest spesielle registreringene i 2009. Flere svært sjeldne fugler (NSKF-arter) ble registrert: Brilleand på Ørin/

Rinnleiret i mai. Kuhegra som ble sett ved Lømsen, Stod og Flatanger var nok et av høydepunktene for mange. Fylkets tredje svartglente viste seg ved Langåsdammen og Ulvilla i april, og dens nære slektning, en glente, var innom i Lierne i mai. Alaskasnipa som ble sett på Tautra i juli var den sjuende i fylket. Nord-Trøndelags femte svartehavsmåke beåret Storleiret med besøk i oktober. Fylkets første amursvale dukket på Lømsen i mai, mens den fjerde sitronerla var innom et gårdsbruk på Steinvik, Stj. i september. Rosenstøren i Verdal i oktober var den femte i fylket. Det tas forbehold om at NSKF-observasjonene ikke er ferdigbehandlet av NSKF. I tillegg er det rapportert enkelte udokumenterte/usikre NSKF-observasjoner som ikke er tatt med i rapporten her. Et noe uvanlig syn var en rømt rødhøne ved Lundleiret i juni-juli. Av regionale sjeldenheter kan nevnes hekkefunn av havsvaler på Sklinna, havsule på fjordbesøk i Mosvik og Inderøy, mellomskarv ved Verdal havn, Lørvikleiret og Storleiret. Åkerrikse hadde en markert forekomst med 6 ind. og 8 polarjo ved Sklinna i september er også et sterkt tall. Flere skogduer ble registrert. Syngende slagugle i Lierne oppleves ikke hvert år, mens hele tre lappugler gjorde en visitt i fylket, med en på Skatval i januar, og to på Ytterøya i april. Hærfuglen som holdt seg ved en gård i Leirådal et par uker i september, ble beskuet av mange tilreisende fuglefolk. Hybridindivider av hvittryggspett/flaggspett ble observert både på Frosta i september og i Verdal i desember. Fjellerke er langt fra noen årlig gjest, og et ind ble sett på Tautra. To nattergaler samme året er svært uvanlig, og begge ble hørt i Verdal. Duetrosten hadde et rekordår igjen. Ellers ble en gresshoppesanger hørt på Jøa, Fosnes i juni, og en tornskate avla Øfsti, Stj. et kort besøk i juni.

Kategorier

Bak enkelte artsnavn er kategoriene C, D og/eller E nevnt. Dette gjelder for arter som i utgangspunktet ikke er naturlig hjemmehørende i Norge. Se symbolforklaring.

Arter uten kategori er i kategori A (arter som er funnet minst engang siden 1.1.1950 og som regnes som spontant forekommende)

Forkortelser og symbolforklaring

Ad = adult, voksen fugl.

juv. = juvenil, ungfugl.

pull. = pullus, dununge, lite flygedyktig unge.

M = hann(-er) (male).

F = hunn(-er) (female).

Ff = hunnfarget.

1K = fugl i sitt 1. kalenderår (fødselsåret fram til 31.12.).

2K = fugl i sitt 2. kalenderår (året etter fødselsåret, 1.1-31.12.).

medd. = meddelt.

* etter dato betyr at observasjonen er dokumentert med foto, video, lydopptak, fjær o.l.

* foran observatør betyr at den/de observatøren(e) oppdaget fuglen(e).

rm – ringmerket.

sy. – syngende.

ptN//Ø/V/S – på trekk, og himmelretning.

NSKF etter artsnavnet betyr at observasjonen er blitt godkjent av Norsk sjeldenhetskomité for fugl. I enkelte tilfeller publiseres også observasjoner som ennå ikke er ferdigbehandlet, men hvor funnet er godt dokumentert og det ikke er tvil om arten.


C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder fritlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger.

D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder. Det ene kan være like sannsynlig som det andre.

E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

Alle lokaliteter angis med kommuneplassing,
hvor kommunenavnet er forkortet:

Fl.	- Flatanger	Nd.	- Namdalseid
Fo.	- Fosnes	Na.	- Namsos
Fr.	- Frosta	Nsk.	- Namsskogan
G.	- Grong	Nø.	- Nærøy
H.	- Høylandet	O.	- Overhalla
I.	- Inderøy	R.	- Røyrvik
Lk.	- Leka	Sn.	- Snåsa
Lks.	- Leksvik	Ste.	- Steinkjer
Lev.	- Levanger	Stj.	- Stjørdal
Li.	- Lierne	V.	- Verdal
Me.	- Meråker	Vr.	- Verran
Mo.	- Mosvik	Vi.	- Vikna



Åkerrikse Helgådalen, Verdal 2. august 2009. Foto: Halvor Sørhuus.



Observasjoner fra 2009

Knoppsvane *Cygnus olor*

Alle funn: 1 2K Ausa, Leksdalsvatnet, V. 19.4 (*TRe m.fl.).

Sangsvane *Cygnus cygnus*

I 2009 ble ni hekkfunn samt en hekkeindikasjon påvist i fylket: Levanger, Verdal, Snåsa (2), Namdalseid, Namsos, Grong, Høylandet og Flatanger (2).

Større antall: 200 ind. rastende sone 3 - Figgaoset, Leksdalsvatnet, Ste. 19.3-28.3 (IHa, HSø). 318 ind. Svepstad, Ste. 6.4 (PIN). 350 ind. Brandsegg, Ogdal, Ste. 8.4-10.4 (PIN). 200 ind. Klinga, Stod, Ste. 10.4 (OMS).

Hekkefunn: 1 par m/reir og 4 pull. Levanger kommune 9.5-19.6 (MHu, Ketil Fagerli). 1 par m/reir og 6 pull Namdalseid kommune 16.5-22.8 (AVa). 1 par m/reir Namsos kommune 16.5 (AVa). 1 par m/reir og 4 pull Flakkan, H. 23.5-12.7 (OSa, TRe, JEØ, RTK, AVa). 1 par m/reir Verdal kommune 23.5-7.6 (TMy, IHa). 1 par m/4 pull Flatanger kommune 30.5-15.8 (RJa, AVa). 1 par m/avledningsmanøver Grong kommune 7.6 (Jens Gaundal). 1 par m/3 pull. Flatanger kommune 10.7 (RJa). 1 par m/3 pull. Snåsa kommune 20.7 (TMy, RTK). 1 par m/1 stor unge Snåsa kommune 24.8 (Harald Førdedal). **Andre sommerfunn:** Det ble registrert til sammen 21 ind. på 11 lokaliteter i juni-august: Lierne 5 ind./3 lok, Leksvik 1 par/1 lok., Verdal 6 ind./2 lok, Snåsa 1 par/1 lok., Meråker 1 par/1 lok., Flatanger 1 ind./1 lok, Mosvik 1 par+1 ind./2 lok.

Sædgås *Anser fabalis*

Ca 42 ind. ble registrert i 2009, hvorav ca. 27 ind. i Trondheimsfjordområdet, og 15 ind. i rasteområde i Røyrvik. Dette omfatter individer som både er underartsbestemt eller er ubestemt. Antall underartsbestemte individer er ikke skilt ut, da det er en salig blanding av begge underartene, og det er variabel praksis på hvordan rapportørene registrerer underarter, noe som gjør det til tider krevende å oppsummere. Foregående seks år ble følgende antall sett: 2008 (41), 2007 (24), 2006 (67), 2005 (18), 2004 (40), 2003 (38).

Vårtrekk: ca 20 ind. i området Levanger-Snåsa 30.3-10.5. **Rasteområde i innlandet:** 15 ind. Vallervatnet, R. 30.4 (Kjartan Trana). **Sommerfunn:** 1 ind. (u.a. fabalis) Fossemvatnet, Ste. 19.7 (AVa). **Høsttrekk:** 6 ind. i området Stjørdal-Steinkjer 27.9-7.11.

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

Bemerkelsesverdig mange sommerobservasjoner, med varierende antall og på flere lokaliteter.

De første vårfunnene: 1 ind. rastende Ystines og Øfstigjardet, Øfsti, Stj. 15.3 (PIV). 4-23 ind. Måsøya, Ørin, V. 26.3-29.3 (TSø, HSø, Ola Sørhuus, Magnus Sørhuus, IJI). **Maksimaltall vårtrekk:** 15000 ind. rastende Vellamelen, Ste. 11.4 (John Haugen, PIN, AVa). 15000 ind. Vellamelen, Ste. 18.4 (MMY, AWi, PWB). **Nevneverdige funn utenom tradisjonelle**



2K knoppsvane Leksdalsvatnet, Verdal 19. april 2009. Foto: Anders Sørhuus.

rasteområder: 3 ind. rastende Nysetersanden, Kvesjøen, Li. 31.5 (TRe, MMy, PWB).

Sommerfunn: 7 ind. Lømsen, Ste. 1.6 (AVa). 3 ind. Vellamelen, Ste. 1.6-20.8 (Gunn Frilund, AVa, Leif Bjørn Lunde, Klaus Maløya Torland, Hans A. Olsvik). 2 ind. Falstadbukta, Lev. 2.6 (BAS). 10 ind. Seemsøra, Viosen-Semsøra, Sn. 2.6-3.6 (BBE). 1 ind. Baglan-Berg, V. 2.6 (RTK, JEØ). 4 ind. Kåra, Ørin, V. 5.6-27.8 (TSø, TFo, KKz, HSø). 2 ind. Bulungneset, Børgin, Ste. 16.6 (Anton Nordgaard). 1 ind. Fossemvatnet, Ste. 17.6 (AVa). 1 ind. Litjholmen, Vestremsbukta, Lev. 28.6 (TRe). 1 ind. Klingsundet, Ste. 30.6 (AVa). 1 ind. Fiborgtangen, Lev. 27.7-2.9 (BAS, OMS). **Første høstfunn:** 50 ind. ptS Vellamelen, Ste. 5.9 (AVa). **Maksimaltall høsttrekk:** 3850-4000 ind. Klingsundet 19.9-20.9 (AVa, PIN). **Vinterfunn:** 6 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 1.12-8.12 (OMS, SNK, GSæ, KTL). 8 ind. Tynesfjæra, Lev. 11.12-12.12 (OMS, TSø, HaS).

Tundragås *Anser albifrons*

Mange av tundraeggessene ble underartsbestemt, og samtlige var av underarten *A. a. albifrons*, som hekker på tundraen i Sibir. Til sammen ble ca 18 ind. observert. De to observasjonene på høsten er trolig samme fugl. Foregående seks år ble følgende antall sett: 2008 (24), 2007 (14), 2006 (34), 2005 (ca 20), 2004 (20), 2003 (30). **Vårtrekk:** Ca 17 ind. i området Frosta-Steinkjer, i perioden 8.4-17.5. Største antall var 4 ind. Fiborgtangen, Lev. 3.5 (TRe). **Høsttrekk:** 1 ind. (albifrons) Marienborg, Eidsbotn 26.9-1.10 (TRe, OMS). 1 ad. (albifrons) Eidsbotn, Lev. 29.10 (TSø, IBu).

Grågås *Anser anser*

Første vårfunn: 1 ind. overflygende Ørin, V. 18.3 (OMS). **Maksimumstall:** Totalt ca 8615 ind. i Nord-Trøndelag 11.9-14.9 (mange observatører). **Maksimumstall på enkelt-lokaliteter:** Ca 2000 ind. Alnesfjæra, Lev. 2.9

(OMS). Min. 1300 ind. Storleiret, Fr. 7.9 (ESæ). Ca 1500 ind. Dalem, Sparbu, Ste. 12.9 (PIV, GSæ). 1480 ind. Måsøya, Ørin, V. 13.9 (TSø). Min 1000 ind. Seli, Leksdalsvatnet, Ste. 13.9 (OKA, EJo, TSø). **Seine høstfunn/vinterfunn:** 1 ind. Ørin, V. 21.11-1.12 (HSø, OMS, KTL).

Stripegås *Anser indicus* (E)


Frosta utgjør "kjerneområdet" for stripegås, hvor de største ansamlingene blir registrert, men i 2009 ble også Leksdalsvatnet bæret med en større flokk. Samtlige fugler som er sett i 2009 har trolig sitt utspring fra Frosta-fuglene, da det ikke er overlapp i datoene for de største flokkene på Tautra, Leksdalsvatnet og Storleiret. Totalt antall i Nord-Trøndelag blir da på 22 ind. i perioden 5.4-25.9. I 2008 ble minst 30 stripegæss registrert.

Alle funn: 3 ind. Galtvik, Fr. 5.4-12.4 (RPe). Tautra, Fr: 1-3 ind. 16.4-6.6, opptil 17 ind. 11.6-15.6 og opptil 22 ind. 19.7-29.8 (MMA, RPe m.fl.), høyeste antall 29.8 (OMS m.fl.). 2 ind. Fiborgtangen, Lev. 17.4 (IBu, JEØ, RTK). 2 ind. Klingsundet, Ste. 3.5 (Kjell Tore Hansen, Per Ivar Bergan, Aslaug Nastad). Leksdalsvatnet, V: 3 ind. 3.6 og 13-15 ind. 24.6-3.8 (BAS, IHa, KKz m.fl.). Opptil 20 ind. Storleiret, Fr. 21.8-21.9 (RPe m.fl.). 2 ind. Måsøya, Ørin, V. 22.8 (HSø). 1 ind. Alnesfjæra, Lev. 2.9 (OMS) og 25.9 (RRi). 1 ind. Fiborgtangen, Lev. 8.9 (OMS). 1 ad Rinnleiret, Lev. 21.9 (BAS).

Snøgås *Anser caerulescens* (DE)

Observasjonene er trolig av samme fugl. Fuglen var ringmerket på venstre fot, og er sannsynligvis en gjenganger fra tidligere år, bl.a. ble to ringmerka fugler sett i 2008.

Alle funn: 1 ind. Fiborgtangen, Lev. 29.4 (BNy, EBa, KKr). 1 ad rastende Falstadbukta, Lev. 30.4 (OMS). 1 ind. rastende Vikaleiret, I. 3.5-6.5* (Flemming Hansen, Arnfinn Nyeng).



Figur 1. Vårobservasjoner av hvitkinngås i Nord-Trøndelag i 2009.

Se tekst for nærmere detaljer.

Ringgås *Branta bernicla*

Alle funn: 1 ind. Salsnes, Fo. 3.5 (Trond Martin Sæterhaug). 125 ind. ptS Sklinna, Lk. 23.9-24.9 (PRh, MRh, GNi, HLi).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Antallene er som vanlig vanskelig å fastsette i Trondheimsfjorderområdet, da større eller mindre flokker og enkeltfugler blir sett rastende på flere lokaliteter i varierende antall over flere uker, og sannsynligvis er det fugler som også raster på flere lokaliteter over tid. Direkte trekkende flokker i ytre kyststrøk er noe enklere å tallfeste. **Vårtrekk:** Minst 50 ind. i perioden 4.4-10.5, i området Frosta-Snåsavatnet (figur 1). Høyeste antall på utvalgte lokaliteter: 10 ind. Tynesfjæra, Lev. 10.4 (TRe). 10 ind. Frøsetvågen, Ste. 12.4 (KAS, BES). 17 ind. Måsøya, Ørin, V. 14.4 (RTK). 9 ind. Rinnleiret, Lev. 15.4 (THa). Minst 16 ind. Fiborgtangen, Lev. 18.4 (TRe, OMS). 9 ind. Hammervatnet, Lev. 23.4 (AKo). 28 ind. Alnesfjæra, Lev. 2.5 (TRe). 20 ind. Murbrek, Snåsa 4.5 (BBE). 15 ind. Klingsundet 10.5 (Kjell Tore Hansen). **Øvrige vårfunn:** 3 ind. Litjøya, Overhalla 3.5 (AVa). **Høsttrekk:** 40-50 ind. i Trondheimsfjorderområdet i perioden 19.9-29.10, og 1 ind. 21.11. Høyeste antall på utvalgte lokaliteter: 10 ind. Tynesfjæra, Lev. 24.9 (RRi). 24 ind. Vellamelen, Ste. 24.10 (AVa). **Kystfunn:** 538 ind. ptS Sklinna, Lk. 28.9-30.9 (PRh, MRh, GNi). 200 ind. ptS Folda, Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø). 1-5 ind. Sandøya, Arnøyfjorden, Nø. 3.10-5.10 (Vigdis Kutschera, PIV)

Kanadagås *Branta canadensis*

Større antall: 117-200 ind. Seli/Sørli, Leksdalsvatnet, Ste. 5.12-12.12 (TSø, ASø, TFO).

Gravand *Tadorna tadorna*

Første vårfunn: 1 hann Storleiret, Fr. 3.3 (MVA). **Innlandsfunn:** 1 par Reppe, Lånke, Stj. 12.4 (KKr). 3 ind. Hammervatnet, Lev. 13.4 (SNK). **Større antall:** 28 ind. Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESæ). Opptil 40 ad Storleiret, Fr. 11.5-6.6 (RPe, TRe) 33 ad Halsøen, Stj. 10.6 (PIV, MHu). 34 ind. Tautra, Fr. 30.8 (TRØ). 44 ind. Alnesfjæra, Lev. 2.9 (OMS). **Siste høstfunn:** 1 1K Kuøra, Tautra, Fr. 5.11 (TSø).

Mandarinand *Aix galericulata* (CE)

Årets to funn er sannsynligvis samme fugl. Foregående seks år ble følgende antall sett: 2008 (2), 2007 (2), 2006 (1, samme ind. som i 2005), 2005 (1), 2004 (3), 2003 (0). **Alle funn:** 1 hann Falstadbukta, Lev. 9.5 (Flemming Hansen). 1 hann Høysjøen, V. 24.5 (Bjørn Arild Ardø).

Brunnakke *Anas penelope*

Vinterfunn: 2 M + 2 F Havfrua, Rinnleiret, V. 1.1-21.1 (TSø, HSø). 1 hann Hopla, Åsenfjord, Lev. 3.1-1.2 (MMY, AWi, PWB m.fl.). 18 ind. Ørin, V. 10.12 (TSø). 3 Ff Børgin, I. 20.12 (TRe). **Større antall:** 140 ind. rastende Rinnleiret, Lev. 29.9 (IHa).

Snadderand *Anas strepera*

18 ind. ble registrert i 2009. Ingen hekkfunn ble gjort, men 1-2 par er observert i Måsdammen på Tautra gjennom sommeren, hvor arten sist ble funnet hekkende i 2008. Foregående seks år ble følgende antall sett: 2008 (17), 2007 (15), 2006 (6), 2005 (27), 2004 (6), 2003 (13).

Alle funn: Opptil 2 par Tautra, Fr. 11.4-17.8 (TRe, OMo, TKo Fuglekjennskap/HiNT, KTL, GSæ). Opptil 3 M og 1 F Ørin, V. 26.4-14.5 (IJL, OMS, RTK m.fl.). 1 par Fiborgtangen, Lev. 30.4-17.5 (PIN, RTK, TRe, OMS m.fl.). 1 par og 1 F Falstadbukta, Lev. 2.5-5.5 (TRe, MMY, AWi, LKL). 1 hann Sandfærhus, Stj. 9.5 (BFu, BNy). 2 ind. Nord-Gustad, Falstadbukta, Lev. 14.7-15.7 (TRe, KKr). 1 M og 1 F. Fiborgtangen, Lev. 10.10 (TRe).

Krikkand *Anas crecca*

Vinterfunn (jan-feb): 1 M Levangerelvosen/Røstadlandet, Lev. 17.1-22.2 (TRe, OMS). 1 F Kausmo, Ørin, V. 29.1-22.3 (TSø, HSø). 1 F Hopla, Åsenfjord, Lev. 31.1 (HSø, Ola Sørhuus, Magnus Sørhuus). 1 M Hopla, Åsenfjord, Lev. 31.1-29.3 (TSø, PIN, JEØ, RTK m.fl.). 1 M Halsøen, Stj. 26.2-20.3 (PIV, BFu, OMS, RPe). **Vinterfunn (des):** 1 ind. Bunesbukta, Leksdalsvatnet, V. 10.12 (TSø, ASø). 1 M Hopla, Åsenfjord, Lev. 13.12-19.12 (MHu, TRe).

Stokkand *Anas platyrhynchos*

Større antall (over 500 ind.): 600 ind. rastende Mediå, G. 20.4 (Kåre Hallager). 500 ind. Storleiret, Fr. 3.10-4.10 (RPe). 528 ind. Halsøen, Stj. 22.11 (DOB). 556 ind. Ørin, V. 31.12 (HSø).

Stjertand *Anas acuta*

Vinterfunn (jan-feb): 1 F Fiborgtangen/Falstadbukta, Lev. 8.2-1.3 (TRe, TSø, PWB). **Vårtrekk:** 34 ind. i perioden 5.4-18.5. Største antall fra en lokalitet: 4 par Falstadbukta, Lev. 9.4 (TRe). **Sommerfunn:** 1 M Langøra nord, Halsøen, Stj. 20.6 (PIV). 1 Ff Fiborgtangen, Lev. 10.7-19.7 (TRe). **Høsttrekk:** 33 ind. i perioden 9.8-7.11. Største antall fra en lokalitet: 8 Ff Fiborgtangen, Lev. 8.9 (OMS). **Vinterfunn (des.):** 1 ad M Vellamelen, Ste. 15.11-13.12 (AVa). 1 Ff Børgin, I. 20.12 (TRe).

Knekkand *Anas querquedula*

Ca 10 ind registrert i 2009. Foregående seks år ble følgende antall sett: 2008 (14), 2007 (8), 2006 (6), 2005 (6), 2004 (7), 2003 (6). **Alle funn:** 1 M Rinnleiret, Lev. 25.4-26.4 (TRØ m.fl.). 2 M Måsdammen, Tautra, Fr. 26.4-22.5 (Per Jan Hagevik, JSa, RPe m.fl.). 1 par Ørin, V. 27.4 (SNK). 1 M Kåra, Ørin, V. 1.5 (HSø). 1 M Hammervatnet, Lev. 21.5-28.5 (OMS, RTK, TRe m.fl.). 1 M sone 1, Leksdalsvatnet 28.5-1.6 (TSø, EBa, AKo, PWB, TRe, MMY). 1 par sone 1, Leksdalsvatnet 29.5 (OKA, EJo). 1 par Hammervatnet, Lev. 31.5 (IBu). 1 ad F Måsdammen, Tautra, Fr. 14.7 (RPe).

Skjeand *Anas clypeata*

Alle funn: 1 M Kåra, Ørin, V. 10.4 (KAS, HSø, TRe, BES, OMS). Opptil 6 M + 4 F Tautra, Fr. 16.4-30.8 (MMa, LKL, MMy, AWi m.fl.), inkl. hekkefunn: 1 F + 4 pull Måsdammen, Tautra, Fr. 1.7 (RPe). 1 par Halsøen, Stj. 26.4 (MVa, PWB). 2 M Eidsbotn, Lev. 29.4 (EBa). 1 par Lundleiret, Ste. 1.5 (PIN). Opptil 4 ind. Ørin, V. 4.5-23.5 (OMS, Trond Martin Sæterhaug, AVa, Raymond Birkelund). 1 par Rinnleiret, Lev. 8.5 (OMS). 1 par Hammervatnet, Lev. 8.5-7.6 (EHu, TRe). 2 F Fiborgtangen, Lev. 16.8 (KKr). 2 F Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 18.8 (OMS). 1 F Ørin sør for Verdalselva, V. 15.9 (TSø).

Taffeland *Aythya ferina*

Arten opptrer sporadisk i fylket, og enkelte år er uten observasjoner. De siste seks årene er følgende antall sett: 2008 (4), 2007 (0), 2006 (1), 2005 (2), 2004 (0), 2003 (0).

Alle funn: 1 hunn sone 3 - Figgaoset, Leksdalsvatnet, Ste. 5.4 (AIn, IJI, KIn, Camilla Indahl).

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterfunn: 1 F Steinkjerelva, utløpet/Bogen, Ste. 5.1-7.2 (AKo, AVa, PIN, RTK, MSt). 1 M Langøra nord, Halsøen, Stj. 24.1 (SNK). 2 M Steinkjerelva, utløpet, Ste. 17.2 (AIn). **Maks antall vår:** 67 ind. Lømsen, Ste. 9.5 (Arild Espelien). **Maks antall høst:** 100 ind. Lømsen, Ste. 15.8 (AVa). **Hekkefunn i ytre kyststrøk:** 1 F m/4 pull i tjønn på Kalvøya, Vi. 29.7 (TRe, Eldar Bendiksen).

Bergand *Aythya marila*

Vinterfunn: 1 M + 3 F Steinkjerelva, utløpet, Ste. 3.1-30.1 (PIN, AVa, RTK). 1 2K M Halsøen, Stj. 7.2-29.3 (SNK, Petter Torvund Lund, TRØ, NKG m.fl.). **Vårfunn:** 13 ind. i perioden 26.3-22.5. **Funn fra potensielle hekkeområder:** 1 M Veresvatnet, Vera, V. 23.5 (IJI, TSø). 1 par Lenglingen, Li. 24.5 (JØ, IHa, PIN, RTK). 1 par Bjørkvatnet, Steinfjellet, R. 8.6 (TMy). **Høstfunn:** 16 ind. i perioden 15.8-19.11.

Ærfugl *Somateria mollissima*

Maksimumstall fra enkelte lokaliteter: 1300 ind. Tautra, Fr. 4.2 (PIN, JØ, RTK). 1487 ind. Straumen, I. 7.2 (HSø, RRI). 2580 ind. Vinge-Velvang, Stj. 22.3 (DOB). 1100 ind. Svaet sør molo, Tautra, Fr. 6.8 (TRe). 1640 ind. Verdalselva, Ørin, V. 8.10 (HSø). ca. 1500 ind. Straumen, I. 8.11 og 20.12 (SNK, TRe). 1200 ind. Svaet sør molo, Tautra, Fr. 19.12 (TRe). **Innlandsfunn:** 1 1K hann Hammervatnet, Lev. 29.11 (DOB, IBu).

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Den voksne hannfuglen fra Børgin/Straumen er en gjenganger, men i januar og mars fikk den selskap av to unge hanner. Voksenfuglen ble også sett i Mosvik, i juni i Straumen, og dukket opp i Straumen igjen på seinhøsten.

Alle funn: 1 ad M Straumen/Børgin, I. 1.1-14.3 (HSø, TMy, TRe, BAS m.fl.). 1 2K M Straumen, I. 4.1-21.3 (TRe, JØ, RTK m.fl.). 2 2K M Straumen, Inderøy 21.3 (HSø). 1 F



Stjertand hann Vellamelen 15. november 2009. Foto: Arne Vanebo.

Vinge-Velvang/Kleivan/Vikanbukta, Stj. 15.3-3.4 (PIV, ESa, TRØ, BNy, NKG). 1 ad M Mosvik, Mo. 16.5 (Arnold Lorentsen). 1 ad M Straumen, I. 22.6 (KKz). 1 ad M Børgin, I. 1.11-29.12 (AVa, OMS, HSø, TSø).

Havelle *Clangula hyemalis*

Store antall: 500 ind. Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESa). **Funn fra hekkeområder:** 1 M Finnkoisjøen, Me. 10.6 (TRe). 3 M + 1 F Nordre Lødølsjøen, Me. 21.6 (AWi). 1 M Grisbakfjella - Vestre Bukvassfjellet, Sn. 22.6-23.6 (TMy).

Svartand *Melanitta nigra*

Maksimumstall: 350 ind. Rinnleiret, Lev./V. 9.5 (KKr). 361 ind. Ørin, V. 9.5 (HSø). Trolig samme flokk på Rinnleiret og Ørin. 150 ind. Aglen, Otterøy, Na. 24.5 (TRe). **Hekkefunn:** 1 reir m/minst 4 egg Gaasejavrie, Sn. 17.6 (TMy). 1 reir m/6 egg Ulendeltaet, Li. 1.7 (RTK, OMø, JØ, PIN, IBu). 18 ind. (ukjent antall kull, trolig 2 kull) Lakadalen, V. 4.7 (IJI).

Brilleand *Melanitta perspicillata* NSKF

Denne nordamerikanske arten er funnet flere ganger i fylket, og alle funn er gjort i Trondheimsfjorden, med første funn april 1979 utenfor Langøra, Stj.

Alle funn: 1 M Ørin, V. og Rinnleiret, Lev. 7.5-12.5 (*JØ, *RTK, KIn, AIn, IJI m.fl.).

Sjørørre *Melanitta fusca*

Store antall: 780 ind. Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESa). 500 ind. Geisnes, Buøya, Nø. 15.5 (OSa). **Funn i hekkeområder:** 1 M + 1 ind. Finnkoisjøen, Me. 10.6 (TRe). 2 M i tjønn ved Tverrelva, Sn. 16.6 (TMy).

Kvinand *Bucephala clangula*

Store antall: 389 ind. Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESa).

Lappfiskand *Mergus albellus*

Alle funn: **Vårfunn:** 1 F Steinkjerelva, utløpet, Ste. 4.1 (TSø, ASø, PIN). 1 ad M Klingsundet, Ste. 29.3-25.4 (SMo, EMo, HSø m.fl.). 1 F

Klingsundet 5.4 (AKo). 1-2 M Hammervatnet, Lev. 10.4-20.4 (ETh, BFu, Arild Espelien m.fl.). 1 ind. Viosen-Semsøra, Sn. 12.4 (EJo, OKA). 1 M Tautra, Fr. 18.4 (KTL). 1 M flere lokaliteter i Leksdalsvatnet, Ste./V. 20.4-27.4 (IJI, HSø, PIN, TFo m.fl.). 1 par Leksdalsvatnet v/Tuset, V. 1.5 (Arild Lindgaard). **Hekkefunn:** 1 F m/5 pull Vikna komune 30.6 (TRe). 1 F på en annen lokalitet, Vikna 30.7 (TRe). **Høstfunn:** 1 F Hammervatnet, Lev. 19.10-8.11 (TRe, MHu, DOB). 1 ad F Nesvatnet, Lev. 5.11 (OMS). 1 M Hammervatnet, Lev. 19.11-23.11 (OMS, TSø, MHu, IBu m.fl.).

Siland *Mergus serrator*

Store antall: 209-301 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 14.9-15.10 (TRe, OMS, GSa).

Rødhøne *Alectoris rufa* (E)

Denne arten, som har sin naturlige utbredelse i Sør-Europa, er blitt satt ut i norsk natur gjentatte ganger, men uten at fuglene har klart å etablere levedyktige bestander (Bevanger 2005). Hvor Steinkjer-fuglen kommer fra, er ikke kjent.

Alle funn: 1 ind. Lundleiret, Ste. 7.6 og 11.7* (EMo, Vegard Sollie). Fuglen var merket med plaststrips på føttene.

Vaktel *Coturnix coturnix*

Antall ind. foregående år: 2008 (1), 2007 (13), 2006 (1), 2005 (1), 2004 (3), 2003 (3), 2002 (10).

Alle funn: 1 sy. Skaga, Nø. 29.5-20.8* (Preludia Welde m.fl.).

Smålom *Gavia stellata*

Nevneverdige maksimumstall: 72 ind. Svaet, Tautra, Fr. 15.3 (IJI). 27 ind. Lørvikleiret, Børgin, I. 15.3 (AVa). 25 ad Vinge-Velvang, Stj. 14.4 (ETh). 114 ind. Tautra, Fr. 30.8 (TRØ). 91 ind. pt Sklinna, Lk. 23.9-30.9 (PRh, MRh, GNi). 44 ind. Svaet, Tautra, Fr. 8.11 (DOB). **Hekkefunn:** Levanger (1) (Rune Johansen). Stjørdal (2) (KAS, Pål Klevan, PIV). Lierne (1) (MMy, TRe, PWB). Meråker (1) (Geir

Hammer). Snåsa (1) (TMy). Steinkjer (2) (Arnt Erik Bratberg). Verran (2) (OKA). Grong (1) (OMO). Utenom hekkefunn ble arten funnet på 17 potensielle hekkebiotoper i hekketida.

Storlom *Gavia arctica*

Vinterfunn: Opptil 2 ind. Tautra, Fr. 27.1-3.3 (PIN, JEØ, RTK m.fl.). 1 ind. Kåra, Ørin, V. 30.1 (RTK). 1 ind. Tautra nord, Svaet, Tautra, Fr. 12.11 (KKr, SNK). 1 ind. Storleiret, Fr. 31.12 (RPe). **Nevneverdige antall:** 21 ind. Tautra, Fr. 24.7 (Tore Vang). **Hekkefunn:** Frosta (1) (RPe). Mosvik (1) (Øyvind Soelberg, Jan Egil Larsen). Høylandet (1) (TRe). Steinkjer (1) (RTK, TMy, IHa, IBu). Snåsa (1) (TMy, PMø, RTK, IBu). Meråker (1) (Gjermund Gomo). Utenom hekkefunn ble arten funnet på 41 potensielle hekkebiotoper i hekketida.

Islom *Gavia immer*

Fuglen på Leksdalsvatnet var første funn for lokaliteten.

Alle funn: 1 2K Børgin, I. 3.1-20.2 (*TMy m.fl.). 1-2 ind. Åtlosanden, Fr. 10.1-27.2 (ASø, TSø, HaS, AWi, MMy, PWB). 1 ind. Svaet, Tautra, Fr. 10.1-13.1 (HaS, ASø, TSø, HSø). 7 ind. Leka, Lk. 16.2-18.2 (SNK). 1 ind. AUSA, Leksdalsvatnet, V. 6.6-8.6 (*AVa m.fl.). 1 ad Tautra, Fr. 7.9 (ESæ). 7 ind. trekkende Sklinna, Lk. 27.9-30.9 (PRh, MRh, GNi). 1 ind. Åtlosanden, Fr. 31.10 (TRe). 1 ind. Svaet nord molo, Tautra, Fr. 1.11 (OMS). 1 ind. Vinge-Velvang, Stj. 22.11 (DOB).

Ub. Is-/gulnebbblom *Gavia immer/adamsii*

Observasjonene fra Åtlosanden er sannsynligvis gulnebbblom.

Alle funn: Opptil 2 ind. Åtlosanden, Fr. 17.1-27.2 (AWi, MMy, PWB). 4 ind. trekkende Sklinna, Lk. 27.9-30.9 (PRh, MRh, GNi). 1 ind. Åtlosanden, Fr. 24.11 (JEØ, RTK).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

13 ind. i februar på Leka viser at de ytre kystområdene i fylket har et betydelig høyere antall enn i Trondheimsfjorden, men dessverre er det langt mellom besøk av ornitologer i ytre kyststrøk, og det reelle antallet er nok mye høyere enn de observasjonene som blir publisert.

Alle funn: 2 ind. Tautra, Fr. 3.1-18.4 (AWi, MMy, PWB m.fl.). 1 ind. Åtlosanden, Fr. 10.1 (HaS, TSø, ASø) og 12.4 (RTK, Torunn Lillian Norum). 13 ind. Leka 16.2-18.2 (SNK). 3 ind. trekkende Sklinna, Lk. 26.9-30.9 (PRh, MRh, GNi). 1 ind. Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø). 1 ad Åtlosanden, Fr. 31.10 (TRe). 2 ind. Tautra, Fr. 31.10-29.11 (TRe, OMS, AVa, DOB m.fl.).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Oppsummering: 9 ind. ble sett i januar-april og 9 ind. i september-desember. **Alle funn:** 2 ind. Børgin, I. 1.1-9.4 (HSø, PIN, TRe, AKo, RTK m.fl.). 1 ind. Levangersundet/Røstad, Lev. 4.1-12.4 (TRe, OMS, RTK). 1 ind. Svaet nord molo, Tautra, Fr. 10.1 (TSø, HaS, ASø). 1 ind. Hopla, Åsenfjord, Lev. 29.1-26.3 (BNy, TRe, TSø m.fl.). 1 ind. Fiborgtangen, Lev. 15.2 (BAS). 1 ind. Otterøy, Na. 18.2 (SNK). 1 ind.

Småland, Fr. 9.3 (MVe). 1 ind. Vinge-Velvang, Stj. 19.3 (OMS). 1 ind. Tautra/Nordfjæra, Fr. 18.9-31.10 (TRe, RPe, AWi). 3 ind. Korsen, Gjovr, I. 24.10 (Erlend Skutberg). Opptil 2 ind. Børgin, I. 14.11-22.12 (HSø, TSø, IJL, OMS m.fl.). 2 ind. Hopla, Åsenfjord, Lev. 6.12-19.12 (OMS, MHu, TRe). 1 ind. Levangersundet, Lev. 8.12-25.12 (OMS, TRe).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Oppsummering: 23 ind. i ble sett i januar-april og 27 ind. i august-desember. **Alle funn:** Opptil 5 ind. Børgin, I. 1.1-29.3 (HSø, TRe m.fl.). Opptil 14 ind. Tautra, Fr. 3.1-18.4 (PWB, AWi, MMy, HSø m.fl.). 2 ind. Røkke, Stj. 7.2 (EHu). 1 ind. Fiborgtangen, Lev. 14.2-15.2 (OMS). 1 ind. Falstadbukta, Lev. 14.3-9.4 (TRe). 2 ind. Tellebukta, Leksdalsvatnet, Ste. 26.8-10.9 (IHa, Roger Espen, TSø). Opptil 17 ind. Tautra, Fr. 7.9-19.12 (ESæ, TRe, AVa, TRØ m.fl.). 1 ind. Klingsundet, Ste. 19.9 (AVa). 2 ind. Storleiret, Fr. 3.10 (AVa). 1 ind. Kåra, Ørin, V. 15.10 (AKo). 4 ind. Børgin, I. 20.12 (TRe).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Nevneverdige makstall: 10 ind. Tautra, Fr. 3.3 (MVA). **Innlands-/ferskvannsfunn:** 2 ind. Seemsøra, Sn. 21.5 (BBE). 1 ind. Sandvika, Movatnet, Lev. 7.6 (TRe). 1 ad Klingsundet, Ste. 20.8 (AVa). **Sommerfunn:** Opptil 4 ind. Tautra, Fr. 5.8-8.8 (Torgeir Krokan, Emil Krokan, Terje O. Nordvik m.fl.).

Horndykker *Podiceps auritus*

Makstall januar-juni (over 20 ind.): 29 ind. Svaet, Tautra, Fr. 15.3 (DOB). 28 ind. Tronesbukta, V. 13.4 (HSø). 25 ind. Askundvatnet, Fr. 22.4 (MVA). 50 ind. Leksdalsvatnet 25.4 (SNK, Espen Viken). **Funn i hekkeområder:** I perioden april-juli ble ca 284 ind. registrert på 47 lokaliteter (Leksdalsvatnet delt opp på dellokaliteter) i 11 kommuner (Steinkjer 12 lok., Levanger 10, Verdal 9, Stjørdal 5, Snåsa 3, Frosta 2, Lierne 2, Høylandet 1, Leksvik 1, Nærøy 1, Verran 1). Dette omfatter maksimumstall på hver lokalitet, og noen av fuglene tidlig i perioden kan dreie seg om rastende fugler. Hekkende fugler er også inkludert. I forhold til den landsdekkende kartlegginga i 2007 og forrige LRSK-rapport (Reinsborg 2008, Reinsborg m.fl. 2009), er følgende lokaliteter nye: 4 ind. Seemsøra, Snåsavatnet, Sn. 1.5 (PMø). Opptil 1 par Reistaddammen, Lev. 3.5-3.7 (TRe). 2 ind. Skeistjønnna, Stj. 9.5 (JKS, VSk). Opptil 2 par Fårabotnen, Hammervatnet, Lev. 13.5-18.6 (JSa, Egil Ween). 2 ind. Tronsmoen, Vera, V. 16.5 (IJL, Svein A. Bratli). 3 ind. Engelsvatnet østre, Stj. 16.5 (PIV). 1 par Aunbukta, Snåsavatnet, Ste. 17.5 (PWB, MMy). 2 ind. Langåsdammen, Lev. 20.5 (OMS). **Makstall august-desember (over 20 ind.):** 32 ind. Lømsen, Ste. 2.8 (AVa). 48 ind. Tautra, Fr. 18.10 (TBo).

Havhest *Fulmarus glacialis*

Arten blir observert årlig på Sklinna, hvor den nylig er påvist hekkende. **Alle funn:** 2 par Sklinna, Lk. 29.6 (RTK, JEØ). 2 ind. Aglen, Otterøy, Na. 11.9 (TRe). 592 ind. trekkende Sklinna, Lk. 27.9-30.9 (PRh, MRh,

GNi). 1 ind. ptS Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø). 3 ind. Aglen, Otterøy, Na. 4.10 (OMS). 1 ind. Hasvåg, Fl. 20.10 (AVa).

Grålire *Puffinus griseus*

Årets funn fra Sklinna er de første i fylket siden 2002 da 3-5 ind. ble sett samme sted.

Alle funn: 12 ind. trekkende Sklinna, Lk. 19.9-29.9 (PRh, MRh, GNi).

Ub. Lire *Puffinus/Calinectris sp.*

5 ind. trekkende Sklinna, Lk. 26.9-29.9 (PRh, MRh, GNi).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

Sklinna er eneste kjente hekkeområde for arten i fylket.

Hekkefunn: 2 ind. med reir, unger hørt Sklinna, Lk. 19.9-24.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). 5 ind. besøker bebodd reir Sklinna, Lk. 19.9-24.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). **Øvrige funn:** 18 ind. ringmerket og 4 kontrollert med ring Sklinna, Lk. 19.9-27.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). 1 ind. Hasvåg, Fl. 20.10 (AVa).

Havsule *Morus bassanus*

Arten er svært sjelden å se inne i Trondheimsfjorden. Årets funn fra Mosvik og Børgin antas å dreie seg om samme individ.

Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ad ptS Lorentsenfjæra, Mo. 2.9 (Arnold Lorentsen). 1 1K+ Bossnesgrunnen, Børgin, I. 3.9* (Tor Gunnar Nilsen).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Ferskvannsfunn: Opptil 2 ind. Hammervatnet, Lev. 13.4-18.4 (KKr). 1 ind. AUSA, Leksdalsvatnet, V. 13.6 (Torgeir Møst). 1 ind. Svarthugguvatnet, Innhalen, V. 6.8 (Johnny Karlsen). Opptil 6 ind. Hammervatnet, Lev. 5.9-13.12 (KKr, OMS, GSæ, MHu m.fl.). 1 ind. bukt v/Furunes, Byavatnet, Lev. 15.11 (OMS). Opptil 6 ind. Hoklingen, Lev. 20.11-13.12 (MHu, TRe).

Storskarv, underarten sinensis

Phalacrocorax carbo sinensis
"Mellomskarv" er aldri sikkert påvist i fylket før, men med en økning i hekkebestanden i Sør-Norge fra 1990-tallet vil sannsynligheten for flere funn øke. Denne underarten kan imidlertid være vanskelig å skille fra den atlantiske nominatunderarten, da det er stor variasjon i hodetegningene, og sikker artsbestemmelse krever detaljstudier av hode og nebb. **Alle funn:** 1 ad Verdal havn, Ørin, V. 31.1 (TSø). 1 ad Lørvikleiret, Børgin, I. 7.2-22.3* (KKz, TSø, ASø, HaS). Opptil 3 Vikaleiret/Storleiret, Fr. 6.3-27.3 (RPe).

Kuhegre *Bubulcus ibis* NSKF

Første funn i fylket, og de to observasjonene dreier seg sannsynligvis om samme fugl. Et høyst uventet funn, også i nasjonal sammenheng. Kuhegre er kun funnet to ganger tidligere i Norge, begge i Finnmark. Utbredelsen er rundt Middelhavet, nærmest i Frankrike.

Alle funn: 1 ind. Lømsen og Stod, Ste. 13.6-19.6* (*OMS m.fl.). 1 ind. Vik, Fl. 20.6-21.6* (Hans A. Olsvik, AVa m.fl.).



Kuhegre Vik, Flatanger 20. juni 2009.
Bildet under er fra Skei ved Lømsen,
Steinkjer dagen i forveien.
Tredje funn i Norge!
Foto: Arne Vanebo.

Gråhegre *Ardea cinerea*

Nevneverdige makstall: 29 ind. Leka, Lk. 16.2-18.2 (SNK). 26 ind. rastende Mediå, G. 13.4 (OMo). 42 ind. Tautra, Fr. 18.10 (TBo). 25 ind. Børgin, I. 20.12 (TRe). **Hekkefunn i innlandet:** Reir m/3 pull Breide, Sn. 8.6 (JEO, RTK, IBu).

Vepsevåk *Pernis apivorus*

Årets funn fra Vera er det første funnet i fylket utenom Lierne siden 1996.

Alle funn: 1 ind. Strådalen, Vera, V. 29.7* (TMy).

Svartglente *Milvus migrans* **NSKF**

Årets funn fra Langåsdammen og Ulvilla vurderes å være samme ind. Dette er kun det tredje funnet av arten i fylket. Det første var fra Gjørø, I. 29.9.1997 og det neste fra Kolvereid, Nø. 14. og 17.7.2003.

Alle funn: 1 ind. Langåsdammen, Lev. 9.4 *(BAS). 1 ind. Ulvilla, V. 19.4-20.4 (Olav Vollen, IJI).

Glente *Milvus milvus* NSKF

Tredje funn av glente i Nord-Trøndelag. Første fugl ble sett i Ogdalen, Ste. 13.6.1995, og nr. to på Mule, Lev. 14.4.2008.

Alle funn: 1 ind. Berglimyra, Li. 8.5 (MVe).

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Ekstreme innlandsfunn: 1 ad Sul, V. 18.4 (WNo). 1 ad Vigdevatnet, Stj. 24.7 (PIV). 1 ad Juldalen, V. 28.8 (GSæ).

Sivhauk *Circus aeruginosus*

4 ind. vurderes å være involvert i årets funnmasse. Hannfuglen fra Hammervatnet antas å være samme ind. som dukket opp på Lømsen noen dager senere. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (4), 2007 (1), 2006 (1), 2005 (2), 2004 (2).

Alle funn: 1 M Hammervatnet, Lev. 21.5-28.5 (OMS, AKo, IHa). 1 F sone 1, Leksdalsvatnet, V. 1.6 (AKo). 1 M Lømsen, Ste. 4.6-4.7* (AVa, Trond Haugskott). 1 ad F Leka, Lk. 11.7 (TKo). 1 1K Elvheim, Sn. 13.8* (BBe).

Myrhauk *Circus cyaneus*

Totalt 3 ind. ble sett dette år, hvorav 1 ind. på høsttrekk. 2 ind. er fordelt på to potensielle hekkeplasser (publiseres ikke med detaljer) i Verdal (IJI) og Meråker (Gjermund Gomo) kommuner. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (5), 2007 (0), 2006 (3), 2005 (4), 2004 (1).

Høsttrekk: 1 ind. Leksvik, Lks. 9.8 (Per Tømmeraas).

Musvåk *Buteo buteo*

Totalt 2 ind. er godkjent for publisering. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (2), 2007 (1), 2006 (0), 2005 (3), 2004 (0).

Høsttrekk: 1 ind. Leangsforden, Åsenfjord, Lev. 24.8 (MHu). 1 ind. Sandfærhus, Stj. 15.9 (PIV).

Fjellvåk *Buteo lagopus*

Første vårfunn: 1 ind. Ulvilla, V. 12.4 (IJI).

Kongeørn *Aquila chrysaetos*

I 2009 ble det i regi av NINA igangsatt et flerårig kartleggingsprosjekt på arten. Dette året ble imidlertid meget dårlig i sørdelen av fylket (hvor kartleggingene hovedsakelig foregikk). Flere kjente reir, samt noen nye områder ble kartlagt i Stjørdal, Meråker, Levanger og Verdal. I Verdal produserte 2 par en unge hver, mens en hekking i Levanger ble mislykket (minst en unge utklekt, men døde). Det var hekkeindikasjoner på ytterligere en lokalitet på Levanger, men reir ble ikke funnet. I Stjørdal og Meråker ble ingen unger produsert. Hekkefunnet i Levanger var det første kjente i nyere tid.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Hekkefunn (lokaliteter pr. kommune): Verdal (1). Steinkjer (1). Snåsa (5). Lierne (2). Øvrige funn i hekketida fra potensielle hekkeområder angis kun med antall funn pr. kommune: Verdal (3). Inderøy (1). Steinkjer (1). Snåsa (2). Grong (1). Lierne (4). Røyrvik (1). **Øvrige funn:** 1 ind. overflygende Hestdalen, Lks. 16.4 (HPa). 1 ind. overflygende Ausa, Leksdalsvatnet, V. 24.4-3.5



Svartglente Langåsdammen, Levanger 9. april 2009. Foto: Bjørn Arild Steinsmo.



Sivhauk Seemsøra, Snåsa 13. august 2009. Foto: Bjørn Berg.



(Camilla Indahl, AIn, KIn m.fl.). 1 ind. Rinnleiret, Lev. 26.4 (KAS, BES). 1 ind. Grønøra, Snåsa, Sn. 28.4-5.5 (PMø, BBe). 1 ind. ptN Høgberga, Nevra, Stj. 30.4 (PIV). 1 ind. Klingsundet, Ste. 8.5-10.5 (AKo, TGi, PMø). 1 ind. Ørin sør for Verdalselva, V. 8.5 (KKz). 1 ind. Lømsen, Ste. 9.5-16.8 (AVa, Espen Lie Dahl, TRe). 1 ind. Holmen Gård, Vuku, V. 14.5 (AIn, Bodil Indahl). 1 ind. Sandfærhus, Stj. 14.6 (MMA). 1 ad Nordkringen, Flora, Stj. 28.8 (Gunnar D. Fordal).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Vinterfunn: 1 ind. Alstad, Fr. 13.1 (RPe). 1 ind. m/ring Fiborgtangen, Lev. 28.11-31.12 (OMS, TSø, ASø m.fl.).

Dvergfolk *Falco columbarius*

Vinterfunn: 1 2K Ff funnet død Stokkan ungdomsskole, Stj. 2.2 (Petter Torvund Lund). 1 ind. Tømmerdalen, Lks. 3.3 (HPa). **Hekkefunn i lavlandet:** 1 reir Leangsfjorden, Åsenfjord, Lev. 25.5-29.5 (MHu). 1 ind. m/mat til unger Kalvøya, Vi. 29.7 (TRe, Eldar Bendiksen).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

Hele 4 ind. er rapportert dette år, og utgjør funn nr. 13-16 i fylket. Tidligere funnår er følgende: 1986, 1990 (2), 1995 (2), 1998, 2003, 2004, 2005 (2), 2006 og 2007.

Alle funn: 1 ind. Kvelia, Li. 10.5 (MVe, Leif Arne Lien). 1 ind. Lømsen, Ste. 13.5 (MVA). 1 2K Ulendeltaet, Li. 26.6 (JEØ, RTK). 1 ind. Tobakksgrubba, Sørli, Li. 6.9 (MMY, PIV, AWi, MVe, TGi, PWB).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Vinterfunn: 1 2K Klostergården, Tautra, Fr. 4.2* (PIN, JEØ, RTK). 1 ind. Ørin, V. 17.9-3.12* (ASø, TKo, Magnus Sørhuus, TSø, HSø m.fl.). **Funn utenom hekkeområdene:** 1 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 18.4 (OMS). 1 ind. Levanger sykehus jernbaneholdeplass, Lev. 18.9 (OMS). 1 1K M Sklinna, Lk. 20.9-24.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). **Hekkefunn:** En hekking er rapportert fra Snåsa (TMy).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Vandrefalkprosjektet i Trøndelag foretar kartlegging av hekkelokalteter i Nord-Trøndelag, og i 2009 ble 27 av 34 kjente eller potensielle lokaliteter besøkt. Resultatet var 17 okkuperte territorier, og vellykket hekking ble konstatert på 6 lokaliteter (Nygård & Reinsborg 2010). **Vinterfunn:** 1 ad Ørin industriområde, V. 16.1 (RTK). 1 ad Skaget, Tautra, Fr. 8.2 (PIN, TMy, RTK). 1 ind. Leka, Lk. 16.2-18.2 (SNK). 1 2K Straumen, I. 8.3 (KKz).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Med 2 ind. registrert om våren og 6 ind. om høsten ble årstotalen på 8 ind. Dette er den beste forekomsten siden 2004. Foregående fem år ble følgende antall registrert: 2008 (1), 2007 (2), 2006 (3), 2005 (3), 2004 (13).

Alle funn: 1 sy. Hammervatnet, Lev. 16.4-20.4 (OHe, TKv, OMS, OMø). 1 sy. Bergshølen, Stj. 30.5 (BFu). 1 ind. Hammervatnet, Lev. 6.9-29.11 (TRe, Dag Gøran Lyng, RTK, IBu m.fl.). Opptil 2 ind. Barsjøen, V. 19.9-21.9 (IJI,

AIn). 1 ind. Måsdammen, Tautra, Fr. 19.10-27.11 (TRe). 1 ind. Liavatnet østende, Fr. 19.10 (TRe). 1 ind. Bunesbukta, Leksdalsvatnet, V. 26.11 (TSø).

Åkerrikse *Crex crex*

Det ble registrert et gledelig meget høyt antall med 6 ind. av arten dette år. Vi må tilbake til 2002 for å finne sammenlignbare antall da 7 ind. ble registrert. Foregående ti år ble følgende antall registrert: 2008 (0), 2007 (1), 2006 (0), 2005 (0), 2004 (0), 2003 (1), 2002 (7), 2001 (1), 2000 (1), 1999 (7).

Alle funn: 1 sy. Strøm, Flatanger, Fl. 17.5-10.6 (*Olav Strøm, *Berit Hestnes, AVa) og Leite, Einvika, Fl. 14.6 (Jon Olav Vollen). 1 sy. Stamnes, Bartnes, Ste. 1.6-14.6 (*Åsbjørn Holien, AVa, m.fl.). 1 sy. Haugtun, I. 8.6 (*RTK, *JEØ, Eivind Andre Østnes, IBu). 1 sy. Auran, Stj. 23.6-23.7 (*JAA m.fl.). 1 sy. Østre Elnes/Nessimoen, Helgådalen, V. 5.7-5.8 (IHa, AKo, TSø m.fl.). 1 sy. Kolås, Ste. 30.7-9.8 (*Leif Arne Sæheim, PIN).

Sivhøne *Gallinula chloropus*

Denne arten foreligger det svært få funn av, og vi må tilbake til 2005 for å finne forrige funn. Da ble 1 ind. registrert på Dragsvågen i Vikna 28.4-3.5. Årets funn er nr 28 etter 1970 i fylket. De fleste funn er gjort i Hammervatnet og i Ytre Namdalen.

Alle funn: 1 1K Hammervatnet, Lev. 22.11 (DOB).

Sothøne *Fulica atra*

Vinterfunn: 1 ind. Hopla, Åsenfjord, Lev. 30.1-12.2 (TRe, TSø, HSø m.fl.). 6 ind. Hammervatnet, Lev. 1.12-6.12 (OMS, KTL, TRe). 1 ind. Storleiret, Fr. 25.12 (RPe).

Hammervatnet, Lev.: Opptil 22 ind. 9.4-6.12 (AWi, Ole Herman Winnem, EHu m.fl.) med makstall 29.8 (JSa). Hekking: 4 pull 13.6-17.6 (TRe, KKz). **Måsdammen, Tautra, Fr.:** Opptil 6 ad 11.4-23.8 (TRe, OMS, GSæ, OMø m.fl.) med makstall 17.8 (TRe). Hekking: Opptil 5 pull 1.6-17.8 (RPe, TRe, Egil Ween m.fl.). **Ausa, Leksdalsvatnet, V.:** Opptil 2 ind.

11.4-14.6 (HSø, AWi, AIn, TRe m.fl.) med makstall 19.4 (IHa). **Lømsen, Ste.:** Opptil 6 ad 25.4-21.10 (AVa, Arnt Erik Bratberg, OKA, EJo m.fl.) med makstall 9.-20.5 (AVa). **Øvrige funn:** 1 ind. Klinga, Leksdalsvatnet, V. 12.4 (IJI). 1 ind. Reistaddammen, Okkenhaug, Lev. 3.5 (TRe). 1 ind. Sandvika, Movatnet, Lev. 3.5 (TRe). Opptil 3 ad Lynvatnet, Lev. 3.5-1.11 (TRe). 1 ind. sone 2 - Tjelderenget, Leksdalsvatnet, V. 6.5-10.5 (TSø, AIn, IJI m.fl.). 1 ind. Klingsundet, Ste. 9.5 (TRe). 1 ind. Nesvatnet, Lev. 16.5 (TRØ). 1 ind. Liavatnet, Vassbygda, Stj. 17.5 (PIV). 1 ind. Settenvatnet, Ste. 19.5 (PIN). 2 ad Hojemstjønna, Finne, Lev. 21.6-13.9 (TRe). 1 ind. Haukå, Leksdalsvatnet, V. 1.10 (TSø, ASø).

Trane *Grus grus*

Første vårfunn: 2 ind. Kvam, Klingsundet, Ste. 4.4 (John Haugen). **Maksimumstall fra rasteplassene på høsttrekk:** Overhalla 332 ind. 12.9 (AVa, OMø). Grong 65 ind. 11.9 (OMø). Snåsa 67 ind. 12.9 (BBe). Klingsundet,

Ste. 256 ind. 1.9 (AVa). Figgadalen, Ste. 307 ind. 12.9 (PIV, GSæ). Verdal 234 ind. 5.9 (HSø). Ronglan, Lev. 239 ind. 11.9 (MHu). Stjørdal 81 ind. 13.9 (PIV). Årets nasjonale tranetelling helga 12.9-13.9 ga som resultat i Nord-Trøndelag totalt 1525 ind. Av 1070 aldersbestemte fugler var 1002 ad og 68 1K (6,36 %) og 35 kull ble registrert (PIV/Trøndelag tranegruppe).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Vinterfunn: Opptil 170 ind. Kåra, Ørin, V. 1.1-22.2 (HSø, TSø, IJI m.fl.). 1 ind. Vinge-bukta, Vinge-Velvang, Stj. 30.1-1.2 (EHu, KKr, DOB). 1 ind. Levangerelvosen/Røstadlandet, Lev. 7.2 (TRe). Opptil 145 ind. Kåra, Ørin, V. 1.12-31.12 (JEØ, TSø, OMS, KTL m.fl.). 2 ind. Vikaleiret, I. 26.12 (TMy). 1 ind. Levangersundet, Lev. 27.12 (OMS).

Større antall: 485 ind. Ørin sør for Verdalselva, V. 26.3 (HSø). 350 ind. Lundleiret, Ste. 7.4 (PIN). 376 ind. Kalvøya, Ste. 13.4 (PIN). 378 ind. Kåra, Ørin, V. 25.7 (TRe). 300 ind. Ørin, V. 12.9 (TKv, OHe, Eva Sofie Dahlø, Charlotte Hallerud).

Dverglo *Charadrius dubius*

2 ind. ble registrert på vårtrekk, og i år som i fjor ble arten registrert med hekkeindikasjon på Væremøra. Foregående fem år er følgende antall sett: 2008 (en hekkeindikasjon), 2007 (1), 2006 (1 + en hekkeindikasjon), 2005 (0), 2004 (0).

Alle funn: 2 ind. Sjødammen, Tautra, Fr. 19.5 (RPe). 1 ad varslende Væremøra, Værem, G. 18.6-19.6 (TRe).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Tidlig vårtrekk: 2 ind. Skagbukta, Tautra, Fr. 3.3 (RPe). 1 ind. Kuøra, Tautra, Fr. 3.3 (RPe). **Større antall:** 113 ind. Lundleiret, Ste. 31.7 (PIN). 147 ind. Ørin, V. 8.8 (IBu). 150 ind. Tautra, Fr. 30.8 (TRØ).

Boltit *Charadrius morinellus*

Det ble registrert 1 ind. på vårtrekk og minst 2 ind. på høsttrekk, mens det var ingen registreringer fra hekkeområdene dette år. Arten er meget sjelden å se i fjæreområdene på høsttrekket, og dette året ble arten registrert både på Tautra og Storleiret på Frosta.

Alle funn: 1 F Åsanfeltet, Forradal, Stj. 10.5 (PIV). ? ind. Tautra, Fr. 2.8 (KTL). 1 ind. Storleiret, Fr. 5.8 (RPe).

Heilo *Pluvialis apricaria*

Første vårfunn: 6 ind. Vinge-Velvang, Stj. 10.4 (TRØ). **Større antall:** 500 ind. Sætersmyra, Lev. 28.4 (OMS).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Seint høstfunn: 1 ind. Tautra, Fr. 15.10-3.11 (RPe, TRe, OMS m.fl.).

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterfunn: 1 ind. Tronesbukta, V. 1.1 (TFo). **Første vårfunn:** 3 ind. Kalvøya, Ste. 9.3 (EMø). **Seint høstfunn:** 1 ind. Tautra nord, Fr. 12.11 (KKr, SNK).



Jaktfalk Ørin, Verdal 17. september 2009. Foto: Terje Kolaas.

Polarsnipe *Calidris canutus*

Kun 1 ind. ble sett på vartrekket dette året. Til sammenligning ble over 80 ind. registrert i 2008.
Vårtrekk: 1 ind. Ørin, V. 18.5 (OMS).

Sandløper *Calidris alba*

Sommerfunn: 1 ad Granabukta, Sn. 16.6 (BBE). **Øvrige funn:** 1 ind. Ørin, V. 28.7 (OMS, Dag Gøran Lyng, GSæ). 1 ad Folvika, Vikanbukta, Stj. 31.7 (PIV). Opptil 4 ind. Kåra, Ørin, V. 5.9-27.9 (IBu, IHa, JEØ m.fl.). 1 ind. Tautra, Fr. 11.9 (RPe). 3 1K Aglen, Otterøy, Na. 12.9 (ASø, TSø, TRe). 1 1K Rinnleiret, Lev. 19.9 (TRe). 1 1K Lundleiret, Ste. 2.10 (PIN, RTK). 1 ind. Skagbukta, Tautra, Fr. 7.10 (RPe).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

I årets funnmasse vurderes ca 23 ind. på vårtrekk i perioden 16.5-28.5 med 10 ind. som høyeste antall, og ca 34 ind. på høsttrekk i perioden 26.7-8.9 med 9 ind. som høyeste antall. Hekkeindikasjoner av 1 par rapporteres fra Tautra og Ørin ved fjorden, mens i fjellområdene er 1 ind. rapportert fra Lakadalen i Verdal.
Hekkeindikasjoner: 2 ind. Tautra, Fr. 17.5-19.7 (RPe, TRe). 1 ind. Lakatjønn, Lakadalen, V. 16.6 (RTK, JEØ, Harald Sletten). 2 ind. Moloen Ørin-Nord, Ørin, V. 11.7 (HSø).

Alaskasnipe *Calidris melanotos* NSKF

Årets funn er det sjuende i fylket og det første for Frosta. Rinnleiret og Ørin har to funn hver, mens de andre er fra Halsøen og Fiborgtangen. Foregående funnår er 2004, 2001, 1997, 1993 og 1989 (2).
Alle funn: 1 ad Sjødammen, Tautra, Fr. 16.7-17.7* (*TRe, OMS, GSæ, RPe, AWi, MHu).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Større antall: 17 ad Sjødammen, Tautra, Fr. 11.7 (RPe).

Fjæreplytt *Calidris maritima*

Større vinterflokker: 65 ind. Kausmo, Ørin, V. 7.2 (TSø). 62 ind. Lundleiret, Ste. 21.3 (AVa).
Hekkeindikasjoner: 1 ind. Gilså gruve m/omegn, Gilsåfjellet, Me. 10.6 (TRe). 1 par Bukvassfjellet, Sn. 24.6 (TMy).

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterfunn: 1 ind. Tautra, Fr. 3.1-3.3 (MMy, AWi, PWB, RPe). Opptil 24 ind. Kåra, Ørin, V. 22.1-28.3 (TSø, RTK, OMS m.fl.). Opptil 18 ind. Kåra, Ørin, V. 1.12-29.12 (KTL, OMS, TRe). **Større antall:** 100 ind. Tautra, Fr. 30.8 (TRØ, NKG). **Hekkeindikasjoner:** 4 ind. Gilså

gruve m/omegn, Gilsåfjellet, Me. 10.6 (TRe). 5 ind. Sæterfjellet, V. 15.6 (RTK, JEØ, Harald Sletten). 1 sy. Semseteren, Snåsaheia, Sn. 18.6 (Jens Gaundal). 1 ind. varslende Gosen, Sanddøla, Li. 8.7 (OMo).

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus*

Det ble gjort ett funn fra en av få kjente hekkelokaliteter for arten i fylket, mens det var ett funn fra høsttrekket. De siste fem foregående år er 2 ind. registrert i 2005 og 1 ind. i 2008, alle fra høsttrekkperioden.
Alle funn: 1 ind. Johannesmyrin, Sæterfjellet, V. 17.6 (RTK, Harald Sletten, JEØ). 1 ind. Tautra, Fr. 11.9 (RPe).

Brushane *Philomachus pugnax*

Første vårfunn: 1 M sone 1, Leksdalsvatnet, V. 27.4 (AKo). **Hekkeindikasjoner:** 2 M AUSA, Leksdalsvatnet, V. 14.6-27.6 (TRe, AKo, KKr). 1 F rugende Finnvollan, Gaundalsstien, Sn. 1.7 (TMy). **Større antall:** 14 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 5.8 (OMS). 17 ind. sone 2 - Tjelderengen, Leksdalsvatnet, V. 13.9 (TSø). 12 ind. Stjørdalshalsen, Stj. 14.9 (John Lang Wilson).

Kvartbekkasin *Lymnocyptes minimus*

Til sammen 9 ind. ble registrert dette år. 1 ind. ble registrert i februar, 1 ind. på vårtrekk og 7 ind. på høsttrekk. 2 ind. i Snåsa holdt seg fra oktober til inn i desember måned.

Vinterfunn: 1 ind. Leka, Lk. 16.2-18.2 (SNK). 2 ind. Gran, Sn. 9.12 (PMø). **Vårtrekk:** 1 ind. Tautratun, Tautra, Fr. 19.4 (TSø). **Høsttrekk:** 2 ind. Gran, Sn. 8.10-25.10 (PMø, HSø, Ragnhild Mølnvik). 2 ind. Østre strandeng, Sandfærhus, Stj. 16.10 (TRe). 1 ind. Rinnleiret, Lev. 18.10-27.10 (TRe, Erlend Skutberg), funnet død sistnevnete dato (RTK, JEØ). 1 ind. Lømsen, Ste. 21.10 (AVa). 1 ind. Haukå, Leksdalsvatnet, V. 25.10-28.10 (TMy, RTK, HSø, JEØ).

Enkeltebekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterfunn: 1 ind. Vinge-Velvang, Stj. 25.2 (AWi, MMy). 1 ind. Gran, Sn. 11.11-9.12 (PMø).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Mange spillplasser, både gamle og nye, ble funnet i 2009, som et resultat av et kartleggingsprosjekt i regi av Høgskolen i Nord-Trøndelag. Funndetaljer blir ikke publisert, kun antall individer og lokaliteter. Det var ingen registreringer fra trekket.

Antall spillende ind./lok: **Meråker:** 34 ind./6 lok. (TRØ, KIU, PIV, KKr). **Stjørdal:** 2 ind./1 lok. (TRØ). **Levanger:** 44 ind./2 lok. (TRe, ETh, Christian Tiller). **Verdal:** 57 ind./7 lok. (RTK, JEØ, TMy, IJI, TSø, Harald Sletten, Steinar Sellæg). **Steinkjer:** 1 ind. (ikke spill)/1 lok (PIN). **Snåsa:** 1 ind. (ikke spill)/1 lok. (TMy).

Rugde *Scolopax rusticola*

Vinterfunn: 1 ind. Tautra, Fr. 10.2 (Arne Moksnes). **Første vårfunn:** 2 spill Husbymarka, Stj. 2.4 (BNy).

Svarthalespove *Limosa limosa*

I vårtrekkperioden er 9 ind. antatt og er en forholdsvis god forekomst. Høsttrekkperioden var noe svakere med 6 ind. registrert. På Tautra holdt 3 ind. (sammen med en lappspove) seg helt til 18. oktober. Totalen for året var på 15 ind. og er en god forekomst sammenliknet med de siste fem år. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (11), 2007 (10), 2006 (16), 2005 (7), 2004 (12).

Alle funn: Vårtrekk: 1 ind. (*islandica*) Tautra, Fr. 22.4-27.4 (MVa, RPe). 1 ad (*islandica*) Tangen, Halsøen, Stj. 23.4-8.5 (John Lang Wilson, PWB, MHu, SNK). 1 ind. (*islandica*) Fiborgtangen, Lev. 28.4-17.5 (MSt, EBa, BNy m.fl.). 1 ind. Ørin, V. 28.4-2.5 (TSø, IHa, HSø, IJI). 1 ind. AUSA, Leksdalsvatnet, V. 3.5 (MMy, LKL, AWi). 1 ind. Figgaset, Steinkjerfjorden, Ste. 5.5 (OMS, MSt). Opptil 2 ind. Tautra, Fr. 8.5-6.6 (JAA, RPe, JSa, Lorentz Noteng, MMA). 1 ind. (*islandica*) Frøsetvågen, Ste. 10.5 (KAS, BES). **Høsttrekk:** 2 ind. Kåra, Ørin, V. 11.7 (HSø). 1 ind. Tangen, Halsøen, Stj. 14.9 (John Lang Wilson). 3 ind. Tautra, Fr. 30.9-18.10 (BAS, IJI, TRe m.fl.).

Lappspove *Limosa lapponica*

Første vårfunn: 1 ind. Lørvikleiret, Børgin, I. 18.3 (OMS). **Innlandsfunn:** 1 ad. Seemsøra-Viosen, Sn. 27.7 (BBe).

Småspove *Numenius phaeopus*

Første vårfunn: 2 ind. Kåra, Ørin, V. 25.4 (Per Jan Hagevik).

Storpspove *Numenius arquata*

Vinterfunn: 1 ind. Halsøen, Stj. 3.1-23.1 (AWi, PWB, MMy, PIV m.fl.). 1 ind. Straumen, Børgin, I. 15.1-14.3 (TSø, JEØ, RTK, TRe m.fl.). 2 ind. Leka, Lk. 16.2-18.2 (SNK). **Større antall:** 50 ind. rastende Lundleiret, Ste. 10.4 (KAS, BES).

Sotsniipe *Tringa erythropus*

Til sammen 7 ind. ble sett dette år, hvorav to vårfunn som er relativt sjelden i fylket. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (3), 2007 (4), 2006 (4), 2005 (14), 2004 (0). **Alle funn: Vårtrekk:** 1 ind. Ørin, V. 3.5-5.5 (TSø, HSø, JEØ, RTK, Håkon Sørheim m.fl.). 1 ind. hørt på trekk Snåsa 6.5 (BBe). **Høsttrekk:** Opptil 2 ad Sjødammen, Tautra, Fr. 11.7-31.7 (RPe, Morten Günther, Andreas Günther, TRe, OMS, GSa, Tore Vang). 1 ad Lundleiret, Ste. 14.7-28.7 (AVa, PIN). 1 ind. Langøra nord, Halsøen, Stj. 27.7 (KKr). 1 1K rastende Folvika, Vikanbukta, Stj. 31.7 (PIV).

Rødstilk *Tringa totanus*

Vinterfunn: Opptil 20 ind. Tautra/Nordfjæra, Fr. 3.1-mars (AKo, TGi, MMy, AWi, PWB m.fl.) med makstall 3.3 (Kjell Larssen). Opptil 11 ind. Tautra, Fr. 3.11-28.12 (Mari Silje A. Norum, Erlend Skutberg, RTK, TSø m.fl.) med makstall 6.11-8.11 (Alfred Brødreskift, Odd Rygh, AVa).

Gluttsniipe *Tringa nebularia*

Første vårfunn: 1 ind. Måsdammen, Tautra, Fr. 20.4 (RPe). **Større antall:** 20 ind. Lundleiret, Ste. 2.5 (AVa). 31 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 31.7-7.8 (OMS, GSa, TRe).

Skogsniipe *Tringa ochropus*

Første vårfunn: 1 ind. Grasenga, Ørin, V. 9.4 (AWi, IJI, Ole Herman Winnem). **Seint funn:** 1 ind. Lømsen, Ste. 16.10 (TMy, SNK).

Strandsniipe *Actitis hypoleucos*

Første vårfunn: 2 ind. Langåsdammen, Lev. 23.4 (BAS). **Større antall:** 19 ind. Vellamelen, Ste. 29.7 (AVa).

Steinvender *Arenaria interpres*

Funn fra Trondheimsfjorden: Opptil 3 ind. Tautra, Fr. 3.3-3.11 (Kjell Larssen, TRe, MVe, GSa m.fl.). 1 ind. Ørin sør for Verdalselva, V. 3.8 (Christian Wexels Riser).

Svømmesniipe *Phalaropus lobatus*

Alle funn: Vårtrekk: 1 ind. Sjødammen, Tautra, Fr. 11.6 (RPe).

Hekkeindikasjoner: 1 ind. Lakatjønnå, Lakadalen, V. 16.6 (RTK, Harald Sletten, JEØ).

2 ind. Nordre Løddølsjøen, Me. 21.6 (AWi). 1 ind. Bjørkmo, R. 3.8-5.8 (EJo, Beate Johansen). **Høsttrekk:** 1 ind. Måsdammen, Tautra, Fr. 29.7 (RPe, Tore Vang). 2 ind. Verdalselva, Ørin, V. 7.8-8.8 (OMS, TSø, HSø m.fl.). 1 hann Sone 2- Dalemark, Leksdalsvatnet, V. 17.8 (IHa). 1 ind. Eidesøra, Eidsbotn, Lev. 17.8 (OMS).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Årets funn av 8 trekkende ind. fra Sklinna er den beste registrerte forekomsten i fylket siden rekordåret 1991 da det var en masseforekomst av minst 184 ind. på vårtrekk. Siden 1970 er det inkl. årets funn registrert 201 ind. i fylket. Foregående funnår (ind.) etter 1970: 2007 (1), 2005 (2), 2004 (2), 2002 (1), 2001 (1), 1997 (2), 1996 (2), 1993 (2), 1991 (184), 1985 (3), 1982 (1).

Alle funn: 8 ind. trekkende Sklinna, Lk. 24.9-30.9 (PRh, MRh, GNi, HLi).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Innlandsfunn: 1 ind. Langmyr, O. 12.5 (Kjartan Trana). **Funn fra Trondheimsfjorden:** 1 ind. Fugletårnet, Ørin, V. 14.6 (TSø). 1 ind. Skagbukta, Tautra, Fr. 16.7 (TRe, OMS, GSa). 5 ind. Tautra, Fr. 24.7 (Tore Vang). 1 ind. Velvang, Vinge-Velvang, Stj. 30.7 (Bente og John Elveland). 1 ind. Småskjæra, Åsenfjord, Lev. 6.8 (Bente og John Elveland).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

I trekkidene ble 5 ind. registrert på vårtrekk og 2 ind. på høsttrekk. Det var noen funn fra hekkeområdene, men det er lite trolig at det var noen hekkinger av omfang pga lite smågnagere. Selv ett varslende ind. i begynnelsen av juni trenger ikke å indikere at hekking har funnet sted, da arten ofte kan forsvare territorium selv om den ikke har egg og unger.

Alle funn: Vårtrekk: 5 ind. ptNØ Aglen, Otterøy, Na. 24.5 (TRe). **Funn fra hekkeområdene:** 1 ind. varslende Østre Sulsjøen, V. 7.6 (WNo). 4 ad Gilså gruve m/omegn, Gilsåfjellet, Me. 10.6 (TRe). 15 ad Nordre Løddølsjøen, Me. 21.6 (AWi). 1 ad Ulendeltaet, Li. 26.6 (JEØ, RTK). **Høsttrekk:** 1 ad Hasvåg, Fl. 9.8 (AVa). 1 ad pt Sklinna, Lk. 24.9 (PRh, MRh, GNi, HLi).

Storjo *Stercorarius skua*

Alle funn: 1 ind. Lyngværet, Fl. 8.6 (Ole Martin Dahle). 1 ind. Kvernøya, Fl. 9.6 (Ole Martin Dahle). 5 ind. pt Sklinna, Lk. 23.9-28.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). 1 ind. Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø).

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus* **NSKF**

Dette er det femte funnet i fylket. Tidligere funn er gjort på Sandfærhus, Stj. 5.6.1991, Horvereid, Nø. 28.10.1993, Eidsbotn, Lev. 1.6.1995 og Ørin, V. 27.5.1997. Årets fugl kan være samme fugl som ble sett i Trondheim tidligere på høsten.

Alle funn: 1 1K Storleiret, Fr. 26.10 (RPe).

Dvergmåke *Larus minutus*

10 ind. (alle 3K+) ble registrert, hvorav 8 ind. på Leksdalsvatnet. 1 ind. ble sett med reirmateriale i Ausa, Leksdalsvatnet, men det ble ikke påvist vellykket hekking her dette året heller. Også dette året ble arten observert på Klingsundet, men heller ikke her ble det registrert hekking. Et uvanlig seint funn ble gjort på Hammervatnet i november.

Alle funn: Opptil 8 3K+ sone 1, Leksdalsvatnet 21.5-25.6 (AVa, OMS, TSø m.fl.) med makstall 25.5 (AKo), også 2 ind Lundselva 21.5 (AVa). 25.5 ble 1 ind. sett med reirmateriale i nebbet. 1 ad Klingsundet, Ste. 30.6 (AVa). 1 ad Hammervatnet, Lev. 22.11 (TRØ).

Hettemåke *Larus ridibundus*

Større antall: 750 ind. Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESæ). 640 ind. Måsdammen, Tautra, Fr. 3.5 (MMY, AWi, LKL). **Hekkefunn:** 6 ad rugende sone 1, Leksdalsvatnet, V. 28.5 (TSø). Noen par hekket i dam v/Litjloken, Ulendeltaet, Li. 31.5 (TRe, MMY, PWB). 200 ind. rugende Sjødammen, Tautra, Fr. 14.6 (JSa). 4 pull Øytjønna, H. 2.7 (TRe). **Vinterfunn (større antall):** Opptil 9 ad + 1 2K Storleiret/Vikaleiret, Fr. 1.1-6.3 (RPe, TSø, ASø, HaS, PWB). Ellers ble det sett 1-3 ind. på flere lokaliteter i Trondheimsfjorden, med til sammen 6 ind. i jan-feb og 11 ind. i des.

Fiskemåke *Larus canus*

Større antall: 2500 ind. Eidsbotn, Lev. 18.4 (PWB, AWi, MMY, TRe). 1000 ind. Vinge-Velvang, Stj. 19.4 (TRØ). **Større antall vinter:** 80 ind. Kåra, Ørin, V. 21.1 (HSø). 62 ind. (60 ad+2 2K) Storleiret, Fr. 31.1 (RPe). 52 ind. Falstadbukta, Lev. 21.2 (TRe).

Sildemåke *Larus fuscus*

Tidlig vårtrekk: 4 ind. næringsøkende Rambergholmen, Vr. 22.3 (EJo, Beate Johansen). **Større antall:** 100 ind. Vellamelen, Ste. 21.6 (Hans A. Olsvik). 91 2K+ Skagbukta, Tautra, Fr. 14.7 (RPe).

Sildemåke, underarten graellsii

Larus fuscus graellsii
Følgende individer er rapportert å ha karakterer til ua graellsii: 1 ind. Volen, Verdal, V. 3.6 (IJI). 2 3K Bunes, Leksdalsvatnet, V. 4.6-5.6 (TMy, TSø).

Gråmåke *Larus argentatus*

Hekkefunn i Trondheimsfjorden: 6 reir på tak av industribygning (Aasen & Five) Tangmoen, Stjørdal, Stj. 17.5 (PIV). 1 ind. rugende Storholmen, Tautra, Fr. 11.6 (RPe). 1 par m/3 pull Litjholmen, Vestremsbukta, Lev. 28.6 (TRe). 1 par m/ 1 pull Kviningen, Tautra, Fr. 17.7 (RPe).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*

En ungfugl er rapportert fra både Verdal havn og litt senere fra Sjørgrenda, og disse vurderes å være samme individ. Denne fuglen ble også sett i desember 2008. En voksenfugl fra Vinge-Velvang er trolig en gjenganger siden 2006. Årstotalen havner følgelig på 2 ind. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (4), 2007 (4), 2006 (3), 2005 (1), 2004 (1).

Alle funn: 1 2K Verdal havn, Ørin, V. 1.1-10.1*



Sildemåke med fargerering ved Bunes, Leksdalsvatnet, Verdal 4. juni 2009
Fuglen ble ringmerket som unge i Sør-Trøndelag i 2006 og ringen er tidligere avlest i Portugal på senhøsten 2006. Foto: Anders Sørhuus.

(TSø, HSø, IJI m.fl.). 1 2K Sjørgrenda, Fr. 8.2* (PIN, RTK, TMy). 1 ad Vinge-Velvang, Stj. 26.3 (ESæ).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

To ungfugler er rapportert fra både Verdal havn og litt senere ble et ind rapportert fra Sjørgrenda, og disse vurderes å være samme individer. Disse fuglene ble også sett i desember 2008. Årstotalen havner følgelig på 3 ind. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (3), 2007 (0), 2006 (0), 2005 (0), 2004 (2). **Alle funn:** 2 2K Verdal havn, Ørin/Rinnleiret, V. 1.1-17.1* (TSø, HSø, IJI m.fl.). 1 2K Spillum småbåthavn, Na. 17.1* (Kjartan Trana). 1 ind. Sjørgrenda, Fr. 8.2 (PIN, RTK, TMy).

Svartbak *Larus marinus*

Hekkefunn i Trondheimsfjorden: 12 ad + 4 pull Øksningen, Tautra, Fr. 22.6 (TRe).

Krykkje *Rissa tridactyla*

Funn i Trondheimsfjorden: 1 ad Verdal havn, Ørin, V. 1.1 (TSø, HSø, IJI). 1 2K Vinnan, Vinge-Velvang, Stj. 28.2 (EHu). **Hekkefunn:** 40 reir Rørvik, Vi. 30.6 (TRe).

Makrellterne *Sterna hirundo*

Første vårfunn: 1 ind. Ørin, V. 8.5 (HSø). **Sein observasjon:** 1 ind. ptS Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Første vårfunn: 2 ind. Kåra, Ørin, V. 16.5 (TRe). 1 ind. Storholmen, Tautra, Fr. 16.5 (TSø, ASø). **Sein observasjon:** 1 ind. ptS Aglen, Otterøy, Na. 3.10 (TSø, ASø).

Alke *Alca torda*

Større antall: 125 ind. Klosterflua, Tautra, Fr. 8.12 (Erlend Skutberg, Harald Sletten).

Alkekonge *Alle alle*

Funn fra Trondheimsfjorden: 2 ind. Trones, Verdal, V. 4.1 (Tor Hynne). 1 ind. Storholmen, Tautra, Fr. 27.1 (PIN, RTK, JEØ).

Lunde *Fratercula arctica*

Funn i Trondheimsfjorden: 1 1K Straumen, I. 20.9 (AVa). 1 ind. Svaet sør molo, Tautra, Fr. 15.10-22.10 (RPe, OMS, GSæ, Erlend Skutberg, JSa, TSø).

Skogdue *Columba oenas*

Årets funnmasse på minst 26 ind. er rekordartet for fylket. En kan begynne å lure på om skogdua er i ferd med å respondere på klimaendringer. I tillegg til mange vårfunn med til dels store flokker, ble det også registrert syngende ind. om sommeren. Territorielle skogduer er det få, om noen av i fylket. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (6), 2007 (0), 2006 (5), 2005 (1), 2004 (0).

Alle funn: 8 ind. Skogn, Lev. 19.4 (Kjetil Schjøberg). 1 ind. Tautra, Fr. 25.4-30.4 (TRe, TSø). 2 ind. Melhus, Utøya, I. 8.5 (TMy). Opptil 3 ad Vikaleiret/Storleiret, Fr. 7.6-28.8 (RPe). 5 ind. Seemsøra, Viosen-Semsøra, Sn. 10.6* (BBE, Kristian Hassel). 1 ind. Steinkjer, Åsa, Imsdalen, Sn. 28.6 (OMS). 1 ind. Vistvik, Leksdalsvatnet 29.6 (TSø). 2 ind. Nyseteren, Sn. 15.7 (OMS, GSæ). 1 ad Grønøra, Snåsa, Sn. 28.7 (BBE). 1 sy. Moksneshaugen, Fr. 29.7 (RPe). 1 ind. Åkerhus, Ørin, V. 31.7 (HSø).



Ringdue *Columba palumbus*

Vinterfunn: 3 ind. Staupslia, Levanger, Lev. 2.1 (Hallvard Klepp). 1 ind. Mære, Ste. 27.1 (BNy). 1 ind. Åtlo, Fr. 29.11 (TSø, ASø). 2 ind. Værnes flyplass, Stj. 17.12 (KTL). 1 ind. Frosta, Fr. 28.12 (Torstein Mostad, Martin Fremstad).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Ut fra årets funnmasse antas minst 35 ind. å være involvert, og de fleste ble som vanlig registrert ved Verdalsøra.

Alle funn: 2 ind. Straumen, Børgin, I. 1.1-30.8 (HSø, RTK, OMS). Opptil 10 ind. på flere lokaliteter v/Verdalsøra, V. 7.1-31.12 (HSø, TFo, TSø, IHa m.fl.). Opptil 4 ind. på flere lokaliteter v/Levanger sentrum, Lev. 9.1-7.8 (BAS, OMS, Trond Martin Sæterhaug, TRe m.fl.). Opptil 5 ind. (3 ad + 2 1K) Ranemsletta/Veglo/Skei, O. 21.1-12.9 (Kjartan Trana, AVa, OMo). 1 ind. Leirfall, Stj. 29.1 (BNy). 2 ind. Grovin, G. 1.2-8.2 (Terje Nordhøy). Opptil 3 ind. Mediå/Tømmerås, G. 12.4-29.4 (OMo). 1 ind. Løsberga, Ste. 24.4 (EMo). 1 sy. Riddersalen, Værnes, Stj. 26.5 (KAS). 1 par Rørvik sentrum, Vi. 30.6 (TRe). Opptil 3 ind. Skatval skole/stasjon, Stj. 8.7-20.11 (JAA, VSk, JKS, TRØ m.fl.). 1-2 ind. Steinvik, Skatval, Stj. 18.9-19.9 (PWB, MVa). 1 ind. Grovin, G. 25.12 (Terje Nordhøy).

Gjøk *Cuculus canorus*

Første vårfunn: 1 sy. Leinsmyra, Lein, V. 16.5 (ASø).

Hubro *Bubo bubo*

Funn fra hekkeområdene: 1 sy. Flatanger 8.4 (via IHa). 1 ind. Stj.ørdal 23.11 (via SNK). 1 ind. Grong 22.12 (via OMo). **Funn utenom hekkeområdene:** Ei nyslått uribbet hodeløs

kråke Staupshaugen, Lev. 26.1 (Ottar Reinsborg). Dette er en god indikasjon på at hubroen har vært på ferde natta i forvegen.

Haukugle *Surnia ulula*

Dette året var spesielt hva forekomsten av arten angår. Ikke ei eneste haukugle ble sett fra nyttår og fram til september. Dette må nok den dårlige forekomsten av smågnagere ta skylden for. Fra september av kom det en betydelig influks, og 14 ind. ble registrert fram til nyttår. **Alle funn:** 1 ind. Tobakksgrubba, Sørli, Li. 5.9 (MMY, PIV, AWi, MVe, PWB, TGi). 1 ind. Seterfloen, Sundvik, Rengen, Li. 6.9 (MMY, AWi, MVe, PIV, PWB, TGi). 1 ind. Forbordsfjellet, Stj. 14.9 (KTL). 1 ind. Åssveet, Grong 16.9 (OSa). 1 ind. Skjækervatnet, Sn. 18.9 (Tore Bjørnstad). 1 ind. Lillfjellet, Veresvegen, V. 30.9 (Steinar Sellæg). 1 ind. Gilten, Ste. 3.10-16.10 (Arnt Erik Bratberg). 1 ind. Skjækervollan, V. 3.10 (GSæ). 1 ind. Symoen, Vera, V. 5.10 (TMy). 1 ind. Sondalen, Stj. 14.10-18.10 (John Atle Kålås, Kåre B Sunde, Kjetil Schjølberg, Sholeen Durga). 1 ind. Beitefeltet, Åsfjellet, Lev. 22.11 (MHu). 1 ind. Holmen Gård, Vuku, V. 28.11 (AIn). 1 ind. Innsvatnet, V. 14.12 (RTK). 1 ind. Grønningen, Sn. 26.12 (Hans Brede).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Hekkefunn: 1 reir Torsbustaden, Lev. 2.6 (BAS).

Kattugle *Strix aluco*

Funn nord for Steinkjer: 1 sy. Grønveien-Snåsa, Sn. 22.3-24.4 (BBø). 1 sy. Gran, Sn. 10.12 (PMø).

Slagugle *Strix uralensis*

Alle funn: 1 sy. Lierne 9.5 (TGi, AKo).

Lappugle *Strix nebulosa*

For første gang siden 2003 fikk vi besøk av denne majestetten fra taigaen, og attpåtil av 2 ind. på samme sted! I utgangspunktet var det noe overraskende at de skulle dukke opp på Ytterøya, men kanskje en øyeffekt med hensyn på annerledes smågnagersykluser har forårsaket at de måtte helt hit for å finne mat. Forekomsten av lappugler i fylket i 2009 kan ses i sammenheng med en markert opptreden i andre deler av Sør-Norge dette året (Solheim 2009). Individet fra Svemarka er det første i Stjørdal kommune, og observatøren som var på vei til jobb, så fuglen sitte på en stubbe ved E6, i grålysninga. Dette blir funn nr. 14 og 15 (individ nr. 14-16) i fylket etter 1970, og det første med 2 ind. på samme lokalitet.

Alle funn: 1 ind. Svemarka, Skatval, Stj. 13.1 (Magni Hagerup). 2 3K+ Ytterøy kirke, Ytterøy, Lev. 27.3-8.6* (Kathrine Haugdahl Nøst m.fl.). Ett av individene ble funnet død på nordøsten den av øya 21.5. Skjebnen til det andre individet er uvisst.

Hornugle *Asio otus*

Alle funn: 1 sy. Flatåsgjerdet, I. 19.2 (PIN, RTK). 1 ind. funnet død Kjæran, Vinne, V. 4.3 (TMy). 1 ind. Vikaleiret/Storleiret, Fr. 27.5-28.6 (RPe). 1 ind. Tranås, Jøa, Fo. 29.6 (TRe). 1 ind. Jule, Ulen, Li. 4.9-5.9 (MMY, TGi, AWi, MVe, PWB, PIV).

Jordugle *Asio flammeus*

Første vårfunn: 1 ind. Volen, Verdalen, V. 3.3 (IJI).



Lappugle Ytterøya 7. april 2009 . Foto: Anders Sørhuus.



Hærfugl Leirådal, Verdal 4. september 2009. Foto: Tørje Kolaas.

Tårnseiler *Apus apus*

Første vårfunn: 4 ind. Levanger sykehus jernbaneholdeplass, Lev. 19.5 (OMS). 2 ind. Vikaleiret, Fr. 19.5 (RPe). **Seine observasjoner:** 1 ind. Stiklestad, V. 12.10 (AIn). 1 ind. Verdalsstasjon, Verdalsøra, V. 12.10 (EMO, RRi). 1 ind. Momarka, Halsan, Lev. 16.10 (OMS). 1 ind. Levanger sykehus jernbaneholdeplass, Lev. 17.10 (OMS).

Hærfugl *Upupa epops*

Ett veldokumentert funn ble gjort dette året, og er en normal opptreden av denne sydlige "punkeren". Årets funn er nr. 34 i rekka etter 1970. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (2), 2007 (0), 2006 (2), 2005 (2), 2004 (1). **Alle funn:** 1 ind. Reppe, Leirådal, V. 3.9-14.9* (fam. Rygg, HSø m.fl.).

Vendehals *Jynx torquilla*

Arten ble registrert med 4 ind. på tre lokaliteter dette året, og dette er trolig gjenganger fra forrige år. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (8), 2007 (2), 2006 (5), 2005 (1), 2004 (0).

Alle funn: Opptil 2 sy. Røli, Ste. 24.4-21.5 (Arnulf Oddbjørn Langli, RTK, PIN). 1 sy. Volhaugen, V. 16.5 (HSø). 1 ind. Torsbjørkdalen, Me. mai (Tore Ersson).

Gråspett *Picus canus*

Hekkefunn: 1 kull (ad M, 1K + 2 ind.) Yttersund, Vi. 1.7 (TRe). 1 kull (ad M + 2 1K) Kopperå, Me. 15.8-5.11 (MVe). **Oppsummering:** Til sammen 45 ind. rapportert fra 37 lokaliteter (inkl. hekkefunn) i 16 kommuner: **Stjørdal:** 4 ind./4 lok. **Meråker:** 5 ind./2 lok. **Frosta:** 3 ind./3 lok. **Levanger:** 5 ind./4 lok. **Verdal:** 11 ind./10 lok. **Inderøy:** 1 ind./1 lok. **Leksvik:** 1 ind./1 lok. **Mosvik:** 1 ind./1 lok. **Verran:** 1 ind./1 lok. **Steinkjer:** 1 ind./1 lok. **Namdalseid:** 1 ind./1 lok. **Flatanger:** 1 ind./1 lok. **Namsos:** 1 ind./1 lok. **Snåsa:** 2 ind./1 lok. **Nærøy:** 3 ind./2 lok. **Vikna:** 4 ind./1 lok.

Grønnspekk *Picus viridis*

I tidligere rapporter har LRSK presentert alle funn av arten, men pga en kraftig økning i funnmassen velger vi kun å presentere oppsummerte antall ind. og lokaliteter for hver kommune. I tillegg presenterer vi vinterfunn, da det knapt rapporteres grønnspekk vinterstid. **Vinterfunn:** 1 ad. M Jådåren, Ste. 22.1 (BNy), 1 ind. Lorås, Ind. (TMy), 1 ad. M Husbemarka, Stj. 23.2 (BNy), 1 ind. Vinge-Velvang, Stj. 25.2 (MMy), 1 ind. Hamperodden, Hammervatnet, Lev. 5.12 (TRe). **Oppsummering:** Til sammen 102 ind., hvorav 13 1K er rapportert fra 73 lokaliteter i 15 kommuner. **Stjørdal:** 8 ind. + 5 1K/ 5 lok. **Frosta:** 2 ind./ 1 lok. **Levanger:** 15 ind. + 3 1K/ 14 lok. **Verdal:** 12 ind./ 11 lok. **Inderøy:** 4 ind./ 4 lok. **Steinkjer:** 20 ind. + 1 1K/ 14 lok. **Snåsa:** 12 ind./ 9 lok. **Verran:** 5 ind. + 4 1K/ 5 lok. **Mosvik:** 3 ind./ 3 lok. **Leksvik:** 2 ind./ 1 lok. **Namdalseid:** 2 ind./2 lok. **Flatanger:** 1 ind./1 lok. **Namsos:** 1 ind./ 1 lok. **Gronng:** 1 ind./ 1 lok. **Nærøy:** 1 ind./ 1 lok.



Hybrid flaggspett x hvitryggspett Moholt, Verdal 4. desember 2009. Foto: Terje Kolaas.

Svartspett *Dryocopus martius*

Hekkefunn: 1 M hakket reirhull Stordalen, Me. 18.4 (TRØ, KIU). 1 par m/mat til unger Ådalsvollen, V. 16.5 (HSø). 1 par m/reir Murubekken, Nordli, Li. 21.5 (MVa, Espen Lie Dahl). 1 par m/reir Ørdalen, I.. 21.5 (RTK, Jon Kristian Norum). 1 par m/reir nordvest for Fornebo, Langstein, Stj. 22.5-29.5 (JKS).

Hybrid hvitryggspett x flaggspett *Dendrocopos leucotos x D. major*

Nord-Trøndelag ligger akkurat nord for hovedutbredelsen av hvitryggspett, som strekker seg opp til Sør-Trøndelag, og i slike randsoner

kan hybridisering mellom hvitryggspett og nær beslektede arter ofte inntreffe.

Alle funn: 1 ad M, varslende og 1 1K Mostad, Fr. 7.9 (RPe). 1 M/ juv. F Mostad, Fr. 8.9 (TRe). 1 M Moholt, V. 4.12-5.12* (Per Hallem*, MVa, HSø).

Flaggspett *Dendrocopos major*

Hekkefunn: 1 reir Staupshaugen, Lev. 18.4-7.6 (TRe, GSæ). 1 reir nordvest for Fornebo, Langstein, Stj. 23.5 (JKS, VSk). 1 reir Baglan-Berg, V. 23.5 (RTK). 1 M m/mat til unger Fagerhaug, Stiklestad, V. 23.5 (TSø). 1 reir Sørhaugsberget, V. 1.6 (IHa). 1 par m/mat til



Fjellerke Tautra, Frosta 1. februar 2009. Foto: Halvor Sørhuus.

unger Skei, Stj. 2.6 (JKS). 1 reir Østborg, Børsåsen, Lev. 7.6 (TRe). 1 reir Børøya, Lev. 7.6 (TRe), 1 reir Finsåsmarka, Sn. 8.6 (JEØ, IBu, RTK). 1 reir Henning, Ste. 12.6 (Knut Børge Strøm). 1 reir Okstadmyra, Henning, Ste. (JEØ). 1 reir Ovrein, Ste. 14.6 (Håkon Holien).

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Hekkefunn: 1 par Staupshaugen, Levanger, Lev. 9.4-14.6 og reir m/unger 14.6 (Ottar Reinsborg, TRe). Opptil 1 par Munkby klosterruin, Munkeby, Lev. 18.5-19.11 (OMS, Eldar Bendiksen) og reir m/unger 21.6 (TRe).

Oppsummering: Til sammen 46 ind. rapportert fra 41 lokaliteter (inkl. hekkefunn) i 5 kommuner: **Stjørdal:** 5 ind. **Frosta:** 3 ind./2 lok.

Levanger: 13 ind./11 lok. **Verdal:** 17 ind./16 lok. **Steinkjer:** 8 ind./8 lok.

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Hekkefunn: 1 F m/mat til unger Torsbustaden, Lev. 20.6 (BAS). 1 ad M + 1K Andortjønnmoen, Sn. 15.7 (TMj, RTK, JEØ, IBu). 2 ad + 2 unger Tørrisheilia, Vr. 16.7 (Paul Harald Pedersen). 3 tiggende 1K Rundstavgjønnin, Åsenfjellet, Lev. 24.7 (TRe). 1 ad M + 1K Skogtange SV for Holmøytjønn, Øvre Forra, Lev. 24.7 (PIV). 1 ad + 1K Tromsdalen, V. 29.7 (TSØ).

Sanglerke *Alauda arvensis*

Syngende fugler i Lierne er sjeldne. I flg Norsk Fugleatlas (Gjershaug m.fl. 1994) er funn av sanglerke i indre Namdalen uvanlig i hekketida, og den ble ikke registrert i Lierne i Atlasperioden (1970-1990).

Første vårfunn: 1 ind. Vinge-Velvang, Stj. 22.3 (TRØ). **Nevneverdige funn:** 1 sy. ind + 1 ind. (muligens et par) Strømnes, Sørli, Li. 30.5.-1.6 (MMj, PWB, TRe). 1 sy. ind. Fjellheim, Inderdalen, Li. 31.5 (MMj, PWB, TRe).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

Årets funn er det første i fylket siden 1997, da 1 ind ble sett på Ørin, V. 9.5. Totalt er det inkludert årets funn, registrert 12 funn av 19 ind. siden 1970, tre av disse er vinterfunn. Fra hekketida er fjellerke kun registrert i Hestkjølen, Li. med 3 ind. i 1982 og Hårskallen, Lev. med 1 ind. i 1971.

Alle funn: 1 ind. Tautra, Fr. 31.1-25.2 (*Heiko Liebel m.fl.).

Sandsvale *Riparia riparia*

Første vårfunn: 1 ind. Kåra, Ørin, V. 5.5 (AIn, KIn). **Hekkekolonier:** 40 ind. v/koloni Bergskleiva, Stj. 24.5 (TSØ). 60 par reirbygging Røesgrenda, Helgådalen, V. 30.5 (IJI). 10 ind. v/ koloni Grong 10.6 (Jens Gaundal). 25 ind. v/ koloni Lømsen, Ste. 4.7 (AVa). 7 reir i koloni

Malbutjønn, Vr. 5.7 (OKA). 10 ind. v/koloni Volen, V. 5.7 (TSØ). 73 reirhull i koloni Sandtak v/Øvre Straumen, Hoklingen, Lev. 19.7 (TRe).

Låvesvale *Hirundo rustica*

Første vårfunn: 1 ind. Sjøfartsgata, Ste. 24.4 (EMo). **Siste høstfunn:** 6 ind. Spillum, Na. 17.10 (Bård Kirkeby). 2 ind. Løssberga, Ste. 17.10 (Bård Kirkeby).

Amursvale *Cecropis daurica* **NSKF**

Første funn i Nord-Trøndelag! Denne arten, som har sin utbredelse rundt Middelhavet og østover i Asia, er funnet 39 ganger i Norge (Olsen & Mjølness 2009), bl.a. to ganger i Sør-Trøndelag, på Titran, Frøya i mai 2003 og Eidsvatnet, Bjugn mai 2008 (Winnem m.fl. 2009).

Alle funn: 2 ind. Lømsen, Ste. 8.5 og 1 ind. 9.5-13.5 (*EJo, *OKA, AVa m.fl.).

Taksvale *Delichon urbicum*

Første vårfunn: 2 ind. Sjøfartsgata, Ste. 24.4 (EMo).

Trepiplerke *Anthus trivialis*

Første vårfunn: 1 sy. Hegra, Stj. 30.4 (EHu). 1 sy. Langåsdammen, Lev. 30.4 (OMS).

Heipiplerke *Anthus pratensis*

Første vårfunn: 1 ind. Kåra, Ørin, V. 10.4 (HSØ).



Amursvale Lømsen, Steinkjer 10. mai 2009 . Foto: Halvor Sørhuus.



Lappiplerke *Anthus cervinus*

Årets funn er nr. 14 i rekka etter 1970, og de foregående fem år foreligger kun to høstfunn fra 2008. Rettelse: 1 ind. i 1981 (førstefunn i fylket) ble ikke nevnt i forrige rapport.

Alle funn: 1 ind. Sklinna, Lk. 30.9 (PRh, MRh, GNi).

Skjærpiplerke *Anthus petrosus*

Vinterfunn i Trondheimsfjorden: Opptil 4 ind. Tautra, Fr. 27.1-15.2 (PIN, JEØ, RTK m.fl.). Opptil 2 ind. Vinnan, Vinge-Velvang, Stj. 1.2-11.2 (KKr, JAA). 1 ind. Gullberget, Fr. 8.2 (PIN, RTK, TMy). 1 ind. Svaet nord molo, Tautra, Fr. 6.12 (OMS). 1 ind. Fiborgtangen, Lev.25.12 (TKo).

Gulerle *Motacilla flava*

Første vårfunn: 1 ind. Vera, V. 16.5 (Svein Arne Bratli). 1 ind. Ørin, V. 16.5 (TRe). 1 ind. Grønveien-Snåsa, Sn.16.5 (BBE).

Sitronerle *Motacilla citreola* NSKF

Årets funn er det fjerde i fylket. De foregående funnene var 1 M Meråker 22.4.1985, 1 F Hellstranda, Stj. 27.4.1985, og 1 ind. Madsøya, Leka 6.10.2003

Alle funn: 1 1K Steinvik, Stj. 17.9-18.9* (*VKr, BNy, TRØ m.fl.).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Det er rapportert 5 hekkefunn. Status for forekomsten av arten i Trøndelag er oppsummert i Reinsborg & Bangjord (2007). I 2009 ble arten i hekketida funnet på 12 potensielle lokaliteter som ikke er omtalt i denne rapporten eller forrige LRSK-rapport. Pr. 2009 er vintererle funnet på 75 potensielle hekkelokaliteter i fylket. Nye lokaliteter fra hekketida:

Follafoss, Ulenbrua, Helgaa v/Volden, Inna v/Gamle Jamtlandsveg, Verdalselva v/Holmen gård, Skogmo, Nesvatnet, Vika v/Leksdalsvatnet, Stjørdalselva v/Nustadfossen, Helgaa v/Helgåsen, Helgaa v/Roesgrenda, Hotterelva v/Engstad.

Hekkefunn: 1 par Follafoss, Vr. 1.5 (EJo, Beate Johansen) og mating av unger 6.6 (EJo, Beate Johansen, OKA). 1 F Ulenbrua, Ulendeltaet, Li. 10.5 (AKo, TGi), par m/unger i reir 30.5-1.6 (TRe, MMy, PWB) og 2. kull 1.7 (RTK, IBu, JEØ, OMø, PIN). 1 par m/mat til unger Malm, Vr. 22.5 (Henry Skevik). 1 ad og 2 nylig utflydde unger Volden, Helgådalen, V. 13.6 (IJI).

Øvrige funn i hekketida: 2 ind. Gamle Jamtlandsveg, Innaldalen, V. 5.4 (AKo). Opptil 2 ind.

Sunnan, Ste. 5.4-10.4 (THa, PIN). Opptil 4 ind. Ulvilla, V. 6.4-10.4 og 2.7 (AIn, IJI, RTK, TSø). 1 F Holmen Gård, Vuku, V. 7.4 (AIn, IJI, BIn). 1 ind. Gråbrek mølle, Stj. 10.4 (TRØ). 1 par Gran, Sn. 11.4-12.4 (PMø). 1 par Skogmo, Lev. 12.4 (MHu). 2 ind. Nesvatnet, Lev. 12.4 (OMS). Opptil 2 par Floan, Munkeby, Lev. 12.4-18.5 (TRe, OMS). Opptil 2 ind. Fossingelva v/Reithaug, Åsen, Lev. 12.4-13.4 (MHu, Torgeir Møst). 1 ind. Vika, Leksdalsvatnet, V. 13.4 (AIn, KIn). 1 ind. Nustadfossen, Me. 13.4 (KIU, TRØ). 1 M Langstein stasjon, Stj. 17.4 (KKr). 1 ind. Helgåsen, Helgådalen, V. 18.4 (IJI). 1 F Fossingelva v/Hoklingen, Lev. 22.4 (MHu). 1 par Leksdalsvatnet, Ste. 24.4 (AIn, KIn, Camilla Indahl). 1 F Reistaddammen,

1K sitronerle Steinvik, Stjørdal 18. september 2009 . Foto: Anders Sørhuus.



Okkenhaug, Lev. 3.5 (TRe). 1 F Levangerelva v/ Munkrøstad, Lev. 3.5 (TRe). 1 M Røesgrenda, Helgådalen, V. 17.5 (IJI). 1 F Munkby kloster-ruin, Munkeby, Lev. 21.6 (TRe). 1 ind. Hotterrelva v/Engstad, Lev. 26.6 (TRe). **Høstfunn:** 1 ind. Namsskogan 13.9 (Per Ole Syvertsen). 1 ind. Fugletårnet, Hammervatnet, Lev. 14.9-18.9 (OMS, GSæ m.fl.). 2 ind. Steinvik, Stj. 18.9 (BFu m.fl.). 1 ind. Gran, Sn. 24.9-13.10 (PMø). 1 ind. Verdal havn, Ørin, V. 17.10-18.10 (IJI, TSø).

Linerle *Motacilla alba*

Første vårfunn/vinterfunn: 1 ind. Skagbukta, Tautra, Fr. 3.3 (RPe). **Sein observasjon:** 2 ind. Alstad, Fr. 13.11 (RPe).

Sidensvans *Bombus garrulus*

Vårfunn: Opptil 20 ind. Skei, Stj. 1.4-10.4 (JKS, VSk). 19 ind. Tvårråsjøen, Torsbustaden, Lev. 3.4 og 2 ind. 19.4 (BAS). 6 ind. Brandsegg, Ogndal, Ste. 4.4 (PIN). 17 ind. Langåsdammen, Lev. 19.4 (BAS).

Hekkeindikasjoner: 1 ind. Grønsjøen, Sønningen, Lev. 17.5 (TRe). 3 ad Møssingvatnet Alstad omegn, Åsenfjellet Lev. 21.5 (MHu). 2 ind. Skurdalsvoll-dammen, Me. 22.7-24.7 (TRØ). 1 ind. Rundstavgjønnin, Åsenfjellet, Lev. 24.7 (TRe). 2 ind. Ulendeltaet, Li. 27.7 (TMy, PIN, RTK). 1 ind. Berge, Bangdalen, Na. 28.7 (EMo). 1 ind. Nessan/Flåttå-dalen, Nsk. 19.8 (TON). 3 ind. Flåttå-dalen, Nsk. 20.8 (TON).

Jernspurv *Prunella modularis*

2 rapporterte vinterfunn dette året av en sjelden overvintrer i Nord-Trøndelag. Individet fra Stjørdal er samme fugl som ble sett i november-desember året før.

Alle vinterfunn: 1 ind. Rønningen, Øfsti, Stj. 1.1-5.1 (PIV). 1 ind. Holmen Gård, Vuku, V. 19.12-27.12 (KIn, AIn, BIn). **Første vårfunn:** Tilsammen 7 ind. den 10.4 fra seks lokaliteter i området Stjørdal-Steinkjer.

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

LRSK har tatt inn alle registreringer som er gjort i forbindelse med den årlige hagefugl-tellinga i månedsskiftet januar-februar. Totalt er det registrert 37 vinterfunn, 31 ind. på etterjuls-vinteren og 7 desemberfunn. Dette er en formidabel økning av antallet overvintrere i forhold til tidligere år. I 2008 var det registrert 6 ind.

Kommunevis oppsummering: Stjørdal (1). Frosta (4). Levanger (16). Verdal (7). Inderøy (4). Steinkjer (1). Leksvik (3). Vikna (1).

Nattergal *Luscinia luscinia*

Dette er de to første funn av arten i Verdal kommune. I fylket er det, inkludert årets funn, gjort 15 funn av arten. Foregående funnår er følgende: 1975 (2), 1978, 1981 (2), 1982, 1983, 1984 (2), 1991, 1994, 1996, 1998, 2007.

Alle funn: 1 sy. Holmen Gård, Vuku, V. 30.5-1.6 (*BIn m.fl.). 1 sy. Tromsdalen, V. 1.6-2.6 (*TSø, AKo).

Blåstrupe *Luscinia svecica*

Første vårfunn: 1 sy. Kråksjøen, V. 17.5 (WNo).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

Første vårfunn: 1 sy. Finnvola, Breivatnet, V. 1.5 (HSø). **Seint høstfunn:** 1 F Fugletårnet, Tautra, Fr. 23.10 (MMA).

Buskskvett *Saxicola rubetra*

Første vårfunn: 1 M Mosvik, Mo. 2.5 (ALo).

Steinskvet *Oenanthe oenanthe*

Første vårfunn: 1 ind. Tautra, Fr. 22.4 (MVA).

Ringtrost *Turdus torquatus*

Vinterfunn: 1 ind. Hestdalen, Lks. 15.2 (HPa). 1 ind. Frøyasvei, Søndre Egge, Ste. 15.2 (EMo). **Første vårfunn:** 1 M Teveldalen, Me. 13.4 (KIU, TRØ). 1 ind. Skillbreia, Ronglan, Lev. 13.4 (OMS).

Gråtrost *Turdus pilaris*

Gråtrosten har økt i antall som overvintrer og LRSK registrerer heretter bare større vinterflokker

Større vinterflokker: 40 ind. pt Dregset, Skatval, Stj. 1.1 (EHu). 10 ind. pt Staupslia, Lev. 1.1 (Hallvard Klepp). 10 ind. Tautra, Fr. 3.1-28.1 (AWi, AKo, KLa, TGi). 12 ind. Verdal havn, Ørin, V. 3.1 (RTK, IJI, TMy, KKr). 38 ind. Heggstad, I. 7.1 (HSø). 10 ind. Straumen, I. 7.1 (HSø). 13 ind. Gangstad, I. 14.1 (RTK, JEØ). 12 ind. Vikaleiret, Fr. 24.1 (RPe). 15 ind. Vikaleiret industriområde, Fr. 30.1 (TRe). 15 ind. Minsås, V. 31.1 (TSø). 37 ind. Langåsdammen, Lev. 2.2 (BAS).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Vinterfunn: 1 ind. Ørin industriområde, Ørin, V. 13.2 (IJI). 2 ind. Vinge-Velvang, Stj. 25.2 (AWi, MMy). 1 ind. Ole Vig vgs, Stj. 3.12 (EHu). 1 ind. Vikaleiret, Fr. 19.12-20.12 (RPe). **Første vårfunn:** 1 ind. Halsan, Lev. 1.4 (OMS, Eilif Størdal).

Duetrost *Turdus viscivorus*

Duetrosten fortsetter å øke i antall. Men mange av de tidlige observasjonene dreier seg nok om fugler som raster og skal over til Sverige. Store antall rapportert langs veiene i vestre Jämtland de siste årene tyder på dette. Ca. 83 ind. er vurdert å være involvert i funnmassen dette året, og er noen få ind. flere enn fjoråret.

Hekkefunn: 1 reir i stor furu (4 m.o.b.) Storåsen, Sn. 22.6-23.6 (PMø). **Hekkeindikasjoner:** 1 ind. varslende Torsbustaden, Lev. 8.5-4.6 (BAS). 1 ind. varslende Kasttjønnelva, Gjevsjøen, Sn. 2.6 (TMy).

1 par varslende Langfylltjønnin, Torsbustaden, Lev. 7.6 (TRe). **Øvrige funn:** 1 ind. Veiset, Elvran, Stj. 8.4 (TRe). 3 ind. Storøya, Stordalen, Me. 13.4 (KIU, TRØ). 4 ind. Buran, Okkenhaug, Lev. 13.4 (TRe). Opptil 6 ind. Vera kapell, Vera, V. 13.4-22.4 (TMy, AIn, JEØ, RTK). Opptil 29 ind. Helgåsén, Helgådalen, V. 17.4-19.4* (IJI, AIn, KIn, TSø, HSø). 7 ind. Stordalen, Me. 18.4 (TRØ, KIU). 1 ind. Asp, Ste. 18.4 (MMy, AWi). 1 sy. Hammervatnet, Lev. 25.4 (Stein Bukholm). 1 ind. Tjønnmoen, Stordalen, Me. 27.4 (MVe). 1 sy. Rotvoll, Stordalen, Me. 27.4 (MVe). 2 ind. Volusjøveien, Okkenhaug, Lev. 30.4 (OMS). 3 ind. Vallervatnet, R. 30.4 (Kjartan Trana). 3 ind. Sandnes, Li. 1.5 (Kjartan Trana). 2 ind. Vestgården, Li. 5.5

(IHa). 1 sy. Berglia, Li. 9.5 (AKo, TGi). 1 ind. Strømnes, Ulen, Li. 9.5-10.5 (TGi, AKo, Leif Arne Lien, MVe). 2 ind. Volusjøveien, Okkenhaug, Lev. 15.5 (OMS). 1 ind. Stod, Ste. 20.6 (Leif Bjørn Lunde, Klaus Maløya Torland). 1 ind. Lakadalen, V. 3.7 (IJI). 1 ind. Andorsjøen vest, Sn. 15.7 (JEØ, TMy, IBu, RTK). 1 ind. Vigdevatnet, Stj. 24.7 (PIV). 2 ind. Røstad, Lev. 29.7 (KKr). 1 ind. Mosvik, Mo. 19.9 (Jan Egil Larsen, Øyvind Soelberg). 1 ind. Heia, G. 3.10* (PIV). 3 ind. Kjesbu, Sn. 5.10* (BBe).

Gresshoppesanger *Locustella naevia*

Årets funn er nr. 15 i fylket. Foregående fem år er følgende antall ind. registrert: 2008 (1), 2004 (2).

Alle funn: 1 sy. Heimdal, Jøa, Fo. 30.6 (TRe).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*

Totalt innrapportert ca 34 syngende individer og ett høstfunn. Høyest antall på enkeltlokalitet som vanlig langs østsiden av Leksdalsvatnet med ca 14 ind.

Oppsummering syngende ind: Frosta (3). Levanger (4). Verdal (utenom Leksdalsvatnet) (1). Steinkjer (utenom Leksdalsvatnet) (2). Flatanger (3). Fosnes (5). **Høstfunn:** 1 ind. Gladsøvatnet, Ste. 1.8 (AVa).

Gulsanger *Hippolais icterina*

Første vårfunn: 1 sy. Ørin, V. 12.5 (TGi).

Møller *Sylvia curruca*

23 ind. antatt fra hekkeområder i 2009, det ble registrert 17 ind. i 2008. I tillegg er det registrert 5 ind. på høsten.

Første vårfunn: 1 sy. Grasenga, Ørin, V. 7.5-3.6 (TSø, OMo, TRe m.fl.). Oppsummering syngende ind: Stjørdal (2). Frosta (4). Levanger (6). Verdal (4). Inderøy (1). Mosvik (1). Steinkjer (2). Flatanger (1). Lierne (1).

Høstfunn: 2 ind. Follafoss, Vr. 16.8 (OKA). 1 ind. Storleiret, Fr. 29.8 (OMS, GSæ, MHu, OMo, KTL, TKo). 1 ind. ringmerket Ørin, V. 30.8 (GSæ, KTL). 1 ind. Fløan, Skatval, Stj. 19.9 (KTL).

Tornsanger *Sylvia communis*

Første vårfunn: 1 sy. Vikaleiret, Fr. 29.4 (RPe).

Hagesanger *Sylvia borin*

Første vårfunn: 1 sy. Hafstadkorsen, Ste. 19.5 (RTK).

Munk *Sylvia atricapilla*

Første vårfunn: 1 sy. Skjevik, Ste. 28.4 (JEØ). **Seine observasjoner:** 1 F Baglan-Berg, V. 3.11 (RTK). 1 M Skei, Stj. 10.11-14.11 (JKS, VSk). 1 F Aglen, Otterøy, Na. 12.11 (JEØ, RTK, Håkon Holien).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Ett funn ble gjort dette året. Foregående fem år er følgende ant. ind. observert: 2008 (4), 2007 (3), 2006 (0), 2005 (4), 2004 (1).

Alle funn: 1 sy. Linnes, Rengen, Li. 30.5 (MMy, TRe, PWB).

Gransanger *Phylloscopus collybita*

Første vårfunn: 1 ind. Åsen, Lev. 8.4 (MHu).



Varsler Seemsøra, Snåsa 21. mars 2009. Foto: Bjørn Berg.

Tabell 1: Forekomsten av varsler i Nord-Trøndelag 2008, fordelt på kommuner og måneder. Hekkefunn er inkludert, og angis med **. I hekkefunn er kun voksne fugler (2 ind. pr. hekkefunn) angitt, også der kun 1K-fugler er sett. * = Ind. registrert tidligere måned regnes ikke med.

K↓/M→	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Fr	2	2*								1	1		6
I		1	1										2
Lev	1	2	2*	2					1	5*	2*	3	18
Li					3**		2**						5
Me	1							1	*				2
Mo							1						1
Na		1											1
Nsk								1		1			2
Sn			2				5						7
Ste	1	1	1						2				5
Stj	3	2*	3*	1			1		2	2	2		16
V	3	3*		1	1	2**			1	1	1*	2*	15
Total	11	12	9	4	4	2	9	2	6	10	5	5	80



1K rosenstær Verdalsøra 12. oktober 2009. Foto: Halvor Sørhuus.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Første vårfunn: 2 ind. Follafooss, Vr. 17.4 (EJo, Beate Johansen). - ind. lokkelyd, øvrige lyder Tautra, Fr. 18.4 (OMo). 2 ind. obs i h.tid, pass. biotop Rinnleiret, Lev. 23.4 (IHa). 1 ind. sang/spill Lundleiret, Ste. 23.4 (PIN).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Tidlige vårfunn: 1 ind. Vassbotna, Eidsvatnet, H. 3.5 (AVa). 1 ind. Staupshaugen, Lev. 3.5 (TRe). 1 ind. Momarka, Halsan, Lev. 3.5 (OMS). 2 sy Ørin, V. 9.5 (OMo).

Svarthvit Fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Første vårfunn: 1 sy Baglan-Berg, V. 24.4 (RTK).

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Funnmønsteret er som normalt med flest registreringer om høsten.

Alle funn: 4-5 ind. Vuddudalen, Lev. 10.1 (Ole Vordal). Opptil 8 ind. Hammervatnet, Lev. 18.1-12.2 (PWB, TRe, TMy, TSø m.fl.). 2 ind. Kringåsen, Flora, Stj. 31.5 (PIV). 7 ind. Fagerheim, Ste. 27.7 (PIN). 10 ind. Reppe, Leirådal V. 14.9 (Knut Børge Strøm). Opptil 5 ind. Holmen Gård, Vuku, V. 21.9-4.10 (AIn, BIn). En flokk Sonstad, Lev. 27.9 (MHu). 5 ind. Skei, Stj. 11.10 (JKS). 6 ind. Myrvang, Hoklingen, Lev. 11.10 (OMS). Opptil 6 ind. Rønningsdammen, Ulvillå, V. 15.10-25.12 (IJI). 8 ind. Mediå, G. 31.10 (Jens Gaundal).

Spettmeis *Sitta europaea*

Utbredelsen av arten fortsetter å øke i fylket, funn i Grong og Namsos kommuner er nye i forhold til 2008.

Verdal: ca 26 ind. Hekkefunn: Forbregd og Fagerhøy, Stiklestad (TSø, HSø, m.fl.). Hekkeindikasjoner med stabile par hele året i Jervdalen (TFo), Sul (WNo), Finnvola (KKz) og Baglan-Berg (RTK). **Stjørdal:** ca 26 ind. Hekkeindikasjon med 2 ind. stabilt hele året i Husbymarka (Geir Hammer m.fl.) og Dregset, Skatval (EHu). **Verran:** 2 ind. hele året i Follafooss (EJo m.fl.). **Steinkjer:** ca 14 ind. Hekkeindikasjon med 2 fugler stabilt hele året i Heggevn. (Håkon Holien). Maks. 3 ind. Furuskogen (AVa m.fl.), Gjevrang-Lund, Lundleiret (EMo) og Frøyas vei, Søndre Egge (EMo). **Snåsa:** 3 ind. Hekkeindikasjon. 2 ind. med tilhold hele året i Grønveien (BBE). **Mosvik:** 1 ind. Flatskogen, Mosvik 13.7 (TMy, SNK). **Meråker:** 8 ind. 2 ind. Stasjonsgrenda, Meråker 13.8-18.10 (TRØ). 2 ind. Skomakermoen, Meråker 25.1 (Henning Haug). 2 ind. Kopperå 15.11 (Astrid Dalåmo Letnes). 2 ind. Funnstjøen 12.6 (via TRØ). **Levanger:** ca 39 ind. Hekkefunn: Staupshaugen (TRe). Hekkeindikasjoner på ytterligere minst 9 lokaliteter hvor 4 av disse er lokaliteter på Ytterøya. Andre funn: 10 ind. Ytterøya 13.4 (MVA). **Leksvik:** 6 ind. Ingen rapport med hekkeindikasjon selv om det er sett opp til 2 ind. samtidig på 2 steder. **Inderøy:** ca 11 ind. Hekkeindikasjon med

stabilt par hele året på Solbakken (JEF). Andre funn: 4 ind. Sunnes 13.10 (BNy). **Frosta:** 1 ind. på Mostad, Frosta 8.9 (TRe). **Grong:** 1 ind. Grovin 1.2 (Terje Nordhøy) og 1 ind. Mediå 1.9 (Jens Gaundal). **Namsos:** 1 ind. Lauvhamaren 5.9. (OSa)

Tornskate *Lanius collurio*

Årets funn er det første siden 2007 da 1 ind. ble sett på Volden, V. 4.-5.9. Inkludert årets funn er det gjort 16 funn av 17 ind. siden 1970 i fylket. Foregående funnår: 2007, 2001, 2000, 1999, 1998 (2), 1996, 1994, 1993, 1992 (1 par), 1990, 1981, 1979, 1976, 1975. **Alle funn:** 1 ad M Øfsti, Stj. 11.6* (*PIV, BNy, BFu).

Varsler *Lanius excubitor*

Årets funnmasse var i likhet med fjoråret meget bra. Inkludert voksenfuglene fra hekkefunn ble 80 ind. sett (Tabell 1) og er nært fjorårets rekordtall på 83 ind. I forhold til fjoråret ble det sett flere ind. i perioden jan.-mars dette året, men færre ind. i perioden okt.-des. **Hekkefunn/hekkeindikasjoner:** 1 ad m/mat til unger Stortjøna v/ Julestraumen, Li. 30.5 (MMy, TRe, PWB). 1 par varslende Bellingsåa, Storbellingen, V. 11.6 (JEØ). 1 1K Økstjønnåsen, Li. 27.7 (TMy, RTK, PIN).

Nøttekråke

Nucifraga caryocatactes macrorhynchos

Alle funn av nøttekråke i Nord-Trøndelag dreier seg trolig om den sibirske underarten *Nucifraga caryocatactes macrorhyncho*. Basert på makstall fra de respektive lokaliteter ble det observert ca 71 individer i løpet av året. Dette er på nivå med fjoråret hvor minst 70 ind. ble rapportert. Funnet i Grong kan kanskje dreie seg om et hekkefunn siden alle 5 ind. ble sett samtidig over flere dager.

Kommunefordeling av funn i perioden ultimo juni-oktober (totaltall hvor også tall utenom perioden er tatt inn): Stjørdal: ca 9 ind.

Levanger: ca 18 ind. Verdal: ca 16 ind. Inderøy: ca 7 ind. Steinkjer: ca 17 ind. Mosvik: 2 ind.

Grong 5 ind. Snåsa: 1 ind. Namsos: 1 ind.

Funn som strekker seg utover perioden ultimo juni-oktober: 2 ind. Langåsdammen, Lev.

14.3-20.9 (BAS). 1 ad. Horjemsberga, Sn. 3.4

(PMø). 1 ind. Rognbakken, Okkenhaug,

Lev.15.5 (OMS). 1 ind. Torsbustaden, Lev.

28.8-8.11 (BAS). 3 ind. Husbemarka, Stj.

13.6-9.11 (PIV, BNy, SNK m.fl.). 3 ad Øvre

Helgesmark, Byafossen, Ste. 18.8-27.12 (AVa,

Trond Einar Brobak). 1 ind. Holåsen sørvest,

Skogn, Lev. 3.12 (LKL). **Nevneverdig funn:** 1

ind. overflygende Aglen, Otterøy, Na. 10.9

(BNy).

Kaie *Corvus monedula*

Større antall: 500 ind. Holsandbukta, Lev. 11.1 (TRe).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

To individer ble registrert dette året og er en normal forekomst. Foregående fem år ble følgende antall sett: 2008 (4), 2007 (2), 2006 (0), 2005 (4), 2004 (2).

Alle funn: 1 2K+ Vikaleiret, Fr. 26.1-29.1

(RPe, TSø). 1 ind. Skaga, Nø. 28.3 (OSa).

Stær *Sturnus vulgaris*

ca 109 ind. rapportert som vinterfunn, en flokk på 50 ind. ved Leksdalsvatnet, V. inn i desember er uvanlig.

Større antall, vinter: 9 ind. Vikaleiret, Fro.

30.1-31.1 (TRe, RPe, Ola Sørhuus, Magnus

Sørhuus, HSø). 10 ind. Trøahaugen, Mos. 12.2

(NN via HSø). 22 ind. Lund, Leksdal, V.

3.12-13.12 (TSø, HaS, TFo). 50 ind. Bunes,

Leksdalsvatnet, V. 12.12 (TFo). **Større flokker:**

1000 ind. Grasenga, Ørin, V. 8.8 (TRe). 1000

ind. Eidsbotn, Lev. 9.8 (TRe). 1500 ind.

Storleiret, Fro. 18.8 (RPe). 2000 ind. Fiborgtan-

gen, Lev. 18.8 (OMS, GSæ). 1000 ind. Fleskhus,

V. 22.8 (TMy). 1000 ind. Lånke, Stj. 23.8

(PIV). 1000 ind. Raset, V. 11.9 (TSø, ASø,

HaS). 1000 ind. Stiklestad, V. 14.9 (TSø, HaS).

Rosenstær *Sturnus roseus* NSKF

Årets funn er det femte funnet i fylket og førstefunn for Verdal. De foregående funn er 1 ind. Værnesmoen, Stj. mai 1993, 1 ind. Bruborg, Lev. 15.10.1993, 1 ad. Sklinna, Leka 21.9-22.9.2001 og 1 1K Husby, Leka 20.9-29.9.2005. Funnet fra 2005 er ikke behandlet av NSKF, men er veldokumentert.

Alle funn: 1 1K Verdalsøra, V. 11.10-15.10*

(*RRi m.fl.).

Pilfink *Passer montanus*

Kommunevis oppsummering der arten opptrer i større antall.

Stjørdal: min.387 ind., inkludert hekking i 8 kasser på Vinge (JAA). **Frosta:** min. 322 ind. (ca 60 ind. Tautra), inkl. flere hekkefunn (RPe, TRe). **Levanger:** min. 156 ind. **Verdal:** min. 149 ind. bl.a. 1-2 ind. Sul, medio mars-medio april (WNo). **Inderøy:** min. 52 ind.. **Steinkjer:** min. 60 ind. inkludert et hekkefunn på Vellamelen (AVa). **Leksvik:** 18 ind. Enerhaugen 25.1 (Erna Landsem). **Snåsa:** min. 24 ind. inkludert ett hekkefunn i fuglekasse på Husa (Torbjørn Opheim via PMø). **Namdalseid:** 2 ind. Elden 22.1 (OSa). **Verran:** 2 ind. Ramberg-holmen 18.3 (EJo). 1 ind. Tømte, Follavatnet 25.10-15.11 (EJo, OKA). 1 ind. Malm 19-24.12 (John Haugen).

Bokfink *Fringilla coelebs*

44 ind. er rapportert fra vinteren.

Større antall, vinter: Opptil 8 ind. (6 M + 2 F)

Baglan-Berg, V. 1.1-15.3 (RTK). Opptil 7 ind.

Kåra, Ørin, V. 1.1-22.2 (HSø, RRI, PIN, TRe).

7 ind. Bunes, Leksdalsvatnet, V. 6.12 (TSø,

HaS).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Som for bokfink ble det registrert rekordantall vinterstid; hele 91 ind. er rapportert.

Vinterfunn (jan-feb/des): Stjørdal (18/1).

Frosta (2/0). Levanger (7/1). Verdal (12/2).

Inderøy (6/0). Leksvik (35/0). Steinkjer (0/2).

Verran (0/1). Snåsa (0/1). Flatanger (1/0).

Største antall på en lokalitet: 21 ind. Solgløtt, Vanvikan, Lks. 7.1-25.2 (HPa).

Stillits *Carduelis carduelis*

Typiske trekk som tidligere år, med ett unntak, utelukkende funn fra Frosta og bare funn fra vinterhalvåret. Det er vanskelig å vurdere antall fra Frosta, da det er uklart hvor vidt flokkene streifer rundt og kan opptre både på Tautra og på fastlandet.

Alle funn: Opptil 24 ind. Storleiret, Fr. 3.1-7.2 (MMy, AWi, PWB m.fl.). Opptil 30 ind. Tautra, Fr. 27.1-19.2 (PIN, JEØ, RTK, AIn m.fl.). 24 ind. Åsholmen, Fr. 7.2 (RPe). Opptil 12 ind. Tautra, Fr. 21.10-7.11 (JSa, Erlend Skutberg, TRe, AVa m.fl.). 1 ind. Ørmelen, Verdalsøra, V. 22.10 (TKo). 9 ind. Vikaleiret industriområde, Fr. 4.11 (RPe).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterfunn: Opptil 20 ind. Tautra, Fr. 3.1-7.2

(TGi, PIN, JEØ, RTK, RPe). 4 ind. Lørviklei-

ret, Børgin, I. 4.1 (Ain, BIn, KIn, Camilla

Indahl). Opptil 2 ind. Nordfjæra, Frosta, Fr.

27.1-29.1 (RTK, JEØ, PIN, TSø). Opptil 70

ind. Storleiret/Vikaleiret, Fr. 27.1-1.2 (PIN,

JEØ, RTK, RPe). 12 ind. Holsandbukta, Lev.

28.12 (OMS).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Årets forekomst på minst 30 ind. er meget sterk, og den beste forekomsten siden 1995 da over 70 ind. ble registrert. Nesten alle ind. ble registrert på etterjulsvinteren. Foregående fem år ble

Kjernebiter på foringsplass i Vellamelen 18. januar 2009. Foto: Arne Vanebo.



følgende antall ind. registrert: 2008 (3), 2007 (4), 2006 (4), 2005 (3), 2004 (8).

Alle funn: 1 M Baglan-Berg, V. 4.1-17.1 (RTK). 1 M Kåra, Ørin, V. 15.1-4.2 (TSø, HSø). 1 F Baglan-Berg, V. 7.2-28.2 (RTK). 1 M Sul, V. 23.1-20.3 (WNo). 1 ind. Vellamelen, Ste. 31.1 (AVa). 1 ind. Lensmyra, Røra, I. 6.2 (TMy). 1 ind. Vikaleiret, Fr. 7.2-10.2 (RPe). 1 ind. Ulvilla, V. 8.2 (IJI). 1 ind. Solgløtt, Vanvikan, Lks. 13.2-14.2 (HPa). 2 ind. Nordgata, Verdalsøra, V. 14.2 (HSø, Ola Sørhuus, Magnus Sørhuus). 1 ind. Momarka, Halsan, Lev. 14.2 (OMS). 1 ind. Vikanvegen, Stj. 14.2-12.3 (TRØ). 1 ind. Grønveien-Snåsa, Sn. 14.2-22.2 (BBø). 1 M Tuvliveien Mære, Ste. 15.2-21.3 (MSt). 1 ind. Skogmo, Lev. 27.2 (PWB). 1 ind. Staupshaugen, Lev. 2.3 (TRe). 1 ind. Fagerheim, Ste. 3.3 (PIN). 4 ind. Prestmoen, Stj. 16.3 (Jonny Sørmo). 1 M Baglan-Berg, V. 21.3-29.3 (RTK). 1 ind. Nordskaget, Trones, V. 28.3 (HSø, Ola Sørhuus, Magnus Sørhuus). 2 ind. Strådalen, Vera, V. 5.4-12.4 (TMy). 2 ind. Heståsdalen, Lev. 5.4-7.4 (JEØ). 1 ind. Heimøya, Sklinna, Lk. 21.10 (IHa). 1 ind. Ulvilla, V. 29.12 (IJI).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

Kun 4 ind. ble registrert dette året.

Foregående fem år ble følgende antall ind. registrert: 2008 (35), 2007 (11), 2006 (2), 2005 (1), 2004 (25).

Alle funn: 1 M Heståsdalen, Lev. 7.4 (TVa). 1 ind. Lømarka, Nø. 30.7 (TRe). 1 F + 1 ind. Tautra, Fr. 1.11-6.12 (OMS, TSø).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

I hekketida ble arten funnet på tre lokaliteter, mens det var to høstfunn.

Årstotalen er dermed på 5 ind. Foregående fem år ble følgende antall ind. registrert: 2008 (4), 2007 (0), 2006 (3), 2005 (1), 2004 (5).

Alle funn: 1 2K M sy Holmen Gård, Vuku, V. 1.6-9.6 (AIn, IJI, BIn, KIn, Camilla Indahl, OMS). 1 3K+ M sy Bjørstadhøgda, Helgådalen V. 22.6-23.6 (Tore Sagvold). 1 sy Skatval kirke, Stj. 28.6-30.6 (ASø, HaS, TSø, JAA). 2 1K ringmerket Sklinna, Lk. 23.9-30.9 (PRh, MRh, GNi, HLi).

Konglebit *Pinicola enucleator*

En etterdønning fra en mindre invasjon høsten før kunne merkes på nyåret, mens ingen registreringer fra hekkeområdene og høsten foreligger. Totalt 42 ind. ble registrert i de to første månedene av året. Foregående fem år ble følgende antall ind. registrert: 2008 (51), 2007 (15), 2006 (94), 2005 (1), 2004 (34).

Alle funn: Opptil 27 ind. Heggstad, I. 5.1-10.1 (JEØ, RTK, KKr, HSø, TSø, TRe, AVa). 5 ind. Strand, Falstadbukta, Lev. 1.2 (TRe, AKo). 10 ind. Volhaugen, V. 15.2 (HSø, Ola Sørhuus).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Ca 81 ind. rapportert i 2009 mot ca 110 ind. i rekordåret 2008. Spesielt å bemerke dette året var den sterke forekomsten av vinterfunn, mest på opptil 12 ind. i januar på Vellamelen, Steinkjer.

Hekkefunn: 1 par + 4 1K Holmen Gård, Vuku, V. 10.4-25.9 (AIn, KIn, BIn). **Øvrige funn:** Opptil 4 M + 2 F Husbymarka, Stj. 1.1-30.5



Konglebit Heggstad, Inderøy 7. januar 2009. Foto: Terje Kolaas.

(GHa, BNy, KKr). Opptil 12 ind. Vellamelen, Ste. 1.1-5.12 (AVa, RTK, AKo, ASø, EMo, TSø). Opptil 14 ad + 2 1K Fagerheim, Ste. 2.1-17.9 (PIN). 2 ind. Mediå, G. 10.1-1.3 (Jens Gaundal). 1 ind. Formo, G. 11.1 (OMo). 1 ind. Korstad, Skjelstadmarka, Stj. 25.1 (Per Hugo Teigen). 1 ind. Tuvliveien Mære, Ste. 8.2 (MSt). 1 ind. Fugletårnet, Hammervatnet, Lev. 12.2 (TSø). 1 ind. Solgløtt, Vanvikan, Lks. 20.2-22.3 (HPa). 2 ind. Vuddudalen, Lev. 7.3 (Ole Vordal). 1 ind. Vanvikan, Lks. 27.3 (Kåre Pedersen). 1 ad Gran, Granabukta, Sn. 2.4 (PMø). Opptil 3 ind. Skei, Stj. 4.4-9.4 (JKS, VSk). Opptil 5 ind. Fagerhøy, Stiklestad, V. 9.4-23.5 (TSø, HSø, HaS, AMS). 1 par Geilvoll-Vibe, Ste. 9.4 (PIN). 1 ind. Ulvilla, V. 10.4-25.6 (IJI). 2 par Reppesleiret (Værnesleiret), Stj. 28.4-4.5 (BGS). Opptil 3 ind. Lerkehaug, Ste. 10.5-17.5 (AOL). 1 par Ørdalen, I. 21.5 (RTK, JKN). 1 ind. Tømte, Follavatnet, Vr. 14.6 (OKA). 1 ind. Bjørstadhøgda, V. 23.6 (Tore Sagvold). 2 ind. Stene, I. 31.8 (OMS, GSæ). 2 ind. Reppe, Leirådal, V. 4.9 (TRe). 2 ind. Baglan-Berg, V. 20.9 (RTK). 1 ind. Feskarvegen, Verdalsøra, V. 12.10 (IJI). 1 M. Mosvik 9.11 (ALo). 1 ind. Åtlo, Fr. 29.11 (TSø, ASø). 1 ind. Levanger

sykehus jernbaneholdeplass, Lev. 26.12 (OMS, TMS).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Trekkobservasjoner: 1 ind. Åstjønna, Forradal, Stj. 25.4 (PIV). 1 M + 1 F Sveet, Vera, V. 1.5 (TSø, IJI, ASø). 1 ind. Skurdalsvoll dammen, Me. 8.5 (MVe, Leif Arne Lien). 1 M Sessilvol-len, Vera, V. 10.5 (AIn, KIn). 1 M Kvelia, Li. 10.5 (MVe, Leif Arne Lien). 1 F Rinnleiret, Lev. 17.5 (Torgeir Møst). 1 ind. Sklinna, Lk. 21.9-22.9 (PRh, MRh, GNi, HLi). **Funn fra hekkeområdene:** 1 sy Auretjønna, Vera, V. 7.6 (IHa). 1 par varslende Vestre Lødølsjøen, Me. 21.6 (AWi).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterfunn: 1 ind. Klingsundet, Ste. 14.1 (BNy). 4 ind. Kåra, Ørin, V. 8.2 (Per Østnes). 30 ind. Ørin, V. 3.12 (ASø, TSø, OMS, GSæ). 8 ind. Alnesfjæra, Lev. 31.12 (TRe).

Sivspurv *Emberiza schoeniclus*

Første vårfunn: 1 sy. M Langåsdammen, Lev. 10.4 (MMa, MKI, ESj).

Observatører


AIn	Arnstein Indahl	IHa	Inge Hafstad	PWB	Per Willy Bøe
AKo	Anne Kolstad	IJI	Inge Joar Indahl	RJa	Runar Jacobsson
ALo	Arnold Lorentsen	IJØ	Ingar J. Øien	RPe	Roar Pettersen
AMS	Anne Mari Sørhuus	JEØ	Jan Eyvind Østnes	RRi	Roar Rismark
AOL	Arnulf Oddbjørn Langli	JKN	Jon Kristian Norum	RTK	Rolf Terje Kroglund
ASø	Anders Sørhuus	JKS	Jon Kristian Skei	SMo	Steinar Moe
AVa	Arne Vanebo	JSa	Jostein Sandvik	SNK	Stein Narve Kjelvik
AWi	Andreas Winnem	JAA	Jo Anders Auran	TBo	Tor Bollingmo
BAS	Bjørn Arild Steinsmo	KAG	Kari Groven	TFo	Trygve Forberg
BBe	Bjørn Berg	KAS	Kjetil Aadne Solbakken	TGi	Terje Gimnes
BES	Beata E. Solbakken	KBS	Kåre B. Sunde	TKo	Terje Kolaas
BFu	Bjørn Fuldseth	KIn	Kristoffer Indahl	TKv	Thomas Kvalnes
BIn	Bodil Indahl	KIU	Karl Inge Uppstrøm	TMS	Trond Martin Sæterhaug
BLy	Bjørn Lysklett	KKr	Knut Krogstad	TMy	Torstein Myhre
BNy	Bård Nyberg	KKz	Karel Krizak	TRe	Tore Reinsborg
DBo	Dave Bowes	KLa	Kjell Larssen	TRØ	Tom Roger Østerås
DOB	Dag O. Bollingmo	KTL	Kjell Thore Leinhardt	TSø	Trond Sørhuus
EBa	Erik Bangjord	LKL	Line-Kristin Larsen	TVa	Tore Vang
EHu	Einar Hugnes	MHu	Magne Husby	VSk	Victoria Skei
EIG	Eirik Grønningsæter	MKI	Magnar Klingan	WNo	Willy Norli
EJo	Even Johansen	MMA	Morten Martinsen		
ELD	Espen Lie Dahl	MMY	Magne Myklebust		
EMo	Erlend Moen	MRh	Mikael Rhönnsstad		
ESp	Eirik Spets	MSt	Magne Stavran		
ESæ	Einar Sæter	MVa	Morten Vang		
EWe	Egil Ween	MVe	Morten Venås		
FFa	Frode Falkenberg	NKG	Nils Kristian Grønvik		
GBa	Georg Bangjord	OHe	Oddvar Heggøy		
GDy	Gunnar Dybvik	OKA	Ole-Kristian Antonsen		
GKj	Gunnar Kjærstad	OMo	Oddvar Moa		
GNi	Gunnar Niklasson	OMS	Ole Martin Sæterhaug		
GSæ	Gisle Sæterhaug	ONo	Ola Nordsteien		
HaS	Hanna Sørhuus	OSa	Ove Sandvik		
HLi	Henrik Lind	PIN	Per Ivar Nicolaisen		
HPa	Hauk Paulsen	PIV	Per Inge Værnesbranden		
HSø	Halvor Sørhuus	PMø	Pål Mølnvik		
IBu	Ingvild Buran	PRh	Patrik Rhönnsstad		



Litteratur

- Bevanger, K. 2005: Nye dyrearter i norsk natur. Landbruksforlaget, Tun Forlag.
- Nygård, T. & Reinsborg, T. 2010. Prosjekt vandrefalk Nord-Trøndelag. Årsrapport 2009. Norsk Ornitologisk Forening (unntatt offentlighet) 17 s.
- Olsen, T. A. & Mjøltnes, K. R. 2009: Sjeldne fugler i Norge i 2007. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 32: 4-41. Norsk Ornitologisk Forening.
- Reinsborg, T. 2008. Kartlegging av horndykker i Nord-Trøndelag i 2007. Minirapport – Norsk Ornitologisk Forening 7 s.
- Reinsborg, T. & Bangjord, G. 2007. Vintererla i Trøndelag. Trøndersk Natur (1) 34: 4-13.
- Reinsborg, T., Værnesbranden, P. I., Sørhuus, T., Kolaas, T. & Nyberg, B. 2009. Fugler i Nord-Trøndelag 2008. Trøndersk Natur (2). 36: 6-25.
- Solheim, R. 2009: Lappugla – en klimaflyktning på vei sydover? Vår Fuglefauna 32: 164-169.
- Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. & Solbakken, K. Aa. 2009: Fugler i Sør-Trøndelag 2008. Meddelelse nr. 33 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomite for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag. Trøndersk Natur (2) 36: 26-51.

Generelle råd ved rapportering i Artsobservasjoner



LRSK i Sør- og Nord-Trøndelag registrerer med glede at de fleste aktive fuglekikkere i fylket nå har begynt å legge inn sine observasjoner på nettsiden www.artsobservasjoner.no/fugler. En observasjon som er lagt inn i Artsobservasjoner er å betrakte som rapportert til LRSK. Komitéene bruker Artsobservasjoner som verktøy til å samle og bearbeide funnmassen som presenteres i rapportene.

Ved innlegging i Artsobservasjoner oppfordres observatørene til å ta med så mye relevant informasjon som mulig om hvert enkelt funn. Art, antall, lokalitet og dato er helt nødvendig, mens alder og kjønn bør tas med for arter hvor det er relevant. Husk at systemet automatisk foreslår dagens dato når du legger inn observasjoner. Hvis funnet er gjort tidligere, må du aktivt endre både startdato og sluttdato under rapporteringen. Klokkeslett kan også være av betydning, for eksempel for å avgjøre hvor mange individer av grønlandsmåke som er sett i Trondheim i løpet av en vinter.

Aktivitet og hekketrium angis i dag i samme felt i rapporteringsskjemaet. Forhåpentligvis vil dette bli endret i en fremtidig versjon. Prioriter å bruke hekketrium der det er relevant. Det er viktigere å rapportere en fugl som "observert i hekketid, passende biotop" enn som "næringssøkende". Hvis du har sett et andekull og angir "pull" under Alder, uten samtidig å velge hekketrium, blir ikke funnet registrert som hekking i systemet. Det blir det heller ikke hvis du kun bruker kommentarfeltet for å beskrive hekking, uten at et hekketrium velges som aktivitet.

Det er også viktig å velge det kriteriet som er det sterkeste beviset på hekking. Hvis du har funnet et reir med unger i, og ser at foreldrene kommer og mater ungene, er riktig valg "Reir, egg/unger", og ikke "Mat til unger". Sistnevnte er i hovedsak aktuelt for spurvefugler hvor du ser voksenfugler med mat, men ikke har funnet noe reir.

Bruk alder når det er relevant, men la gjerne være ellers. Å oppgi alderen til en fugl som 1K+, eller som 2K+ på etterm vinteren og våren, gir i realiteten ingen nyttig informasjon om funnet. Alle fugler er per definisjon 1K+. Ofte er det å foretrekke å bruke betegnelsen adult fremfor 2K+. Til høyre på hver linje i rapporteringsskjemaet går det an å hake av for "skal rapporteres til LRSK". Bruk denne når du rapporterer spesielle funn som ikke fanges opp av rapporteringsmalen. Det kan for eksempel være en lirype i Trondheim, eller en skogsnipe på Frøya. For alle observasjoner som fanges opp av rapporteringsmalen, trenger du derimot ikke aktivt å fortelle systemet at LRSK skal varsles om funnet. Dette skjer automatisk for disse artene, og det forenkler komitéarbeidet om disse ikke tagges med "skal rapporteres til LRSK".

All saksbehandling av uvanlige funn skjer nå også i Artsobservasjoner. Har du sett en art som LRSK eller NSKF ønsker beskrivelse av, så skal beskrivelsen lages i Artsobservasjoner. Når du har logget inn, vil du nederst til høyre på forsiden finne en restanseliste hvor du finner alle dine observasjoner som skal beskrives. Klikker du på ett av funnene i listen, så vil et skjema komme frem. Her kan du lage beskrivelse og laste opp bilder og annen dokumenta-

sjon. LRSK oppfordrer observatørene til å bruke Artsobservasjoner til å beskrive funn. Dette er arbeidsbesparende både for observatørene og for LRSK. Hvis du ikke finner en art i restanselisten din, så kan du også søke den opp under fanen "Vis funn", og så trykke på "Administrer funn". Til høyre på linjen for observasjonen skal det da være et skjemasymbol. Trykker du på dette, vil rapportskjemaet komme frem. I dag tar det imidlertid opp til et døgn fra en observasjon legges inn til det er mulig å lage en beskrivelse, noe som forhåpentligvis vil bli endret.

Lag gjerne beskrivelser så fort som mulig etter at observasjonen er gjort. Det er ingen grunn til å vente til årets slutt når observasjonen ikke lenger er fersk men kun et fjernt minne. LRSK ser gjerne at eventuelle digitale bilder lastes opp i full oppløsning sammen med beskrivelsen. Dokumentasjonen er da bevart i LRSK sitt arkiv for ettertiden, og den kan brukes til å illustrere rapporten for det aktuelle året. Bilder som lastes opp til allmenn beskuelse i Artsobservasjoner, blir automatisk komprimert av systemet. Bildene bør derfor lastes opp på nytt når en beskrivelse lages. Fristen for å lage beskrivelser til LRSK og NSKF er 1. februar året etter observasjonen er gjort. Funn som beskrives etter dette, vil i noen tilfeller ikke komme med i rapporten for det aktuelle året men i stedet bli publisert i neste årsrapport.

Alle observatører oppfordres til å legge inn sine observasjoner fra 2010 i Artsobservasjoner så fort som mulig, da arbeidet med disse rapportene påbegynnes umiddelbart.

Goose Specialist Group Meeting i Höllviken, Sverige – 2009



Av Paul Shimmings & Per Ivar Nicolaisen

Siden 1995 har the Goose Specialist Group i Wetlands International (WI) og International Union for the Conservation of Nature (IUCN) avholdt flere regelmessige møter. I 2009 ble det 12. møtet i "gåsegruppa" avholdt i Höllviken i Sverige i perioden 9. – 14. oktober. Höllviken ligger ca. 1 mil nord for Falsterbo, som mange kjenner som et meget viktig område for å kunne observere store mengder med trekkfugler. Området er også brukt av store mengder med gjess i trekkperiodene.

De fleste deltakere fikk sett seg rundt i området og så mengder med både trekkfugler og flokker med beitende gjess, bl.a. ble det, under perioden møtet pågikk, observert tusenvis av grå- og hvitkinngjess, samt et mindre antall sæd- og kanadagjess. Andre høydepunkter var flokker med traner og trekkende rovfugler. For oss nordmenn var det artig å se et tosifret antall glenter i løpet av noen få minutter under en pause i konferanseprogrammet.

Og så til selve konferansen. Med til sammen 100 deltakere fra 19 land var det forventet et stort faglig utbytte blant vi som er glad i gjess. Det var til sammen 6 deltakere fra Norge – 1 bosatt i Troms, 1 fra Nordland og 4 bosatt i Trøndelagsfylkene – så Midt- og Nord-Norge var usædvanlig godt representert på møtet! Et tettpakket program med flere foredrag, diskusjoner og sosialt samvær lovet bra. Og møte gikk over alle forventninger! Det er umulig å velge ut enkelte foredrag eller resultater som ble

Kortnebbgåsgruppen samlet. Fra venstre: Paul Shimmings (N), Per Ivar Nicolaisen (N), Jesper Madsen (DK), Christine Verscheure (B), Eckhart Kuijken (B), Fred Cottaar (NL) og Ingunn M. Tombre (N). Bildet øverst: Fra ekskursjonen til Falsterbo.





Fra foredragssalen.

presentert under møtet. Det ble presentert resultater fra undersøkelser om blant annet bestandsendringer, populasjonsdynamikken, områdebruk både på hekke-, trekk- og overvintringsplasser, om problemer knyttet til forvaltning, konflikter med landbruk og mulige løsninger på disse, om introduserte arter, om merking av gjess og resultatene fra merkingen (både med fotringer, halsringer og satellitmerking). En hel ettermiddag ble brukt til en workshop om sædgås og dens status, utbredelse, forvaltning og underarter. Dessverre var det få foredrag om økologien – noe som flere savnet og som har vært mye mer i fokus under tidligere møter. Men dette til tross, så var dette et møte med et veldig høyt faglig nivå.

Siden begge artikkelforfattere er spesielt opptatt av kortnebbgjess og at en av oss også jobber med hvitkinngås presenterer vi her et kort sammendrag av resultatene som ble lagt fram under møtet når det gjelder disse to artene og spesielt det som er relevant i forvaltningen av disse.

Mandag 12. Oktober var det "mini-workshop" hvor kortnebbgåsgruppa, bestående av 3 norske (inkludert begge forfattere), 1 danske, 1 nederlandsk og 2 belgiske deltakere, fikk snakket litt om erfaringer og forskningsresultater på en uformell måte. Det må legges til at det smakte fortreffelig med deilig belgisk sjokolade under workshopen. Fra flere hold ble det nevnt om

samspillet mellom kortnebb- og hvitkinngjess, både i hekke- og overvintringsområder, der hvitkinngjess fortrenger kortnebbgjess. Til tross for at hvitkinngås er mye mindre i størrelse enn kortnebbgås så viser observasjoner at hvitkinngjess er skikkelige hissigpropper! Som eksempel så har man i Nederland observert at hvitkinngåsa "overtar" områder som tradisjonelt har blitt beitet av kortnebbgjess. På våren er hvitkinngås observert å jage vekk kortnebbgås på rastelokaliteter i Vesterålen. På øya Kolguev i den russiske polarområdet jager hvitkinngåsa tundra gjess fra beiteområder og utkonkurrerer sistnevnte i kamp om maten – tundra gjess er også mye større enn hvitkinngås.

Det kom fram under møtet i Höllviken at hvitkinngjess øker i antall i områder i Danmark der det er lagt ut korn til kortnebbgjess, for å lokke kortnebbgjess til områder der de skaper mindre konflikt med landbruk. Dette er også blitt lansert som en løsning om våren i Nord-Trøndelag, men anbefales ikke da dette kan føre til en økning i antall rastende hvitkinngjess i trekktiden (antall rastende hvitkinngjess i Trøndelag har økt både på vår- og høsttrekk de seinere år). At hvitkinngåsa raskt kan endre matvaner ble godt illustrert da vi fikk høre at det er nå rundt 135.000 (!) som i oktober ernærer seg på sukkerbete i Skåne i Sverige – en plante de har tatt i bruk relativt nylig. Før de oppdaget sukkerbete var det få hvitkinngjess i Skåne om høsten.

"Proceedings" fra møtet i Höllviken skal publiseres i et kommende nummer av *Ornis Svecica*.

Goose Specialist Group er åpen for alle med en spesiell interesse for gjess. Gruppe har en egen webside www.geese.nl/gsg/. På websiden finner man mye informasjon om hvordan gruppa opererer, oppsummeringer fra de siste møtene og om hvordan man kan melder seg inn i gruppa.

Siden møtet i Höllviken har ting gått sin gang i Nord-Trøndelag. Kortnebbgjessene har atter gjennomført sitt vårtrekk og en forvaltningsplan for vår- og høsttrekkende kortnebbgås i Nord-Trøndelag er publisert. Forvaltningsplanen foreslår en rekke tiltak som i sum gir et godt grunnlag for en bærekraftig forvaltning av kortnebbgås, med et redusert konfliktnivå. Blant annet foreslås det i rapporten at man frigjør areal til beite gjennom støtteordninger, økt jakt på bestanden, kartlegging av beiteskader, samt tilrettelegging for økt turisme knyttet til fuglekikking.

Artikkelforfatterne ønsker å takke Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag for økonomisk støtte til å kunne delta på møte i Höllviken.

Forfatternes adresser:

Paul Shimmings, 8980 Vega
Per Ivar Nicolaisen, 7716 Steinkjer

18. april 2010. Fugletitting på Tautra. Hilsen fra Hanne H.M.



Jentan på tur! Foto Ingebjørg Vestrum, Frostingen.

Historiens første fuglekikkerkurs for kvinner i Nord-Trøndelag

Av Hanne Holthe Munkeby

Itre dager, 16-18. april, holdt Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag et jentekurs på Tautra. Med innkvartering på Klostergården og hele øya til disposisjon for 20 jenter i alle aldre ble dette ei spennende helg. Anne Kolstad (NOF-NT), Verdal, ledet kurset og med god hjelp at dyktige fugle-eksperter som Magne Husby, Andreas Meyer Winnem, Tore Reinsborg, Per Inge Værnesbranden og Inge Hafstad fikk vi oppleve noen

unike stunder på den vakre øya. Roar Pettersen, oppsynsmann på Tautra, fortalte om øya og reglene for hvordan vi som turister skulle forholde oss til de fredede områdene. Været var ikke helt på vår side, det regnet, det snødde og det blåste, men hva gjør vel det når man vet å kle seg og når alle hadde vært ute en "vinterdag" før. Av og til var det oppholdsvær, sola kom fram og lyste opp terrenget og vi fikk øye på enda flere av de vakre fuglene.

Med kikkert, telelinse og teleskop med zoom, med sekk på ryggen som inneholdt termos og mat gikk vi stille fram, fra post til post og studerte de mange fugleartene som holder til på øya. Til sammen i løpet av oppholdet kunne vi summere opp at vi hadde sett og også hørt 60 forskjellige fuglearter!

En utrolig samling av vakre fugler! Vi ble delt inn i små grupper i felt ved ulike lokaliteter på øya og med dyktige guider gikk vi rundt og kikket, noterte,

tok bilder og guidene svarte på absolutt alt som vi spurte om innen fugle verden.

Fuglelydene skulle også læres, men om ikke alle sitter i husken og forbindes med den rette fuglen enda, har vi fått en bra start slik at det kan bli enda mere interessant å farte rundt i naturen.

På ettermiddagene og kveldene ble det sosialt samvær med foredrag, lysbildeframvisning, fortelling om fugleopplevelser og vi ble godt kjent med de fleste deltakerne på kurset. Det ble også undervist i fugleregistrering på PC, rapportering og en presentasjon av

artsdatabankens rapporteringsdatabase for fugler. Fuglelivet i Trøndelag fikk vi også en orientering om og hvor i fylket man kan få øye på de forskjellige artene. Noen seinkvelder ble det ikke ettersom vi startet dagene klokka 0600 og som er vanlig for oss med fugleinteresse.

Søndag kveld var vi alle vel hjemme igjen etter mange kilometers gange, fram og tilbake, mange notater, mange besvarte spørsmål og mange hadde med seg en god del bilder på minnebrikken. Altså et vellykket jentekurs som vi gjerne vil møte opp på igjen når det blir en ny sjanse.



Hilsen fra Hanne. 16. april 2010.

Lunsj på klostergården. Foto: Hanne Holthe Munkeby.

Spesielle observasjoner

FØRSTE HALVÅR 2010



Emil Kristoffer Krokan

Denne gangen dekker vi perioden 1. januar t.o.m. 30. juni 2010.

Observasjonene er hovedsakelig hentet fra artsobservasjoner (artsobservasjoner.no/fugler)

Det understrekes at ingen av observasjonene er behandlet av NSKF eller LRSK.

Bildet øverst: Taffeland hann Nedre Leirfoss 23. februar 2010. Foto: Emil Kristoffer Krokan.

Lommer - andefugler

Det ble rapportert en god del **gulnebb-lommer** i Trøndelagsfylkene gjennom dette halvåret, observasjonene ble gjort i Ørlandet, Bjugn, Åfjord, Flatanger, Levanger, Frosta, Verdal og Leka kommune. Også en rekke **islommer** ble observert i Trøndelag. En **dvergdykker**

ble sett i Strømmen, Rissa 31.1. Hele 19 **toppdykkere** ble observert utenfor Tautra 6.2, ellers ble det rapportert **toppdykkere** ved flere lokaliteter i begge fylkene. En **egretthege** ble observert i Leksdalsvatnet 17.-18.5.

To **dvergsvaner** ble observert på Ørlandet i månedsskiftet mars/april. Det ble registrert en rekke **tundragjess** og **sædgjess** i NT det første halvåret, også noen få observasjoner ble gjort fra ST. En **ringgås** ble observert i Fiborgtangen mellom 27.4-9.5. Også ett individ ble rapportert fra Innstrandfjæra, Ørlandet 3.5.

En **mandarinand** ble observert i Fiborgtangen 29.4. En mandarinand hann ble sett ved Mortensbru, Stjørdal 5.5. En **mandarinand** ble observert ved Seemsøra, Snåsa gjennom hele mai, og ved en anledning i juni. En **mandarinand** hann ble oppdaget ved Krokan, Glåmos 13.5. Det ble regel-

messig sett **snadderender** ved flere lokaliteter i begge Trøndelagsfylkene.

Det ble også hyppig rapportert **skjeender** fra begge fylkene, blant annet kan en hunn med 10 pull på Tautra trekkes fram. En **amerikakrikkand** hann ble observert 5. og 6. mai ved Storøya, Selbu. Mellom 13. og 15. mai ble en **amerikakrikkand** sett ved Vera. En kryssning mellom **krikkand** og **Amerikakrikkand** ble sett i Laugen, Skaun 5.5. En **knekkand** hann ble sett utenfor Ørin i perioden 10.-18.4. Også en hannfugl hadde tilhold ved Storøya, Selbu i fra 29.4-9.5. I Laugen, Skaun ble en **knekkand** sett mellom 9.-15.5. En longstayer ble sett i Gaulosen i midten av mai og sist i starten av juni. En **knekkand** ble sett i Leksdalsvatnet ved flere anledninger i midten av mai. Ellers ble enkelt-individer sett i Litlvatnet, Sessilvollen, Hibergtjønna, Storleiret, Fiborgtangen

og i Vikanbukta i mai/juni. En adult **taffelend** hann ble observert i Nidelva mellom Svean og Nidarø i tidsperioden 31.1-20.3. Også en voksen **taffelend** hann ble sett i Klingsundet mellom 25.-27.4. En **taffelend** hann ble observert ved Volløya, Tr.heim 6.5. To hannfugler ble sett i Leksdalsvatnet 8.5. En hann ble sett i Halsøen, Stjørdal 9.5. Årets første **taffelend** hunn ble sett i Lømsen 12.5. To **taffeler** ble observert i Øytjønna 13.5. En hann ble sett ved Sandfærhus i midten av mai, og ett **taffelpar** ble observert i Litlvatnet, Agdenes i slutten av mai. Opptil 14 **praktærfugler** ble observert ved Innstrandfjæra, Ørlandet 1.1, også ett ind. ved Uthaug samme dag. En adult hann **praktærfugl** ble sett i Straumen, Inderøy gjennom hele januar. En **praktærfugl** ble observert utenfor Bingsholmsråsa, Åfjord 20.1. To **praktærfugler** ble sett ved Hoøya 24.1. En ung **praktærfugl** hann ble observert utenfor Døsvika, Ørlandet 11.2. Fire **praktærfugler** ble sett ved

Lakskløholmen, Ørlandet 16.2. En **praktærfugl** ble sett utenfor Garten 21.3. 14 **praktærfugler** ble sett utenfor Hoøya 11.4. En **praktærfugl** hunn ble observert utenfor Midtsandan, Malvik 11.4. En **praktærfugl** hann ble sett ved Bjugnholmen 14.4. En **praktærfugl** hann ble observert ved Åtlosanden, Frosta 16.4. En **praktærfugl** ble observert ved Ytterøya 15.5. Og 25.5 ble sannsynligvis samme individ sett utenfor Mosvik. En **brilleand** ble hadde et 4-dagers opphold utenfor Ørin i midten av mai. En **brilleand** hann ble observert utenfor Hoøya, Ørlandet 14.6. En **lappfiskand** hunn ble sett ved Strømmen, Rissa 6.2, og en adult hann ble observert i Gammelosen, Orkanger 7.2. En **lappfiskand** hann ble observert ved Vessøra, Kyrksæterøra i perioden 6.-21.3. En **lappfiskand** hadde tilholdt i Klingsundet en måneds tid fra midten av april og utover. I midten av mai ble et **lappfiskandpar** observert regelmessig ved Ånøya.

Rovfugler - trane

Intet mindre enn en satelittmerket **storskrikørn** 3K+ hann var på flere svippturer innom Norge, deriblant Nord- og Sør-Trøndelag, i juni! Uheldigvis ble den aldri sett av en av "våre", men kun registrert pr. satelitt. Fuglen ble merket som reirunge i Vest-Estland i 2008 og bærer navnet Tönn. En **svartglente** ble sett ved flere anledninger i Verdal, mens den streifet mellom flere lokaliteter i juni. En **sivhauk** hann ble observert ved Hofstad, Melhus 11.5. En **sivhauk** ble sett i Hammervannet, Levanger 23.5. En **sivhauk** ble observert i Vikvarvet, Selbu 11.6. En **sivhauk** hann ble sett ved flere anledninger i Leksdalsvatnet i juni, etterhvert ble også en hunn observert. En **musvåk** ble sett i flukt over Langåsdammen, Levanger 21.2, og så ett individ ble rapportert fra Helgådalen, Verdal samme dato. En **musvåk** ble observert i Sør-Modalen, Rissa 16.5. En **musvåk** ble rapportert

Taffelend hann Nedre Leirfoss 23. februar 2010. Foto: Emil Kristoffer Krokan.





Sivhøne Nedre Leirfoss 22 april 2010. Foto: Trond Haugskott.

fra Leksdalsvatnet 24.5. En **musvåk** i Gjersvikbukta, Røyrvik 26.5. En **musvåk** ble observert i Røra, Inderøy 4.6. En **lerkefalk** ble observert ved Sanddøla, Lierne 17.5. Halvårets andre **lerkefalk**-observasjon ble gjort ved Ausa, Leksdalsvatnet 13.6.

En **åkerrikse** ble hørt krekse ved Brakstad, Levanger i hele juni. En **åkerrikse** ble hørt ved Grandan, Steinkjer 22.6, og ut måneden. En **sivhøne** ble oppdaget nedenfor kraftverket ved Nedre Leirfoss, Trondheim 21.4. En **sivhøne** ble observert i Hammervannet 9.5. En **sivhøne** ble sett ved Hofstad, Melhus 13.6.

Vadefugler - alkefugler

En **fellmyrløper** ble oppdaget i Halsøen 24.5. To **fellmyrløpere** ble observert utenfor Ørin 5.6. Halvårets store høydepunkt var da en **tereksnipe** ble oppdaget i Grandefjæra 11.6, til manges skuffelse ble den sett bare i kort tid. To **svarthalespover** ble observert i Fiborgtangen 16.4. En **svarthalespove** ble sett i Vellamelen, Steinkjer 30.4. En **svarthalespove** ble oppdaget i Buvika, Skaun 9.5. Også ett ind. I Brekstad-fjæra samme dag. En **svarthalespove** ble sett i Gaulosen 10.5. Tre **svarthalespover** ble sett i Botngård, Bjugn 12.5.

To **dvergmåker** ble sett på Ørin 22.5. To adulte **dvergmåker** ble sett i

Lømsen, Steinkjer 23.5. To **dvergmåker** ble observert Leksdalsvatnet i slutten av mai. Ett **dvergmåkepar** ble observert ved Kvamsholman, Inderøy 25.5. En 2K **dvergmåke** var stasjonær i Gaulosen fra 29.5-7.6. Hele åtte **dvergmåker** ble det meldt fra Huddingselva, Røyrvik 29.5. To **dvergmåker** ble sett i Eidsbotn, Levanger 19.6. Det ble meldt om en voksen **polarmåke** i Lysøysundet 3.1. En adult **grønlandsmåke** ble observert i Halsøen, Stjørdal 16.1. En ung **grønlandsmåke** ble sett ved Åsholmen, Frosta 6.2. En 2K **grønlandsmåke** var stasjonær ved Vessøra, Kyrksæterøra i perioden 7.3-23.4. En adult **svarterterne** ble observert i Gaulosen 19.6.



Svarthalespove Buvika 12. mai 2010. Foto: Trond Haugskott.

Duer - spetter

Trøndelags første overvintrende **skogdue** ble funnet i Trollsvingen, Charlottenlund 9.1, den ble sist sett 1.2. En **skogdue** ble sett i Soknedalen 14.4. Ett **skogduepar** ble observert ved

Vollhaugen, Verdal i midten av mai. Ett høyt antall **haukugler** har blitt rapportert fra begge Trøndelagsfylkene i første halvåret. En **hærfugl** ble rapportert fra Løkken skole, Meldal 25.5. En **hærfugl** ble observert på Fannrem 16.6. En **isfugl** ble observert

kort i det den fløy forbi fugletårnet, Gaulosen og ut fjorden 15.5. Det ble observert flere **vendehalser** fra begge Trøndelagsfylkene i dette halvåret, virker som om bestanden i Trøndelag har en positiv utvikling.



Skogdue Charlottenlund 10. januar 2010. Foto: Emil Kristoffer Krokan.

Spurvefugler

En **nattergal** ble hørt ved Fagerlia, Meråker mellom 15.-17.5. Også en **nattergal** ble rapportert fra Kjønnsvika, Hemne 16.6. En hunnfarget **svartrødstjert** ble observert rundt Sklinna fyr 13.5. I begynnelsen av mai ble en hunnfarget **svartrødstjert** sett på Volløya, Tr.heim og i Munkeby, Levanger. En **gresshoppesanger** ble hørt syngende ved Hellandsjøen, Hemne mellom 24.5-25.6. En **myrsanger** ble rapportert syngende ved Hellandsjøen 29.5. En **bøksanger** ble meldt fra Rengen, Lierne 16.5. Også en **bøksanger** ved Jersåsen, Lierne samme dag. En **bøksanger** ble observert syngende ved Reksåsvatnet, Hølonda 24.5. To **bøksanger** hanner ble observert syngende ved Breidvik, Snillfjord 24.5. En **bøksanger** ved Varsmoen, Meldal 1.6. Det ble meldt om en **bøksanger** ved Reinskloster, Rissa 10.6. Det ble sett en **bøksanger**

ved Storsten, Meldal 14.6. En **bøksanger** ble rapportert fra Ogndalen, Steinkjer 17.6. Det ble også rapportert en **bøksanger** ved Sundet, Røros 20.6. En **bøksanger** ble hyppig rapportert fra Dragvoll, Trondheim i slutten av juni. Det ble meldt om en **bøksanger** ved Mosjøen, Tydal 24.6. En **bøksanger** ble hørt syngende ved Tangalommene, Rennebu 28.6. En **østsanger** var på en kort visitt innom Hundhammeren, Malvik 24.5. Det ble observert **lapp-meiser** i Femundsmarka igjen, det høyest rapporterte antallet var på 7 individer. En hunnfarget **tornskate** ble observert i Haltdalen, Holtålen 30.5. En syngende **tornskate** hann ble observert i Åmotsdalen, Oppdal 14.6. Ett **tornskatepar** med 3 utflyvende unger ble sett på Seterholmen, Dyrøya, Frøya 19.6. Det ble meldt om relativt lite **polarisisiker** i år enn normalt, 9 observasjoner fra ST og 3 fra NT lyder tallene. En **konglebit** ble hørt ved Svean, Klæbu 6.2. To **båndkorsnebb**

ble observert ved Ringve botaniske hage fra 1.1-6.2. Tre **Båndkorsnebb** ble observert ved Blussuvoll Skole, Trondheim 7.1. To **båndkorsnebb** ble sett på Saupstad, Trondheim 9.1. To **båndkorsnebb** hanner ble sett på Storfosna, Ørlandet 13.1. To **båndkorsnebb** i Klostergården, Tautra 6.2. Også to **båndkorsnebb** ble observert på Dolmøya, Hitra 24.2. Fire **båndkorsnebb** ble rapportert fra Saupstad, Trondheim 6.3. En **rosenfink** ble observert syngende ved Kattem, Trondheim 17.5. En **rosenfink** ble sett i Sør-Modalen, Rissa 18.5. En **rosenfink** ble hørt syngende ved Klefstadbukta, Trondheim 23.5. En **rosenfink** hann ble observert ved Vigda, Melhus 23.5. En **rosenfink** ble sett ved Sistranda, Frøya 25.5. En **rosenfink** ble sett ved Nerbekken, Skaun 30.5. En **rosenfink** ble sett ved Kvitlandskrysset, Rissa 31.5. En ung **rosenfink** hann ble oppdaget ved Olderøya, Orkanger 10.6.

Vi oppfordrer alle leserne av TN til å sende inn sine bilder av sjeldne og ikke fullt så sjeldne fugler!



Båndkorsnebb Ringve 15. januar 2010. Foto: Trond Haugskott.



Rosenfink Kattem 17. mai 2010. Foto: Trond Haugskott.

NORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF)

avd. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

NOF avd. Nord-Trøndelag

<http://www.nofnt.no/site/>

NOF avd. Sør-Trøndelag

<http://www.birdlife.no/organisasjonen/st/>



Foto: Terje O. Nordvik.





Brilleartugl – foto: Bjørn Fuldseth – www.bjornfuldseth.blogspot.com



KikkertSpesialisten, fast annonsør i Vår Fuglefauna siden 1981, drives av ornitologer og er en av Norges få spesialbutikker for kikkerter. Vi håndplukker markedets beste optikk på grunnlag av de tester vi selv utfører. Som fast lagervare har vi 200 kikkert-/teleskopmodeller og 25 ulike stativer. Vi lagerfører Swarovski, Leica, Zeiss, Opticron, Kowa, Nikon, Tele Vue, Fujinon, Steiner, Look, Sky-Watcher, Gitzo, Feisol, Slik, Manfrotto, Berlebach m.fl.

- **Fraktfri levering NOF-medlemmer**
- **14 dagers full returrett**

Norske ornitologers kikkert-leverandør siden 1981

SWAROVSKI EL 10x42 Swarovision

Swarovski hviler ikke på laurbærene. Januar 2010 kom de med ny EL 8,5x42 og 10x42. Disse nye modellene har økt okular diameter, redusert nærfokusradius fra 2,5 m til 1,5 m, økt diopterjustering fra +/- 3 til +/- 5, økt øye-okular-avstand fra 15 mm til 20 mm, større synsfelt (133 m og 112 m), økt synssirkel, økt oppløsning og kontrast, og ikke minst full skarphet i hele synsfeltet. Ved hjelp av «flat field»-linser er all forvring («puteform») fjernet. Gummi-armeringen er trukket rundt hele objektivtubusene og bedrer grepet om kikkerten og isolerer fingertuppene mot kuldetap til metallkroppen. Våre testresultater på www.kikkertspesialisten.no viser at det gamle slagordet for Freia sjokolade, «Ingen over, ingen ved siden», like gjerne kan brukes på Swarovskis nye EL-modeller!

Revolusjonerende... EL 10x42 Swarovision



Tilbud 19690,-
Veil. kr 21200



Opticron

Best blant de små...

6995,-

Inkl. zoomokular HR2 13-39x

754 g
Nitrogenfylt

Spar opptil 10 000 kr på Leica-pakker!

Ny!



DIGISKOPING-PAKKE

Tilbud kr 31000 Veil. kr 41194
Teleskop, kameraadapter, veske, alustativ



Tilbud 27200,-
Apo-Televid 82 m/zoom
Veil. kr 31000

Tilbud 35790,-
Leica Premium-pakke
m/Feisol karbonfiberstativ

Leica Apo-Televid 82 – teleskopet på øverste hylle...

Leicas nye teleskop har i følge KikkertSpesialistens tester (se vårt nettsted) best oppløsning av alle. Det nye, vidvinklede 25-50x zoomokularet gir godt overblikk og er samtidig komfortabelt å observere gjennom. Den kombinasjonen er Leica hittil alene om. For deg som i tillegg ønsker et stødig, men lettest mulig stativ, har vi satt sammen en «Premium»-pakke med Leica Apo-Televid 82, 25-50x zoom, beredskapsveske, Feisol Elite CT-3372 karbonstativ og Berlebach 551 videohode. Pakkepris kr 38 680. Alle produktene i denne pakken er plukket fra «øverste hylle».

Best i klassen



9895,-
Inkl. SDL zoom

OPTICRON ES 80 GA ED/45°

Bstselgeren til ornitologer. Med sin ED-optikk puster ES 80 GA ED/45° markedets toppteleskop i 20 000-klassen i nakken. Nitrogenfylt. 30 års garanti. Leveres også i prisgunstig modell uten ED-glass: ES 80 GA/45° m/23-69x HR2 zoom kr 6995



Test-rapporter

KikkertSpesialistens tester er vårt firmas unike forbrukerinformasjon. Testene finner du på www.kikkertspesialisten.no

Berlebach 551 videohode Unik!



Ny!

2995,-

Hele 6 kg lasteevne!

Beste videohode vi har sett – kompakt og lett. Tysk flimekanikk på sitt beste!



FEISOL karbonfiber

Høykvalitets stativ i et materiale som veier halvparten av aluminium og absorberer vibrasjoner bedre. Til en uslåelig pris!

1545,-
CT-3301
1180g

Beste 8x42-kikkerter

Pris under 8 000 kr i KikkertSpesialistens tester, rangert etter optisk kvalitet:



1 6495,-

Opticron Imagic 8x42 BGA SE

Testvinner i bladene Villmarksliv 8/2009 og Fjell og Vidde 2008. Magnesiumhus, 30 års garanti.



Opticron HR WP 8x42

Revolusjonerende porromodell fra Japan med interfokus, nitrogen og utsøkt optikk! Kun 715 g. 30 års garanti.



Opticron Explorer 8x42

Robust, vanntett kikkert fra Kina. 10 års garanti.



Nikon Monarch 8x42

En lett og god kikkert fra Kina. Vanntett. 10 års garanti.

MEDLEMSBLAD

Returadresse:
Trøndersk Natur,
c/o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim

