TRØNDERSK NATUR

Årgang 43 | Nr. 1 - 2016

Fugler i Sør-Trøndelag 2014

Steppehauker på Ørlandet

Guide til fuglelivet i Røyrvik

Norsk Ornitologisk Forening
avd. Sør- og Nord-Trøndelag

naturogfritid.no

Butikken for alle fugleinteresserte som har kunnskap og lang erfaring om det det beste fuglekikkerutstyret, til gunstige priser. Med NOF som eier skaper vi overskudd til fuglevern og kommer fuglemiljøet til gode.
Natur og Fritid - Det naturlige valget!

Kikkert.no - Stor kikkertbutikk på nett

Nikon Prostaff 3

Lette og rimelige allround-modeller med god optikk. Vanntett og robust.

Prostaff 3s 8x42 - kr 1390
Prostaff 3s 10x42 - kr 1490

Nikon Monarch 5 - Bestselger

Nikons allroundmodell med god optikk som er vanntett og har god nærgrense.

Monarch 5 8x42 - kr 2690
Monarch 5 10x42 - kr 3149

Monarch 7 - Stort synsfelt & god optikk

Monarch 7 har ED-glass og betydelig bedre optikk enn standard Monarch-modeller. Spesielt stort synsfelt.

2,5 m nærgrense

Monarch 7 8x42 - kr 4790
Monarch 7 10x42 - kr 4990

Swarovski ATX Teleskop

95 mm objektiv m/30-70x zoom

Swarovskis toppmodell er bestselgeren blant alle våre kvalitetsmodeller.

SWAROVSKI OPTIK

Pris kr 34.000

Frøautomater

Meget solid kvalitet

Ordretelefon 38 70 67 50

Liten - 4 frøuttak	kr 298
Med. - 6 frøuttak	kr 359
Stor - 10 frøuttak (Kan ta 1,75 kg frø)	kr 895
XL – 12 frøuttak (Kan ta 3,5 kg frø)	kr 995
Stang til bakkemontering	kr 179
Fôrskål til å feste under	kr 179

Nikon Prostaff teleskop

Tilbudspakker med stativ

Rimelige teleskop for fuglekikking, felt- og terrassebruk. Vanntett med skarpt bilde og høy synskomfort.

Leveres i sett med teleskophus, okular og Manfrotto 290 stativ med Manfrotto 128 RC2 videohode. Alt til redusert pris.

Prostaff 60mm	Prostaff 82mm
30× okular	20-60× okular
Manfrottostativ	Manfrottostativ
Nå kr 5490	**Nå kr 6490**

Følg med på livet i din egen fuglekasse!

Ferdigemontert sett med fuglekasse og kamera til å plugge rett i din egen skjerm.

Fuglekasse fargekamera-kit m/IR-lys for nattbilde og kabel for tilkobling til TV.

Pris kr 1750

Natur og Fritid AS, Fyrveien 6, 4563 Borhaug. e-post: post@naturogfritid.no

Gravand er årets fugl i 2016. Bidra til å heve kunnskapsnivået om årets fugl gjennom å registrere dine hekkefunn og andre observasjoner av arten på artsobservasjoner.no. Fuglen i bildet er en voksen hunn fra Tautra 24. juli 2013. Hann og hunn skilles enkelt ved størrelsen på den røde panneknølen. Foto: Morten Vang/www.fuglefoto.net.

Trøndersk Natur (TN) utgis av Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør- og Nord-Trøndelag

Ansvarlig redaktør
Thomas Kvalnes

Øvrig redaksjon
Rolf B. Sandven, Morten Martinsen, Arnt Stavne, Bjørn-Steinar Tanem og Vegard Aksnes

Kontakt
Trøndersk Natur
c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim
trondersk.natur@gmail.com

Om redaksjonen
Styret i NOF Sør-Trøndelag har vært redaksjon for dette nummeret. Ny redaksjon vil bestå av Øystein R. Størkersen (redaktør), Rolf Terje Kroglund, Charlotte Hallerud og Per Inge Værnesbranden.

Trykk: Skipnes Kommunikasjon, Trondheim
Layout: Thomas Kvalnes
ISSN: 0806-0517
Opplag: 550 eks.

Manuskriptfrister
TN 2-16: 15. november 2016
TN 1-17: 1. mars 2017

TN utkommer med to hefter pr år. Artikler og innlegg til TN sendes redaksjonen som digitale dokumenter pr e-post eller pr post på egnet lagringsmedie. Vennligst orienter redaksjonen i god tid før innsending. Forfattere og fotografer gir utgiver rettigheten til å publisere innsendt materiale i trykt og digital form. Det utbetales ikke honorarer.

Adresseforandringer
Tidsskriftet sendes ut til alle som har betalt lokalt tillegg for NOF avd. Sør- eller Nord-Trøndelag på grunnlag av medlemslistene. Endring av adresse, etterlysning av manglende blad o.l. må derfor rettes til respektive fylkeslag.

Forsidebilde
Svartand hann fotografert ved Vesle Orkelsjøen 3. juli 2016.
Foto: Jon Helle.

Innhold

5 **Lederen i ST har ordet**
Thomas Kvalnes

6 **Opplev fuglelivet i Røyrvik**
Rolf Terje Kroglund, Jan Eivind Østnes og Tom Roger Østerås

16 **Steppehauker på Ørlandet**
Andreas Winnem

19 **Forening for fuglevern og fuglevernere**
Martin Eggen

22 **Nytt fra Trøndelag**

24 **Kommentaren**
Øystein Størkersen

26 **Til minne om Rolf Birger Sandven (1957-2016)**

27 **Fugler i Sør-Trøndelag 2014**
Andreas Winnem, Kjetil A. Solbakken, Magne Myklebust og Einar Sæter





Lederen i ST har ordet

Thomas Kvalnes

Gratulerer, du har nå et nytt nummer av Trøndersk Natur i hendene. Forut for denne utgivelsen er det gjort flere forandringer i tidsskriftet. Denne lederspalten som du nå leser er en av nyhetene og skal følge tidsskriftet videre. Det er likevel ikke den største forandringen.

Etter 11 år som redaktør for tidsskriftet har Trond Haugskott sendt stafettpinnen videre. Jeg vil starte med å berømme innsatsen han har lagt ned for å gjøre TN til det flotte produktet det er i dag. Trond har latt sine tegninger og akvareller pryde tidsskriftet i hele perioden. Dette har gjort TN til noe som ingen andre fylkestidsskrift har kunnet måle seg med. I tillegg gav Trond layouten til TN et realt løft da han tok over som redaktør. Sammen med de artikler og bilder som er publisert gjennom årene, har det sikret oss et moderne tidsskrift å hygge oss med. Jeg er sikker på at jeg har alle leserne av TN i ryggen når jeg uttrykker takknemlighet for det arbeidet Trond har utført og ønsker ham lykke til videre! Det vil også i framtiden være rom for bidrag fra Trond i Trøndersk Natur.

Trond har latt sine tegninger og akvareller pryde tidsskriftet.

Styret i NOF avdeling Sør-Trøndelag har vært midlertidig redaksjon for dette nummeret av Trøndersk Natur, med undertegnede som ansvarlig redaktør. Jobben har vært større enn vanlig siden det også måtte lages en ny layout for tidsskriftet. Parallelt har styret jobbet med å etablere en ny redaksjon. Trond arbeidet alene som redaktør for TN, slik flere redaktører har gjort før ham.

Nå ønsket styrene i NOF Sør- og Nord-Trøndelag å etablere en redaksjon med tre medlemmer og redaktør. Dette arbeidet gikk raskt når det først kom i gang, og uten ytterligere ventetid er det nå på tide å introdusere den nye redaksjonen. Øystein R. Størkersen trer inn som redaktør og med seg på laget får han Charlotte Hallerud, Rolf Terje Kroglund og Per Inge Værnesbranden.

Jeg ønsker den nye redaksjonen lykke til og håper alle lesere får en fuglerik høst!

Thomas Kvalnes

Thomas Kvalnes | Leder NOF avd. Sør-Trøndelag

Linerlene er nå dratt sørover til overvintringsområdene rundt middelhavet. Foto: Thomas Kvalnes.

Opplev fuglelivet i Røyrvik

Denne artikkelen om fuglelivet og fuglelokaliteter i Røyrvik er inspirert av to tidligere TN-artikler (Venås 2014, Østerås og Venås 2015). Til forskjell fra eksempelvis Lierne, har Røyrvik tradisjonelt vært lite besøkt av ornitologer. Dette er nok ikke fordi potensialet er særlig mindre, men ornitologer er konservative i valget av lokaliteter for sine utferder. Vi håper vår artikkel bidrar til flere besøk, flotte opplevelser og verdifulle registreringer av fuglelivet i Røyrvik.

Rolf Terje Kroglund
Førstelektor
Nord Universitet

Jan Eivind Østnes
Førsteamanuensis
Nord Universitet

Tom Roger Østerås

I perioden 2010 til 2016 har forfatterne tilbragt mange feltdøgn i Røyrvik. Våre besøk har i hovedsak vært knyttet til prosjektarbeid på den eksklusive bestanden av sædgås u.a. *fabalis* som fortsatt hekker i Nord-Trøndelag (Kroglund og Østnes 2015a). Under dette arbeidet, men også i ledige stunder, når vi har fartet rundt i kommunen, har vi opplevd at Røyrvik er svært så spennende. Målsettingen med denne artikkelen er å presentere det vi har erfart som spennende lokaliteter, samt å nevne noen spennende arter det er mulig å komme i kontakt med. Basert på våre erfaringer er det kanskje særlig andefugler, skogshøns, vadere, rovfugler og spurvefugler som er godt representert. Det kan jo allerede her nevnes at dette er den eneste kommunen i fylket hvor alle de fire alpine dykkendene hekker (Kroglund og Østnes 2015b). Av rovfugler har vi under våre opphold registrert

Bilde øverst: Svømmesnipe. Foto: Jan Eivind Østnes.

Steppehauk. Foto: Tom Roger Østerås.

følgende arter: Kongeørn, havørn, fiskeørn, musvåk, fjellvåk, hønsehauk, spurvehauk, steppehauk, myrhauk, jaktfalk, vandrefalk, tårnfalk og dvergfalk. Av vadere er boltit, sandlo, heilo, vipe, tjeld, temmincksnipe, rødstilk, sotsnipe, strandsnipe, skogsnipe, grønnstilk, brushane, storspove, småspove, gluttsnipe, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin, fjellmyrløper og svømmesnipe på artslista. I likhet med nabokommunen i sør, Lierne, gir også et besøk i Røyrvik muligheten til å møte østlige arter. Sidensvans blir stadig mer vanlig og hekker mange steder, båndkorsnebb blir også regulært registrert i hekkesesongen og med tålmodighet og god feltinnsats er også lappmeis innenfor rekkevidde.

Dersom dere legger turen til Røyrvik i april/mai anbefaler vi å ta av fra E6 ved Lassemoen, kjøre østover mot Skorovatn for så å fortsette langs vestsida av Tunnsjøen mot Gjersvika. Seint i mai og i juni er det erfaringsmessig best å kjøre E6 til Brekkvasselv for så å legge turen over Steinfjellet. Denne ruta blir ekstra spennende om dere bruker litt ekstra tid og kjører «gammelvegen». Avkjøringa til gammelvegen er dårlig merket, men ta av til venstre når dere er nesten framme ved Steinfjelltunellen. Dette blir da ingen fartsetappe, men gir muligheter for observasjoner av alpine arter fra vegen.

Dette er den eneste kommunen i fylket hvor alle de fire alpine dykkendene hekker.

I og med at «alle», med unntak av de som kommer fra Lierne, kjører gjennom deler av Namsskogan på veg mot Røyrvik har vi valgt å omtale et mindre antall spennende lokaliteter også derfra.

1. Grøndalen (Namsskogan)

På tidlige vårturer i slutten av april eller tidlig i mai kan kjøreturen gjennom Grøndalen være spennende. Ikke lenge etter avkjøringa fra E6 dukker de første trostene opp i vegkanten. Flere 10-talls duetroster er fullt mulig i løpet av en overfart. Ikke like tallrik, men like fullt er også ringtrost regulær langs vegen på denne tiden. Av mer spesielle egenopplevelser kan vendehals første uka i mai nevnes.

2. Tunnsjørøyrvik

Obligatorisk stopp på vegen mellom Skorovatn og Gjersvika. Ta til høyre i krysset og kjør et par hundre meter på vegen i retning Lierne. Herfra har dere god oversikt over store areal med dyrka mark, ei spennende vik i Tunnsjøen og omkringliggende blandingsskog. På tidlige vårturer kan dyrkamarka være dekt av gressender, vadere og spurvefugl. Sett av litt tid her da det

Ringtrost hann. Foto: Jan Eivind Østnes.



Kart over Røyrvik kommune med tilgrensende Lierne og Namsskogan kommuner. Interessante lokaliteter for fuglekikking er indikert med nummer. Beskrivelse av hver lokalitet finnes i teksten. Kartkilde: © Kartverket.

stort sett alltid «dukker opp» noe. På vaderfronten kan arter som rødstilk, grønnstilk, småspove, strandsnipe, temmincksnipe, heilo og vipe nærmest forventes. I tillegg er boltit heller ingen umulighet. Store mengder linerler, gulerler, bokfink, bjørkefink og heipiplerker bør også vies oppmerksomhet da det innimellom kan være noe annet. Vi har bl.a. hatt rastende lappspurv her. På denne lokaliteten ser vi «alltid» rovfugl, og selv om trivielle arter som dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk dominerer har vi ofte sett kongeørn her. Våren 2015 hadde også en steppehauk tatt en rast ved bredden av Tunnsjøen, og gjennomførte i klassisk kjerrhaukstil rolig lavtflygende jakt over innmarka.

3. Spunstjønna (Namsskogan)

Spunstjønna ligger på venstre side når dere kjører oppover mot Steinfjellet fra Brekkvasselv. Det er litt drøy avstand, men med teleskop oppnås bra oversikt fra vegen. Det er fornuftig å sette fra seg bilen på ei lita parkeringslomme på høyre side da vegen ikke er særlig brei. Spunstjønna er bl.a. en «bombesikker» lokalitet for bergand på våren. Fram mot midten av mai er det også alle muligheter for å oppleve to-tre territoriehevdende blåstruper i vierkjerrene langs vegen. Av vadere har vi ofte vært i kontakt med dobbeltbekkasin og grønnstilk like inntil vegen her. En spillplass for dobbeltbekkasin ligger også i området.

4. Steinfjellet (deles mellom Namsskogan og Røyrvik)

Fra midten av mai er det verd å investere litt tid på overfarten over Steinfjellet. Har en anledning til å snegle seg langs gammelvegen vil dette gi ekstra muligheter. Det er helt kurant å kjøre gammelvegen med vanlig personbil, men da det ikke er bare ornitologer som velger denne sløyfa så pass på at vegen ikke blokkeres for andre. En større avkjørsel på venstre side i nærheten av det høyeste punktet kan anbefales for en liten rusletur i området. I dette området hekker bl.a. temmincksnipe, myrsnipe, sandlo, fjellrype og boltit. Det bør også være mulig å finne lappspurv i vierfeltene her. I gode smågnagerår er også fjelljo en art som kan «dukke opp» under overfarten.

5. Bjørkvatnet

Umiddelbart idet du kommer ut av tunellen på vegen fra Namsskogan til Røyrvik får du Bjørkvatnet på høyre side. Fra vegen får du fin høyde. Det er imidlertid litt drøy avstand så det er nødvendig med teleskop. Lokaliteten fortjener absolutt en stopp, og tidlig i mai er det gode muligheter for arter som brushane og svømmesnipe. I tillegg huser området mer trivielle arter som gulerle, blåstrupe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, fjellvåk m.fl. Her vil du også som regel se et lite antall bergender på denne tida, og dette er en av de få lokaliteter hvor arten fortsatt hekker i Nord-Trøndelag. Vær ellers oppmerksom på snøspurv som gjerne opptrer i veikanten ved tunnelmunningen tidlig på året.

6. Gjersvika

Enten du kjører over Steinfjellet eller du kommer via Skorovatn

Fjellvåk. Foto: Tom Roger Østerås.

kommer du til Gjersvika på vegen mot Røyrvik sentrum. Det er obligatorisk med en kort stopp her. Du har god oversikt fra vegen. Med hell er det faktisk mulig å oppleve alle våre fire alpine dykkender her (sjøorre dog unntaksvis). Fra Gjersvika er det kort avstand til den eneste kjente hekkelokaliteten for sjøorre i Nord-Trøndelag. Fra vegskuldra har du forholdsvis kort avstand til eventuelle rastende fugl på denne lokaliteten. Lokaliteten er erfaringsmessig ikke så spennende i forhold til vadere, men rastende temmincksniper er registrert.

7. Røyrvika

Like nedenfor Røyrvik sentrum ligger lokaliteten: Røyrvika. Det er ofte mer trivielle arter som påtreffes, men på enkelte dager kan det være godt med fugl her. De vanligste vaderne er representert, det samme med smålom og storlom, trane og noen titalls gress- og dykkender. Våren 2015 ble over 20 bergender registrert samtidig her! Havelle og svartand blir også sett her på våren, mens de venter på at hekkelokalitetene i Børgefjell blir tilgjengelige. Eneste funn av knoppsvane (2010) og gravand (2013) i Røyrvik kommune er fra denne lokaliteten. Tårnfalk hekker tilsynelatende årvisst like ved og dukker «alltid» opp her.

8. Storfloen

Definitivt en av Røyrvik kommunes aller beste lokaliteter! Området er så stort at her bør en stoppe på i alle fall et par steder. Ta til venstre på vegen fra Røyrvik sentrum østover mot Hudningsdalen (skiltet mot Namsvatnet). Umiddelbart kommer ei avkjøring til høyre med parkering og infotavle. Dette er en fin plass for å se over de vestlige deler av Storfloen. Vi har flere ganger hørt spillende dobbeltbekkasin fra parkeringa her. Etter at dere er ferdig her kjør tilbake til krysset og ta til venstre innover Hudningsdalen. Da kommer flere møteplasser som kan benyttes til parkering i forhold til å se over mer sentrale deler av Storfloen. Basert på mange, mange timer i dette området anbefaler vi at området studeres fra avstand og at en ikke tråkker av gårde utover i våtmarksområdet. Dette ikke bare av hensyn til fuglelivet, men faktisk også i forhold til ornitologenes uttelling. Med litt høyde oppnås mye bedre oversikt enn om en går helt ned på myrflata.

Forfatterne har besøkt denne lokaliteten i forbindelse med flere kartleggingsprosjekter bl.a. på brushane og fjellmyrløper (Østnes & Kroglund 2014, Østnes & Kroglund 2015). I flere år nå har Storfloen vært den største spillplassen for brushane i Nord-Trøndelag. Vi har registrert i størrelsesorden 8-15 spillende hanner i området hvilket i seinere år er blitt et uvanlig syn (kanskje med unntak av enkelte steder i Finnmark). Storfloen er også en regulær hekkelokalitet for

Brushane. Foto: Jan Eivind Østnes.

Rugde. Foto: Jan Eivind Østnes.

fjellmyrløper, og det er fullt mulig å se flere spillende hanner samtidig. Igjen er beste oppskrift å bruke litt tid. Basert på egne erfaringer er det slett ikke uvanlig å oppleve spillende fjellmyrløper her midt på dagen. Ellers gir Storfloen perfekte jaktmuligheter for arter som jordugle, fjellvåk, tårnfalk og myrhauk, men for alle disse er smågnagersituasjonen selvsagt avgjørende. Posteringsjegere som haukugle og varsler er også «vanlig» på Storfloen. Tornskate ble sett her så seint som våren 2015. Lokaliteten huser også flere par rødnebbterner, smålom, viper, myrsnipe, rødstilk, grønnstilk og heilo. Sangsvane har også gjennomført hekkeforsøk, uten at vellykket hekking er konstatert. De senere år har 2-10 rastende dvergmåker oppholdt seg i området noen dager på våren.

9. Bjørkmoen

Neste stopp innover Hudningsdalen er Bjørkmoen. Området ligger på samme side av vegen som Storfloen. Dette er ved den første bosettingen innover dalen. Ta av til venstre like før en enebolig på venstre side. Vegen nedover er ofte stengt med bom, og vi anbefaler at bilen uansett parkeres ved bommen. Nede på området er det av og til aktivitet ved den sørsamiske temaparken «Destinasjon Derga» - vis hensyn! På dyrkamarka her kan det være store mengder spurvefugl, vadere og ender. Flere titalls gulerler, heipiplerker, blåstrupe, enkeltbekkasin og heilo er regulært her. Brushaner (og høner) som spiller på Storfloen drar også gjerne til innmarka ved Bjørkmoen for næringssøk. Nede ved vannkanten møtes du av storlom, rødnebbterner og gjerne også svømmesniper. Andre spennende arter vi har notert herfra er knekkand, jordugle og dvergmåke.

10. Litjbotn

En av de mest spennende lokalitetene i Røyrvik, og det sier ikke så lite. Et besøk her i månedsskiftet mai/juni gir alltid flotte opplevelser. Her kan du påregne gressender som stokkand, krikkand, brunnakke og stjertand. Skjeand er også sett her. Vaderne er representert med brushane, rødstilk, grønnstilk og strandsnipe. Et større trekkplaster er kanskje de ofte tallrike svømmesnipene som årvisst raster her før de trekker inn mot hekkelokalitetene i fjellet. Det er helt vanlig å påvise et 20-talls (ofte flere) svømmesniper på lokaliteten første uka i juni. Ett til to par rødnebbterner hekker også årvisst på lokaliteten. Med litt hell har du også muligheten til å oppleve rastende

Røy. Foto: Jan Eivind Østnes.

dvergmåker som snapper insekter over vannspeilet i Litjbotntjønna. Såpass mange som 10 individer er sett samtidig. Etter at fuglene på vannet er studert kan det også svare seg å bruke kikkerten litt. Særlig over ryggen på nordsida har vi tidvis hatt god uttelling i form av arter som dvergfalk, myrhauk, hønsehauk, jaktfalk og kongeørn. Er det bra med gnagere er også tårnfalk og haukugle vanlig forekommende. Mot sør og fjellet Firklumpen er det med teleskop gode muligheter til å se næringssøkende fjellryper på de øverste barflekkene. Her passerte også Storskrikørna «Tønn» på sin turne i Nord-Trøndelag for noen år siden. Vegen gjennom Hudningsdalen er smal, så pass på at du ikke hindrer trafikken.

11. Kjærnes

Litt øst for midten av Hudningsvatnet ligger denne spennende lokaliteten. Det er plass til å parkere bilen i krysset ved gårdsvegen til Kjærnes. Særlig god uttelling kan påregnes under snøsmeltinga når dyrkamarka mellom vegen og Hudingsvatnet er delvis under vann. Artslisten på vadere kan bli imponerende her: Sandlo, myrsnipe, brushane, temmincksnipe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, småspove, strandsnipe, skogsnipe og dobbeltbekkasin er fullt mulig. På innmarka på motsatt side av vegen er det fast rasteplass for heilo, men vi har også notert boltit her. I mai er også alle vanlige gressender innom her, inkludert den halvsjeldne knekkanda.

12. Lybekkdalen

Fra Hudningsvatnet er det etter hvert ikke langt til riksgrensa, men mellom ligger Lybekkdalen som går tilnærmet parallelt med vegen på nordsida. Kjør østover mot Vestre Vallervatnet. Her duger det ikke med skåding fra vegskuldra, nå må fjellsko på, men det anbefales. Dalføret er rikt og naturskjønt med flott vegetasjon dominert av høgstauder som turt, tyrihjelm og ballblom. Spillende liryper og syngende ringtrost inngår i opplevelsene her. Med litt hell er det også muligheter for dvergspett, kongeørn, jaktfalk og lappmeis. Sistnevnte er sett her flere ganger (pers. medd. Øyvind Spjøtvoll). Lybekkdalen er også vertskap for to større spillplasser for dobbeltbekkasin (Østnes m.fl. 2014).

13. Husvika

Fortsett østover fra Bjørkmoen innover Hudningsdalen ca. 1,5 kilometer til dere får elva på høyre side ved Seteråsen. Ta av nordover (til venstre) og kjør (rolig) innover i retning Husvika (som er den østlige delen av Vekteren). Frodig vegetasjon og mye død og døende ved gir attraktive hekkelokaliteter for mange hulerugere. Båndkorsnebb er også inne på artslista på denne strekningen. Kjør rundt bukta til dere er på nordsida, ved utløpet av Husvikelva og gå nedover mot vannet. Her oppnås fin høyde og god oversikt over myrflater og østlige deler av Vekteren. Rastende dvergmåker synes å være årvisst her nå, og en liten hekkebestand er trolig i ferd med å etablere seg i området. Noen par med rødnebbterne,

Sædgjess og trane i bakgrunnen. Flere av sædgjessene i Røyrvik er merket med halsring slik som den ene av disse fuglene. Halsringene har en bokstav og to siffere. Foto: Jan Eivind Østnes.

brushane og storlom er også årvisst i området. Fortsett videre nordover og dere kommer inn på 361 like nord for Vekterlia. Merk imidlertid at denne veien om Husvika ikke er åpen før et godt stykke ut i mai.

14. Vekterlia, Skånålia og vegen mot Namsvatnet

Fortsett vegen fra infotavla ved Storfloen nordover mot Namsvatnet. Vær særlig oppmerksom i området ved Vekterlia og Skånålia. Her er innmarksområder som er interessante for rastende ender, vadere og spurvefugl. Eneste kjente funn av snadderand i Røyrvik er fra Vekterlia (2015). En svartrødstjert på en brøytestikke ved Skånålia første uka i mai 2016, mens det ennå var over en halv meter snø, er nok vårt mest overraskende funn i Røyrvik. Tidlig på året blir også snøspurv sett ved Vekterlia, og i vegkanten videre innover mot Namsvatnet. Spillende dobbeltbekkasin er faktisk mulig å oppleve fra vegen på denne strekningen. Hyggelige arter som blåstrupe, haukugle og varsler er også innen rekkevidde. I gressbakkene ved Vekterlia er både ringtrost og duetrost alltid til stede i trosteflokkene tidlig i mai.

15. Heimvatnet

Nesten framme ved Namsvatnet ligger Heimvatnet på venstre side. Kjør rolig og parker ved stor garasje/driftsbygningen på venstre side. På kveldstid i første halvdel av juni er det gode muligheter til å se sædgås herfra. Bruk teleskopet og se nøye over innmarksområdene sørvestover. Dette er en fast lokalitet for sædgjess som mislykkes med hekking eller som avstår fra hekking inneværende sesong (Kroglund og Østnes 2015a). Fuglene ankommer dette området på tidlig kveld, og beiter her til over midnatt. De er imidlertid svært årvåkne og sky, og det henstilles om at fuglene beskues med teleskop på denne avstanden. Dersom noen registrerer halsringer er det et sterkt ønske om at disse avleses, og videreformidles til oss. Lokaliteten kan ellers varte opp med et bra antall rastende vadere og spurvefugl. I tillegg har dette etter hvert også blitt en lokalitet hvor overflygende fiskeørn kan påregnes, og hvor mindre flokker med bergirisk gjerne søker næring på vegkantene.

En del av myrene på Storfloen. Dette er et ettertraktet område for blant annet brushane og fjellmyrløper. I tillegg sees det flotte fjellet Dergaklumpen (1108 moh) i bakgrunnen. Foto: Jan Eivind Østnes.

16. Strekningen Røyrvik sentrum-Liminglia (Lierne)

En kjøretur på denne strekningen er alltid en opplevelse. Skal utbytte bli stort bør en gjennomføre denne turen før andre biler, dvs. mellom kl. 05:00 og kl. 07:00. Den beste delen av denne turen er erfaringsmessig fra kommunegrensa til Liminglia i Lierne. Da må kuleramma fram om en skal holde oversikt over antall hønsefugl. Er det bra med smågnagere er det heller ikke langt mellom territoriene for tårnfalk og fjellvåk på denne strekningen. Framme ved innmarka på Liminglia kan en møte flere hundre troster, deriblant betydelige antall av både ringtrost og duetrost.

Litteratur

Kroglund, R.T. og Østnes, J.E. 2015a. Status for sædgås (*Anser f. fabalis*) i Nord-Trøndelag. *HiNT Utredning* 180: 1–30.

Kroglund, R.T. og Østnes, J.E. 2015b. Bestandsstatus for «alpine dykkender» i Nord-Trøndelag. *HiNT Utredning* 170: 1–27.

Venås, M. 2014. Fugler i Lierne. *Trøndersk Natur* 41(1): 4-15.

Østerås, T.R. og Venås, M. 2015. Fugler i Meråker. *Trøndersk Natur* 42(1): 4-13.

Østnes, J.E. og Kroglund, R.T. 2014. Bestandsstatus for brushane (*Philomachus pugnax*) i Nord-Trøndelag. *HiNT Utredning* 160: 1–21.

Østnes, J.E., Kroglund, R.T. og Kålås, J.A. 2014. A survey and GIS-based estimate of the breeding population of Great Snipe Gallinago media in Central Norway. *Bird Study* 61: 386–393.

Østnes, J.E. og Kroglund, R.T. 2015. Kartlegging av hekkelokaliteter for fjellmyrløper (*Calidris falcinellus*) i Nord-Trøndelag med vekt på verneområder. *HiNT Utredning* 169: 1–18.

Steppehauker i Grandefjæra

I løpet av ni septemberdager i 2015 ble hele tre steppehauker rapportert på Fosen i Sør-Trøndelag. Dette er historien om to av dem.

Andreas Winnem

Torsdag 3. september fant Harald Dahlby og Svein Melum en ung steppehauk ved Innstrandfjæra på Ørlandet. Senere på dagen ble fuglen gjenfunnet jaktende over åkrene innenfor amfiet sentralt i Grandefjæra. Bilder av fuglen ble lagt ut på artsobservasjoner.no, noe som trigget skuelysten hos fuglekikkere i fylket.

Den andre fuglen skilte seg draktmessig fra den første gjennom en mørkere framkant på armen og en halsboa som hadde lyse sjatteringer og strakk seg lenger ned på brystsidene. Den ga også et litt kraftigere inntrykk da fuglene ble sett sammen. Mørk iris bekrefter at denne fuglen er en hunn. Foto: Arvid Bredesen.

To steppehauker

Neste morgen dro Eirik Spets, Emil Krokan og jeg på tur for å se om vi kunne finne igjen fuglen. Den viste seg å være svært så samarbeidsvillig og dukket opp igjen ved amfiet allerede kl. 0730, rett etter vi ankom. Fuglen jaktet og var synlig i noen minutter av gangen, for så å være borte en stund, gjerne opp mot en times tid. Den kom stadig flygende tilbake med sine elegante, fjærende vingeslag, og den ble sett til og fra mellom Televerkets antenner og Småbåthavna gjennom hele dagen.

Tidlig på ettermiddagen kom fuglen flygende, jaktende over jordene, før den landet i grasenga innenfor amfiet. Det var første gang vi så den sittende, noe som ga mulighet til å studere de særegne hodetegningene godt i teleskop. Mens vi sto der og betraktet skjønnheten, dukket plutselig enda en kjerrhauk opp, flygende mot sør lavt over kulturlandskapet. Umiddelbart tenkte vi myrhauk, da denne fuglen virket noe kraftigere, og det hadde dessuten vært sett to hunnfargete myrhauker på Ørlandet dagene i forveien. Det ble imidlertid fort klart at den nye fuglen var enda en steppehauk. Den nye fuglen satte tydeligvis lite pris på selskap, for det første den gjorde var å fly rett bort til steppehauken som alt satt på bakken og gjøre et utslag mot denne, for så å overta sitteplassen. Fugl nummer én skvatt opp og fløy noen titalls meter før den slo seg ned på bakken på nytt. I manøveren viste fugl nummer to frem en helt ustreket, oransjetonet underside, og da den satt kunne vi konstatere at hodetegningene også på denne fuglen passet perfekt for steppehauk. Etter et par minutter lettet fugl nummer to og gjentok angrepet på den første fuglen. Denne lettet da på nytt og fløy sørover, og den ble ikke sett igjen resten av dagen.

Kjønnsbestemmelse

Den første steppehauken var en hann. Bilder viser at fuglen har lys iris, noe som er tilstrekkelig for å kjønnsbestemme unge kjerrhauker. Fuglen var dessuten veldig smekker i flukt med en avsmalnende, spiss hånd når den fløy aktivt. Hos rovfugler er gjerne hannen mindre og slankere enn hunnen. Så også hos steppehauk.

Fugl nummer to ga et noe kraftigere inntrykk, og særlig var hånden noe mer fyldig da fuglene kunne sammenlignes direkte. Fugl nummer to ble derfor antatt å være en hunn, noe som kunne bekreftes gjennom mørk iris, synlig på bilder tatt to dager senere. De to fuglene kunne for øvrig fint skilles fra hverandre på fjærdrakten. Framkanten av armen, utenfor det lyse dekkerfeltet, var lysere brun enn

Steppehauker i juvenil drakt har en brunoransje farge på hele undersiden. Brystet og buken er helt uten streking, noe en ung myrhauk ville hatt. Den lyse, ustrekete halskragen som strekker seg rundt nakken og skiller den mørke kinntegningen fra den like mørke halsboaen, er artstypisk. Foto: Svein Melum.

Kontrastrike lyse bremmer på svingfjær og alle dekkfjær på oversiden av vingen er et karaktertrekk for juvenil drakt hos steppehauk, som det også er hos mange andre rovfuglarter. Foto: Svein Melum.

Hos steppehauken danner de fire ytterste håndsvingfjærene frittstående fingre. En myrhauk har fem slike fingre. Hos unge kjerrhauker er armsvingfjærene veldig mørke på undersiden, men dette er mest utpreget hos steppehauk. Dette mørke feltet danner en stor kontrast mot de lysere håndsvingfjærene. Disse har hos en ung steppehauk kun en diffust avsatt mørk bakkant, og de mørke tuppene på fingrene er mindre, lysere og mer diffust avsatt enn hos myrhauk og enghauk. Legg merke til lys iris, som forteller at denne fuglen er en hann. Foto: Svein Melum.

resten av vingeoversiden på den første fuglen. På fugl nummer to var dette partiet like mørkt som resten av vingen. Forskjellen var tydelig nok til at fuglene ganske enkelt lot seg skille i flukt, selv om man bare så én av dem. Hannen ble ikke sett igjen med sikkerhet etter at den ble jaget av hunnen. Bilder tatt de neste dagene, viser hunnen.

Identifikasjon

Unge steppehauker er et vakkert skue, både på grunn av den slanke, elegante fremtoningen og den grasiøse, dansende flukten, og fordi fjærdrakten er tonet i oransje og har velmarkerte tegninger. Det første man legger merke til når man ser en steppehauk, er gjerne at fuglen er påfallende smalvinget, liten og slank sammenlignet med myrhauk, og den har en elegant, dansende flukt med lette, fjærende vingeslag. Myrhaukens håndsvingfjær danner fem tydelige fingre ytterst på vingen, mens steppehauken med sin smalere hånd, kun har fire fingre. Den største forvekslingsrisikoen er derfor unge enghauker, som også er slankere og lettere i flukten enn en myrhauk.

Fjærdrakten på en ung steppehauk er karakteristisk med en helt ustreket underside, vakkert farget i en oransjebeige fargetone. Hodetegningene er velmarkerte og artstypiske og viktige å merke seg for en sikker artsbestemmelse. Unge steppehauker har et ustreket, lyst bånd rundt hele nakken, som avgrenses i bakkant av en kontrasterende brun krage, som i varierende grad strekker seg ned på brystsiden. Denne mørke kragen omtales gjerne som en «halsboa». Både over og under øyet har steppehauken små hvite tegninger. Den siste rammes inn av mørkebrune øredekkere. Denne mørke kinntegningen strekker seg helt frem mot nebbet, slik at den hvite tegningen under øyet er adskilt fra nebbet. Hos en ung enghauk vil det hvite partiet under øyet være større, og det brune partiet på kinnet strekker seg ikke fram til nebbet. Den lyse kragen og den mørke halsboaen er også mindre markerte og kontrastfylte, og begge tegningene er streket.

Mens vi sto der og betraktet skjønnheten, dukket plutselig enda en kjerrhauk opp, flygende mot sør lavt over kulturlandskapet.

En ung myrhauk er en kraftigere og større fugl, og den bestemmes også lett på fjærdrakten. Unge myrhauker har alltid et streket bryst, og den mangler steppehaukens klare oransje fargetone. De siste årene har det imidlertid blitt dokumentert hybridhekkinger i Finland, og flere antatte hybrider rapporteres nå årlig i Sverige og Finland. Det er også gjort noen få funn i Norge. Alle kjennetegn bør derfor helst stemme før man kan være sikker på hva man har foran seg. Det er uansett alltid fint med god fotodokumentasjon for en sikker ID av unge kjerrhauker.

Også undersiden av svingfjærene byr på diagnostiske kjennetegn. Hos en ung steppehauk viser undervingen en påfallende kontrast mellom veldig mørke armsvingfjær og lyse håndsvingfjær. Denne kontrasten har også ungfugler hos enghauk og

myrhauk, men den er mest markert hos en steppehauk. Håndsvingfjærenes mørke flekker er i gjennomsnitt mindre og litt mer uregelmessig avsatt på en steppehauk, men det er betydelig individuell variasjon. To detaljer er likevel typiske for steppehauk kontra enghauk. Den innerste delen av håndsvingfjærene mangler gjerne mørk båndning, noe som gir et sammenhengende lyst felt utenfor de mørke spissene på håndekkerne. Denne lyse tegningen omtales gjerne som en lys «bumerang» på grunn av den avbøyde formen på feltet. Dessuten er den mørke bakkanten på hånden kun diffust avsatt. De mørke spissene på fingrene er også grålige og lite markerte. En ung enghauk mangler tydelig lys «bumerang», har en markert og skarpt avsatt mørk bakkant på hånden, og de mørke tuppene på fingrene er større, mørkere og skarpere avsatt. For den som ønsker å sette seg nærmere inn i identifikasjonen av artene, anbefales Forsman (2016).

Når man er så heldig å komme over en steppehauk på høsten, er det altså viktig å merke seg detaljer for å gjøre en sikker artsbestemmelse. Sannsynligheten taler imidlertid for at en ubestemt steppehauk eller enghauk er den første arten. Steppehauken hekker på steppe og i jordbrukslandskap primært fra Ukraina og østover. Den har de siste årene utvidet utbredelsen sin vestover, og flere hekkefunn er gjort i Finland. Funnfrekvensen i Norge har følgelig økt betydelig det siste tiåret. Arten har topper i funnstatistikken både vår og høst. Den opptrer nå gjerne med et titalls individer i Norge hver høst, fugler på vei mot overvintringsområdene i tropisk Afrika. Enghauk er derimot en utpreget vårart hos oss. Høstfunn av ungfugler forekommer, men langt mindre hyppig enn hos steppehauk. Norske funn av enghauk gjøres dessuten i all hovedsak langs kysten fra Jæren til svenskegrensen, og det foreligger ingen godkjente funn i Trøndelag. Steppehauken viser en mer variabel geografisk opptreden, og særlig høstfunn er gjort spredt over hele landet.

Steppehauk i Trøndelag

I Trøndelag er steppehauk en sjelden art. Første funn ble gjort så sent som i 2010. De siste seks årene har imidlertid syv individer blitt godkjent. I tillegg foreligger det ytterligere en håndfull funn fra 2015, men alle disse er enda ikke behandlet av LRSK. Arten viser således en stigende trend, i likhet med i resten av Skandinavia. Det er derfor all grunn til å tro at vi vil få oppleve flere møter med denne elegante arten i årene som kommer.

Tabell 1: *Godkjente trønderske funn av steppehauk.*

Alder	Kjønn	Sted	Dato
2K	X	Vera, Verdal, NT	16.5.2010
1K	M	Leksdalsvatnet, Verdal, NT	26.8.2010
1K	X	Grønningsbukta, Rissa, ST	21.8.2011
2K	M	Teveldalen, Meråker, NT	9.6.2012
3K	M	Brekken, Røros, ST	12.6.2013
1K	M	Innstrand og Grandefjæra, Ørland, ST	3.-4.9.2015
1K	F	Grandefjæra, Ørland, ST	4.-6.9.2015

Litteratur

Forsman, D. 2016. *Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and the Middle East.* Bloomsbury Publishing, London.

Parkering ved Gaulosen

Besøkende på Øysand-siden av Gaulosen må betale for parkering. NOF avdeling Sør-Trøndelag har en avtale med Øysand Camping om et sterkt rabattert årskort til 300 kr. Parkeringskortet vil være gyldig frem til 1. september 2017.

Medlemmer av NOF som ønsker å kjøpe et parkeringskort sender en e-post til: sor-trondelag@birdlife.no

Foreningen for fuglevern og fuglevernere

Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være slagkraftig i naturvernarbeidet. Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur hver dag, som følger med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette!

Martin Eggen
Naturvernrådgiver
Norsk Ornitologisk Forening

Verdens fugleliv er truet fra mange kanter. Felles for dem alle er at det er mange lokale OG regionale påvirkningsfaktorer som utgjør den totale negative trenden. 421 millioner fugler er borte fra den europeiske faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nært truet. I mange saker er det kommunene der hver enkelt av oss bor som har ansvaret for naturen både vi og fuglene er avhengig av. Bortfall av gode plasser for næringssøk og hekking er fortsatt den primære årsaken til at fugler forsvinner.

Bilde øverst: Martin Eggen er ny naturvernrådgiver i NOF, og organisasjonen ønsker med ansettelsen å øke slagkraften i naturvernsaker. Foto: Jon Olav Larsen.

Uten NOF ville norsk natur vært fattigere.

Fuglevern

Naturvernarbeid omfatter det meste av det vi sysler med i NOF, både nasjonalt og lokalt. Enten vi er ute for å registrere fugler i nærmiljøet, driver med vinterfôring eller forteller andre om fugler, er det i vid betydning naturvernarbeid. Gjennom å kartlegge fugler og bevisstgjøre andre om fuglers krav til miljø legges mye av grunnlaget for god forvaltning av fuglene. Naturvern, mer spesifikt fuglevern, er så viktig for oss at det til og med er inkludert i navnet vårt: Norsk Ornitologisk Forening – forening for fuglevern.

I NOFs strategi vedtatt på årsmøtet i 2014 er forvaltning av fuglene våre på en bærekraftig måte mål nummer én av totalt fire satsingsområder. NOF har lenge vært en sentral aktør i norsk

Den viktigste årsaken til at det blir færre fugler er ødeleggelse av områder for næringssøk og hekking. Brekstadfjæra i Ørland var et av de viktigste våtmarksområdene i den sørtrønderske kommunen, men ble vedtatt utfylt til næringsformål. Fylkesmannen har levert innsigelse mot planene. Foto: Georg Bangjord.

naturforvaltning, ikke minst gjennom å ha en medlemsmasse av kyndige fuglefolk. Dette setter oss i en særstilling. Dette gjør at vi blir lyttet til, og selv kan bidra med verdifull informasjon. Rundt omkring er det mengder av NOFere som legger inn observasjoner i artsobservasjoner.no, og således bidrar til kunnskap om naturen. De fleste lokallag og fylkesavdelinger har på et eller annet tidspunkt kommet med uttalelser eller jobbet mer planmessig med å engasjere seg når fugleliv i deres område er truet. Mange jobber godt med dette, og opplever at det er en aktivitet som gir både tap og seire. Mest av alt gir det mening. Hva kan være bedre for en fuglekikker enn å bidra til å ta vare på fuglene rundt oss?

Gjør hverandre gode!

Dette ønsker vi mer av. For å styrke fuglevernarbeidet har derfor NOF ansatt en egen naturvernrådgiver, som skal ha et spesielt fokus på fuglevern. En av de primære oppgavene er å styrke naturvernarbeidet ute i lokallag og fylkesavdelinger. Med våre 9000 medlemmer, der svært mange kan tenkes å ha ressurser å bidra med, er

Det er ikke uvesentlig hvor en kraftlinje legges. Mange av NOFs avdelinger jobber konkret med denne type saker – slik at hubro og andre fuglearter ikke skal få økt dødelighet gjennom elektrokusjon og kollisjoner. Foto: Karl-Otto Jacobsen.

potensialet for enda mer engasjement stort. Ved å hjelpe hverandre og gi hverandre tips vil vi bli enda mer slagferdig. Dette gjør vi gjennom:

- Å gi hverandre tips om ressurspersoner og kontaktpersoner.
- Å vise frem de gode resultatene. Hva har fungert andre steder?
- Å bidra med det hver enkelt er god på, og få hjelp til det man føler seg utrygg på.
- Å bygge kompetanse innad i foreningen.
- Å følge med på små og store naturvernsaker over hele landet.
- Å bli sett og hørt i den offentlige debatten.

De hyggelige eksemplene

Det er viktig å huske på at det vi gjør betyr noe, også i et langt perspektiv. NOF har siden 1957 bidratt til å sette fuglevern på kartet. Vi har vært sentral i å foreslå verneplaner og opprette naturreservater over hele landet. Vi har gjennom årtier korrigert og vært både en vaktbikkje og støttespiller til forvaltningen. Mange naturinngrep er ikke gjennomført blant annet takket være NOF, og vi kan trygt si at uten NOF ville norsk natur vært fattigere. Vi jobber mot konkrete arter, blant annet dverggås, hubro, åkerrikse og vipe – vi vet at langsiktig naturvernarbeid gir resultater! Ikke bare konkret, men også gjennom utformingen av forvaltningen av artene på sikt.

Svært mye av det vi oppnår er takket være alle våre medlemmer og tillitsvalgte over hele landet. Dere er ryggraden i organisasjonen. Med en nyansatt naturrådgiver er ønsket at NOF kan bli enda mer aktuell og slagkraftig, og at samarbeidet mellom ulike nivåer i NOF styrkes.

Denne artikkelen ble først publisert på birdlife.no den 4. januar 2016.

NOFs kontaktperson for naturvernsaker

Martin Eggen
martin@birdlife.no
Tlf: 90 56 51 08

Nytt fra Trøndelag

Fuglekikking på Kråkvåg. Foto: Arnt Stavne.

Fylkestur til Kråkvåg og Storfosna

Arnt Stavne

Helgen 8. – 10. april ble det arrangert tur til Kråkvåg og Storfosna. Denne turen har vært fast innslag de siste årene. Der ute i havgapet kan en oppleve starten på våren hvor de første trekkfuglene allerede er ankommet. Det ble en flott tur med totalt 11 deltakere.

Lørdagen morgen startet med at vi dro ut i forskjellige grupper, avtalen var at vi skulle samles ved befalsbrakka til felles rundtur kl 8. Fellesturen startet med besøk på toppen av Kråkøya hvor vi har god utsikt over havet, det blåste ganske bra der så det gikk ikke så lang tid før ferden gikk videre til Storslåttøya. Neste stopp ble Kråkvågsvaet før vi dro over til Storfosna. Der var vi innom på Nordheim, fergekaia, småbåthavna og Skaget.

Totalt fikk vi sett nesten 50 arter i løpet av dagen, blant høydepunktene var islom og gråstrupedykker i full sommerdrakt. Dessuten hadde vi en lomvi rett ved der vi parkerte på veien over Svaet. På ettermiddagen fikk vi også en flokk steinvendere på kloss hold på Storslåttøya. Utpå kvelden var det fellesmiddag, noen laget middagen, mens andre skulle vaske opp og rydde.

Søndagen morgen var det opp tidlig i nydelig vær, vi skulle ta fergen kl 09, så da vi hadde pakket i bilene ble det tid til gjøre noen siste besøk på Kråkvåg og Storfosna. Da vi kom til Garten fikk vi med en deltager til, ferden gikk til Grandefjæra hvor noen dro ut til Kløholmen, mens resten ble på Amfiet. Høydepunktet var vel at vi alle fikk sett gulnebblom. Etter å ha besøkt Kråka og Snekkerverkstedet dro de enkelte bilene i litt forskjellige retninger.

Nok en gang en fin tur, selv om de helt store bombene uteble denne gangen.

Gaulosen og Rødberg marine verneområder er opprettet

Thomas Kvalnes

Fredag den 17. juni 2016 var en gledens dag. Gaulosen og Rødberg marine verneområde ble vedtatt opprettet. For Gaulosen betyr dette at tiår med trusler om utbygging og utfyllinger nå er kommet til ende. To fantastiske naturområder for fugl er tatt vare på for ettertiden!

Gjennom tidene har det ikke manglet på planer som kunne gitt historien et helt annet utfall. For eksempel ville tyskerene under andre verdenskrig bygge en ny by på Øysand (Nau-Drontheim) og begynte smått med å skulle etablere en ubåthavn. Den siste tiden har NOF avdeling Sør-Trøndelag jobbet for å ivareta fuglelivet i diskusjoner

Sjøorre er blant karakterartene ved Rødberg og Gaulosen marine verneomrder. I Gaulosen utpeker brekkgrunnen seg som et viktig område for blant annet sjøorre og andre dykkender. Foto: Jon Helle.

om planer om hotellutbygging i fjæra langs Øysand og massedeponi på Brekkgrunnen.

Fuglelivet i Gaulosen er viden kjent blant Norges ornitologer. Området har et rikt fugleliv, og er et av de viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-Trøndelag fylke. Fjæreområdene inngår som del av et svært viktig bløtbunnsområde i Gaulosen. Det rike fuglelivet, og spesielt områdets verdi for et stort antall rastende gjess vår og høst, har gitt Gaulosen status som Important Bird and Biodiversity Area (IBA). Prestbukta og Grønningsbukta med tilhørende sjøområder rundt Rødbergneset er godt kjent over lang tid for sin rike forekomster av vannfugl, med spesielt høye individantall under trekktidene og større forekomster av overvintrende vannfugl, blant annet sjøorre som er identifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen uttalte tidligere: «Desse nye verneområda er viktige for å ta vare på de særeigne marine naturverdiane langs den lange norske kystlinja.»

I tillegg til de marine verneområdene har Gaulosen naturreservat blitt utvidet og slått sammen med Gaulosen landskapsvernområde og Leinøra og Gaulosen naturreservat. Nytt vernet areal øker med 166 dekar til 2700 dekar. Med dette er nesten hele arealet innenfor IBAet i Gaulosen nå vernet. I Nord-Trøndelag har Ørin naturreservat blitt utvida og slått sammen med Kausmofjæra fuglefredingsområde. Nytt vernet areal øker med 509 dekar til 2004 dekar. Også dette området er identifisert som IBA. Områdene består av marine elvedeltaer, og mye av verneområdene er våtmark og grunntvannsområder.

Visste du at NOF tilbyr avtalegiro?

Vi anbefaler alle medlemmer å benytte seg av avtalegiro for å betale medlemskontingenten til NOF. Det er både enkelt og miljøvennlig, og så unngår man irriterende purringer. Let opp «Norsk Ornitologisk Forening» i din nettbank, og inngå en avtale om avtalegiro med oss. Hvis du inngår en slik avtale vil denne tas i bruk ved fakturering av neste års medlemskontingent.

Bilde over: Det var mange besøkende som ville prate om fugl og prøve fuglequiz.

Bilde under: Fuglekassesnekring var meget populært. Begge foto: Rolf B. Sandven.

Høstdagen

Rolf B. Sandven

Høstdagen ble arrangert for 25. gang ved Haukvatnet i Trondheim. Slik som i fjor deltok NOF avdeling Sør-Trøndelag med en stand under arrangementet. Både barn og voksne koste seg med fuglekassesnekring, fuglequiz, kikkerter og teleskoper. Utrolig mange fant glede i å gjette fuglequizen, og ikke minst snekre fuglekasser. Ca. 60 nye fuglekasser kommer nå på markedet som nye hjem for våre småfugler. Mange hadde også artige fuglehistorier som vi fikk høre. Kjetil Aadne Solbakken, Beata Solbakken, Arnt Stavne og Rolf Sandven deltok på arrangementet og koste seg blant mange flotte folk. Thomas Kvalnes tok seg av nødvendige forberedelser med fuglekassene. Slike arrangement gjør mye for fugleinteressen blant folk, og vi kommer helt sikkert tilbake neste år (med dobbelt antall fuglekasser!). Vi inviterer alle NOFere til å bli med på NOFs stand en annen gang.

Kommentaren

Øystein Størkersen

Ser du det?

Bare hiv avfall på havet, det forsvinner så elegant i bølgene. Eller? Et av verdens største problemer for ville dyr er nettopp det sjokoladeomslaget eller avkappet av fiskeline som du kaster på havet. På verdensbasis er det beregnet at over 6 millioner tonn plastbiter, liner, plastkopper, lightere, plastkanner, pensler, dukker, sigarettsneiper, fiskegarn osv. årlig havner i bølgene. Det er altså milliarder av slike små og store plastbiter som havner i sjøen. FN anslår at på hver eneste kvadratkilometer på verdenshavene så flyter det 30.000 biter av plastikk. På strendene finnes det også rikelig med sigarettfiltre, lightere, brusflasker, plastposer, fiskegarn osv.

Hele 25% av alle sjøfugler i verden svelger hvert år plastbiter.

Tenker vi egentlig på hvilken konsekvens vår skjødesløse håndtering av avfall får for marine dyr? Her er noen tall som kanskje kan få deg til å våkne: 100.000 hval og havskilpadder omkommer årlig som direkte følge av plastikkavfall, enten de spiser det eller de vikler seg inn i det. Det er utrolig trist å se spermhval eller delfiner som drasser på alskens tauverk, eller plast som tyter ut av munnen på havskilpadder, sel med rep som 'magebelter' eller tauverk rundt

Marin forsøpling er et enormt problem. Plast som havner i havet driver rundt inntil det synker til bunns eller blåses på land. Ved Oksbåsen i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag, ryddet fotografen og familien store mengder søppel under årets strandryddedag. Foto: Kjartan Trana.

halsen, eller døde fugler på stranda som kan ha kilovis av plast i magen. Hva fisken i havet spiser av avfall er ikke like lett å avdekke. Kartlegginger viser at alle disse dyrene før eller siden omkommer når de enten spiser slikt avfall eller blir fanget i det. Beregninger viser at det knapt finnes en eneste sjøfugl som i sitt liv ikke har spist slike plastgjenstander. Hele 25% av alle sjøfugler i verden svelger hvert år plastbiter, noe som neppe fremmer deres ve og vel.

Økning av plast i havene og på enkelte steder i verdenshavene er en naturlig følge av vår forsøpling av miljøet. Med andre ord øker mengden i havene mer og mer. Hvor lang tid tar det å bryte ned plast tror du? En plastpose tar visstnok ikke mer enn 10-20 år før den ikke lenger er synlig. Kanskje er den da blitt til usynlig mikroplast? Slik plast, og hvilken fare det kan utgjøre for miljøet og selvsagt til syvende og sist menneskene selv, er nå blitt mer omdiskutert. Visste du at bildekk står for 60% av mikroplast i havene? Dekkene slites ned og bitene havner i vassdrag og til slutt i havene. Vi kan trygt kalle dette en snikende fare, på linje med giftige stoffer som vi i rikelig monn omgir oss med. Den samlede belastningen på naturen, og f.eks. de fugleartene som lever der, som følge av marin forsøpling kommer i tillegg til andre farer, som oljesøl, kollisjoner mot kraftlinjer og vindmøller, bifangst i fiskerier, illegal jakt i mange deler av verden (Middelhavsområdet er blant verstingene), forgiftninger som følge av industrijordbruk og direkte etterstrebelse. Legg så til at menneskene har ødelagt dyrelivets leveområder i stort monn. Ikke rart at fuglelivet nå er på sterkt vikende front over hele verden.

Det er stor fokus på marin forsøpling i verden, og en rekke råd og anbefalinger om fornuftige tiltak er godt kjent. I stor grad kan man si at disse følges opp i vestlige land som Norge, mens fattigere deler av verden fortsatt har et stykke å gå. Blant folk flest i Norge har nok likevel myndigheter og naturvern-organisasjoner som NOF fortsatt en oppgave å informere og bygge kunnskap og dermed holdninger.

Det urørte mageinnholdet til en død albatrossunge ved Midwayøyene i september 2009. Midwayøyene ligger i Stillehavet midtveis mellom Nord-Amerika og Asia, langt fra nærmeste store sivilisasjon. Ungen døde antagelig som følge av at magen fyltes av plastavfall som den ble foret med av foreldrene. Foto: Chris Jordan.

Går du med planer om et bidrag til Trøndersk Natur?

Tekst og bilder sendes redaksjonen i digital form via post eller e-post.

trondersk.natur@gmail.com
eller
Trøndersk Natur c\o NOF avd. Sør-Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim

Foto: Rolf B. Sandven.

Til minne om Rolf Birger Sandven (1957-2016)

Rolf er død. Vi har mistet en god venn og kollega gjennom mange år, og NOF har mistet ett av sine mest engasjerte medlemmer. Torsdag den 6. oktober stoppet hjertet til Rolf å slå, 59 år gammel. Det er knapt vi kan forstå at vi nå skriver minneord til deg Rolf, du skulle jo være med oss i mange år ennå.

Rolf Birger Sandven ble født 6. juni 1957 i Haugesund. Der vokste han opp inntil han i 1976 flyttet til Trondheim for å studere. I sitt profesjonelle liv jobbet han med geoteknikk og oppnådde en doktorgrad innen fagfeltet fra Norges Tekniske Høgskole (nå NTNU), hvor han også var professor i 25 år. De senere år jobbet han som spesialrådgiver og faglig leder ved konsulentselskapet Multiconsult.

Vi kjente imidlertid Rolf best som en engasjert amatørornitolog med en glødende interesse for fugl og natur. Rolf var ofte ute med kikkerten og teleskopet for å studere fugler, og når han var på jobbreiser ble det gjerne tid til en fugleopplevelse samtidig. Under våren og forsommeren påtok han seg fugletakseringer i forbindelse med TOV-E (Ekstensiv overvåking av hekkefugl), som han gjennomførte med stor nøyaktighet. Det ble også satt av tid til det Rolf omtalte som «vårens vakreste eventyr», nemlig besøk på leik med orrfugl. Han hadde sin egen faste lokalitet som han fulgte opp, gjerne flere ganger i løpet av sesongen. Rolf verdsatte fugle- og naturopplevelser høyt og fant stor glede i å studere naturen rundt seg. I etterkant fortalte han gjerne fra opplevelsene, med en innlevelse og engasjement som kunne nå inn til selv den mest blaserte.

Som medlem i NOF gjorde Rolf seg bemerket gjennom sin uavbrutte innsats i styret for NOF avdeling Sør-Trøndelag. Han skapte kontinuitet i arbeidet gjennom sin tilstedeværelse, fra han ble valgt inn i 2004 til hans bortgang i år. Rolf hadde et smittsomt godt humør og bidro med sitt lune vesen til å skape et positivt og hyggelig fellesskap i organisasjonen. Han tok gjerne imot arbeidsoppgaver og gjennomførte disse med stor nøyaktighet og glede. Spesielt stor glede virket det som Rolf fant i å delta på arrangement hvor vi møtte folk for å informere om fugler og om NOFs arbeid og aktiviteter. Rolf var aktiv inntil det siste og etterlater et stort tomrom.

Takk for innsatsen, og takk for at du delte tiden din med oss, Rolf. Du vil bli savnet.

Thomas Kvalnes
Bjørn Steinar Tanem
Vegard Aksnes
Morten Martinsen
Arnt Stavne

Fugler i Sør-Trøndelag 2014

Meddelelse nr. 39 fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomité for fugl (LRSK) i Sør-Trøndelag.

Andreas Winnem
Sekretær

Magne Myklebust

Einar Sæter

Kjetil Aa. Solbakken

LRSK takker alle som har bidratt med observasjoner og bilder til denne årsrapporten. Forrige rapport dekket året 2013 og ble publisert i Trøndersk Natur 1-2015.

Bilde øverst: Bøksanger med reirmateriale i nebbet 1. juni 2014 i Lauglolia i Trondheim. Hos bøksangeren er håndsvingfjærprojeksjonen lengre enn både den synlige tertiærlengden og stjertprojeksjonen bak vingespissen. Foto: Trond Hervik.

Komitéens sammensetning

LRSKs sammensetning under arbeidet med denne rapporten har vært uendret siden publiseringen av årsrapporten for 2013. LRSK utvides nå med et medlem, da Øyvind Aas kommer inn i komitéen. Vi ønsker Øyvind velkommen og ser fram til et godt samarbeid!

Henvendelser til LRSK

Rapportering av observasjoner gjøres på Artsobservasjoner. Øvrige henvendelser til LRSK går til sekretær Andreas Winnem (andreas.winnem@gmail.com, tlf 97 04 23 13).

Råd til observatørene

Generelle råd om hvordan man rapporterer i Artsobservasjoner ble gitt i egen artikkel i Trøndersk Natur nr 1-2013. For å beskytte sårbare arter er noen observasjoner i denne rapporten presentert bare med kommunenavn eller andre betegnelser på større geografiske områder. LRSK vil på det sterkeste oppfordre observatører til å vise stor varsomhet med avspilling av lyd til ropende hornugler, hekkende vendehalser o.l. Likeledes bør kjente overvintrende kvartbekkasiner og vannrikser få være i fred når vinteren er streng. I de fleste tilfeller vil én enkelt lydavspilling eller oppskremming i seg selv ikke få større konsekvenser for fuglene. Det samlede presset på enkeltindivider fra fotografer og fuglekikkere kan imidlertid være stort, særlig nær Trondheim. Det kan derfor godt være nettopp du som uforvarende er årsak til at en vendehals i etableringsfasen skyr territoriet eller

at en kvartbekkasin til slutt stryker med i vinterkulda. Observasjoner av sårbare arter bør derfor skjermes når de rapporteres i Artsobservasjoner.

For en del arter som nevnes i denne rapporten, er kun utvalgte observasjoner listet opp. Dette gjelder for eksempel stillits og nøttekråke. LRSK oppfordrer alle observatører til å rapportere alle observasjoner av slike arter likevel, selv om ikke alt nevnes i rapporten. Observasjonene vil da være tilgjengelige i Artsobservasjoner. En høy rapporteringsgrad er viktig for å dokumentere forekomsten av en art. På sikt kan Artsobservasjoner dermed være med på å dokumentere bestandssvingninger og endringer i utbredelse, både lokalt og nasjonalt.

Forskjellen på en LRSK-rapport og for eksempel en nettside med fugleobservasjoner, er at LRSK kvalitetssikrer observasjonsmaterialet før det publiseres i årsrapporten. Alle observasjoner i denne rapporten er å betrakte som godkjente av LRSK, selv om ikke alle er understøttet av dokumentasjon eller en beskrivelse. Funn av arter som står på NSKFs liste, behandles ikke av LRSK, men godkjente funn av NSKF-arter tas likevel med i denne rapporten for oversiktens skyld.

Hva skal rapporteres?

For funn av arter listet i tabell 1, ønsker LRSK å motta bilder, en beskrivelse eller annen dokumentasjon før funnet publiseres. For øvrige arter kreves det normalt ingen dokumentasjon. Observatører vil likevel kunne bli bedt om å beskrive funn gjort på ekstreme datoer, på svært uvanlige lokaliteter e.l. Slike funn kan bli underkjent dersom momenter ved observasjonen tilsier det.

Endringer i rapporteringslistene

Ungfugler av polarjo tas ut av listen over arter som må dokumenteres eller beskrives, med virkning fra 1.1.2015. Høsten 2014 var det en svært god forekomst av polarjo langs kysten vår, og det er også gitt amnesti fra kravet om beskrivelser for funn fra denne influksen. Arten hekker på den sibirske tundraen, og en betydelig del av denne bestanden trekker langs norskekysten vår og høst. Trekket går imidlertid langt til havs, og arten blir derfor registrert primært i forbindelse med kraftig pålandsvind i trekkperiodene. Siden arten trekker forbi kysten vår i betydelige antall hvert år og således er regulær i våre farvann, anser LRSK at det ikke lenger er behov for å kreve beskrivelser av funn av arten. Funn som bryter med det ordinære funnmønsteret, vil fortsatt kunne bli underlagt et krav om en beskrivelse før det godkjennes. Antall polarjo som registreres i fylket varierer mye mellom år. Observatørene oppfordres til å være kritiske ved bestemming av polarjo på trekk og kun rapportere arten når tyvjo kan utelukkes med sikkerhet.

Hvordan lage beskrivelser

Funn av arter som står i tabell 1, blir ikke publisert og inkludert i funnstatistikken uten at funnet er dokumentert med foto eller en beskrivelse av kjennetegn og omstendigheter. Det er viktig å presisere at årsaken til at en beskrivelse etterspørres, ikke er at funnet i utgangspunktet betviles. Artene som er listet opp i tabell 1 er genuint sjeldne i fylket, og flere ligner mye på andre, nærstående arter og kan derfor by på identifikasjonsmessige utfordringer. Når en beskrivelse er laget, er også detaljene rundt funnet bevart for ettertiden. Kravet om beskrivelser eller dokumentasjon gjelder alle observatører, også de mest erfarne, og det inkluderer også LRSKs medlemmer, som må beskrive egne funn på lik linje med alle andre.

Når man lager en sak på et funn, er

Tabell 1 *Observasjoner av følgende arter/underarter skal behandles av LRSK Sør-Trøndelag og skal dokumenteres med beskrivelse, foto e.l. I tillegg kreves det beskrivelse av arter/underarter som er nye for fylket og for arter som skal godkjennes av NSKF, samt av alle hybrider.*

Arter			
Dvergsvane	Tundragås ua. *flavirostris*	Dverggås	Snøgås
Ringgås ua. *bernicla*	Mandarinand FF[1]	Snadderand FF[1]	Amerikakrikkand
Knekkand FF[1]	Taffeland FF[1]	Stellerand	Havlire
Stormsvale	Egretthegre	Vepsevåk	Svartglente[2]
Glente	Sivhauk	Steppehauk[2]	Musvåk
Lerkefalk	Myrrikse	Avosett	Alaskasnipe
Dobbeltbekkasin[3]	Polarsvømmesnipe	Svartehavsmåke[2]	Sabinemåke
Splitterne	Svartterne	Polarlomvi	Skogdue
Turteldue	Snøugle	Slagugle	Lappugle
Nattravn	Isfugl	Hærfugl	Trelerke
Tartarpiplerke	Sibirpiplerke[2]	Lappiplerke	Sitronerle
Gulerle ua. *flava*	Linerle ua. *yarrellii*	Nattergal	Svartrødstjert
Svartstrupe	Steinskvett ua. *leucorhoa*	Rødvingetrost ua. *coburni*	Gresshoppesanger
Elvesanger[2]	Rørsanger	Myrsanger	Busksanger
Gransanger ua. *tristis*	Lappsanger	Dvergfluesnapper	Tornskate
Svartkråke	Rosenstær	Pirol	Polarsisik ua. *hornemanni*
Hortulan	Vierspurv	Dvergspurv	

[1]Kun enslige FF. [2]Fra 2014. [3]Gjelder kun observasjoner utenom hekkeområdene.

det viktig å få med alle kjennetegn som ble sett som gjorde at fuglen kunne artsbestemmes. Skriv gjerne også noen ord om generelt utseende, størrelse og proporsjoner, gjerne sammenlignet med andre arter. Ta også med litt om funnomstendighetene, som hvem som oppdaget fuglen, observasjonsavstand, lysforhold osv. Fyller man ut alle punkter i skjemaet som virker relevante for observasjonen, så får man med alt som er vesentlig. For å lage en god beskrivelse er det på ingen måte nødvendig å være spesielt skrivefør. Kjennetegn og omstendigheter kan godt skrives ned med halve setninger og delvis på stikkordsform om nødvendig. Det er innholdet som er viktig, ikke hvordan setninger er formulert.

Beskrivelser til LRSK og NSKF lages i Artsobservasjoner. Observasjonene dine som skal beskrives, finnes i restanselisten på venstre side i visningen «Mine sider». Du kan også søke frem observasjonen i fanen «Vis funn». Klikk på observasjonen, og trykk så på knappen «Skriv rapport» øverst på siden som viser funndata. Da kommer det frem et skjema som kan fylles ut. Husk å legge ved bilder. Bilder som alt ligger på funnet i Artsobservasjoner, bør også lastes opp som vedlegg til rapporten.

Funn av nasjonale sjeldenheter og nye arter for fylket

Til sammen 255 arter i kategori A til C ble sett i Sør-Trøndelag i 2014, fire arter færre enn i 2013. Tre nye arter for fylket ble funnet: Kuhegre, rustsnipe og starrsanger. I tillegg presenteres det første godkjente funnet av ærfugl som viser karakterer til underarten *borealis*. Rødfotanda fra 2013, som ble presentert som en hybrid i 2013-rapporten, er revurdert av NSKF, og den er nå godkjent som en ren rødfotand. 347 arter i kategori A til C er nå registrert i Sør-Trøndelag. Merk at dette tallet er oppjustert med én art grunnet en tellefeil i forrige rapport. Andre NSKF-arter som presenteres i denne rapporten, er silkehegre, amursvale (2), tundrapiplerke og rødhodevarsler. Alle presenterte funn av NSKF-arter er godkjent av NSKF. Av andre sjeldne arter i fylket presenteres funn av amerikakrikkand, stormsvale, egretthegre, svartglente, ubestemt steppehauk/enghauk, lerkefalk, polarsvømmesnipe (5), sabinemåke, splitterne, turteldue (3), lappugle, hærfugl (2), tartarpiplerke, sibirpiplerke, svartstrupe, busksanger (3), myrsanger, dvergfluesnapper (4), rosenstær, svartkråke, polarsisik ua. *hornemanni* (5) og dvergspurv (2).

Forkortelser og tegnforklaring

For en del arter nevnes antall funn for årene 2009-2013 i artsomtalen. Tidligere årsrapporter nevnes også i noen artsomtaler. Referansene til de aktuelle rapportene er ikke tatt med under hver art, men kan i stedet finnes i referanselisten bakerst i denne rapporten. Som hovedregel er maksimalt fire observatører listet opp for hvert funn. For arter i kategori C, D og E nevnes dette bak artsnavnet. Forklaring på kategoriseringen finnes i NSKFs rapporter, f.eks. Heggøy & Olsen (2015). En stjerne (*) bak dato betyr at funnet er belagt med dokumentasjon som foto, lydopptak, video eller lignende. Dette angis vanligvis bare for arter i tabell 1. En stjerne foran initialer betyr at observatøren oppdaget fuglen. < > = Første siffer angir antall individer av arten funnet i fylket til og med 1970, og andre siffer angir antall individer i perioden 1971-2014, inkludert omtalte funn. For å begrense størrelsen på årsrapporten, er kommunenavn og uttrykk forkortet ihh. til tabellene under.

Tabell 2 *Forkortelser for kommuner.*

Kommune (Forkortelse)	
Agdenes (A.)	Osen (Os.)
Bjugn (B.)	Rennebu (Re.)
Frøya (F.)	Rissa (Ri.)
Hemne (He.)	Roan (Ro.)
Hitra (Hi.)	Røros (Rø.)
Holtålen (Ho.)	Selbu (Se.)
Klæbu (K.)	Skaun (Sk.)
Malvik (Ma.)	Snillfjord (Sn.)
Meldal (Md.)	Trondheim (Tr.)
Melhus (Mh.)	Tydal (Ty.)
Midtre Gauldal (MG.)	Ørland (Ø.)
Oppdal (Op.)	Åfjord (Å.)
Orkdal (Or.)	

Tabell 3 *Alders- og kjønnsbegrep.*

	Beskrivelse
Ad.[1]	Voksen (adultus)
Subad.	Nesten fullt utfarget voksendrakt
Juv.[2]	Flyvedyktig ungfugl i første ekte fjærdrakt
Pull.[3]	Årsunge som enda ikke kan fly
1K	Individ i første kalenderår
2K	Individ i andre kalenderår
2K+	Individ i andre kalenderår eller eldre
F	Hunn (female)
FF	Hunnfarget
M	Hann (male)

[1] *Adultus.* [2] *Juvenilus.* [3] *Pullus, flertall pulli.*

Tabell 4 *Andre forkortelser.*

	Beskrivelse
ind.	individ(er)
min.	minimum
maks.	maksimum
ua.	underart
sy.	syngende
rug.	rugende
rm.	fuglen ble ringmerket
N, Ø, S, V	nord, øst, sør, vest
pt	på trekk (etterfulgt av himmelretning)
km	kilometer
nm	nautiske mil
s.st.	samme sted
div. lok.	diverse lokaliteter

Knoppsvane *Cygnus olor*
Tre hekkefunn ble gjort denne sommeren. Det er en tangering av 2012, som er året med flest hekkefunn. I Åfjord fikk et par frem 5 pulli, og 4 av dem vokste opp. I Snillfjord gikk et par til hekking, og de ble sett rugende. Unger ble imidlertid ikke registrert, og fuglene ble ikke sett etter 7.6, så hekkingen var sannsynligvis mislykket. Det første hekkefunnet for Hemne resulterte i 4 unger, som ble sett gjennom sommeren. Fuglene på Hitra er rømte fangenskapsfugler som har holdt til i området gjennom flere år.
Hekkefunn: 1 par med 5 pull. Monstad, Å. 4.4-22.9 (SME, SGA, MGA mfl.). 1 par rug. Åstfjorden, Sn. 5.4-7.6 (BST, MVE, MMA mfl.). 1 par med 4 pull. Holla, He. 25.6-28.9 (JOB mfl.). **Andre funn:** 3 ind. (Kat. E) Børøysundet, Hi. 2.1-16.8 (ARB, BST, FRL, SWA mfl.).

Sangsvane *Cygnus cygnus*
Tre hekkefunn ble gjort. To av parene er rapportert med hhv. 5 og 3 pulli, mens paret på Røros fikk mislykket hekking. Arten hekker gjerne i avsidesliggende ferskvann, så det er sannsynlig at flere par kan ha hekket ved lokaliteter som ikke besøkes ofte av fuglekikkere. En god del sommerobservasjoner ble gjort, særlig på Røros, uten at hekkeindikasjoner er rapportert. Sommerfunn fra Røros listes ikke under. Årets høyeste antall ble kun 230 ind. i Bjugn i mars.
Hekkefunn: 1 par med 5 pull. Slettestjønna, Re. 11.4-11.9 (MMA, AST mfl.). 1 par rug. Langensjøen, Rø. 26.4-6.6 (ESÆ, MMY, THA mfl.). 1 par med 3 pull. Valtjørna, A. 6.7 (TMO). **Andre nevneverdige sommerfunn:** 1 ad. Eidsvatnet, B. 11.5-19.9 (JBJ, ABR, EBJ mfl.). 1 par Grønbakken, Op. 17.5 (PWB). 1 ad. Flognan, MG. 21.5 (EYD). 4 ind. Fløosvatnet, Hi. 25.5 (KBE). 1 ind. Solsjøen, Or. 25.5 (FRL). 3 ind. Bjørndalsheia, Ri. 26.5 (KNI). 1 par Stråsjøen, Se. 1.6-16.8 (THA, EBA, ESÆ mfl.). 1 ad. Veslvontjønnin, Op. 3.-8.6 (IRØ, EBA, ESÆ). 2 ad. Tjørna, Sn. 7.6 (ARB). 4 ad. Ånøya syd, Mh. 8.6 (TBJ). **Nevneverdig lokalitet:** 2 2K Halten, F. 4.-10.5 (HER, HDA, GBA). **Stort antall:** 230 ind. Seter, Botngård, B. 4.3 (HER).

Sædgås *Anser fabalis*
Anslagsvis 52 ind. ble sett i løpet av året. Av disse er 25 ind. angitt å tilhøre den tundrahekkende underarten *rossicus*. En liten influks fra medio februar til primo april sto for 29 av årets fugler. Resten fordeler seg på 12 ind. i de tre vintermånedene, 8 ind. på vårtrekk i perioden 10.5-9.6 og 3 ind. på høstrekk i oktober. Antall ind. foregående år: 2013 (13), 2012 (45), 2011 (22), 2010 (9) og 2009 (5).
Alle funn: 7 ind. (ua. *rossicus*) Loholt og Øvre Leirfoss, Tr. 1.-15.2 (GBA mfl.). 1 ind. (ua. *rossicus*) Nidarø, Tr. 13.2-3.3 (EIG mfl.). Opptil 2 ind. (min. 1 ua. *rossicus*) Strømmen, Ri. 17.2-1.3 (ORY, OAF, GBA mfl.). Opptil 5 ind. (min. 1 ua. *rossicus*) div. lok., Ø. 22.2-22.3 (AER, HDA, SME mfl.). Opptil 5 ind. Storøya, Se. 27.2-20.3 (JSA). 4 ind. (ua. *rossicus*) Seter, Botngård, B. 3.-10.3 (SME mfl.). 6 ind. (ua. *rossicus*) Lauvøya, Å. 8.3 (TKV). 4 ind. (ua. *rossicus*) Gaulosen, Mh. 20.-23.3 (AST mfl.). 1 ind. Lauvøya, Å. 1.4 (TRØ). 1 ind. (ua. *rossicus*) Steinsdalen, Os. 3.-11.4 (TRE). 1 ind. Gaulosen, Mh. 10.-19.5 (SGJ, AST mfl.). 5 ind. Volløya, Tr. 16.5 (BEB, SGJ). 1 ad. Håsjøen, Rø. 30.5 (HIK, AAS). 1 ad. Gaulosen, Mh. 6.-9.6 (KWO, HEG, EBA mfl.). 3 ind. Litlvatnet, A. og Kråka, Ø. 9.-14.10 (HER, JOB). 1 par Grøtvågen, He. 15.-22.12 (JOB). Opptil 3 ind. Grande, Ø. 17.-26.12 (SME, GDY).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*
I de tre vintermånedene ble 19 ind. registrert. Tre av disse hadde tilhold i Ørland og Bjugn gjennom januar og februar, mens resten ble sett i desember. Et sommerfunn ble gjort på Gaulosen.
Vinterfunn: 3 ind. div. lok., Ø. og B. 14.1-28.2 (HDA, HER mfl.). 12 ind. Gaulosen og Buvika, Mh., Tr. og Sk. 23.11-7.12 (TBO, EKR, TKR mfl.). 3 ind. div. lok., Ø. 4.-31.12 (HDA, SME, HLL mfl.). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 19.12 (NGR). **Sommerfunn:** 2 ind. Gaulosen, Mh. 27.5-12.6 (RES, ARE, BEB mfl.).

Dverggås *Anser erythropus* E
Årets fugl var en fargemerket svensk prosjektfugl, og den plasseres derfor i kategori E. Fuglen holdt seg i en blandet gåseflokk med grågjess, noen kortnebbgjess og en ringgås.
Alle funn: 1 1K M Innstrandfjæra, Ø. 9.-12.10* (HER, SME, GDY, TRI, JSØ, PEL, JSP mfl.).

Tundragås *Anser albifrons*
Anslagsvis 8 ind. er rapportert dette året, hvorav 3 var vinterfugler, 3 besøkte oss på vårtrekk, mens de 2 siste ble sett på høsten. 8 ind. på et år er en normal forekomst av arten hos oss. 2 ind. var av den sibirske underarten albifrons. Antall ind. foregående år: 2013 (4), 2012 (148), 2011 (124), 2010 (10) og 2009 (8).
Alle funn: Opptil 2 ad. (ua. albifrons) div. lok., Ø. 26.1-29.3 (PEL, GDY, SME mfl.). 2 2K Grande, Ø. 3.-18.4 (GBA, JOB, HOL mfl.). 1 ind. Volløya, Mh. 23.5 (SGJ, AST). 1 ind. Gaulosen, Mh. 8.-27.9 (THA mfl.). 1 2K+ Opphaug, Ø. 29.11-4.12 (HDA, ARB, SME mfl.). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 21.-30.12 (NGR, ARB mfl.).

En sædgås av den tundrahekkende underarten rossicus *holdt til langs Nidelva i Trondheim tre uker på ettervinteren, her fotografert ved Marinen 1. mars. Underarten* rossicus *er i gjennomsnitt noe mindre og har kortere og kraftigere hals enn den skoghekkende formen* fabalis*. Størrelse og proporsjoner hos en* rossicus *er omtrent som hos en kortnebbgås, mens* fabalis *heller gir assosiasjoner til en grågås. En* rossicus *har også i gjennomsnitt et litt kortere og kraftigere nebb, og den øvre kanten av undernebbet bølger nedover innerst, noe den ikke gjør i samme grad hos* fabalis*. Dette kalles gjerne en «grin patch». Underarten* rossicus *hekker ikke i Norge, men den opptrer regelmessig i Trøndelag, ofte sammen med kortnebbgjess. Foto: Erik Bangjord.*

Grågås *Anser anser*
275 ind. er rapportert i de tre vintermånedene. 55 av disse ble sett i januar, 6 nye ind. ble funnet i februar, mens 214 ind. ble registrert i desember. 200 ind. tilbrakte årets siste måned i Ørland og Bjugn, noe som er et uvanlig høyt antall så sent på året.
Vinterfunn: Opptil 50 ad. Døsvika, Ø. 1.1-28.2 (HER, TRI, HDA mfl.). 1 ind. Herfjorden, Å. 2.-6.1 (SGA). 1 ind. Nidarø, Tr. 17.-18.1 (NKG, ORD, AES mfl.). 3 ind. Bjørnavågen, Hi. 26.1 (SWA). 1 ind. Viggja, Sk. 4.2 (RES). 2 ind. Fillan, Hi. 10.2 (KBE). 2 ind. Norddyrøya, F. 27.2 (GOL). 1 ind. Storøya, Se. 27.2 (JSA). Opptil 200 ind. Grandefjæra, Ø. 2.-31.12 (SME, HER, GDY mfl.). 13 ind. Gaulosen, Mh. 7.-19.12 (THE, TON, SGJ mfl.). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 21.-30.12 (NGR mfl.).

Stripegås *Anser indicus* E
Fem funn av til sammen ni ind. ble gjort i perioden 11. mai til 25. august, noe som må betegnes som en normal forekomst. Antall ind. foregående år: 2013 (17), 2012 (10), 2011 (7), 2010 (1) og 2009 (23).
Alle funn: 3 ind. Storøya, Se. 11.-20.5 (JSA). 2 ad. Orkanger, Or. 22.5 (MMA, FRL). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 5.-7.6 (HDA, PEL). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 6.8 (HDA, OSF). 1 ind. Gaulosen, Mh. 21.-25.8 (SGJ, AST mfl.).

Hvitkinngås *Branta leucopsis*
Minimum 2409 hvitkinngjess er rapportert i fylket i 2014. Det ble gjort tre vinterfunn, med tre ind. i januar og februar og én fugl i Ørland fra oktober og ut året. Tre ind. i Rissa ultimo mars kan også godt ha tilbrakt vinteren på våre breddegrader. Fugler på vårtrekk ble sett i perioden 2.-24. mai og omfattet 174 ind. To funn fra Tydal og Røros er verdt å merke seg. Den første flokken på høsttrekk ble sett 21. september, og høstens siste flokk på direkte trekk ble sett 1. oktober. Etter dette ble noen få gjenværende fugler sett i Ørland, Rissa og Hemne. Forekomsten på høsten anslås å omfatte 2232 ind., inkludert fuglen som ble værende inn i desember. Antall ind. foregående år: 2013 (6957), 2012 (4979), 2011 (22301), 2010 (493) og 2009 (2996).
Vinterfunn: 2 ind. div. lok., Ø. og B. 4.2-20.4 (SME, GDY, HER mfl.). 1 ind. Gaulosen, Tr. 24.2-31.3 (KWO, OHO). 1 ind. div. lok., Ø. 9.10-28.12 (HDA, SME mfl.). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 ind. Stuggusjøen, Ty. 23.5 (IHA, ØAS). 4 ind. Molinga, Rø. 24.5 (THE).

Ringgås *Branta bernicla*
Ringgås er en fåtallig art hos oss, og kun 5 funn av 24 ind. ble gjort dette året. Med unntak av én fugl i april, ble alle sett i september og oktober. To høstfugler ble underartsbestemt, hvorav én var av den Svalbard-hekkende underarten *hrota*, mens den andre var av den sibirske formen *bernicla*. Antall registrerte ringgås varierer mye fra år til år, avhengig av observatørdekning på trekkplasser på kysten de dagene Svalbard-bestanden passerer på trekket. Antall ind. foregående år: 2013 (9), 2012 (88), 2011 (6), 2010 (6) og 2009 (295).
Vårtrekk: 1 3K+ Grande, Ø. 8.4 (HER, TRI, EPE mfl.). **Høsttrekk:** 1 ind. Vikhammer, Ma. 17.9 (PSH). 1 ind. (ua. *hrota*) Grandefjæra, Ø. 22.9 (HDA, SME, GDY). 20 ind. ptS Titran, F. 22.9 (JOB). 1 ind. (ua. *bernicla*) Hoøya, Ø. 11.-20.10 (AER, PEL, SME, AWI mfl.).

Gravand *Tadorna tadorna*
Ingen vinterfunn ble gjort dette året.
Innlandsfunn: 1 M Eidem til Fløtnes, Se. 16.-31.3 (GBA, SBA, JSA). 7 ind. Selbusjøen vest, K. 21.3 (KWO). 2 ad. Sundet, Rø. 12.4 (KAS, BES).
Nevneverdige lokaliteter: 3 1K Inner Singsvatnet, F. 23.8 (OSF, KTH, DBS mfl.). 1 ad. Slettringen, Titran, F. 12.-25.9 (JOB, THA, ESÆ).

Mandarinand *Aix galericulata* C
Fem hanner er rapportert gjennom året. I tillegg kommer en hann som overvintret på Storfosna, som antas å ha rømt fra lokalt andehold og derfor plasseres i kategori E. Antall ind. foregående år: 2013 (4), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (2) og 2009 (1).
Alle funn: 1 M (kat. E) Vågen, Storfosna, Ø. overvintret (NN). 2 M Nidarø, Tr. 30.3-7.4 (*BJT, TKR, EKR mfl.). 2 M Døsvika, Ø. 4.-6.5 (GDY, AER, EPE mfl.). 1 M Viggja, Sk. 18.9 (MMA, KKR).

Brunnakke *Anas penelope*
Til sammen 294 brunnakker ble sett i de tre vintermånedene. Anslagsvis 46 ind. er rapportert i januar og februar i Agdenes (27), Ørland/Bjugn (15), Trondheim (3) og Skaun (1). I desember ble anslagsvis 248 ind. registrert, fordelt på Ørland (181), Agdenes (57), Trondheim (4), Melhus/Skaun (3), Orkdal (2) og Hemne (1). Særlig en flokk på 180 ind. i Døsvikfjæra 1. desember er et høyt antall vinterstid. Disse bør imidlertid betraktes som sene høsttrekkere, da antallet fugler sank betydelig utover i måneden.
Store antall vinter: Opptil 180 ind. Døsvika, Ø. 1.-27.12 (HDA mfl.). Opptil 57 ind. Litlvatnet, A. 1.-12.12 (DOB, GBA).

Snadderand *Anas strepera*
Med en total på anslagsvis 17 ind. ble 2014 nok et godt år for snadderand i fylket. 3 ind. overvintret på Ørlandet, 7 ind. ble sett på vårtrekk mellom 18.4 og 7.6, 5 ind. dukket opp på høsttrekk i oktober, mens 2 fugler ble sett i månedsskiftet november-desember. Som vanlig ble flest snadderender sett i våtmarksområdene i området rundt utløpet av Trondheimsfjorden, hvor Ørland og Bjugn kommuner og Litlvatnet i Agdenes sto for til sammen 12 av årets 17 individer. Antall ind. foregående år: 2013 (21), 2012 (8), 2011 (18), 2010 (12) og 2009 (11).
Alle funn: 2 M og 1 F div. lok., B. og Ø. 11.1-19.4 (HDA, SME, JSP mfl.). 1 ad. M Gaulosen, Mh. 18.-21.4 (OHO, GOH, FRL mfl.). 1 par Såsøya, Se. 3.5 (JSA). 1 M Havsjøen, Rø. 12.5 (TTH). 2 M Botngårdsfjæra, B. 3.6 (SME, HDA, GDY). 1 ad. M Litlvatnet, A. 7.6 (ETH, OTH, BAT). 1 ind. Litlvatnet, A. 3.10-1.12 (OHE, SME, JOB mfl.). 1 M Døsvikfjæra, Ø. 4.10-15.11 (HDA). 2 FF Hovsfjæra, Ø. 5.10 (AER). 1 M Gammelelva, Mh. 12.10 (MMY). 1 1K M Litlvatnet, A. 29.11-1.12 (OHE, DOB, PSR). 1 FF Døsvika, Ø. 29.11* (SME, AER).

Krikkand *Anas crecca*
Anslagsvis 60 ind. ble sett vinterstid. I januar og februar er 27 ind. rapportert i Trondheim (12), Bjugn (7), Agdenes (3), Hitra (1), Rissa (1), Skaun (1), Ørland (1) og Ørland/Bjugn (1), mens 43 ind. i desember fordeler seg kommunevis på Agdenes (15), Trondheim (14), Trondheim/Skaun (8), Ørland/Bjugn (3) og Ørland (3).
Store antall vår: 176 ind. Gaulosen, Mh. 20.4 (SGJ, EBA, AST, FSC). 120 ind. Floan, Rø. 26.4 (ESÆ). 120 ind. Borgosen, Rø. 11.5 (MVE). **Store antall høst:** 141 ind. Gaulosen, Mh. 24.9 (DOB). 150 ind. Grandefjæra, Ø. 25.9 (HDA). 112 ind. Gangåsvatnet, Or. 28.9 (MMA). 191 ind. Litlvatnet, A. 2.11 (DOB).

Amerikakrikkand *Anas carolinensis* <0,17>
En hann ble sett på Gaulosen to uker i juni. To dager etter siste observasjonsdato ble antatt samme fugl sett igjen i Leangenbukta. Funnet er det syttende i fylket og det sjette fra Gaulosen.
Alle funn: 1 M Gaulosen, Mh. 9.-22.6* (*KAS, BES mfl.) og Leangenbukta, Tr. 24.6 (SGJ, BEB).

En knekkand ble oppdaget ved Øvre Leirfoss i Trondheim 11. mai. Voksne hanner er lett gjenkjennelige med sin brede, hvite øyenbrynsstrek, som strekker seg langt bak i nakken, og som står i stor kontrast til et ellers ganske mørkt hode. Foto: Erik Bangjord.

Stokkand *Anas platyrhynchos*
Store antall: 1840 ind. Litlvatnet, A. 7.1 (HER, TRI, SME mfl.). 1134 ind. Buvika, Sk. 23.11 (TBO).

Rødfotand *Anas rubripes* NSKF <0,1>
Funnet på Gaulosen fra 2013 har tidligere vært publisert som en hybrid rødfotand x stokkand. Denne fuglen har blitt revurdert av NSKF og er nå godkjent som en ren rødfotand. Funnet er det første i Sør-Trøndelag.
Funn fra tidligere år: 1 M Volløya og Gaulosen, Tr. og Mh. 19.4-1.5.2013* (*ESÆ, KAS, THA mfl.)

Stjertand *Anas acuta*
Anslagsvis 80 stjertender ble registrert i 2014. Et hekkefunn ble konstatert på Slettestjønna i Rennebu, hvor 2 par hadde tilhold, og ett av dem fikk frem 3 unger. Ellers ble 8 fugler sett i januar og februar, 24 ble sett på vårtrekk, 6 ind. er rapportert fra potensielle hekkeplasser, 8 ind. var junifunn utenfor antatte hekkeområder, 26 ind. var på høsttrekk, mens én fugl er meldt i desember. Hannen på Gjeddvatnet i Trondheim dannet par med en stokkand-hunn. Antall ind. foregående år: 2013 (71), 2012 (103), 2011 (92), 2010 (94) og 2009 (50). **Hekkefunn:** 2 par og 3 1K Slettestjønna, Re. 21.4-9.8 (MMA mfl.). **Andre funn fra potensielle hekkeområder:** 1 par Molinga, Rø. 14.-24.5 (MVE, THE). 1 F Elgsjøelvaosen, Op. 2.6 (MVE). 1 M Vesle Orkelsjø, Op. 3.6 (MVE). 1 F Storорkelsjøen, Op. 14.6 (MMA, MKL, RES mfl.). **Vinterfunn:** 1 par Litlvatnet, A. 3.1-15.4 (ESÆ, HER, MMA mfl.). 2 par Fevåg, Ri. 29.1-24.3 (GBA, ORY, GNY mfl.). 1 par Brekstadfjæra, Ø. 8.2-20.4 (PEL, MMA, HDA mfl.). 1 M Buvika, Sk. 15.11-7.12 (ESÆ, DOB). 1 F Brekstadfjæra, Ø. 17.-20.12 (SME, HDA). **Høyt antall:** Opptil 9 ind. Grandefjæra, Ø. 25.9 (AER).
Nevneverdig lokalitet: 1 FF Kjervågsund, Titran, F. 8.11 (AST, TRE).

Knekkand *Anas querquedula*
Med anslagsvis 26 ind. ble 2014 det beste året for arten i fylket noensinne. Årets funn i første halvår ble gjort i perioden 30. mars til 24. juni, mens et høstfunn ble gjort på Litlvatnet, Agdenes 7. september. Ankomstdatoen 30. mars er svært tidlig for arten. Store deler av bestanden tilbringer vinteren sør for Sahara, og arten dukker normalt ikke opp i Trøndelag før ultimo april. Vårt tidligste vårfunn ble gjort i 1996, da et par ankom Buvika allerede 10. mars i forbindelse med en større influks i Vest-Europa. Antall ind. foregående år: 2013 (16), 2012 (1), 2011 (14), 2010 (4) og 2009 (11).
Vårtrekk: 1 M Litlvatnet, A. 30.3-12.4* (KWO, RSA, AWI mfl.). 1 M Eidsvatnet, B. og Hovsfjæra, Ø. 17.-19.4 (PEL, HDA, GME mfl.). 1 par Litlvatnet og Gjeddvatnet, Tr. 28.4-18.5 (EBA, TKR, EKR mfl.). 2 par Gaulosen, Mh. 6.5 (HLL, SGJ, THE mfl.). 1 par Aursunden ved utløpet og Borgosen, Rø. 10.-13.5 (ESÆ, MVE). 1 M Øvre Leirfoss, Tr. 11.-12.5 (JHE, RFR, TON mfl.). 1 M Låen, Se. 11.5 (AWI). 1 par Eidsvatnet, B. og Hovsfjæra, Ø. 12.-20.5 (AES, SME, HDA, HER). 1 M Laugen, Sk. 13.5 (KWO). 1 par Gaulosen, Mh. og Leangenbukta, Tr. 16.5-24.6 (HEG, MHE, AST mfl.). 1 par Valatjønna, B. 16.5 (SME). 1 par Gardåa, Op. 28.5 (ÅLO). 1 M Holtvatna, MG. 1.6 (ØSO). 2 ad. M Litlvatnet, A. 7.6 (ETH, OTH, BAT). **Høsttrekk:** 1 par Litlvatnet, A. 7.9 (SPR, AST, OHO, SGJ, KWO).

Skjeand *Anas clypeata*
Årets forekomst anslås å omfatte 26 ind., som er et litt lavere tall enn vi har vært vant til de seneste årene. Et vinterfunn i Agdenes i januar er uvanlig. Dette kan godt dreie seg om samme fugl som ble sett på Ørlandet i desember året før. Et funn på Hitra er også verdt å merke seg. Antall ind. foregående år: 2013 (38), 2012 (29), 2011 (44), 2010 (33) og 2009 (45).
Alle funn: 1 F Litlvatnet, A. 7.-8.1 (TRI, HDA, SME mfl.). 1 par og 1 M Eidsvatnet, B. 26.4-4.5 (TRI, HDA, JSP mfl.). 2 M Volløya, Tr. 30.4 (THA, BEB, SGJ mfl.). 1 F Botngårdsfjæra, B. 9.5 (GDY, SME). 1 par Grønningsbukta, Ri. 9.-24.5 (TON, JBJ, EBJ mfl.). Min. 1 par og 1 M Gaulosen, Mh. 10.5-25.6 (SGJ, AST, EBA, THA mfl.). 1 ad. M Drågavatnet, Hi. 27.5 (ARB, OSF). 1 M Haugatjønna, Myrmoen, Rø. 1.6 (MVE). 1 par Gjølmesfjæra, Or. 23.6 (MMA, JOB, HOL). 3 M og 2 FF Botn og Strømmen, Ri. 1.-13.8 (ORY, SME, GNY mfl.). 1 FF Eidsvatnet, B. 22.8 (BJT). 1 FF Litlvatnet, A. 24.8-7.9 (PWB, AWI, EBA mfl.). 1 FF Gaulosen, Mh. 19.9 (RES, HLL). 1 F Kråka, Ø. 26.10 (HDA). 1 1K Garbergosen, Se. 2.11 (GBA, SBA).

Taffeland *Aythya ferina*
To taffelender ble sett dette året, én på våren og én på høsten. To funn i løpet av et år er en normal forekomst av arten hos oss. Antall ind. foregående år: 2013 (2), 2012 (4), 2011 (18), 2010 (3) og 2009 (1).
Alle funn: 1 F Gaulosen, Mh. 15.-20.4* (ESÆ, MMA, OHO mfl.). 1 ad. M Eidsvatnet, B. 4.-25.10* (AER, HER, JSP mfl.).

Toppand *Aythya fuligula*
Nevneverdige lokaliteter: 1 par Ervikvatnet, F. 18.4-7.6 (OSF). 2 ad. M Bustbergvatnet, F. 11.-24.5 (BST, KTH, PEI mfl.). 2 1K Skybuvatnet, Titran, F. 22.9 (*ESÆ, MMY, JOB mfl.). **Store antall:** 136 ind. Havsjøen, Rø. 10.5 (ESÆ). 57 M og 42 F Glåmos, Rø. 12.5 (MVE). **Stort antall vinter:** 17 M og 24 F Stavne, Nidelva, Tr. 1.2 (EBA).

Bergand *Aythya marila*
Anslagsvis 66 bergender ble registrert i 2014. Årsunger ble sett i aktuelle hekkeområder ved to lokaliteter i Oppdal. Til sammen 8 ind. ble sett i januar og februar, 5 fugler var på vårtrekk, 8 ind. er rapportert fra hekkeområdene, 2 ble sett sommerstid utenfor hekkeområder, 41 var på

høsttrekk, hvorav 6 ble sett inn i desember, og 2 nye fugler dukket opp i desember.
Funn fra hekkeområdene: 2 ad. F og 2 1K Kvolvtjønnin, Op. 7.8 (PWB). 1 ind. Langsjøen, K. 24.8 (OAI). 3 ind. (min. 1 1K) Stororkelsjøen, Op. 18.-29.9 (JOB mfl.). **Andre sommerfunn:** 1 M Gaulosen, Mh. 21.-26.6 (MMY mfl.). 1 F Molinga, Rø. 19.7 (EWE). **Vinterfunn:** 1 2K+ F Åremsstranda, A. 1.2 (TMO). Opptil 5 ind. Litlvatnet, A. 9.10-12.12 (AER, HDA, DOB mfl.). 2 ind. Likroken, He. 12.10-31.12 (JOB, HOL, ALY). 2 1K Litlvatnet, Tr. 16.-26.12 (GBA). **Stort antall:** Opptil 17 ind. Brekkgrunnen, Sk. 25.9-21.11 (KWO, OHO, AST mfl.).

Ærfugl *Somateria mollissima*
Store antall: 2015 ind. Midtsandan, Ma. 4.4 (PSH). 1304 ind. Mule, Gaulosen, Tr. 18.10 (DOB).

Ærfugl *Somateria mollissima borealis* <0,1>
Første bekreftede funn av denne underarten i fylket. Fuglen ble oppdaget 1. juledag i Ila-bassenget og ble sett ut året og inn i 2015. Den holdt seg sammen med ærfugler mellom Ila og utløpet av Nidelva. Fuglen er godkjent som et individ som matcher utseendet til en *borealis*, men det er ikke mulig å fastslå fra hvilken bestand fuglen har sitt opphav. Underarten *borealis* defineres ulikt i litteraturen. Klassiske *borealis* hekker øst i Canada og vest på Grønland. Fugler fra det østlige Grønland, Island, Svalbard og Frans Josefs land har vekselvis blitt betraktet som *borealis*, som en egen underart *islandica*, og som *mollissima*. På Svalbard finnes fugler med et utseende som matcher *borealis*, fugler som ser ut som norske *mollissima*, samt mellomformer. Svalbardbestanden overvintrer i stor grad langs kysten av Finnmark, og det er mest nærliggende å anta at den aktuelle fuglen stammer herfra. Ærfuglhanner har skapulærer med brede ytterfaner som kan reises, og de fremstår da som to tydelige kuler på ryggen, gjerne kalt seil. Den viktigste forskjellen mellom hanner av *borealis* og *mollissima* er hvordan de bruker disse seilene. Hos *mollissima* kan de løftes under spill, men de ligger stort sett nede ellers. En *borealis* har derimot i stor grad seilene reist permanent, noe denne fuglen hadde. Det er også en gjennomsnittlig forskjell i nebbfarge hos de to formene, men variasjonen er for stor hos begge former til at dette kan brukes som noe mer enn en støttekarakter. Denne fuglen har en oransjegul farge på de indre delene av nebbet som stemmer bra med en klassisk *borealis*. Det er også mindre forskjeller på de to formene i proporsjonene på nebbet og i neseborets plassering.
Alle funn: 1 ad. M Ila til Nidelva nedenfor Pirbrua, Tr. 25.-31.12* (*GBA, JHE, TBO mfl.).

En ærfugl som viste karakterene til den nordlige underarten borealis *ble oppdaget ved Skansen i Trondheim i romjulen, her fotografert 27. desember. Foto: Jon Helle.*

Praktærfugl *Somateria spectabilis*
Til sammen seks praktærfugler ble sett i løpet av året. Funn både i mai, juni og juli er verdt å merke seg. Funnene av hunnfugler fra Valsneset i mai og Været i juni bedømmes å være trolig samme individ, da arten er sjelden sommerstid. Antall ind. foregående år: 2013 (12), 2012 (11), 2011 (9), 2010 (34) og 2009 (27).
Alle funn: 1 ad. M Bjugnholmen, B. til Kjeungan, Ø. 1.1-18.4 (HER, JSØ, HDA mfl.). 1 F Innstrandfjæra, Ø. 1.-4.1 (HER, TRI). 1 F Vessøra, He. 29.1 (JOB). 1 ad. F Midtsandan til Muruvika, Ma. 24.3-6.4 (DOB, PSH mfl.). 1 2K F Valsneset, B. 19.5 (SME, GDY, HDA). 1 2K+ F Været, B. 30.6 (HER). 1 F Viggja, Sk. 8.-9.7 (RES, MMA, EBA).

Havelle *Clangula hyemalis*
Min. to hekkefunn ble konstatert denne sommeren, begge i Oppdal. I tillegg til hekkefunnene er 16 ind. sett på 8 lokaliteter i potensielle hekkeområder, fordelt på Oppdal (8/4), Røros (7/3) og Tydal (1/1). Under vårtrekket er 38 ind. registrert i ferskvann ved 7 lokaliteter i Selbu (29/4), Tydal (6/1), Klæbu (2/1) og Røros (1/1), mens 44 ind. ble sett om høsten på 9 lokaliteter i Selbu (26/3), Tydal (13/1), Rennebu (2/2), Klæbu (1/1), Hemne (1/1) og Røros (1/1).
Hekkefunn: Min. 3 ad. F og 9 pull. Stororkelsjøen, Op. 29.5-20.9 (PWB, SGA, MGA mfl.). 1 F med 4 1K Vesle Orkelsjø, Op. 8.6-20.8 (PWB, TAN, HOL). **Andre funn fra hekkeområdene:** 1 par Gjevillvatnet, Op. 15.-24.5 (PWB). 1 par Unndalsvatnet, Op. 29.5-24.6 (ØSO, JEL mfl.). 3 ind. Finnsjøen, Op. 31.5-8.6 (PWB, BJT, EBA mfl.). 1 F Gardkleppsjøen, Ty. 6.7 (ESÆ, TAS). 1 ind. Leirpullan, Op. 10.8 (GGU, ALO).
Vårtrekk ferskvann: Min. 7 ind. Litlvatnet, Tr. 17.4-18.5 (GBA mfl.).
Høsttrekk ferskvann: 1 1K Lauvåstjønnan, Re. 6.9 (ESÆ). 3 ind. Litlvatnet, Tr. 13.9-22.12 (GBA, BJT, EBA). 1 1K Holmtjønna, Re. 9.10 (NVA). 1 ind. Mugga, Femundsmarka, Rø. 11.10 (MAU). 4 ind. Liavatnet, B. 19.10 (NN via GST). **Store antall:** 150 ind. Vessøra, He. 30.1 (RES, JOB). 266 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 29.3 (AWI, EBA, PWB, RSA mfl.). 520 ind. Midtsandan, Ma. 3.4 (PSH). 110 ind. ptS Sula 5.10 (EKR, ØHE). 138 ind. ptSV Gjæsingen, F. 11.10 (DOB). 120 ind. Vessøra, He. 31.12 (JOB).

Svartand *Melanitta nigra*
Minimum 6 hekkefunn ble gjort, alle i Oppdal kommune. I tillegg er arten rapportert i hekketid med 44 ind. fra ytterligere 15 lokaliteter i potensielle hekkeområder i Røros (14/6), Oppdal (5/3), Tydal (13/3), Midtre Gauldal (1/1), Roan (1/1) og Åfjord (1/1). På vårtrekk er hele 287 ind. rapportert i ferskvann fra 17 lokaliteter i Selbu (121/1), Orkdal (35/2), Skaun (30/1), Røros (27/5), Klæbu (21/1), Rennebu (15/1), Hemne (12/1), Oppdal (10/1), Trondheim (8/1), Åfjord (5/1), Tydal (2/1) og Melhus (1/1). En flokk på 110 ind. på Selbusjøen 10. mai er verdt å merke seg. På høsten ble 23 ind. sett på 8 ferskvannslokaliteter fordelt på Røros (8/2), Hemne (6/1), Orkdal (5/1), Bjugn (2/2), Agdenes (1/1) og Selbu (1/1).

Hekkefunn: 2 F med hhv. 2 og 4 1K Stororkelsjøen, Op. 29.5-20.8 (PWB mfl.). 1 F med 2 1K Unndalsvatnet, Op. 1.6-31.7 (EBA, PWB). 1 F med 3 pull. Butjørna, Op. 13.-21.7 (MMY). 3 F med 9 1K (min. 2 kull) Vesle Orkelsjø, Op. 24.7-20.8 (TAN, TÅS, PWB). **Andre funn fra hekkeområdene:** 1 par Håsjøen, Rø. 14.5 (HIK). 10 ind. Gjevillvatnet, Op. 15.5 (PWB). 8 ind. Mosjøen, Ty. 17.-31.5 (ESÆ, THA). 1 F Grønbakken, Op. 18.5 (PWB). 2 M og 1 F Rien, Rø. 29.5 (ESÆ). 5 par Butjørna, Op. 29.5-1.6 (PWB, EBA). 3 ind. Skjerivatnet, Å. 1.6 (KKJ). 3 ind. Finnsjøen, Op. 2.6 (JOB). 7 ind. Vesle Orkelsjø, Op. 8.6-10.7 (PWB, EBA, TAN mfl.). 3 ind. Burusjøen, MG. 8.-10.6 (OAF). 2 ind. Mustjønna, Ty. 14.6 (BEI, SSL). 2 M og 1 F Gardkleppsjøen, Ty. 6.7 (ESÆ, TAS). 1 M Rien, Rø. 25.7 (BSÆ). 1 FF Leirpullan, Op. 10.8 (GGU, ALO). 6 FF Hyllingen, Rø. 31.8 (ESÆ). 1 ind. Roasten, Rø. 5.9 (GBA). 1 F Øversjøen, Rø. 14.9 (BSÆ). **Vinterfunn ferskvann:** 1 FF Glåmos, Rø. 1.1* (TMH). 1 FF Storvatnet, A. 8.1 (GBA). 1 FF Granbybukta, Se. 6.12 (GBA). **Stort antall ferskvann:** Opptil 110 ind. Selbusjøen, Se. 6.4-15.5 (GBA, JSA, MMY mfl.). **Store antall:** 400 ind. Utgrunnskjæra, F. 10.5 (GBA). 400 ind. Baren, Ro. 10.6 (GBA, AES).

Sjøorre *Melanitta fusca*
Ni hekkefunn ble konstatert på fem lokaliteter, fordelt kommunevis på Oppdal (6/3), Tydal (2/1) og Midtre Gauldal (1/1). I tillegg kan 4 1K i Ovlingen i Tydal 10. september godt utgjøre ytterligere et hekkefunn, men såpass sent på året kan de godt ha forflyttet seg et stykke fra hekkeplassen. Utenom lokalitetene med konstatert hekking foreligger det funn i mulige hekkeområder på fem lokaliteter i Røros (3) og Tydal (2). Under vårtrekket er anslagsvis 80 ind. rapportert i ferskvann i Røros (48), Selbu (13), Klæbu (10), Midtre Gauldal (5), Tydal (3) og Orkdal (1), mens 22 ind. ble sett i ferskvann under høsttrekket, fordelt på Røros (18), Selbu (2), Rennebu (1) og Orkdal (1). **Hekkefunn:** 3 F med hhv. 18, 10 og 7 1K Vesle Orkelsjø, Op. 10.7-20.8 (PWB mfl.). 1 F med 6 pull. Kameldyrtjønna, MG. 24.7 (AMS). 1 F med 5 1K Unndalsvatnet, Op. 31.7-3.8 (PWB). 2 F med hhv. 5 og 3 1K Stororkelsjøen, Op. 31.7-20.9 (PWB, MMA, JOB mfl.). 2 F med hhv. 7 og 6 pull. Ystesosen, Ty. 7.8-10.9 (PSH, ESÆ, JOB mfl.). **Andre funn fra hekkområdene:** 1 par Rien, Rø. 29.5 (ESÆ). Opptil 9 ind. Mustjønna, Ty. 31.5-14.6 (ESÆ, EBA, BEI mfl.). Opptil 4 ind. Stororkelsjøen, Op. 31.5-25.6 (HTH, JOB mfl.). Opptil 2 par Unndalsvatnet nord, Op. 1.-7.6 (EBA, ORY, ABR). 2 F Langtjønna, Rø. 1.6 (MVE). 9 par Unndalsvatnet sør, Op. 2.6 (MVE). 8 par Vesle Orkelsjø, Op. 3.-8.6 (MVE, PWB). 4 1K Ovlingen, Ty. 10.9 (JOB, HOL, VAK). 1 F Rien, Rø. 14.9 (BSÆ). 1 ind. Nesjøen, Ty. 17.9 (APE). **Vårtrekk ferskvann:** 1 M Gangåsvatnet, Or. 29.4 (MMA). 1 par Såsøya, Se. 3.5 (JSA). 34 ad. Havsjøen, Rø. 10.-31.5 (ESÆ, MMY, TTH mfl.). 5 par Selbusjøen, K. 10.5 (KWO, OAF). 11 ind. Selbusjøen sentralt, Se. 10.-15.5 (JSA). 1 par Sjøvollholman, Brekken, Rø. 12.5 (MVE). 1 par Aursunden ved utløpet, Rø. 13.5 (MVE). Opptil 8 ad. Håsjøen og Langensjøen, Rø. 14.5-7.6 (HIK, LHE, AES mfl.). 3 ad. M , 1 2K M og 1 ad. F Samsjøen, MG. 17.5 (OAF). 3 ind. Mosjøen, Ty. 17.5 (ESÆ, THA). 1 par Botnet, Aursunden, Rø. 18.5 (ESÆ, THA). **Høsttrekk ferskvann:** 1 ind. Slettestjønna, Re. 1.7 (ORE). 1 FF Gangåsvatnet, Or. 20.8 (MMA). 18 ind. Havsjøen, Rø. 10.9 (ESÆ). 2 ind. Neadeltaet, Se. 25.9 (JSA). **Store antall:** 273 ind. Grandefjæra, Ø. 23.3 (TBO). 358 ind. Midtsandan, Ma. 2.4 (PSH). 350 ind. Bjugnfjorden, B. 2.7 (JSP, EPE).

Kvinand *Bucephala clangula*
Store antall: 220 ind. Laksåvika, Hi. 3.1 (ARB). 170 ind. Sagfjorden, Sn. 2.3 (ESÆ, MMY). 151 ind. Buvika, Sk. 8.3 (OHE, HEG). 186 ind. Buvika, Sk. 25.10 (DOB).

Lappfiskand *Mergellus albellus*
Syv lappfiskender er rapportert dette året. Fire av dem dukket opp på vårtrekk i april og mai, mens tre ble sett på høsttrekk i oktober. Antall ind. foregående år: 2013 (6), 2012 (4), 2011 (4), 2010 (11), 2009 (4) og 2008 (8). **Alle funn:** 1 F Gjølmesfjæra, Or. 10.4 (MMA, FRL, RES). 1 F Litlvatnet, Tr. 12.4-1.6 (GBA, EVI, KWO mfl.). 1 F Eidsvatnet, B. 10.-22.5 (GME, HDA, SME mfl.). 1 F Orvos, Rø. 10.5 (ESÆ). 1 FF Litlvatnet, A. 3.-12.10 (SME, AWI). 1 1K Likroken, He. 12.10-5.11 (SME, JOB, ALY mfl.). 1 FF Gaulosen, Mh. 18.-23.10 (FSC, TBO mfl.).

Laksand *Mergus merganser*
Store antall: Opptil 48 ind. Uthaug til Døsvika, Ø. 2.1-12.2 (GDY, SME, HDA mfl.). Opptil 41 ind. Vinjefjorden, He. 24.1-13.3 (HOL, KTO, JOB). 1 M Strømøya, F. 24.1 (KTH). 39 ind. Botngård, B. 24.1 (EBA, AST). 1 M Uttian, F. 11.2 (BST). 30 ind. Vinjefjorden, He. 4.12 (JOB).

Vaktel *Coturnix coturnix*
Anslagsvis 30 vaktler ble rapportert i perioden 29. mai til 29. september. Av disse var 25 syngende hanner. Ved Grønningsbukta i Rissa ble et sjeldent hekkefunn konstatert da et kull på 6 ind. ble skremt opp 28. september. Hekking forekommer trolig regelmessig i Trøndelag, men artens tilbaketrukne levevis gjør hekkefunn vanskelige å konstatere. To hanner sang ved Grønningsbukta denne sommeren. Én av disse kan godt ha vært i flokken på seks, og denne er derfor ikke telt dobbelt i totalen. Årets syngende fugler fordelte seg kommunevis på Orkdal (3), Rissa (3), Ørland (3), Malvik (2), Melhus (2), Selbu (2), Trondheim (2), Bjugn (1), Frøya (1), Hemne (1), Meldal (1), Oppdal (1), Rennebu (1), Skaun (1) og Åfjord (1). Antall ind. foregående år: 2013 (3), 2012 (16), 2011 (35), 2010 (4) og 2009 (15). **Alle funn:** 1 sy. M Børsa, Sk. 29.5 (ORØ). 1 sy. M Olderøya, Or. 30.5-23.7 (RES, MMA, FRL). 1 sy. M Kjøsnes, Se. 31.5-15.7 (TMØ). 1 sy. M Ekra, Tr. 1.6-6.7 (VAK, THA, ESP mfl.). 1 sy. M Storfosna, Ø. 4.6 (JSP). 1 sy. M Songmoen, Or. 7.6 (FHO). 1 sy. M Lauvøya, Å. 8.6 (ESP). 1 sy. M Storsanden, Ma. 10.-15.6 (NN via OFR). 1 sy. M Stororkelsjøen, Op. 14.6 (FHO). 1 sy. M Oppigard, Re. 15.6 (MMA). 2 sy. M Vollhåggån, Mh. 27.6-25.7 (ESP, EBA, THE). 1 sy. M Rovatnet, He. 28.6-5.7 (JOB, HOL, EBA). 1 sy. M Vasseljå, Ma. 29.6 (PSH). 1 sy. M Storøya, Se. 1.-5.7 (JSA). 1 sy. M Nes, B. 9.-12.7 (HER, TRI, MHR mfl.). 1 sy. M Klett, Tr. 9.-10.7 (KAS, BES). 1 sy. M Ervika, F. 10.7 (OSF). 1 sy. M Grønningsbukta, Ri. 11.7-29.9 (NGR, ABR mfl.). 1 sy. M Byagrenda, Or. 12.7 (MMA). 1 sy. M Stadsbygd kirke, Ri. 13.7-13.8 (JBJ, EBJ, ORY mfl.). 1 sy. M Grønningsbukta, Ri. 16.7-1.8 (ORY, ARB, NGR mfl.). 1 sy. M Å, Md. 21.7 (JOB). 1 sy. M Amfiet, Grandefjæra, Ø. 5.-16.8 (ARB, OSF, PEL mfl.). 1 ind. Leirbekken, Grandefjæra, Ø. 13.8 (HDA). 6 ind. Grønningsbukta, Ri. 28.9 (NGR, ABR).

Fasan *Phasianus colchicus* E
Minimum 10 fasaner ble registrert dette året, inkludert 6 1K fra et hekkefunn. Alle fasaner i fylket stammer fra rømte eller utsatte fugler.
Alle funn: 1 M Ervika, F. 1.1-27.12 (OSF). 1 M Ulvøya, Hi. 28.3-22.6 (OSF, DBS). 1 F Vikan, Strømøya, F. 19.4 (BST). Opptil 1 ad F og 6 1K Ervika og Dyrvik, F. 19.8-12.12 (PEI, BST, FRL, KTH, GOL).

Lirype *Lagopus lagopus*
Nevneverdig lokalitet: 1 ind. Fjordgata, Tr. 17.10 (OFR).

Dvergdykker, Ila, Trondheim 10. november. Dvergdykkeren legger seg ofte inntil flytende tang eller annen vegetasjon og bruker dette som kamuflasje. Foto: Eirik Spets.

Orrfugl *Tetrao tetrix*
Nevneverdige lokaliteter: 2 M Straum, Hi. 16.4 (ARB). 1 1K M funnet død Hammarstaddalen, Hi. 28.9 (BST). 2 ind. Fillan, Hi. 28.9 (AWI, BJT, VAK).

Smålom *Gavia stellata*
Stort antall: 72 ind. Øya, Hoøya, Ø. 12.8 (HDA).

Storlom *Gavia arctica*
Anslagsvis 26 ind. ble registrert i de tre vintermånedene, fordelt på 22 ind. i januar og februar og 4 ind. i desember. **Vinterfunn:** Opptil 2 ind. Viggja, Sk. 1.1-5.2 (MMA, RES). 1 ind. Grilstadfjæra, Tr. 1.1-8.2 (AST, GBA, EBA mfl.). Opptil 6 ind. Døsvika, Ø. 1.1-28.2 (PWB, ORY, SME mfl.). 2 ind. Bjugnholmen, B. 1.1 (HER, TRI, HDA). Opptil 2 ind. Midtsandan, Ma. 4.1-8.2 (POS, SFB, PSH mfl.). 1 ind. Laksåvika, Hi. 8.1 (KBE). 1 ind. Været, B. 8.1 (HER). 2 ind. Rørvik, Ri. 8.1 (GNY). 1 ind. Garten, Ø. 24.1-23.2 (AWI, BJT, EBA mfl.). 1 ind. Nordvika, Os. 16.2 (SGA, MGA). 1 ind. Inntian, F. 21.2 (FRL). 2 ind. Linesøya, Å. 28.2 (JHE). 2 ind. Døsvika, Ø. 1.-4.12 (SME, HDA, HLL). 1 ad. Hommelvik, Ma. 27.12 (BJT). 1 ad. Norddyrøy, F. 27.12 (FRL, GOL).

Islom *Gavia immer*
Anslagsvis 3 ind. er rapportert i Trondheimsfjorden, hvorav ett funn var i juli, fylkets eneste sommerfunn dette året.
Funn fra Trondheimsfjorden: 1 ind. Være til Leangenbukta, Tr. 1.1-12.2 (AST, EBA, GBA mfl.). 1 ind. Viggja, Sk. 22.2 (DOB). **Sommerfunn:** 1 2K Viggja, Sk. 8.7 (MMA).

Gulnebblom *Gavia adamsii*
Årets funnmasse anslås å dreie seg om 35 ind., noe som er en høyere årssum enn de siste årene. Av disse ble 20 ind. rapportert i vårhalvåret, mens 15 ind. ble sett i andre halvår. To funn fra Trondheimsfjorden i februar er uvanlig. **Funn fra Trondheimsfjorden:** 1 3K+ Midtsandan, Ma. 1.2* (TKV, RHA, OHE mfl.). 1 2K Vikhammerløkka, Ma. 2.-8.2* (ØSO, THA). **Andre funn:** 1 ind. Døsvika, Ø. 3.1-1.4 (GDY mfl.). Opptil 12 ind. Grandebukta, Ø. 4.1-11.5 (HDA, PEL, TBO mfl.). 1 2K Været, B. 8.1 (HER). 1 ind. Mausundvær, F. 1.-2.3 (MMA). 2 ind. Innstrand, Ø. 1.4 (GDY, SME). 1 ind. Sandviksberget, Os. 4.4 (TRE). 5 ind. Sula, F. 3.-5.10 (EKR, ØHE mfl.). 1 ad. Gjæsingen, F. 12.10 (DOB). 1 ind. Linesøya, Å. 12.10 (JHE). 1 ad. Gimsan, F. 13.10 (GBA, HER). Opptil 5 ind. Grandebukta, Ø. 14.10-4.12 (JOB, SSÆ, KSÆ mfl.). 1 ad. ptSV Titran, F. 26.10 (VAK). 1 1K Bingsholmsråsa, Å. 1.12 (SGA, MGA).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*
Anslagsvis 25 dvergdykkere er rapportert i løpet av året. Antatte gjengangere i begge vintersesonger er ikke telt dobbelt. En fugl som holdt seg i Strømmen i Rissa i juni og juli, er telt separat fra funn i vintersesongen ved samme lokalitet, da det er stor avstand i datospenn, og et sommerfunn faller utenfor det normale funnmønsteret for returnerende fugler. Det kan som alltid ikke utelukkes at noen individer blir telt dobbelt etter å ha forflyttet seg mellom ulike lokaliteter. Særlig gjelder dette fugler som blir sett kun én enkelt eller noen få dager vår og høst. Antall ind. foregående år: 2013 (25), 2012 (20), 2011 (22), 2010 (30) og 2009 (22).
Første halvår: 2 ind. Strømmen, Ri. 1.1-29.4 (GNY, MHO, ORY mfl.). 1 ind. Vessøra, He. 1.1-30.3 (JOB, HOL, RES). 1 ind. Gammelosen, Or. 1.1-8.4 (MMA, RES, FRL mfl.). 2 ind. Tillerbrua. Tr. 2.-27.1 (KWO, EKR, TKR mfl.). 2 ind. Sandstad og Børøysundet, Hi. 2.1-28.3 (ARB, GRA mfl.). 1 ind. Tanemsbrua. K. 2.1 (HLL). 1 ind. Litlvatnet, A. 3.-9.1 (ESÆ, HDA, SME mfl.). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 4.1-5.2 (JSØ, HDA). 1 ind. Kjerringvåg, Hi. 5.1 (OSF). 1 ind. Brattøra, Tr. 13.1-10.4 (ESÆ, DBS, TON mfl.). 1 ind. Viggja, Sk. 15.1 (ALY). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 19.-31.1 (EBA, HLL, CBE mfl.). 2 ind. Lysøysundet, B. 22.1-21.2 (SME, HDA, GDY). 1 ind. Hopen, Os. 2.5 (MVE). 1 ind. Strømmen, Ri. 17.6-21.7 (GNY). **Andre halvår:** 4 ind. Strømmen, Ri. 9.10-31.12 (GNY mfl.). 1 ind. Skansen, Tr. 9.10-13.12 (ESÆ mfl.). 1 ind. Vessøra, He. 4.11-31.12 (JOB mfl.). 1 ind. Døsvika, Ø. 8.11-4.12 (SME, HLL, HDA). 1 ind. Eidsvatnet, B. 9.-15.11 (SGA, MGA, GME mfl.). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 10.11-31.12 (PSH, MMA, RES mfl.). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 15.11-26.12 (THE, BJT, EBA mfl.). 1 ind. Værebukta, Tr. 18.11-28.12 (AST, SGJ, EBA mfl.). 1 ind. Leinøra, Tr. 18.11 (ESÆ). 1 ind. Sandstad, Hi. 20.12 (ARB).

Toppdykker *Podiceps cristatus*
Syv individer ble sett i løpet av året. De to fuglene i Grandefjæra på høsten antas å være returnerende individer og er ikke telt dobbelt. Antall ind. foregående år: 2013 (7), 2012 (9), 2011 (5), 2010 (7) og 2009 (6).
Første halvår: 2 ind. Innstrandfjæra, Ø. 4.1-24.3 (GDY, JSP, HER mfl.). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 22.2-17.4 (JSP, EPE mfl.). **Andre halvår:** 2 ind. Grandefjæra, Ø. 25.9-2.10 (AER, HDA). 2 ind. Brekkgrunnen, Sk. 19.10-15.11 (RES, EBA, BJT mfl.). 1 ind. Likroken 6.11 (JOB, HOL).

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*
Funn fra Trondheimsfjorden: 2 ind. Hasselvika, Ri. 9.1-24.3 (JEI). 1 ind. Viggja, Sk. 31.1 (MMA, ESÆ). 1 1K Viggja, Sk. 25.10 (DOB). **Innlandsfunn:** 1 1K+ Langsjøen, K. 24.8 (OAI). 1 ind. Slettestjønna, Re. 5.9 (PWB). **Stort antall:** 80 ind. Grandebukta, Ø. 23.3 (TBO).

Horndykker *Podiceps auritus*
Minimum 11 hekkefunn er rapportert på 9 lokaliteter. På Røros er 4 hekkinger rapportert ved Hittersjøen, Sundtjønna, Åbborloken i Hådalen og Stikkillen. De tre førstnvente parene ble sett med hhv. 2, 3 og 2 pulli. Fuglene ved Stikkillen er kun rapportert rugende. I Malvik hekket

Sør-Trøndelags første kuhegre ble sett ved Mosjøen i Tydal i september. Fuglen fikk naturlig nok mye oppmerksomhet av fylkets ornitologer. Fuglen holdt til på et fellesbeite, hvor den snappet insekter rundt kyrne. Gule fargetoner på hodet, brystet og ryggen viser at fuglen fortsatt har rester av hekkedrakt og dermed må være voksen. Bildet er tatt 10. september. Foto: Bjørn Steinar Tanem.

2 par ved Vennatjønna, og disse fikk frem hhv. 2 og 1 pulli. I tillegg ble reirbygging sett ved Snustaddammen. I Rennebu hekket minimum 2 par på Slettestjønna. Disse ble sett med til sammen 4 pulli. I Orkdal gikk minimum 1 par til hekking ved Tjønnlitjønna, men hekkesuksessen er ukjent. Det er godt mulig flere par hekket her, da flere adulte fugler er rapportert på lokaliteten. I Rissa ble et par sett med 5 pulli på Storvatnet. I tillegg er arten observert ved flere potensielle hekkeplasser, uten at konkrete hekkeindikasjoner er rapportert. En del aktuelle lokaliteter besøkes sjeldent av fuglekikkere i perioden på sommeren når man kan påvise hekkefunn. Fire 1K-fugler på Lauvåstjønnan i Rennebu 6. september kan godt ha vært klekt her, men regnes ikke som et konstatert hekkefunn da arten ikke er rapportert på lokaliteten etter 7. juni. For en art som horndykker, som kan hekke i løse kolonier, er det viktig at antall rugende fugler, eller fugler som på annen måte viser hekkeatferd, spesifiseres når man rapporterer. Det er avgjørende for å kunne vurdere antall par som har gått til hekking.

Store antall: 29 ind. Været, B. 8.1 (HER). 23 ind. Neadeltaet, Se. 26.4 (GBA). Opptil 29 ad. Havsjøen, Rø. 10.-18.5 (ESÆ mfl.).

Havhest *Fulmarus glacialis*
Nevneverdige lokaliteter: 4 ind. ptSV Valsneset, B. 27.9 (HER, TRI). 2 ind. Uthaug, Ø. 28.9 (ABR). 2 ind. Valsneset, B. 28.9 (HDA, AER). 2 ind. ptSV Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 4 ind. Nes, B. 28.9 (JSP, HER, EPE). 10 ind. Valsneset, B. 29.9 (SME). 35 ind. ptSV Tarvafjorden, B. 29.9 (HER). 1 ind. Valsneset, B. 27.10 (SME). 1 ind. Uthaug, Ø. 31.10 (HDA, SME, TRI mfl.).

Grålire *Puffinus griseus*
Til sammen 18 ind. ble registrert i perioden 6. september til 3. oktober. Særlig er et funn fra Uthaug i Ørland verdt å merke seg. Gråliren trekker forbi kysten vår på høsten, og antall registrerte individer avhenger mye av værforhold og observatørdekning på ytterkysten i den aktuelle perioden. Antall ind. foregående år: 2013 (3), 2012 (5), 2011 (18), 2010 (0) og 2009 (8).
Alle funn: 1 ind. N for Halten, F. 6.9* (TKO, KTH, ARB mfl.). 1 ind. N for Halten, F. 16.9 (HDA, SME). 3 ind. Titran, F. 20.9 (EBA, THA). 2 ind. ptNØ Titran, F. 25.9 (ESÆ). 1 ind. Uthaug, Ø. 27.9 (AER, HDA). 2 ind. ptSV Nes, B. 27.9 (HER, TRI). 1 ind. Tarva, B. 28.9 (EDY). 1 ind. ptSV Titran, F. 28.9 (AWI, BJT, VAK, MMY). 1 ind. ptSV Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 1 ind. Valsneset, B. 29.9 (SME). 1 ind. Taftøyan, He. 29.9 (JOB). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC, KLA, KHE mfl.). 1 ind. ptV Sula, F. 1.10 (TON, KLA, KHE mfl.). 1 ind. ptSV Titran, F. 3.10 (JOB).

Havlire *Puffinus puffinus*
Fire havlirer ble sett i andre halvår i Frøya kommune. Ett ind. ble sett i 2013, men før det var forrige funn helt tilbake i 2008. Havliren besøker trolig kysten vår regelmessig i lite antall sommer og høst på næringstrekk fra britiske kolonier, og den er vanligere i våre farvann enn den beskjedne funnmassen tilsier. Havliren lever pelagisk, noe som gjør den vanskelig å registrere.
Alle funn: 3 ind. Humlingsværet, F. 4.7 (RUH). 1 ind. ptV Sula, F. 3.10 (EKR).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*
Til sammen fem individer ble sett dette året, hvorav kun én ble ringmerket. To funn fra Trondheimsfjorden er verdt å merke seg. Disse funnene er de første siden et individ ble funnet dødt i Grilstadfjæra 11. november 1973. Havsvaler lever utpreget pelagisk, og det kreves som oftest målrettet innsats for å komme i kontakt med arten. Den opptrer mer regelmessig langs den ytterste kyststripen vår enn funnmassen tilsier. Antall ind. foregående år: 2013 (7), 2012 (5), 2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 2 ind. NV for Halten, F. 21.7 (GBA, EBA, SBA). 1 2K+ rm. Stabben, Titran, F. 9.8 (MMY, RES, ØAA mfl.). 1 ind. ptV Østmarkneset, Tr. 27.9 (OHE). 1 ind. Østmarkneset, Tr. 20.11 (ORD).

Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa* <4,16>
Årets stormsvale ble sett fra fergen mellom Valset og Brekstad. Funnet er det første siden 2012.
Alle funn: 1 ind. S for Brekstad, Ø. 31.10-1.11 (*EKR, ELI).

Storskarv *Phalacrocorax carbo*
Arten opptrer relativt vanlig i Nidelva, og funn herfra nevnes derfor ikke.
Utvalgte ferskvannsfunn: 2 ind. Kjøsnes, Se. 10.-24.1 (HBR, TMØ). 17 ind. ptN Haltdalen, Ho. 13.4 (DOB). 1 ind. Aursunden, Rø. 29.5-29.6 (ESÆ, AWI). 6 ind. Rien, Rø. 25.7 (BSÆ). 1 ind. Femunden, Rø. 23.8 (DOB). 2 ind. Krokhølen, Rø. 10.9 (ESÆ). 1 ad. Neadeltaet, Se. 25.9 (JSA). 1 ind. Langvatnet, Mh. 20.10 (NN via TBR). 1 ind. Hammar, Se. 14.11 (TMØ). 1 ind. Jonsvatnet, Tr. 22.12 (GBA). 1 ind. Mobakk, Or. 26.12 (MRE).

Mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis* <0,13>
Med tre funn i 2014 og tre nye funn fra tidligere år foreligger det nå 13 bekreftede funn av underarten i Sør-Trøndelag. De to nye funnene fra Frøya i 2009 utgjør de første dokumenterte fuglene i fylket. Storskarv av underarten *sinensis* opptrer trolig betydelig mer regelmessig i fylket enn den beskjedne funnmassen antyder. Underarten skilles fra *carbo* på formen på den bare huden innenfor undernebbet, eller nærmere bestemt vinkelen mellom munnviken og den indre kanten av det fjærløse partiet. Er denne vinkelen over 73 grader, er fuglen en *sinensis*, mens fugler med vinkel under 65 grader er *carbo*. Fugler med vinkel mellom 65 og 73 grader kan ikke bestemmes til underart (Newson mfl. 2004). Fugler av underarten *sinensis* er dessuten mer knyttet til ferskvann, og de hekker og sitter gjerne i trær, men begge underartene kan opptre i både fersk- og saltvann. Trønderske fuglekikkere oppfordres til å ta en ekstra kikk på storskarver som observeres på nært hold, særlig i ferskvann, og dokumentere fugler som mistenkes å være *sinensis*.
Alle funn: 1 ind. Østmarkneset, Tr. 27.9 (OHE). 1 ind. Tilfredshet kirkegård, Tr. 6.10* (ESP). 1 ind. Nedre Leirfoss, Tr. 29.11* (JHE). Funn fra tidligere år: 1 ind. Ervika, F. 9.4.2009* (OSF). 1 ind. Ervika, F. 17.5.2009* (OSF). 1 ind. Ladehammeren, Tr. 26.11.2011* (BJT).

Kuhegre *Bubulcus ibis* NSKF <0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! Vår første kuhegre dukket opp på et fellesbeite ved Mosjøen i Tydal i september 2014. Den ble funnet av Elisabeth Klingsheim 6. september og meldt via NOFs websider. 9. september fant Einar Sæter igjen fuglen, som da i følge røkter Jostein Lunden skal ha vært på lokaliteten i ca. en uke. Fuglen holdt til sammen med kyr og snappet insekter rundt disse, noe som er en typisk oppførsel for arten. Fra 24. september til 1. oktober ble en kuhegre, sannsynligvis den samme fuglen, sett utenfor Bodø i Nordland. Fuglen utgjør det femte funnet i Norge. Arten er tidligere påtruffet én gang i Trøndelag, da en fugl besøkte Steinkjer og Flatanger i juni 2009. Årets funn er nærmere beskrevet av Winnem (2015).
Alle funn: 1 ad. Moen, Mosjøen, Ty. 2.-12.9* (EKL, JLU, ESÆ mfl.).

Egretthegre *Egretta alba* <0,10>
Årets funn er det tiende i fylket og det første for Trondheim kommune. Arten viser en tydelig økende funnfrekvens i Sør-Trøndelag i takt med en tilsvarende trend i resten av landet. Første funn i fylket kom så sent som i 2001, men arten har de siste årene opptrådt omtrent årlig. Årets fugl utgjør kun vårt andre høstfunn. Fra før er åtte fugler registrert i april og mai, mens ett ind. er registrert i november og desember.
Alle funn: 1 ind. Nidelva ved Øya. Tr. 4.-7.10* (OHE, VAK, PWB mfl.).

Silkehegre *Egretta garzetta* NSKF <0,3>
Vår tredje silkehegre ble funnet i Gaulosen 6. juli. Et sommerfunn er typisk for arten i Norge. Tidligere funn i fylket er fra Måsøyvalen, Frøya 29.10-2.11.2011 og Strømmen, Rissa 18.-19.11.2013.
Alle funn: 1 ind. Gaulosen, Mh. 6.7* og Volløya, Tr. 7.7* (*KWO, BES, KAS, ØAA mfl.).

Svartglente *Milvus migrans* <0,4>
Fjerde funn i fylket. Første funn ble gjort i 2010, og arten har vært nesten årlig siden. Funnmassen i resten av landet viser en tilsvarende positiv trend. Det er derfor rimelig å tro at vi vil komme til å få flere funn av arten i årene som kommer.
Alle funn: 1 ind. Hauka, MG. 27.5* (TMY).

Havørn *Haliaeetus albicilla*
Stort antall: 32 ind. Mausundvær, F. 2.3 (MMA).

Sivhauk *Circus aeruginosus* <0,47>
To sivhauker er godkjent i 2014. Antall ind. foregående år: 2013 (8), 2012 (1), 2011 (5), 2010 (1) og 2009 (6).
Alle funn: 1 2K M Grandefjæra, Ø. 19.7-12.8* (SME, HDA, EBA mfl.). 1 FF Gaulosen, Mh. 31.8* (JHE).

En egretthegre hadde tilhold i Nidelva ved Øya i Trondheim i oktober, her foreviget 6. oktober. Fuglen kunne i perioder ses fint fra broen ved sykehuset. Funnet er det første i Trondheim. Foto: Eirik Spets.

Ung jaktfalk fra et av årets hekkefunn. Hos jaktfalk stikker stjerten ut et stykke bak vingespissene på en sittende fugl. Dette er i alle drakter et godt kjennetegn for å skille arten fra vandrefalk, som har en kortere stjert som akkurat når ut til vingespissene. Foto: Erik Bangjord.

Myrhauk *Circus cyaneus*
Ett reir med tre pulli ble funnet i Oppdal. I tillegg er fire par og to enslige hanner registrert i anslagsvis fire andre territorier. Ingen andre funn er gjort i potensielle hekkebiotoper, men en ubestemt hunnfarget kjerrhauk fra fjellet i Midtre Gauldal i juli var mest sannsynlig en myrhauk. Fra vårtrekket foreligger tre funn fra Røros, mens to ind. ble registrert i Ørland og Holtålen på høsttrekk.
Vårtrekk: 1 ad. M Floan, Rø. 14.4 (KAS). 1 F Håsjøen, Rø. 10.5 (ESÆ). 1 M Borgosen, Rø. 11.5 (MVE).
Høsttrekk: 1 FF Garten, Ø. 8.9 (SME, GDY). 1 ind. Nesvold, Ho. 21.9 (TKR).

Ub. steppe-/enghauk *Circus macrorus/pygargus* <0,2>
Fuglen er mest sannsynlig en steppehauk, men bildene og observasjonen var ikke gode nok til å utelukke enghauk med sikkerhet. Ubestemt steppe-/enghauk er sett én gang før i Sør-Trøndelag, da en 2K ble observert i Grandefjæra 15.5.1982. Det foreligger to funn av steppehauk i fylket, mens enghauk aldri er sett hos oss.
Alle funn: 1 1K ptSV Gjæsingen, F. 29.8* (DOB).

Hønsehauk *Accipiter gentilis*
I 2014 er 92 lokaliteter kontrollert og 33 hekkinger påvist. I tillegg ble det registrert hønsehauk på 15 andre lokaliteter. Til sammen ble 66 unger registrert ved 30 av de påviste hekkingene. 21 unger ble ringmerket. Fem nye lokaliteter ble funnet, tre i Skaun, én i Melhus og én i Selbu (RJA).

Musvåk *Buteo buteo*
Kun to funn ble gjort dette året, begge på høsten.
Alle funn: 1 1K Snellmyra, Mh. 5.8 (ALI). 1 1K Mosjøen, Ty. 11.-16.9* (EIG, KSC, GBA, TON mfl.).

Fjellvåk *Buteo lagopus*
To vinterfunn ble gjort, ett i januar og ett i desember.
Vinterfunn: 1 ind. Ler, Mh. 1.1 (ESP, ORY). 1 ind. Ler, Mh. 19.12 (PWB).
Nevneverdig lokaliteter: 2 ind. Titran, F. 9.8 (TRE, RES, ØAA mfl.). 1 ind. Mausundvær, F. 24.8 (MHE).

Fiskeørn *Pandion haliaetus*
Tre hekkefunn ble konstatert i Melhus (2) og Røros. Parene i Melhus fikk frem hhv. to og én unge, mens paret på Røros fikk frem to unger. På Røros er arten i tillegg registrert ved fem andre lokaliteter. Andre steder i fylket er fiskeørn rapportert i hekketiden fra Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rissa og Tydal, men flere av disse kan godt dreie seg om trekkende eller streifende fugler. Ved en lokalitet i Bjugn ble to ind. sett i september. Minst én av disse var en 1K, noe som kan tyde på hekking i området, men fuglene kan også være trekkere som ikke har hekket lokalt. Tre ind. ble registrert på vårtrekk og én fugl på høsttrekk.
Vårtrekk: 1 ind. ptNØ Litjfjellet, Se. 23.4 (MVE). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 25.4 (MMA). 1 ind. Gaulosen, Mh. og Volløya, Tr. 25.-27.5 (THE, OHE, MHE mfl.). **Høsttrekk:** 1 ind. Flora, Se. 13.9* (JGL).

Tårnfalk *Falco tinnunculus*
Fire tårnfalker er rapportert i januar og februar. Desember forløp uten funn.
Vinterfunn: 1 ind. Valsneset, B. 1.1 (GDY, SME). 2 ind. Tårnes til Stokkøya, Å. 4.1-28.2 (JHE, GBA, ORY). 1 ind. Olden, B. 21.2 (GDY, SME).

Dvergfalk *Falco columbarius*
Tre vinterfunn er rapportert.
Vinterfunn: 1 ad. M Kråkvåg, Ø. 14.1-5.2 (HER, HDA). 1 ind. Innstrand, Ø. 19.2 (GBA, OAF). 1 ind. Lundamo, Mh. 12.12 (EDE).

Lerkefalk *Falco subbuteo* <0,14>
Årets funn er det fjortende i fylket.
Alle funn: 1 ind. ptNV Øvre Rotvoll, Tr. 22.5 (MMA).

Jaktfalk *Falco rusticolus*
Tre konstaterte hekkefunn ble gjort i Oppdal (2) og Midtre Gauldal (1). I tillegg er arten registrert på ni lokaliteter på fjellet i hekketiden, fordelt på Oppdal (4), Selbu (2), Midtre Gauldal (1), Rennebu (1) og Tydal (1). Utenfor hekketiden foreligger observasjoner fra ytterligere seks lokaliteter i eller ved mulige hekkeområder.
Funn utenfor hekkeområdene: 1 3K+ M Nordmyra, Tr. 18.1 (THA). 1 ind. Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 1 ind. Linesøya, Å. 18.2 (ORY). 1 2K Være, Tr. 21.2 (TGI, JEL). 1 ind. Mausundvær, F. 2.3 (MMA). 1 2K Falkhyttmyra, Ø. 12.4 (HER). 1 ind. Holtvatna, MG. 20.4 (ØSO, ØJS, SSO). 1 ind. Vassfjellet, Mh. 29.8 (SGJ, BEB). 1 ad. Hoøya, Ø. 31.8 (HDA). 1 ad. Valsneset, B. 15.9 (SME). 1 1K Valsneset, B. 28.9 (JSP, EPE). 1 ind. Magerøysundet, He. 29.9 (JOB). 1 ad. Stokkøya, Å. 7.12 (SGA, MGA). 1 ad. Grandefjæra, Ø. 15.12 (SME, HDA, GDY mfl.).

Vandrefalk *Falco peregrinus*
Fire vinterfunn ble gjort.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 5.1-3.2 (PEL, HDA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 5.1 (KAS). 1 ad. Linesøya, Å. 28.2 (JHE). 1 ad. Grandefjæra, Ø. 4.-26.12 (HLL, SME, HDA).

Vannrikse *Rallus aquaticus*
Til sammen 12 vannrikser er rapportert, noe som er en litt høyere årstotal enn de siste årene. Tre av fuglene ble sett i første halvår frem til 2. april, mens ni ble registrert på høsten fra 30. september og ut året. Vannrikser blir primært registrert på seinhøsten og vinteren i Sør-Trøndelag, og flest funn gjøres på kysten, noe årets funnbilde illustrerer godt. Antall funn foregående år: 2013 (7), 2012 (4), 2011 (5), 2010 (8) og 2009 (14).
Alle funn: 1 ind. Beian, Ø. 1.-7.1 (LNV,

EPE, SME mfl.). 1 ind. Storfosna, Ø. 14.1 (HER). 1 ind. Litlvatnet, A. 11.2-2.4 (LNO, GBA, BES mfl.). 3 ind. Sula, F. 30.9-4.10 (PWB, EKR, TKR mfl.). 1 ind. Likroken, He. 17.10 (JOB). 1 ind. Litlvatnet, A. 3.11 (SME, HDA). 1 ind. Titran, F. 7.-9.11 (ESÆ, EBA mfl.). 1 ind. Beian, Ø. 16.-27.12 (GDY, HER, HDA mfl.). 2 ind. Nes, B. 28.12 (HER).

Myrrikse *Porzana porzana*
Årets fugl er den første siden 2011, da to spillende fugler ble hørt. Antall funn foregående år: 2013 (0), 2012 (0), 2011 (2), 2010 (0) og 2009 (0).
Alle funn: 1 sy. M Putten, Se. 21.-26.7* (JSA mfl.).

Åkerrikse *Crex crex*
Kun én åkerrikse er rapportert i 2014. Denne fuglen ble skremt opp fra en graseng under slått i september. Antall ind. foregående år: 2013 (6), 2012 (4), 2011 (5), 2010 (0) og 2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Brødreskift, Ri. 2.9 (ABR).

Sivhøne *Gallinula chloropus*
Seks sivhøner er rapportert i perioden 29. mars til 28. oktober. Antall ind. foregående år: 2013 (5), 2012 (1), 2011 (1), 2010 (3) og 2009 (1).
Alle funn: 1 ind. Eidsvatnet, B. 29.3 (HER). 1 ind. Leangenbukta, Tr. 9.-16.4* (SFB, EBA mfl.). 1 ind. Hovindammen, Mh. 16.-17.4 (ESÆ, KWO). 1 ind. Leangenbukta, Tr. 3.7 (GBA). 1 ind. Likroken, He. 18.10 (JOB). 1 ind. Eidsvatnet, B. 19.-28.10* (HDA, SME).

Sothøne *Fulica atra*
Årets funn anslås å omfatte 6 ind. Fuglene som er rapportert fra Litlvatnet i januar, april og august er regnet som ulike individer, da det er lang tid mellom observasjonene, og lokaliteten er relativt godt besøkt. Antall ind. foregående år: 2013 (7), 2012 (9), 2011 (11), 2010 (10) og 2009 (12).
Alle funn: 2 ind. Litlvatnet, A. 3.-9.1 (GBA, SME, MMA mfl.). 1 ind. Hammarvågen, F. 14.2-10.3 (KTH, OSF, ARB mfl.). 1 ind. Litlvatnet, A. 1.-2.4 (MMA, RES, HDA). 1 ind. Leinøra, Tr. 29.4 (OHO). 1 ad. Litlvatnet, A. 22.8 (JOB).

Trane *Grus grus*
Store antall: 300 ind. Storøya, Se. 13.4 (JSA). 93 ad. og 9 1K Byagrenda, Or. 2.9 (ONO). 103 ind. Grinni, Mh. 7.9 (MAU). 427 ad. og 66 1K Snoen, Md. 10.9 (ONO). 105 ind. Melby, Sk. 14.9 (VAK). 238 ind. Storøya, Se. 19.9 (JSA). 116 ind. ptS Haltdalen, Ho. 21.9 (DOB).

Tjeld *Haematopus ostralegus*
Til sammen 86 tjeld er rapportert i de tre vintermånedene. 23 av disse ble sett i januar, 60 nye fugler er rapportert i februar, mens kun 3 ind. ble sett i desember. Hele 46 av de nye individene i februar dukket opp de to siste dagene i måneden, og disse bør betraktes som de første vårtrekkerne.
Vinterfunn: 2 ind. Uthaug til Døsvika, Ø. 8.-30.1 (GBA, EPE, SME mfl.). 16 ind. Været, B. 8.1 (HER). 5 ind. Valsneset, B. 21.1 (GDY). 9 ind. Uthaug, Ø. 6.-28.2 (HER, HDA, PEL). 25 ind. Linesøya. Å. 11.-28.2 (SGA, ORY, JHE). 2 ind. Laksåvika, Hi. 16.2 (KBE). 1 ind. Kvitgæsinga, Å. 20.2 (SGA). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 27.2 (KKR). 5 ind. Prestbukta, Ri. 28.2 (ABR, JBJ). 1 ind. Børøysundet, Hi. 28.2 (ARB). 5 ind. Botngårdsfjæra, B. 28.2 (SME). 2 ind. Hestvika, Hi. 28.2 (ARB). 9 ind. Valsneset, B. 28.2 (SME). 1 ind. Botngårdsfjæra, B. 15.12 (SME). 1 ind. Stokkøya, Å. 28.12 (SGA, MGA). 1 ind. Uthaug, Ø. 29.12 (HER). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 ind. Mosjøen, Ty. 13.4 (ESÆ). 4 ind. Aursunden ved utløpet, Rø. 14.-15.4 (KAS, GAS). 1 par Stuggusjøen, Ty. 11.5 (ESÆ).

Vannrikse, Likroken i Rovatnet, Hemne 17. oktober. Arten opptrer fåtallig i Trøndelag, primært seint på høsten og vinterstid. Foto: Jan Ove Bratset.

Heilo *Pluvialis apricaria*
Stort antall: 1010 ind. Storøya, Se. 3.5 (JSA). **Sene høstfunn:** 2 ind. Grandefjæra, Ø. 2.11 (HDA). 1 ind. Buvika, Sk. 22.11 (DOB).

Tundralo *Pluvialis squatarola*
To vinterfunn ble gjort i januar.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 9.1 (HER). 1 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 14.-30.1 (HER, GBA). **Stort antall:** 29 ind. Grandefjæra, Ø. 11.10 (HER).

Vipe *Vanellus vanellus*
Til sammen 4 ind. er rapportert i årets to første måneder, mens 2 ind. ble sett i desember. De to fuglene på Midtsandan i januar gjorde ikke overvintringsforsøk. Fuglen på Hoøya 28. februar er sannsynligvis en tidlig vårtrekker.
Vinterfunn: 2 ind. Midtsandan, Ma. 1.-8.1 (GBA, EBA, BJT mfl.). 1 ind. Kvisten, F. 26.1 (GAR). 1 ind. Hoøya, Ø. 28.2 (AER). 2 ind. Midtsandan, Ma. 6.-14.12 (DOB, BJT, PSH).

Dverglo *Charadrius dubius*
Hekkefunn ble konstatert på Gaulosen og Volløya, hvor to par fikk frem hhv. 2 og 3 unger. I tillegg er arten rapportert fra syv andre potensielle hekkeplasser i Midtre Gauldal (3), Melhus (2), Orkdal og Trondheim. Ved lokaliteten i Trondheim ble det sannsynligvis gjort et hekkeforsøk, men med ukjent resultat. Funn fra Granåsen i Trondheim og Tanem i Klæbu 17. mai antas å være trekkere, da det ikke foreligger flere observasjoner i løpet av sommeren. Et juli-funn fra Ørland er verdt å merke seg.
Trekkobservasjoner: 2 ind. Tanem, K. 17.5 (MVA). 2 ind. Granåsen, Tr. 17.5 (JHE). 1 1K Grandefjæra, Ø. 29.7 (HER).

Sandlo *Charadrius hiaticula*
Stort antall: 400 ind. Grandefjæra, Ø. 31.8 (KKJ, JSØ).

Boltit *Charadrius morinellus*
Årets forekomst av boltit anslås til å omfatte 67 individer, én pullus fra et hekkefunn ikke medregnet. Med unntak av ett individ i Tydal ble alle årets fugler sett i Oppdal.
Lavlandsfunn: 3 ind. Vinstradalen bomstasjon, Op. 10.-15.5 (PWB). 2 ind. Driva, Op. 15.5 (PWB). 12 ind. Driva, Op. 22.6 (PWB). **Funn fra hekkeområdene:** Opptil 30 ind.

Adult dverglo ved Granåsen, Trondheim 17. mai. I flukt mangler dvergloen det lyse vingebåndet som sandloen har, noe som er et godt kjennetegn for å skille de to artene fra hverandre. Den gule øyeringen er også iøynefallende på en voksen dverglo. Foto: Jon Helle.

Sæterfjellet til Raudhøa, Op. 20.5-23.8 (AJM, TBR mfl.). Opptil 12 ind., hvorav minst én hekking, Ålmflåin, Op. 23.5-12.7 (PWB mfl.). 3 ind. Veslvonlægret, Op. 31.5-25.7 (KWO, TAN, TÅS). 1 ind. Grønbakken, Op. 31.5 (BJT). 1 ind. Finnsjøen, Op. 2.6 (JOB). 1 ind. Ryggen, Op. 12.6 (OHE). 1 ad. Sør-Skardsfjelltoppen, Ty. 14.6 (OKL). 1 ad. med min. 1 pull. Tverrbekken, Blåhø, Op. 6.8 (ABS).

Småspove *Numenius phaeopus*
Tidlig vårtrekk: 2 ind. Ånegga, Re. 19.-21.4 (NVA, RWA). 1 ind. Gaulosen, Mh. 23.4 (GBA). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 30.4 (MMA, RES).

Storspove *Numenius arquata*
Anslagsvis 104 storspover ble sett i de tre vintermånedene, fordelt på 84 i januar og februar og 20 i desember. Vinterfunnene fordeler seg kommunevis på Ørland (67), Bjugn (13), Hitra (10), Åfjord (8), Frøya (5) og Hemne (1).
Vinterfunn: Opptil 38 ind. Grandefjæra, Ø. 1.1-25.2 (JSØ, HER mfl.). 2 ind. Valsneset, B. 1.1 (GDY, SME). Opptil 5 ind. Strandfjæra, Hi. 2.1-28.2 (EBR, ARB, OSF mfl.). Opptil 11 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 4.1-8.2 (JSØ, HER mfl.). Opptil 5 ind. Kråka, Innstrandfjæra, Ø. 5.1-19.2 (EBA, AST, GDY mfl.). 8 ind. Været, B. 8.1 (HER). 2 ind. Ulvan, Hi. 14.1 (GRA). 2 ind. Gjæsinga, Å. 5.-20.2 (SGA). 2 ind. Linesøybrua. Å. 11.2-5.3 (SGA, JHE). 3 ind. Harbaksvika, Å. 11.2 (SGA). 1 ind. Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 4 ind. Titran, F. 19.-22.2 (GOL, FRL, ARB). 1 ind. Norddyrøya, F. 27.2 (GOL). 3 ind. Valsneset, B. 1.12 (SME). 8 ind. Grandefjæra, Ø. 4.-31.12 (SME, HDA, HLL mfl.). 1 ind. Taftøyan, He. 5.-10.12 (JOB). 3 ind. Strandfjæra, Hi. 11.12 (ARB). 5 ind. Uthaug, Ø. 12.12 (SME).
Stort antall vårtrekk: 89 ind. Neadeltaet, Se. 12.4 (JSA).

Svarthalespove *Limosa limosa*
Med et anslag på 39 ind. ble 2014 et godt år for svarthalespove. Min. 19 ind. var av den nordlige underarten *islandica*, men det er rimelig å anta at så godt som alle fugler som besøker Midt-Norge er av denne underarten. 29 ind. ble sett på vårtrekk i perioden 20. april til 25. mai, ett sommerfunn 18. juni bør trolig betraktes som en tidlig høsttrekker, mens 9 ind. ble sett på høstrekk mellom 15. august og 14. september. Den ene fuglen i flokken som ble sett på Volløya og Gaulosen i slutten av april har av noen observatører blitt angitt å være av den kontinentale underarten *limosa*. Flere detaljer i fjærdrakten tilsier imidlertid at denne fuglen med stor sannsynlighet er en *islandica* hunn. Særlig mønsteret på tertiærer og sommerdraktstegnede skapulærer, og at alle fuglens seks tertiærer er sommerdraktstegnede, er veldig gode indikasjoner på *islandica*. For den som ønsker å sette seg nærmere inn i ID-en på de to underartene av svarthalespove, så anbefales Hellquist (2006). Underarten *limosa* er aldri påvist med sikkerhet i Sør-Trøndelag. Antall ind. foregående år: 2013 (17), 2012 (24), 2011 (44), 2010 (19) og 2009 (6).
Vårtrekk: 9 ind. (min. 7 ua. islandica) Gaulosen, Mh. 20.4-18.5 (EBA, AST, FSC mfl.). 7 ind. (ua. islandica) Kråka, Ø. 20.-21.4 (BJT, JSP, EPE mfl.). 9 ind. (min. 1 ua. islandica) Grønningsbukta, Ri. 25.4 (NGR, JBJ, ESU mfl.). 1 ind. (ua. islandica) Halten, F. 4.-5.5 (HDA, HER). 1 ind. (ua. islandica) Grønningsbukta, Ri. 13.-20.5 (HDA, SME, JBJ mfl.). 1 ind. (ua. islandica) Leangenbukta, Tr. 14.5 (THE, GBA). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 25.5 (HER). **Høsttrekk:** 1 ind. (ua. islandica) Gjølmesfjæra, Or. 18.6 (MMA). 1 ind. Sistranda, F. 15.8 (OSF, KTH). 2 ind. Grønningsbukta, Ri. 21.8-9.9 (ABR, EKO, GBA). 3 ind. Gaulosen, Mh. 3.-12.9 (EBA, DOB, AST mfl.). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 4.-7.9 (HDA, SME, HLL mfl.). 2 ind. Nes, B. 8.-14.9 (HER, JSØ, SME mfl.).

Lappspove *Limosa lapponica*
Lappspove er en svært fåtallig overvintrer i Midt-Norge, og kun to fugler ble registrert dette året. Et uvanlig innlandsfunn ble gjort i Selbu på vårtrekk i april.
Vinterfunn: 1 ind. Grandefjæra, Ø. 5.-9.1 (PEL, HDA, HER). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 4.12 (HLL, SME, HDA). **Innlandsfunn:** 1 ind. Neadeltaet, Se. 12.-13.4 (JSA, GBA).

Steinvender *Arenaria interpres*
Årets funn på Oppdal er det andre kjente fra kommunen, kun ett år etter førstefunnet i 2013.
Innlandsfunn: 1 ind. Unndalsvatnet, Op. 1.6 (EBA).

Polarsnipe *Calidris canutus*
Minimum 95 polarsniper er rapportert vinterstid.
Vinterfunn: Opptil 32 ind. Grandefjæra, Ø. 4.-9.1 (HDA, PEL, HER). Opptil 63 ind. Grandefjæra, Ø. 2.-4.12 (HER, HLL, SME mfl.).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*
I området rundt Orkelsjøen i Oppdal er arten rapportert regelmessig fra 29. mai til 3. august. På det meste ble 12 adulte fugler sett primo juni. Ett reir ble funnet ved Stororkelsjøen, og en varslende fugl indikerte hekking ved Butjønna. I tillegg ble en fugl sett i Unndalen ultimo juni. Etter 1. juli har imidlertid ingen rapportører meldt om flere enn to individer i området rundt Orkelsjøen, og kun én 1K-fugl er sett, så det er nærliggende å anta at hekkesuksessen her var laber denne sommeren. Fra andre egnede hekkeområder i fjellet er arten rapportert med 4 ind. fra Gjetbekkvika i Tydal 30. mai. Fra hekkeområdene i lavlandet er arten registrert på Gaulosen og ved utløpet av Orkla. Ved Gaulosen og Volløya er arten registrert i perioden 13. mai til 24. august. Som vanlig viser forekomsten en topp ultimo mai, som utgjøres av fugler på gjennomtrekk. Høyeste dagsantall var 14 ind. 23. mai.

Utover sommeren ble 4 ind. sett i området. To par er rapportert med hekkeindikasjoner, ett hver på Øyamelen og Volløya. De to første 1K-fuglene ble sett 22. juli, og flere enn to 1K-er ble aldri registrert ved Gaulosen dette året. Ved Grønøra i Orkdal ble ett par sett gjennom hele sommeren, og arten gjorde trolig et hekkeforsøk her. 5 ind. ved Gammelosen 30. juli er telt som høsttrekkere. Under vårtrekket ble anslagsvis 28 ind. rapportert i Melhus/Trondheim (10), Røros (10), Rissa (3), Tydal (3), Selbu (1) og Trondheim (1). Høsttrekket ga 21 ind., fordelt kommunevis på Ørland (7), Orkdal (5), Selbu (3), Rissa (2), Åfjord (2), Malvik (1) og Trondheim (1). Kun trekkobservasjoner utenfor hekkeområdene er gjengitt under.
Vårtrekk: 2 ind. Valsetholman, Brekken, Rø. 13.5 (MVE). 1 ind. Garbergosen, Se. 17.5 (ESÆ, THA). 6 ind. Borgosen, Rø. 18.-31.5 (ESÆ, THA). 3 ind. Grønningsbukta, Ri. 18.-31.5 (ABR, NGR, JBJ mfl.). 3 ind. Stuggusjøen, Ty. 18.5 (ESÆ, THA). 2 ind. Krokhølen, Rø. 18.5 (ESÆ, THA). 2 ind. Momyrvatnet, Å. 18.5 (HER). 1 ind. Nydalsdammen, Tr. 19.5 (KAS). **Høsttrekk:** 2 ind. Grønningsbukta, Ri. 3.8 (ARB). 3 ind. Vikaengene, Se. 10.-17.8 (GBA, JSA). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 18.-25.8 (HER, HDA mfl.). 1 1K Muruvika, Ma. 19.8 (PSH). 4 ind. Innstrandfjæra, Ø. 25.8 (SME, GDY). 1 ind. Nidarø, Tr. 30.8 (BJT). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 3.9 (HDA).

Sandløper *Calidris alba*
Årets funn antas å omfatte 29 ind., et litt høyere antall enn de fleste år. Arten passerer Trøndelag på trekk i større antall enn den registrerte funnmassen skulle tilsi, men fuglene passerer i hovedsak på ytterkysten, ofte uten å raste i noen særlig grad. Den geografiske spredningen på årets fugler er typisk, med alle funn fra kysten, med unntak av fire fugler på Gaulosen. Alle ble registrert på høsttrekk i perioden 21. juli til 13. oktober.
Alle funn: 13 ad. N for Halten, F. 21.7 (GBA, EBA, SBA). 2 ind. Linesøya, Å. 21.7 (EBA, SBA, GBA). 2 ind. NV for Halten, F. 21.7 (GBA, BST, EBA mfl.). 2 ad. Langskjæret, Å. 21.7 (GBA, EBA, SBA). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 17.-25.8 (PWB, HOL, JOB mfl.). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 25.8 (SME, GDY). 4 ind. Gaulosen, Mh. 4.-8.9 (AST, KWO, ESÆ mfl.). 1 ind. Kråkvåg, Ø. 10.10 (HDA, AER, PEL). 2 ind. NV for Halten, F. 13.10 (GBA, HER).

Myrsnipe *Calidris alpina*
I hekkeområdene er 62 myrsniper rapportert fra 12 lokaliteter fordelt på Oppdal (42/6), Tydal (12/2), Hitra (4/1),

Denne 1K fjellmyrløperen fotografert 16. august, Grandefjæra, Ørland. Gode kjennetegn for å skille arten fra myrsnipe, er en litt mindre størrelse, den lyse streken over det lyse øyenbrynet, at nebbet kurver så vidt nedover kun helt på tuppen, en lys grågrønn beinfarge, og at den mangler mørke flekker på bryst og flanker, som unge som myrsniper har. Foto: Erik Bangjord.

Rennebu (2/1), Holtålen (1/1) og Selbu (1/1). I de tre vintermånedene ble anslagsvis 81 myrsniper sett, fordelt på 77 ind. i januar og februar og 4 ind. i desember. Alle vinterfunn er fra Ørland.
Vinterfunn: Opptil 66 ind. Grandefjæra, Ø. 5.1-16.2 (PEL, HDA, HER mfl.). 1 ind. Uthaug, Ø. 12.-13.1 (JSØ, KKJ, JSP mfl.). Opptil 9 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 14.-30.1 (HER, GBA). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 8.2 (MMA). 4 ind. Grandefjæra, Ø. 4.12 (HLL, SME, HDA).

Fjæreplytt *Calidris maritima*
Hekkefunn: 1 ad. med 2 pull. Brunkollen, Op. 1.7 (TBR, HRØ). **Stort antall:** 140 ind. Linesøya, Å. 29.11 (NKG).

Dvergsnipe *Calidris minuta*
På vårtrekket ble tre ind. registrert. To innlandsfunn ble gjort under høsttrekket, noe som er uvanlig for arten. Fuglen på Hitra er den andre kjente i kommunen, mens funnet på Sula er det første for lokaliteten.
Vårtrekk: 2 ind. Gaulosen, Mh. 21.-28.5 (OHE, ESÆ, THE mfl.). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 27.5 (NGR).
Innlandsfunn: 1 ind. Gangåsvatnet, Or. 29.7 (MMA). 1 1K Vikaengene, Se. 10.8 (JSA). **Nevneverdige lokaliteter:** 1 ind. Strandfjæra, Hi. 24.8 (ARB). 1 ind. Sula, F. 30.8 (OHE).

Fjellmyrløper *Calidris falcinellus*
Fjellmyrløper er rapportert fra to kjente hekkelokaliteter i Røros og Selbu. To ind. ble sett på lokaliteten i Røros, mens tre adulte fugler ble registrert på lokaliteten i Selbu. I tillegg ble én fugl sett på fjellet i Oppdal, men dette dreier seg trolig om en fugl på trekk. Én fugl ble sett på vårtrekk og fem ind. på høsten ved trekklokaliteter i lavlandet.
Vårtrekk: 1 ind. Gaulosen, Mh. 6.6* (HEG, EBA, AST mfl.). 1 ind. Vesle Orkelsjø, Op. 6.6 (JOB). **Høsttrekk:** 3 ind. Grandefjæra, Ø. 15.-25.8* (PEL, HDA, TRI mfl.). 1 ind. Hovsfjæra, Ø. 24.8 (MAU). 1 ind. Gaulosen, Mh. 19.-25.9 (THE, SGJ, KWO).

Rustsnipe *Calidris subruficollis* NSKF <0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! Fylkets første rustsnipe ble funnet av Trond Haugskott på Gaulosen 16. august. To funn foreligger fra før i Nord-Trøndelag fra Rinnleiret 17.9.1980 og Ørin 29.8.1992. Arten er en sjelden gjest fra Nord-Amerika.
Alle funn: 1 ad. Gaulosen, Mh. 16.-17.8* (*THA mfl.).

Brushane *Calidris pugnax*
Brushaner er rapportert i passende hekkehabitat med min. 28 ind. på 6 lokaliteter i Tydal (11/1), Oppdal (6/2), Rennebu (6/1), Røros (4/1) og Selbu (1/1). Høstflokkene i Ørland var noe mindre enn hva vi har sett noen eksempler på de siste årene, men 330 ind. i Grandefjæra i august er likevel en god forekomst av arten, noe som bekrefter lokalitetens betydning som rasteplass for brushaner under høsttrekket.
Funn fra hekkeområdene: Min. 4 M og 2 F Slettestjønna, Re. 20.5-14.6 (AES, PWB, MMA mfl.). Min. 2 M og 2 F Molinga, Rø. 24.5-8.6 (THE mfl.). 7 M og 4 F Gjetbekkvika, Kjølen, Ty. 30.5

Fylkets første rustsnipe rastet i Gaulosen (Melhus) to dager i august. Fotografert den 17. august. Arten ligner mye på en ung brushane i fjærdrakten. Rustsnipa er imidlertid ikke større enn en myrsnipe. Foto: Eirik Spets.

(ESÆ). 1 F Stråsjøen, Se. 1.-15.6 (THA, ESÆ). Opptil 3 M og 2 F Vesle Orkelsjø, Op. 3.-8.6 (MVE, PWB, JOB). 1 M Slåbergstjønnin, Op. 8.6 (EBA). **Stort antall:** Opptil 330 ind. Grandefjæra, Ø. 28.7-7.9 (HDA, ØAA, HER mfl.).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*
Fra hekkeområdene er 46 ind. rapportert fra 8 lokaliteter i Oppdal (25/4), Rennebu (13/2), Røros (4/1) og Selbu (4/1), deriblant 1 1K ved Vesle Orkelsjø i Oppdal. I tillegg ble tre ind. sett på to lokaliteter i Røros, fugler som antas å være på vei videre til hekkeplasser i fjellet. I lavlandet ble to ind. sett på våren og ett på høsten.
Funn utenfor hekkeområdene: 1 ind. Gaulosen, Mh. 23.5 (THA). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 4.-7.6* (GDY, SME, TON). 1 1K Grandefjæra, Ø. 19.8* (SME, JOB, HDA mfl.).

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*
<1,42>
Tre funn av fem individer ble gjort denne høsten i perioden 29. september til 21. desember. Dette er fjerde år på rad at arten registreres langs kysten i forbindelse med kraftige vinder fra vest på høsten. Både tid og sted for årets funn er typiske, og særlig Uthaug har vist seg å være en god lokalitet for arten. Et nytt funn fra 2011 bringer årstotalen for dette året opp i 11 fugler.
Alle funn: 1 1K Kjervågsund, Titran, F. 29.9 (MMY). 3 ind. Uthaug, Ø. 30.10-10.11* (HDA, SME, BJT mfl.). 1 ind. Uthaug, Ø. 14.-21.12* (SME, HDA, AER mfl.). **Funn fra tidligere år:** 1 ind. Linesfjorden, Å. 22.9.2011* (BMU).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*
Fuglen som ble oppdaget i Muruvika 27. desember 2013, ble sett frem til 5. januar.

Vinterfunn: 1 ind. Muruvika, Ma. 1.-5.1* (BJT, EBA, TRE mfl.). **Sene høstfunn:** 1 ind. Leinøra, Tr. 6.10 (KWO). 1 ind. Midtsandan, Ma. 15.11 (PSH).

Sotsnipe *Tringa erythropus*
Anslagsvis 19 sotsniper er rapportert i 2014. Et individ som hadde tilhold på Gaulosen 12 dager i mai var et uvanlig vårfunn som ga trønderske ornitologer en sjelden mulighet til å få oppleve arten i full sommerdrakt. Tre innlandsfunn ved Orkelsjøen i Oppdal, Feragshåen i Røros og Neadeltaet i Selbu er også uvanlig for arten, som primært ses ved kystlokaliteter hos oss. Antall ind. foregående år: 2013 (31), 2012 (14), 2011 (34), 2010 (26) og 2009 (10).
Vårtrekk: 1 ind. Gaulosen, Mh. 10.-21.5 (SGJ, AST, KAS mfl.). **Høsttrekk:** 1 ind. N for Stororkelsjøen, Op. 11.7 (BBR, KIS). 1 ind. Vinjeøra, He. 21.7 (MMA). 5 1K Feragshåen, Rø. 10.8 (OHE, RHA). 1 1K Eidsvatnet, B. 10.8 (HDA). 1 1K Gangåsvatnet, Or. 15.-16.8 (MMA mfl.). 2 1K Gaulosen, Mh. 17.-26.8 (ESÆ, ØAA, MHE mfl.). 2 ind. Neadeltaet, Se. 17.8 (GBA). Min. 2 1K Grandefjæra, Ø. 19.-31.8 (HER, JOB, HOL mfl.). 1 1K Leangenbukta, Tr. 23.-27.8 (TKR, GBA, TON mfl.). 1 ind. Været, B. 3.9 (GBA, ABT). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 16.9 (HER).

Rødstilk *Tringa totanus*
Anslagsvis 57 ind. ble registrert i de tre vintermånedene, fordelt på 37 ind. i januar og februar og 20 ind. i desember. Et januarfunn i Trondheim er uvanlig.
Vinterfunn: 3 ind. Korsvika, Tr. 1.1 (GBA, BJT). Opptil 15 ind. Uthaug til Innstrandfjæra, Ø. 1.1-19.2 (HDA, HER, TRI mfl.). Opptil 10 ind. Grandefjæra, Ø. 1.1-22.2 (HER, TRI mfl.). Opptil 7 ind. Kråkvågsvaet, Ø. 4.1-8.2 (JSØ mfl.). 1 ind. Valsneset, B. 16.1 (HER). 1 ind. Brekstadfjæra og Hovsfjæra, Ø. 1.-16.2 (HDA, AER, PEL mfl.). Opptil 19 ind. Uthaug, Ø. til Ervika, B. 2.-29.12 (SME, HDA, GDY mfl.). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 21.12 (HER, JSP).

Ung polarsvømmesnipe fra Uthaug, Ørland 8. november. Uthaug er en av landets beste lokaliteter utenom Svalbard for å få se denne arten. Polarsvømmesniper observeres nå nesten årlig her etter vestavær i årets tre siste måneder. Forveksling med svømmesnipe er ikke en reell problemstilling i november, da de aller fleste svømmesniper forlater landet allerede i august. Fuglen på bildet viser et kraftig nebb til svømmesnipe å være, og nebbet har gul basis, kjennetegn som uansett bekrefter artstilhørigheten. Foto: Jan Ove Bratset.

Kvartbekkasin *Lymnocryptes minimus*
Anslagsvis 24 kvartbekkasiner er rapportert dette året. Funndatoene fordeler seg månedsvis på januar (4), mars (2), april (1), mai (1), september (10), oktober (4) og november (2), mens kommunefordelingen var Frøya (7), Trondheim (5), Ørland (4), Bjugn (3), Melhus (2), Agdenes (1), Rissa (1) og Selbu (1). Ikke alle funn av overvintrende fugler presenteres, da disse er sårbare for forstyrrelser i kuldeperioder. LRSK oppfordrer observatører til å unngå å støkke opp kjente individer unødig. Antall ind. foregående år: 2013 (16), 2012 (16), 2011 (20), 2010 (14) og 2009 (25).
Utvalgte funn: 1 ind. Litlvatnet, A. 1.-3.3 (BES, KAS, MMA). 1 ind. Norddyrøy, F. 29.3 (FRL). 1 ind. Tillermarka, Tr. 18.4 (EKR, TKR). 1 ind. Rusasetvatnet, Ø. 2.-5.5 (HDA, EPE, JSP). 1 ind. Halten, F. 9.9 (GBA, ABR). 1 ind. Eidsvatnet, B. 18.9 (SME, SGA, MGA). 3 ind. Titran, F. 21.9-17.10 (ESÆ, OSF, EBA mfl.). 1 ind. Grandefjæra, Ø. 25.-26.9 (HDA, AER). 2 ind. Gaulosen, Mh. 27.9-19.10 (ESP, THA). 2 ind. Sula, F. 30.9-4.10 (KHE, THA, JHE mfl.). 1 ind. Nordmyra, Tr. 2.10 (BEB). 1 ind. Flatnesfjæra, Ø. 25.10 (MVE, KWO). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 25.10 (EBA, MVA). 1 ind. Buheim, Ri. 31.10-30.11 (ABR, PJS, JBJ mfl.).

Rugde *Scolopax rusticola*
Vinterfunn: 1 ind. Kløstermyran, He. 12.12 (JVU).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*
Til sammen 26 ind. ble sett i løpet av de tre vintermånedene, fordelt på 19 i januar og februar og 7 i desember. Funnene fordelte seg kommunevis på Ørland (17), Trondheim (3), Bjugn (2), Frøya (2), Agdenes (1) og Åfjord (1).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*
Til sammen 33 dobbeltbekkasiner er rapportert fra 9 spillplasser i hekkeområdene. Kommunefordelingen var Midtre Gauldal (6/2), Oppdal (13/3), Rennebu (6/2), Meldal (4/1) og Røros (4/1). I tillegg er fire enkeltindivider observert på vårtrekk på tre lokaliteter i Røros og én i Oppdal. Ingen funn ble gjort i lavlandet. Arten er vanligere i egnet habitat i fjellet enn den rapporterte funnmassen indikerer.

Polarjo *Stercorarius pomarinus*
Kraftige vestlige vinder langs kysten denne høsten ga en influks på hele 96 polarjo i Sør-Trøndelag! Fuglene ble sett i perioden 25. september til 2. november, og de fleste var på direkte trekk. Som vanlig var det på kysten arten i hovedsak ble registrert, men én fugl ble også sett i Trondheim. Kommunevis fordeling på høstens funn var Frøya (49), Hemne (20), Bjugn (23), Ørland (3) og Trondheim (1). Antall ind. foregående år: 2013 (1), 2012 (0), 2011 (3), 2010 (2) og 2009 (5).
Alle funn: 1 ad. ptSV Titran, F. 25.9 (ESÆ). 2 1K ptSV Titran, F. 26.9 (ESÆ, MMY). 1 ind. Uthaug, Ø. 27.9 (AER, HER). 3 1K ptSV Valsneset, B. 27.9 (HER, TRI). 2 1K Titran, F. 27.9 (AWI, BJT, VAK mfl.). 1 ind. ptSV Nes, B. 27.9 (HER, TRI). 1 ad. og 1 1K ptN og 3 1K ptSV Titran, F. 28.9 (MMY, AWI, BJT, VAK). 2 ind. Valsneset, B. 28.9 (HDA, AER). 6 ad. (4 ptS) og 3 1K ptS Tarvafjorden, B. 28.9 (HER). 1 1K Valsneset, B. 29.9* (SME). 10 ind. Sula, F. 29.9 (FSC, TKR, THA mfl.). 7 ad. og 15 1K ptV Titran, F. 29.9 (MMY). 3 ad. og 3 1K ptSV Tarvafjorden, B. 29.9* (HER). 8 ind. ptSV Magerøysundet, He. 29.9 (JOB). 12 ind. ptSV Taftøyan, He. 29.9* (JOB). 1 ad. ptV Sula, F. 1.10 (TON, TKR, THA mfl.). 2 1K ptV Titran, F. 2.10 (JEL, MMY, SPR mfl.). 1 1K Sula, F. 3.-5.10 (EKR mfl.). 1 ind. Nes, B. 4.10 (HDA, AER, PEL). 3 1K Gjæsingen, F. 11.-12.10 (DOB). 1 1K Brekstadbukta, Ø. 30.10-2.11* (HDA, SME mfl.). 1 ind. ptV Østmarkneset, Tr. 30.10 (OHE). 1 1K Uthaug, Ø. 2.11 (AER, TRI, AST).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*
Fra hekkeområdene er det rapportert anslagsvis 24 ind. Det er som vanlig en betydelig overvekt av observasjoner i Oppdal, noe som både skyldes at kommunen har gode habitater for arten og at observatørdekningen nok er bedre her enn i andre aktuelle fjellområder. Ett par i Oppdal ble konstatert hekkende, og ytterligere to viste hekkeatferd. Utenfor hekkeområdene er 42 ind. rapportert på vårtrekk og 10 ind. på høsttrekk. 3 1K ved Vikaengene i Selbu i september kan tyde på vellykket hekking et sted i fjellheimen øst i fylket.
Kommunefordeling av trekkende fugler var Trondheim (25), Frøya (5), Selbu (3), Ørland (3), Rissa (2), Hemne (2) og Røros (2).
Funn fra hekkeområdene: 2 ad. Stroplsjødalen, Op. 21.-22.5 (AJM). 1 par Ålmflåin, Op. 23.5-12.7 (PWB mfl.). 2 ind. Grønfjellet, Ho. 29.5-13.7 (DOB). 1 ad. Rambergsfjellet, Rø. 30.5 (HIK, AAS). Opptil 3 ind. Finnsjøen, Op. 31.5-8.6 (PWB mfl.). Opptil 4 ad. Veslvontjønnin, Op. 31.5-30.7 (PWB, KWO mfl.). 2 ad. ved reir Tjønnglupen, Op. 24.6-2.7 (IRØ). 1 ad. Fremre Tverråa, Op. 24.6 (IRØ). 2 ind. Hultsjøen, Ho. 2.7 (LHE). 2 ad. Blåurdtjønna, MG. 13.-27.7 (JEA, OAF). 1 ad. Fossætra, Orkeldalen, Op. 16.7 (ARB, OSF). 1 ind. Gråtjønna, MG. 27.7 (OAF). 1 ind. Larsbekken, Op. 10.8 (GGU, ALO). **Vårtrekk:** Min. 25 ind. ptN Brattøra, Tr. 18.-20.5 (EBA, GBA, OHE mfl.). 2 ind. ptV Borgosen, Rø. 31.5 (ESÆ). 2 ind. Grandefjæra, Ø. 5.6 (HDA, PEL). 1 ind. Andsteinen, F. 7.6 (ØHE, MHE). 1 ind. Halten, F. 10.6 (GBA, AES). 1 ad. NV for Halten, F. 10.6 (GBA, AES, BST). **Høsttrekk:** 2 ad. pt Galgeneset, Ri. 24.7 (HER). 1 ind. Kråka, Ø. 1.8 (HDA). 1 ind. Gimsan, F. 23.8 (MMA). 3 1K Vikaengene, Se. 25.9 (JSA). 2 ind. ptSV Magerøysundet, He. 29.9 (JOB). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC, JHE, KLA mfl.).

Storjo *Stercorarius skua*
Gjennom året ble 13 ind. sett, hvorav tre ind. i mai og ti ind. i høstsesongen fra 21. juli til 4. oktober. Som vanlig er det flest funn fra Frøya med 11 ind., mens Bjugn og Hemne har ett funn hver. Antall registreringer avhenger mye av værforholdene på høsten og observatørdekning på aktuelle lokaliteter langs kysten. Antall ind. foregående år: 2013 (28), 2012 (14), 2011 (22), 2010 (4) og 2009 (12).
Alle funn: 1 ind. N for Melstein, B. 4.5 (HDA, HER). 2 ind. N for Halten, F. 10.5 (GBA). 1 ind. Halten, F. 21.7 (JRO). 1 ind. ptNØ Titran, F. 9.8 (RES, EBA). 1 ind. Titran, F. 10.-12.8 (MMY, ØAA, FRL). 1 ad. Halten, F. 23.8 (MVE, MGA, SGA mfl.). 1 ind. N for Halten, F. 6.9 (KTH, TKO, OSF mfl.). 1 ind. Titran, F. 12.9 (JOB). 1 ind. ptSV Titran, F. 26.9 (ESÆ, MMY). 1 ind. ptN Frohavet, F. 28.9 (PEI). 1 ad. ptSV Taftøyan, He. 29.9 (JOB). 1 ind. Sula, F. 4.10 (PWB, ØHE).

Dvergmåke *Hydrocoloeus minutus*
Minimum 21 dvergmåker ble sett dette året. 2014 ble dermed nok et godt år for arten, som er i fremgang i Norge. Minst 11 ind. ble sett ved Brekken med omegn på Røros i mai og juni, men flere individer kan godt ha vært involvert. Fuglene hekker på svensk side av grensen. En fugl i Trondheimsfjorden i februar utgjør et veldig uvanlig vinterfunn. Kun én gang tidligere har arten blitt observert i januar eller februar i fylket. Et mars-funn fra Leksa i Agdenes er også verdt å merke seg. Denne fuglen hadde tilhold i noen dager ved et oppdrettsanlegg. To oktober-funn var de eneste i andre halvår. Fuglen på Titran var den første for lokaliteten. Antall ind. foregående år: 2013 (43), 2012 (26), 2011 (11), 2010 (4) og 2009 (12).
Alle funn: 1 2K Midtsandan, Ma. 7.-24.2 (PSH, DOB, GBA mfl.). 1 ind. Nordleksa, A. 11.-14.3 (SPE). 1 ad. Buvika, Sk. 5.5 (JOB). 1 3K Hovsfjæra, Ø. 25.5 (HDA, SME, AER mfl.). Min. 11

Haugatjønna ved Brekken, Røros har vært den sikreste plassen å se dvergmåke i Sør-Trøndelag de siste årene. Fuglene bruker tjønna til næringssøk, men de hekker på svensk side av grensen. Denne fuglen ble fotografert 20. juli og viser godt artens karakteristiske mørke vingeundersider og hvite bakkant på vingen. Denne strekker seg frem til tuppen av hånda, noe som bidrar til inntrykket av avrundede vinger som arten gjerne gir. Foto: Trond Hervik.

ind. Borgosen og Vauldalen, Rø. 27.5-10.6* (BGS, HIK, DOB, ESÆ mfl.). 1 2K Gaulosen, Mh. 28.5-2.6 (MMA, RES, KAS mfl.). 3 ind. Vesle Orkelsjø og Unndalen, Op. 29.5-23.6* (PWB, TKO, JOB). 1 1K ptNØ Titran, F. 8.10 (BES, KAS). 1 1K Uthaug, Ø. 31.10* (HDA, PEL, AER mfl.).

Sabinemåke *Xema sabini* <1,26>
Ett funn ble gjort på Titran i oktober. Både tid og sted er typisk for funn i Trøndelag.
Alle funn: 1 1K ptØ Kjervågsund, Titran, F. 2.10 (SPR, JEL).

Krykkje *Rissa tridactyla*
I kolonien på Halten ble 92 okkuperte reir telt 9. juni, hvorav 71 fugler tilsynelatende ruget. Trolig fikk ingen av parene frem unger. Predasjon fra svartbak og ravn antas å være årsaken (GBA, AES, BST mfl.).

Fiskemåke *Larus canus*
Stort antall: 2800 ind. Selbusjøen, Se. 27.4 (JSA).

Grønlandsmåke *Larus glaucoides*
Til sammen 12 grønlandsmåker ble sett i 2014, som dermed ble et godt år for arten i fylket. 8 ind. ble sett i første halvår og 4 i andre halvår. Antall ind. foregående år: 2013 (12), 2012 (144), 2011 (5), 2010 (3) og 2009 (9).
Alle funn: Min. 2 2K Hommelvik, Ma. til Flakk, Tr. 5.1-21.5 (KAS mfl.). 1 ad. Munkholmen, Tr. 27.1-7.4 (TBO, BEB, GBA mfl.). 1 2K+ Uthaug, Ø. 15.3 (SME). 1 2K Grønningsbukta, Ri. 23.3-12.4 (NGR, GBA, ABR mfl.). 1 3K-Seter, Os. 2.4 (TRE). 1 2K Hasselvika, Ri. 21.4 (ORY, MHO). 1 ind. Innstrand, Ø. 29.4 (JSP, EPE). 1 1K Gjæsingen, F. 12.10 (DOB). 1 ad. Hommelvik, Ma. 16.11-27.12 (TRØ, TKV, EBA mfl.). 1 ind. Uthaug, Ø. 16.12 (HDA, SME). 1 1K Midtsandan, Ma. 31.12 (SGJ, PSH, BEB).

Polarmåke *Larus hyperboreus*
Med anslagsvis 12 ind. ble 2014 et relativt godt år for arten. 9 fugler ble sett i første halvår og bare 3 i andre, til tross for mye pålandsvind denne høsten. Antall ind. foregående år: 2013 (6), 2012 (19), 2011 (6), 2010 (2) og 2009 (13).
Alle funn: 1 2K Storodden, He. 5.1-11.3 (JOB, RES). 1 2K Børøysundet, Hi. 8.-28.2 (ARB, AWR, GRA). 1 2K+ Uthaug, Ø. 11.2 (HDA, SME, GDY). 2 2K Mausundvær, F. 2.3 (MMA). 1 2K Munkholmen, Tr. 8.3-30.4 (HEG mfl.). 1 ad. Høvringen, Tr. 20.3 (EBA). 1 2K ptSØ Halten, F. 5.5 (HER). 1 4K-Halten, F. 10.6 (GBA, AES). 1 1K Titran, F. 25.9 (ESÆ). 1 1K Uthaug, Ø. 9.11 (SME, AER). 1 ind. Buholmen, Ro. 9.12 (PEI).

Svartbak *Larus marinus*
Nevneverdig innlandsfunn: 1 ind. Aursunden ved utløpet, Rø. 19.4 (TKR).

Splitterne *Thalasseus sandvicensis* <0,12>
Årets funn er det andre fra Trondheimsfjorden. Det første ble gjort utenfor Hundhammeren i Malvik 26.6.2005.
Alle funn: 1 ind. Flatholmskjæret, Muruvika, Ma. 27.5 (MVE).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*
De aller fleste terner forblir i overvintringsområdene det første leveåret. Funn av 2K-fugler er derfor uvanlig i Norge.
Funn av 2K-fugler: 1 2K Gimsan, F. 9.6 (HER). 1 2K Litlkrinsholmen, B. 30.6 (HER). 7 2K Halten, F. 21.7 (GBA, EBA, SBA).

Lomvi *Uria aalge*
Anslagsvis 99 ind. er rapportert dette året, fordelt kommunevis på Frøya (21), Bjugn (20), Malvik (17), Åfjord (14), Ørland (10), Ørland/Bjugn (6), Hemne (5), Rissa (2), Agdenes (1), Orkdal (1), Skaun (1) og Trondheim (1).

Alke *Alca torda*
Store antall: 647 ind. Midtsandan, Ma. 8.2 (PSH). 442 ind. Midtsandan, Ma. 27.12 (PSH).

Teist *Cepphus grylle*
Store antall: 298 ad. Kunnasundet, F. 5.5 (HER). 296 ad. Halten, F. 5.5 (HER, HDA).

Lunde *Fratercula arctica*
Fra fylkets eneste koloni på Halten i Frøya er opptil 90 ind. rapportert denne sommeren. Fra andre lokaliteter er minimum 23 ind. rapportert fra Frøya (11), Ørland (5), Bjugn (3), Åfjord (3) og Hemne (1).
Funn fra hekkeområder: Opptil 90 ind. Halten, F. 5.5-29.7 (NKG, EGR, GBA mfl.). **Nevneverdig lokalitet:** 1 ad. Lernesstranda, He. 21.12 (JOB).

Ringdue *Columba palumbus*
Det er rapportert 121 ringduer i januar, 72 nye individer i februar og 207 individer i desember. De tilsvarende tall for 2013/2012 var 224/123 i januar, 80/28 i februar og 104/166 i desember. Kommunefordeling (antall individer) for vinterfunn 2014: Trondheim (242), Ørland (110), Malvik (29), Bjugn (13), Rissa (5) og Hemne. Dette året ble 60,5 % av alle vinterfunn av ringdue i fylket registrert i Trondheim kommune. Tilsvarende tall for de tre foregående årene er 86 % i 2013, 83 % i 2012 og 73 % i 2011. En sterk vinterforekomst i Ørland kommune er et markant trekk i 2014. De største forekomstene var 31 ind. Leangenbukta, Tr. 31.1 (PWB) og 85 ind. Hoøya, Ø. 26.12 (SME, GDY).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*
Årets forekomst anslås til å omfatte 38 ind. Arten observeres regelmessig gjennom året i Trondheim og øst på

Frøya. I tillegg ble arten registrert i perioder ved Monstad i Åfjord, Stadsbygda i Rissa og Opphaug i Ørland. Øvrige observasjoner var enkeltregistreringer. Årets fugler fordeler seg kommunevis på Trondheim (14), Frøya (12), Rissa (3), Bjugn (2), Åfjord (2), Hitra (1), Malvik (1), Melhus (1), Orkdal (1) og Ørland (1). Antall ind. foregående år: 2013 (54), 2012 (42), 2011 (35), 2010 (22) og 2009 (27).
Hekkefunn: 2 ad. og 1 1K Ervika, F. 15.8 (OSF). **Nevneverdig lokalitet:** 1 ind. Halten, F. 5.5 (HDA, HER).

Turteldue *Streptopelia turtur*
Det foreligger tre funn av turteldue i Sør-Trøndelag i 2014, alle fra Frøya kommune om høsten. Funn foregående år (antall individer): 2013 (2), 2012 (1), 2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ind. Halten, F. 6.9* (BNY, TKO, KBE mfl.). 1 1K Titran, F. 13.9 (*MMY, BST, RES mfl.). 1 ind. Titran, F. 7.10 (ETH, KAS).

Hubro *Bubo bubo*
Observasjoner er rapportert fra seks lokaliteter i løpet av året. Nærmere detaljer gis ikke.

Haukugle *Surnia ulula*
I 2014 fikk vi tidenes forekomst av haukugle i Sør-Trøndelag, og det må åpenbart ha vært god tilgang på smågnagere i innlandet. Det ble registrert hele 224 individer dette året, med et markant tyngdepunkt i høyereliggende innlandskommuner. Dette tallet inkluderer hele 56 pullus fra 21 hekkefunn. Den invasjonsartede forekomsten fra september 2013 førte til at mange haukugler var å finne i fylket ved starten av 2014. Kommunefordeling (antall individer/hekkefunn): Røros (47/4), Midtre Gauldal (21/3), Oppdal (21/2), Selbu (21/3), Melhus (19/2), Rennebu (19/3), Tydal (18), Orkdal (12/2), Bjugn (10), Holtålen (9), Skaun (7/2), Klæbu (3), Meldal (3), Snillfjord (3), Trondheim (3), Rissa (2), Åfjord (2), Frøya, Hitra, Malvik og Ørland. Fire kommuner (Agdenes, Hemne, Osen og Roan) manglet funn av arten i 2014. Funn foregående år (antall individer/hekkefunn): 2013 (158/1), 2012 (38/0), 2011 (36/4), 2010 (59/9) og 2009 (5/0).
Nevneverdige funn: 1 ind. Kvaløya, F. 4.3 (HKW) og 1 ind. Fillan, Hi. 10.8 (RLE).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*
Det er rapportert 33 spurveugler i Sør-Trøndelag i 2014, 13 ind. første halvår og 20 ind. andre halvår. Det er rapportert fire syngende hanner første halvår og ni syngende hanner andre halvår, og det er ikke rapportert sterkere hekkeindikasjoner. Månedsfordeling (antall individer): januar (3), februar (3), mars (1), april (3), mai (2), juni (1), august (5), september (4), oktober (6), november (2) og desember (3). Kommunefordeling (antall individer): Melhus (6), Trondheim (6), Orkdal (5), Meldal (3), Holtålen (2), Rennebu (2), Snillfjord (2), Bjugn, Frøya, Klæbu, Malvik, Røros, Selbu og Åfjord. Funn foregående år (antall individer): 2013 (12), 2012 (29), 2011 (34), 2010 (39) og 2009 (23).
Nevneverdig funn: 1 ind. Kvisten, F. 11.10 (TON).

Den gode forekomsten av smågnagere i 2014 førte til flere registreringer av spurveugle enn de siste to årene. Denne ble observert i Jervanmarka, Trondheim 19. februar. Foto: Erik Bangjord.

Lappugle *Strix nebulosa* <0,5>
Ett funn av lappugle ble gjort dette året. Med fremgangen arten har vist i Hedmark de siste hekkesesongene, er det kanskje lov til å håpe på flere funn hos oss i årene som kommer? Tidligere funn i fylket er gjort i 1997, 2009 og 2012 (2).
Alle funn: 1 ind. Tronget, Ma. 29.11* (LSL).

Hornugle *Asio otus*
Smågnageråret 2014 ga gode tall for hornugle, som for flere av de andre ugleartene. Det ble registrert 81 individer, et tall som inkluderer 46 dununger fra 21 hekkefunn. Fuglene er observert i perioden 17.2-25.12, med følgende månedsfordeling (antall individer): Februar (2), mars (10), april, mai (3), juni

En hornugle-pullus fra et av de 21 hekkefunnene som ble konstatert denne sommeren. De karakteristiske fjærtoppene på hodet, som har gitt arten navn, utvilkes allerede før ungene får sin første komplette fjærdrakt. Foto: Jon Helle.

(36), juli (24), august (4) og desember. Kommunefordeling (antall individer/hekkefunn): Oppdal (23/6), Melhus (12/4), Skaun (10/2), Selbu (7/1), Orkdal (5/1), Rennebu (5/1), Bjugn (4/1), Holtålen (3/1), Meldal (3/1), Trondheim (3/1), Åfjord (3/1), Røros (2/1) og Ørland. Den sterke forekomsten i Oppdal dette året bør trekkes spesielt fram. Her dukket fuglene opp alt de første dagene av mars grunnet god tilgang på smågnagere, og seks hekkefunn ble konstatert senere på året. Funn foregående år i fylket (antall individer/hekkefunn): 2013 (19/4), 2012 (16/1), 2011 (98/28), 2010 (38/9) og 2009 (5/0).
Nevneverdig funn: 1 ind. Hovde, Ø. 25.12* (RDA).

Jordugle *Asio flammeus*
Det gode smågnageråret i fjellregionen medførte et rekordår også for jordugle. Det ble registrert 170 individer i perioden 6.3-16.11, med et markert tyngdepunkt i høyereliggende innlandskommuner. Ingen vinterfunn ble gjort dette året. Funnmassen involverer 36 pulli fra 8 hekkinger. Den sterke forekomsten i Midtre Gauldal skiller seg ut. Kommunefordeling (antall individer/hekkefunn): Midtre Gauldal (59/7), Oppdal (38), Røros (26), Holtålen (16/1), Tydal (9), Selbu (5), Rennebu (4), Åfjord (3), Bjugn (2), Frøya (2), Trondheim (2), Malvik, Melhus, Rissa og Ørland. Månedsfordeling (antall individer): mars (2), april (9), mai (26), juni (69), juli (27), august (9), september (18), oktober (9) og november. Funn foregående år (antall individer/hekkefunn): 2013 (76/1), 2012 (54/0), 2011 (76/4), 2010 (41/3) og 2009 (21/0).
Sent høstfunn: 1 ind. Rylia, Rø. 16.11 (LHE, HIK).

Perleugle *Aegolius funereus*
Oppgangsåret 2013 ble fulgt av smågnageråret 2014, noe som ga sterke tall også for perleugle. Det ble registrert 91 perleugler i Sør-Trøndelag i 2014, og forekomsten inkluderer 39 pulli fra 17 hekkefunn. De to kommunene Melhus og Midtre Gauldal skiller seg ut dette året med en sterk forekomst. Kommunefordeling (antall individer/hekkefunn): Melhus (23/5), Midtre Gauldal (20/2), Oppdal (8/2), Åfjord (7), Hemne (6/1), Røros (6/3), Trondheim (4), Klæbu (3/1), Orkdal (3/1), Holtålen (2/1), Meldal (2), Snillfjord (2/1), Agdenes, Bjugn, Frøya, Malvik og Selbu. Månedsfordeling (antall individer): januar, februar (6), mars (11), april (17), mai (49), juni, juli (3), september (2) og oktober. Funn foregående år (antall individer/hekkefunn): 2013 (41/2), 2012 (13/0), 2011 (66/10), 2010 (39/4) og 2009 (10/0).
Nevneverdig funn: 1 ind. rm. Titran, F. 3.10 (MMY, SPR, TRE mfl.).

Tårnseiler *Apus apus*
Tidlig vårfunn: 1 ind. Eidsvatnet, B. 10.5 (HER, SME, TRI mfl.).
Nevneverdige lokaliteter: Opptil 3 ind. Halten, F. 21.-28.7 (GBA, EBA, SBA, BST). 1 ind. Titran, F. 13.9 (BJT).

Hærfugl *Upupa epops*
To funn foreligger i 2014, og arten er dermed sett uavbrutt siden 2001 i fylket. År 2000 var siste år uten funn. Funn foregående år: 2013 (2), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (1) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ind. Håkkåran, Op. 23.4 (KSJ) og 1 ind. Titran, F. 20.-21.9* (*ØAA mfl.).

Vendehals *Jynx torquilla*
Det ble registrert 13 voksne vendehalser og 11 dununger i Sør-Trøndelag i 2014. Fuglene er registrert i det korte tidsvinduet 17.4-1.7. Kommunefordeling (antall individer): Røros (14), Trondheim (3), Orkdal (3), Oppdal (2), Selbu og Frøya. To hekkefunn foreligger, begge fra Røros. I det ene kullet var det 11 nyklekte dununger, i det andre kullet var det 11 egg.
Trekkfunn: 1 ind. Lavollen, Tr. 17.4 (BJT). 1 ind. Svellingen, F. 26.4* (BST).

Hvitryggspett *Dendrocopos leucotos*
Det ble registrert 31 hvitryggspetter i Sør-Trøndelag i 2014, med et markert tyngdepunkt i Hemne og Snillfjord. Kommunefordeling (antall individer): Hemne (12), Snillfjord (11), Oppdal (5), Agdenes, Meldal og Rennebu. Funn foregående år (antall individer): 2013 (19), 2012 (16), 2011 (21), 2010 (28) og 2009 (34).
Alle funn: 2 ind. Berg, Sn. 4.1-25.5 (*JØB, JOB, HDA mfl.). 1 par Storlidalen, Op. 1.2-8.5 (TBJ). 1 F Krokstadøra, Sn. 26.2-10.5 (HDA, SME, EAR). 1 M Mistfjorden, He. 2.3 (JOB). 1 par Vinjeøra, He. 3.3-13.7 (JOB). 1 par Melvasslia, Sn. 30.3-25.4 (*JØB, EBA, MMA). 1 par Sengsdalen, He. 30.3-6.5 (*JOB, THA, EBA mfl.). 1 M Emangen, Op. 11.-12.4 (TBJ, PWB). 1 ind. Resdalen, Md. 12.4-5.8 (FST). 1 F Vågan, Sn. 19.4 (VEH). 1 M Loslia, Op. 20.4 (PWB). 1 F Nordåsen, A. 21.4 (TMO). 1 F Stranda, Rovatnet, He. 11.5 (JOB, HOL). 1 M Rustlia, He. 26.5 (JOB). 1 F Minnilldalsmyran, Op. 27.5-29.7 (GBO). 1 ad. M og 2 pull. Glasshylltjørna, Sn. 7.-8.6 (ARB, OSF). 2 ind. Vessesetra, He. 12.7 (TMO). 1 ad M og 1 1K Vinjeøra, He. 13.7 (JOB). 2 ind. Berg, Sn. 22.9 (JØB). 1 M Ånegga, Re. 12.10 (ØAA, RAA). 1 M Likroken, He. 3.11 (JOB).
Sent høstfunn: 1 ind. Titran, F. 8.-9.11 (EBA, ESÆ mfl.)

Fjellerke *Eremophila alpestris*
Det ble registrert 15 fjellerker i Sør-Trøndelag i 2014, samtlige i Oppdal. Funn (antall individer) foregående år: 2013 (38), 2012 (13), 2011 (13), 2010 (11) og 2009 (17).
Alle funn: 1 varsl. par og 1 ad. Kvernbekkhøa, Op. 27.5-26.7 (JOB, PWB, HOL). 4 sy. M og 1 par med mat til unger (tot. 5 ad.) Ålmflåin, Op. 29.5-12.7 (ØSO, JEL mfl.). 1 par Finnsjøen, Op. 31.5-2.6 (PWB, JOB). 1 par Slåbergstjønnin, Op. 8.6 (ESÆ, TAS). 1 ind. med mat til unger Indre Veslvonskaret, Op. 14.6 (MMA, MKL, RES mfl.). 1 sy. M Langtjørna, Op. 25.6 (SGJ, BEB). 1 1K Orkeldalen, Op. 3.8 (MMA).

Sandsvale *Riparia riparia*
Tidlige vårfunn: Opptil 4 ind. Eidsvatnet, B. 27.-29.4 (JSP, EPE, HDA mfl.). 2 ind. Nidarø, Tr. 28.4 (THA, SBS). Opptil 3 ind. Gaulosen, Mh. 28.-30.4 (*KWO, EBA mfl.). 1 ind. Laugen, Sk. 29.4 (FSC).

Låvesvale *Hirundo rustica*
Sene høstfunn: 2 ind. Frengen, Ri. 19.10 (ABY). 1 ind. Brekstad, Ø. 26.-27.10 (HDA, JSP).

Taksvale *Delichon urbicum*
Tidlige vårfunn: Opptil 3 ind. Likroken 27.-30.4 (JOB). 1 ind. Eidsvatnet, B. 27.-28.4 (EPE, JSP, HDA mfl.). 1 ind. Jervanmarka, Tr. 27.4 (JST). **Stort antall:** 118 ind. Midtsandan, Ma. 6.8 (PSH).

Amursvale *Cecropis daurica* NSKF <0,5>
To amursvaler ble sett sammen ved Litlvatnet i Agdenes 5. mai, funnet av NOF Orkla lokallag på tur. Tidligere funn i fylket er gjort på Titran, Frøya 24.5.2003, Eidsvatnet, Bjugn 13.-19.5.2008 og Gangåsvatnet, Orkdal 1.6.2009.
Alle funn: 2 ad. Litlvatnet, A. 5.5 (MMA, MKL, RES, FRL).

Tartarpiplerke *Anthus richardi* <0,53>
Kun ett funn av tartarpiplerke ble gjort i 2014. Funnet er relativt tidlig, de fleste funn i fylket gjøres etter 20.9. Antall ind. foregående år: 2013 (5), 2012 (3), 2011 (2), 2010 (0) og 2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Titran, F. 13.9 (BJT).

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni* <0,13>
Det foreligger ett funn av sibirpiplerke i fylket i 2014. Alle funn i fylket er gjort i

En sibirpiplerke ble fanget for ringmerking på Titran, Frøya 30. september. Blant kjennetegnene som skiller arten fra trepiplerke, er en oliventonet rygg uten lysere streker, en karakteristisk hodetegning med en velmarkert mørk kant over det lyse øyenbrynet og en lys og en mørk flekk lengst bak på øredekkerne, samt krafigere streking på flanken. Foto: Magne Myklebust.

Frøya kommune.
Alle funn: 1 1K+ rm. Titran, F. 30.9* (*MMY).

Trepiplerke *Anthus trivialis*
Tidlige vårfunn: Opptil 2 sy. M Tillermarka, Tr. 21.-28.4 (EKR, TKR, EBA mfl.). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 22.4 (MMA). 1 sy. M Kammen, Tr. 30.4 (KAS). **Funn på ytterkysten:** 1 1K rm. Titran, F. 22.9 (*MMY, EBA, JOB mfl.). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC, KHE, JHE mfl.).

Tundrapiplerke *Anthus gustavi* NSKF <0,3>
Fire år etter førstefunnet i fylket kom de to neste funnene av tundrapiplerke i 2014. Akkurat som i 2009 hang det et individ i nettene i Suzukidammen på Titran, mens den nærliggende lokaliteten Sula kunne by på en feltobservasjon en drøy måned senere. Interessant nok var de to funnene fra Frøya de eneste i Norge i 2014.
Alle funn: 1 1K+ rm. Suzukidammen, Titran, F. 22.9* (*MMY, EBA, ESÆ). 1 ind. Sula, F. 25.10* (BOT, MAK).

Heipiplerke *Anthus pratensis*
Vinterfunn: Opptil 5 ind. Kråkvåg, Ø. 4.1-5.2 (JSØ, HDA). 1 ind. Hoøya, Ø. 27.1 (HER). **Sent høstfunn:** Opptil 2 ind. Titran, F. 7.-8.11 (AST, EBA, ESÆ mfl.).

Gulerle *Motacilla flava*
Tidlig vårfunn: 1 M Likroken, He. 27.4 (JOB). **Sene høstfunn:** 1 ind. Titran, F. 6.10 (*KAS, BES, ETH mfl.). 1 ind. Titran, F. 18.10 (ESÆ, BST).

Vintererle *Motacilla cinerea*
Med 79 individer registrert i 2014 kan det se ut som om bestanden av vintererle er i ferd med å ta seg opp etter magre år. Vintrene 2009/10 og 2010/11 var svært kalde og snørike både i Norge og i vinterkvarterene til arten på det europeiske kontinentet. Dette ga vintererlebestanden en knekk. Arten er i 2014 registrert i perioden 23.3-18.10, og det foreligger dermed ingen vinterfunn. Det er gjort seks konstaterte hekkefunn dette året, men i tillegg er par registrert på en rekke tradisjonelle hekkebiotoper uten at hekking er konstatert.

Månedsfordeling (antall individer): mars (6), april (18), mai (9), juni (9), juli (9), august (10), september (15) og oktober (3). Kommunefordeling (antall individer): Trondheim (39), Midtre Gauldal (14), Melhus (6), Klæbu (4), Snillfjord (4), Holtålen (2), Røros (2), Skaun (2), Malvik, Oppdal, Rennebu, Rissa, Selbu og Tydal. Funn foregående år (antall individer): 2013 (45), 2012 (40), 2011 (31), 2010 (51) og 2009 (81).

Linerle *Motacilla alba*
Det ble gjort ett vinterfunn i 2014. **Vinterfunn:** 1 ind. Leangenbukta, Tr. 14.12 (ØSO). **Tidlige vårfunn:** 1 ind. Strømmen, Ri. 24.3 (GNY). 1 ind. Midtsandan, Ma. 30.3 (GBA). 1 ind. Prestelva, Ri. 30.3 (NGR). **Sene høstfunn:** 1 ind. Uthaug, Ø. 10.11 (ØHE, MHE). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 10.11 (PSH).

Svartryggerle *Motacilla alba yarrellii*
Det ble registrert fire svartryggerler i perioden 16. april til 6. juli. En hann var involvert i et hekkefunn på Hitra. **Alle funn:** 1 ad. M Holtvatna, MG. 16.4* (ØJS, SSO). 1 M Krokhølen, Rø. 25.4 (ESÆ). 1 FF Munkholmen, Tr. 14.5 (EKR). 1 M med mat til unger Bjørnavågen, Hi. 6.7 (SWA).

Sidensvans *Bombycilla garrulus*
Ingen hekkefunn foreligger i 2014. **Sommerfunn:** 2 ind. Haltdalen, Ho. 30.7 (THE). **Tidlige høstfunn:** 1 ind. Stokkanhaugen, Tr. 15.8 (TKR). 12 ind. Strømmen, Ri. 8.9 (GNY).

Tundrapiplerke ringmerket på Titran, Frøya 22. september. Arten ligner mye på en ung lappiplerke, men den skiller seg fra denne blant annet gjennom en gul grunnfarge på brystet, rosa nebb, en tydelig håndsvingfjærprojeksjon og at den hvite øyeringen er brutt i fremkant. Foto: Magne Myklebust.

Fossekall *Cinclus cinclus*
Sjelden art i Frøya kommune. Fuglen er rapportert på samme lok. i januar 2013.
Nevneverdig lokalitet: 1 ind. Tungvågen, F. 20.-22.2 (GOL, FRL, OSF, BST).

Jernspurv *Prunella modularis*
Fuglen i Leangenbukta har hatt tilhold der siden 14.12.2013, og trolig er det samme fugl som også ble registrert s.st. 17.-30.3 (HLL, OHO, GBA).
Vinterfunn: 1 ind. Leangenbukta, Tr. 1.-31.1 (JEL, ØSO, EBA mfl.). **Tidlige vårfunn:** 1 sy. Sandstad, Hi. 23.3 (ARB, EBR). 1 sy. Kjøsnes, Se. 30.3 (TMØ).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*
I vintermånedene januar, februar og desember er det rapportert 178 rødstruper i Sør-Trøndelag. Av disse er 114 ind. registrert i januar, 17 ind. i februar og 47 ind. i desember. Kommunefordeling: Trondheim (79), Frøya (21), Hitra (15), Orkdal (15), Hemne (14), Ørland (8), Rissa (6), Bjugn (4), Åfjord (4), Malvik (3), Melhus (3), Selbu (2), Skaun (2), Osen og Roan. Antall ind. foregående år: 2013 (176), 2012 (119), 2011 (100), 2010 (70) og 2009 (114). Det ble rapportert 57 rødstruper i forbindelse med Hagefugltellingen 25.-26. januar. De tilsvarende tallene tidligere år er 70 ind. i 2013, 39 ind. i 2012, 38 ind. i 2011, 34 ind. i 2010 og 33 ind. i 2009.
Innlandsfunn vinter: 1 ind. Slindmoene, Se. 8.-26.1 (NOS). 1 ind. Hersjøen, Se. 25.1 (KOH).

Blåstrupe *Luscinia svecica*
Dette er det tidligste funnet av arten i fylket som er rapportert på Artsobservasjoner.
Tidlig vårfunn: 1 sy. M Juvatnet, Å. 7.5 (GNY).

Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*
Tidlig vårtrekk: 1 ind. Husdalen, Or. 27.4 (TMO).1 ad. M rm. Stavsengan, Tr. 29.4 (HEG).

Buskskvett *Saxicola rubetra*
Tidlig vårfunn: 1 ind. Gaulosen, Mh. 25.4 (EBA, ESP).

Svartstrupe *Saxicola rubicola* <0,13>
Det foreligger ett funn av en hann fra Frøya høsten 2014. Det forrige året med funn av arten var 2009, med et marsfunn fra Malvik og et høstfunn fra Frøya. Tatt i betraktning at arten hekker i Møre og Romsdal, er den usedvanlig sjelden i Sør-Trøndelag.
Alle funn: 1 M Halten, F. 7.9-14.10* (GBA, TKO, KTH mfl.).

Ringtrost *Turdus torquatus*
Det foreligger ingen vinterfunn i 2014.
Tidlige vårfunn: 1 sy. Taftøyan, He. 8.4 (JOB). 1 M Stordalen, Å. 11.4 (SGA, MVE, TRØ). 1 M Nes, B. 11.4 (HER).
Sent høstfunn: 1 ind. Holladalen, He. 1.11 (JOB).

Måltrost *Turdus philomelos*
Ingen vinterfunn foreligger i 2014.
Tidlige vårfunn: 1 ind. Brekkvatnet, B. 29.3 (HER, GDY, TON mfl.). 1 ind. Eidsvatnet, B. 29.3 (HDA). 1 ind. Hoøya, Ø. 30.3 (AWI, RSA, PWB mfl.). 1 ind. Solem, B. 30.3 (HER, GDY, ANS mfl.). 1 sy. Straumsvatnet, Ro. 31.3 (TRØ). **Sene høstfunn:** 3 ind. Haukdalen, MG. 1.-2.11 (EDE). 1 ind. Titran, F. 8.11 (EBA). 1 1K rm. Titran, F. 9.11 (MMY, ESÆ).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*
Det ble registrert 39 individer vinterstid i 2014, med følgende månedsfordeling: januar (7), februar (0) og desember (32). Vinterfunn (antall individer) tidligere år: 2013 (12), 2012 (32), 2011 (53), 2010 (3) og 2009 (40).
Vinterfunn: 1 ind. Oddatunet, Litlvatnet, Tr. 22.1 (GBA). 5 ind. Hammarvika, F. 26.1 (JEE). 1 ind. Hernes, Hi. 27.1 (SHE). 1 ind. Innstrand, Ø. 4.12 (HLL, SME, HDA). 1 ind. Kystadveien, Tr. 6.12 (FFA). 1 ind. Ringve, Tr. 14.12 (EBA). 1 ind. Staulan, F. 14.12 (BST). 1 ind. Nes, B. 19.-28.12 (HER). 1 ind. Jektvika, Hi. 20.12 (ARB). 1 ind. Nedre Rømmesbakkan, Or. 21.-30.12 (MMA). 2 ind. Øvre Skograndan, He. 21.-29.12 (JOB). 5 ind. Ryggen, Ø. 22.12 (HDA). 1 ind. Fannrem, Or. 22.12 (RES). 3 ind. Titran, F. 23.12 (OSF). 2 ind. Brødreskift, Ri. 25.12 (ABR). 1 ind. Audalen, B. 26.12 (SME). 5 ind. Leangenbukta, Tr. 27.-31.12 (*GBA, EBA). 1 ind. Gaulosen, Tr. 27.12 (EBA). 1 ind. Grønningsbukta, Ri. 28.12 (NGR). 3 ind. Stokkøya, Å. 28.12 (SGA, MGA). 1 ind. Bjørkneset, He. 31.12 (JOB).

Duetrost *Turdus viscivorus*
Med 238 individer fikk vi tidenes rekordår for duetrost i Sør-Trøndelag i 2014. Arten er dette året registrert i fylket i perioden 27.3-15.10. Det er ikke gjort vinterfunn, men det foreligger to konstaterte hekkefunn.
Kommunfordeling (antall individer): Røros (46), Selbu (23), Holtålen (21), Rennebu (21), Orkdal (20), Meldal (16), Oppdal (14), Trondheim (13), Åfjord (13), Bjugn (8), Hemne (8), Malvik (8), Klæbu (7), Midtre Gauldal (7), Melhus (5), Frøya (2), Snillfjord (2), Tydal (2), Agdenes og Skaun. Månedsfordeling (antall individer): mars (23), april (119), mai (30), juni (18), juli (3), august (25), september (11) og oktober (9). Funn foregående år (antall individer): 2013 (95), 2012 (88), 2011 (151), 2010 (103) og 2009 (105).
Hekkefunn: 1 par ved reir med 2 unger og 3 egg Skjerlivatnet, He. 3.6 (JOB). 1 1K (nylig utfløyet) Hådalen, Rø. 24.6 (BGS). **Sannsynlige hekkefunn:** 1 varslende ad. Tangvella, K. 8.6 (IST). 5 ind. (4 1K + 1 ad.) Slettestjønna, Re. 25.6 (THE). 1 ad. og 1 1K Kattugleåsen, Ma. 28.6 (PSH).

Fylkets første starrsanger ble funnet på Nes i Bjugn 23. september. Som andre Locustella*-arter kan starrsangeren ha en kryptisk oppførsel, og det kan være vanskelig å få sett fuglen godt. En velmarkert lys overøyestripe som fortsetter godt bak øyet, en mørkere farge på issen enn på ryggen og markerte hvite bremmer ytterst på tertiærer og stordekkere er blant kjennetegnene som skiller arten fra gresshoppesanger. Starrsangeren har også en rødbrun overgump og hvite tupper på stjertfjærene. Foto: Svein Melum.*

Starrsanger *Locustella certhiola* NSKF <0,1>
Ny art for Sør-Trøndelag! En 1K starrsanger dukket opp i Merkefeltet på Nes i Bjugn en regnfull septemberdag, men gikk ikke i fangstnettene. Det lyktes heldigvis Svein Melum å fotografere fuglen mens den satt inne i tett buskas, og bildene viser nok til en sikker artsbestemmelse. Det foreligger 22 funn i Norge t.o.m. 31.12.2014. Med ett unntak foreligger funnene langs kysten fra Lista i sør til Røst i nord i perioden 14.9-9.10. Unntaket utgjøres av et julifunn fra Bjørnøya i 2013. I 1995 fikk Nord-Trøndelag sitt første og eneste funn 27.-28.9 på Sklinna, Leka.
Alle funn: 1 1K Merkefeltet, Nes, B. 23.9* (HER, HDA, SME, JSØ, TRI).

Gulsanger *Hippolais icterina*
Arten er sjelden i begge kommuner.
Nevneverdige funn: 1 sy. Daløya, F. 29.5 (TON). 1 sy. Fjellsjølia, Rø. 15.6 (TTH).

Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus*
Det ble rapportert 132 sivsangere i Sør-Trøndelag i 2014, som vanlig med et betydelig tyngdepunkt i kommunene på Fosen. Arten er rapportert i perioden 16.5-14.9, og i funnmassen på 132 individer er 66 syngende hanner. Funnet fra Selbu er tidlig til Sør-Trøndelag å være. Arten dukket ikke opp i kjerneområdet på Ørlandet før 24.5 dette året. Kommunefordeling (antall individer): Ørland (51), Åfjord (27), Hemne (13), Bjugn (8), Hitra (7), Frøya (6), Snillfjord (6), Agdenes (5), Rissa (5), Melhus, Osen, Selbu og Trondheim. Antall individer foregående år: 2013 (96), 2012 (105), 2011 (158), 2010 (77) og 2009 (115).
Nevneverdige funn: 1 sy. M Låen, Se. 16.5-15.6 (*NOS, ESÆ, EBA). 20 sy. M Lauvøya, Å. 8.6 (ESP, OKL).

Busksanger *Acrocephalus dumetorum* <0,12>
Tre nye funn ble gjort av busksanger i 2014. To var syngende hanner som dukket opp i juni, mens den siste ble ringmerket på kysten på høsten. Våre tolv funn i Sør-Trøndelag fordeler seg nå på syv syngende hanner sommerstid og fem ringmerkede fugler på høsten.
Alle funn: 1 sy. M Grøtan, He. 25.-30.6* (*JOB mfl.). 1 sy. M Stokkhaugen, Or. 28.6-2.7* (*MMA mfl.). 1 1K rm. Kjervågsund, Titran, F. 22.9* (*MMY, *ESÆ, EBA mfl.).

Myrsanger *Acrocephalus palustris <0,30>*
Det ble gjort ett funn av myrsanger i Sør-Trøndelag i 2014. Funnet er for øvrig det tidligste noensinne i fylket, den forrige rekorden var en syngende hann Norddal,

Busksanger, fanget for ringmerking på Kjervågsund, Titran, Frøya 22. september. En velmarkert lys overøyestripe, særlig tydelig foran øyet, er en av karakterene som skiller busksangeren fra myrsanger og rørsanger. Ofte fortsetter det lyse øyenbrynet så vidt bak øyet, noe det imidlertid ikke gjør på denne fuglen. I hånd skilles artene på ulik vingeformel. Foto: Magne Myklebust.

Syngende myrsanger ved Tislauan, Melhus 5. juni. Enger og kantsoner med hundekjeks og bringebærkratt er et typisk habitat for arten. Foto: Eirik Spets.

Sandvika, Frøya 8. juni 2000. Av 30 funn i fylket er 23 fra sommeren, mens 7 er høstfunn. Antall individer foregående år: 2013 (1), 2012 (3), 2011 (3), 2010 (1) og 2009 (1).
Alle funn: 1 sy. M Tislauan, Mh. 5.-7.6* (*ESP, VAK, TRE mfl.).

Hauksanger *Sylvia nisoria* <0, 167>
Det ble registrert 12 ind. (8 rm.) i 2014, alle 1K-fugler fra Frøya og Bjugn i perioden 7.9-5.10. Funn foregående år (ant. ind.): 2013 (0), 2012 (4), 2011 (11), 2010 (19) og 2009 (16).
Alle funn: Opptil 2 1K (1 rm.) Halten, F. 7.-16.9* (KTH, ARB, KBE mfl.). Opptil 5 1K (3 rm.) Titran, F. 13.9-3.10* (*MMY, OSF, ESP mfl.). 2 1K rm. Nes, B. 14.-23.9* (HDA, SME, ANS, HER mfl.). Opptil 3 1K (2 rm.) Sula, F. 29.9-5.10* (PWB, EKR, AWI mfl.).

Møller *Sylvia curruca*
Det ble registrert 80 møllere i Sør-Trøndelag i 2014, med følgende kommunefordeling (antall individer): Trondheim (30), Frøya (7), Oppdal (6), Midtre Gauldal (5), Orkdal (5), Røros (5), Bjugn (4), Malvik (3), Ørland (3), Åfjord (3), Holtålen (2), Rissa (2), Selbu (2), Hemne, Hitra og Tydal. Månedsfordeling (antall individer): mai (32), juni (21), juli (8), august (10), september (8) og oktober (1). Fuglene er registrert i perioden 7.5-25.10, og av disse er 51 syngende hanner i perioden 7.5-9.7. Funn (antall individer)

Hauksanger, Sula, Frøya 4. oktober. Hauksangere spiser mye bær på høsten, og de fuglene som dukker opp hos oss, ses derfor ofte i bærbusker. Sammenlignet med en hagesanger, er hauksangeren litt større og har en lenger stjert. Hauksangeren har lyse bremmer på stor- og mellomdekkere og tertiærer, samt gjerne noe mer diffust på skulderfjær og overgump. Flankefjærene er lyse med mørkere bremmer i varierende grad. Dette gir unge hauksangere et karakteristisk skjellete utseende. Foto: Eirik Spets.

foregående år: 2013 (80), 2012 (66), 2011 (72), 2010 (71) og 2009 (76).
Sent høstfunn: 1 ind. rm. Titran, F. 25.10 (MMY, VAK mfl.).

Hagesanger *Sylvia borin*
Tidlige vårfunn: 1 sy. Krokstadøra, Sn. 11.5* (EAR). 1 sy. Karlsenget, Ø. 13.5 (HER).

Munk *Sylvia atricapilla*
Det var en normal vinterforekomst av munk i 2014 med 12 individer. Vinterfunn foregående år: 2013 (18), 2012 (19), 2011 (12), 2010 (4) og 2009 (11). Det ble i 2014 registrert 7 ind. i januar, 1 ind. i februar, 1 ind. i mars og 3 ind. i desember. Kommunefordeling (antall individer): Rissa (3), Or. (2), Tr. (2), Ø. (2), B., Hi. og Malvik. Funnet 9. april i Malivk er nok også en overvintrer. Det neste vårfunnet i fylket kom 22.4, og arten ble regelmessig registert etter den dagen i Sør-Trøndelag.
Vinterfunn: 1 par Brekstad, Ø. 1.-4.1 (PEL, HDA). 1 M Pertrøa, Ri. 1.-21.1 (JBJ, EBJ). 1 F Lysøysundet, B. 11.-20.1 (KKJ). 1 par Slakken, Ri. 12.1 (ARR). 1 M Lade, Tr. 26.1 (SGJ). 1 ind. Naustanbergan, Ma. 8.2 (SFB). 1 F Melandsjø, Hi. 22.3 (ARB, KBE, OSF mfl.). 1 M Nedre Rømmesbakkan, Or. 30.11-24.12 (MMA). 1 M Tiller, Tr. 14.12 (EKR, TKR). 1 F Nedre Rømmesbakkan, Or. 25.12 (MMA).
Tidlig vårfunn: 1 sy. M Ringve, Tr. 9.4 (SFB).

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*
<0,178>
Det ble registrert 21 ind. (19 rm.) i fylket i 2014, alle om høsten på lokaliteter med nettfangst. Forekomsten er sterk og er kun slått av rekordåret 2011. Funn foregående år: 2013 (20), 2012 (9), 2011 (42), 2010 (8) og 2009 (4).
Alle funn: 15 ind. rm. Titran, F. 13.9-4.10* (*MMY, ESP, RES mfl.). 4 ind. (2 rm.) Sula, F. 3.-5.10* (PWB, EKR, AWI mfl.). 2 ind. rm. Merkefeltet, Nes, B. 4.10* (*HER, HDA, TRI mfl.).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*
Hele 17 bøksangere ble registrert på 13 ulike lokaliteter i løpet av året, noe som er ny årsrekord. Arten ble registrert i perioden 10. mai til 1. oktober. Hekkefunn ble konstatert i Femundsmarka på Røros og i Lauglolia i Trondheim. Fuglen som ble ringmerket på Titran 1. oktober, utgjør kun det andre oktober-funnet i fylket, kun slått av et ringmerket individ fra Nes i Bjugn 22. oktober 2006. Antall ind. foregående år: 2013 (2), 2012 (0), 2011 (8), 2010 (13) og 2009 (5).
Vår- og sommerfunn: 1 sy. M Stranda gård, Rovatnet, He. 10.-16.5 (*JOB, HOL). Opptil 3 ind. Austråttlunden, Ø. 23.5-20.6 (AER, EPE, TRI mfl.). 1 sy. M Vulu, Ma. 24.5 (PSH). 1 ind. med reirmateriale Lauglolia, Tr. 1.-7.6 (*THE, MMA, SGJ mfl.). 1 sy. M Haugatjønna, Myrmoen, Rø. 1.6 (MVE). 1 sy. M Trøta, Rø. 8.6 (THK, OJK). 1 sy. M Gjetvollen, Rø. 8.6 (AES). 1 par Karlslyst, Ma. 11.-14.6 (*KAS, PSH, BES). 1 sy. M Skyttholet, Se. 14.6 (JSA). 2 ind. med mat til unger Heggrøstad, Rø. 23.6 (GBA).
Høsttrekk: 1 ind. Vikvarvet, Se. 14.8 (KVO). 1 ind. Sauøya, F. 6.9 (KTH, KBE, BNY mfl.). 1 1K rm. Titran, F. 1.10* (MMY, SPR, TRE).

Gransanger *Phylloscopus collybita*
Ingen vinterfunn foreligger.
Sent høstfunn: 1 ind. rm. Titran, F. 8.11 (TRE, AST, ESÆ mfl.).

Én av de fem dvergfluesnapperne som ble sett denne høsten, fotografert på Sula, Frøya 2. oktober. De hvite sidene på den indre delen av stjerten er et karakteristisk kjennetegn på arten i alle drakter. Foto: Jon Helle.

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*
Tidlige vårfunn: 1 ind. Gjølgalia, B. 21.4 (JSP, EPE). 1 ind. Reppesåsen, Tr. 21.4 (RED). 2 sy. M Vardheifoten, Rusaset, Ø. 24.4 (HER). **Sene høstfunn:** 1 1K Sula, F. 2.10 (EKR, KHE, JHE mfl.). 1 ind. Titran, F. 4.10 (ARB, SPR, OSF mfl.).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*
Sent høstfunn: 1 ind. Titran, F. 2.10 (TRE).

Dvergfluesnapper *Ficedula parva* <0,29>
Det foreligger fire funn av fem individer i Sør-Trøndelag i 2014, og som vanlig er det 1K-individer på Frøya i september-oktober det er snakk om. Observasjonen av to individer i Holmskogen, Titran 1. oktober er uvanlig, kun ved et tidligere tilfelle er to ind. registrert samtidig på en lokalitet i fylket. Det skjedde på Sula 4. oktober 2011. For Gjæsingen var dvergfluesnapper et førstefunn i 2014. Hele 28 av 29 individer i fylket er registrert i Frøya kommune. Av disse er 16 (14 rm.) fra Titran, 10 (4 rm.) fra Sula og så kommer Halten og Gjæsingen med ett funn hver. Det er førstefunnet som skiller seg ut tidsmessig og geografisk; en voksen M som ble funnet død utenfor inngangsdøra til Stephen Barstow på Naustanbergan, Ma. 25.5.1995.
Alle funn: 1 1K M rm. Kjervågsund, Titran, F. 24.9* (*MMY, EBA, ESÆ). 1 1K Sula, F. 30.9-5.10* (ESP, KWO, JHE mfl.). 2 ind. (1 rm.) Titran, F. 1.-4.10* (*SPR, MMY, TRE mfl.). 1 1K Gjæsingen, F. 13.10* (DOB).

Lappmeis *Poecile cinctus*
Det er registrert fem lappmeiser i Sør-Trøndelag i 2014, samtlige funn er fra Femundsmarka i Røros kommune. Funn (ant. ind.) tidligere år: 2013 (10), 2012 (1), 2011 (16), 2010 (20) og 2009 (4).
Alle funn: 2 ind. SV av Gubbtjønna, Rø. 18.3 (EBA). 2 ind. Koltjønna, Rø. 19.3 (EBA). 1 ind. Lortholbua, Rø. 9.8 (OHE, RHA).

Spettmeis *Sitta europaea*
Nevneverdig funn: 1 ind. rm. Titran, F. 3.-4.10 (TRE, SPR, JEL mfl.).

Trekryper *Certhia familiaris*
Nevneverdige funn: 3 ind. rm. Titran, F. 1.-18.10 (TRE, MMY, SPR mfl.). 1 ind. Sula, F. 25.10 (BOT, MAK).

Tornskate *Lanius collurio*
Én tornskate ble registrert i 2014. Antall ind. foregående år: 2013 (2), 2012 (2), 2011 (4), 2010 (2) og 2009 (2).
Alle funn: 1 ad. F Gaulosen, Mh. 14.6* (*THE, ESÆ, BJT mfl.).

Varsler *Lanius excubitor*
Det ble registrert 138 varslere i fylket i 2014, dette inkluderer 3 pulli fra et hekkefunn i Midtre Gauldal. Selv om dette er det eneste konstaterte hekkefunnet, foreligger det en rekke andre observasjoner i hekketid i 2014. Eksempelvis kan nevnes funn av 4 ind. på tre forskjellige lokaliteter i Rissa i juli-august, mest sannsynlig resultatet av flere vellykkede hekkinger. Funn foregående år (antall individer): 2013 (89), 2012 (107), 2011 (162), 2010 (68), 2009 (92) og 2008 (111). Forekomsten ser ut til å følge topper i forekomstene av smågnagere, derav gode smågnager- og varsler-år i 2008, 2011 og 2014. Kun 2011 har en sterkere forekomst av varsler, og det året ble hele ni hekkefunn gjort i fylket. Det ble registrert 65 ind. i første halvår og 73 ind. i andre halvår i 2014.
Månedsfordeling (antall individer): januar (22), februar (11), mars (7), april (7), mai (9), juni (9), juli (11), august (14), september (21), oktober (11), november (11) og desember (5).
Kommunefordeling (antall individer): Rissa (30), Orkdal (11), Trondheim (9), Agdenes (8), Oppdal (8), Bjugn (7), Midtre Gauldal (7), Snillfjord (7), Åfjord (7), Rennebu (6), Frøya (5), Melhus (5), Hemne (4), Hitra (4), Selbu (4), Tydal (4), Holtålen (3), Røros (3), Klæbu (2), Skaun (2), Malvik (1) og Ørland (1). De eneste kommunene uten funn av varsler i 2014 var Meldal, Osen og Roan.

Rødhodevarsler *Lanius senator* NSKF <0,4>
Det fjerde funnet av rødhodevarsler i Sør-Trøndelag kom i form av en 1K-fugl av nominatunderarten i slutten av september. De tre tidligere funnene er 1 1K rm. Titran, Frøya 9.-15.10.2002, 1 1K Sula, Frøya 10.10.2003 og 1 1K Sandbakken, Nes, Bjugn 25.-29.9.2012.
Alle funn: 1 1K Føya, Lauvøya, Å. 22.9-1.10* (*TRØ, SGA, MGA mfl.).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*
Nevneverdige funn: 1 ind. Voll, Re. 25.1 (IBR). 2 ind. Stuggudalen, Ty. 3.2-13.4 (SSL, BEI). 1 ind. Haltdalen kirke, Ho. 5.2 (MRØ). 1 ind. Langset, Md. 17.7 (RPE). 2 ind. Fillvågen, Hi. 5.9 (ARB). 1 ind. Gunnes, Re. 6.9 (ESÆ). 5 ind. Mosjøen, Ty. 10.-13.9 (*TRE, PBU, STS mfl.). 1 ind. Stuggudalen, Ty. 14.-28.9 (SSL, BEI). 1 ind. Stamnan, Re. 16.11 (GBA).

Kaie *Corvus monedula*
Kaie er en regulær hekkefugl i Trondheim og noen av nabokommunene, men hekker også i innlandskommunene Røros, Selbu og Rennebu. Utenfor hekkeområdene var det i 2014 for tredje år på rad en svært god forekomst av kaie i Stadsbygd, Rissa om høsten. Disse dukket opp senhøsten 2013. Interessant nok var det ingen funn av kaie i Rissa høsten 2014.
Funn utenfor hekkeområdene: Opptil 9 ind. Kyrksæterøra, Holla og Likroken, He. 1.1-25.3 (*JOB, HOL, KTO mfl.). Opptil 150 ind. Stadsbygd, Ri. 1.1-19.5 (*JBJ, *EBJ, ECB mfl.). 2 ind. Strømmen, Ri. 1.1 (GNY). Opptil 2 ind. div. lok. Ø. 7.1-18.3 (*HDA, *SME, HER mfl.). 4 ind. Løvøya, Ty. 25.4 (ESÆ). 1 Likroken, He. 11.5 (JOB). 1 ind. Haugen, Op. 11.5 (PWB). 2 ind. Voll, Md. 17.6 (SME). 4 ind. Årnset, Ri. 28.7 (SGA, MGA). 3 ind. Driva, Op. 15.10 (PWB). Opptil 4 ind. div. lok., Ø. 16.10-17.12 (*JSP, MGA, MVE mfl.). 1 ind. Øver Skograndan, He. 23.10 (JOB). 1 ind. Hubakkan, Å. 24.12 (TEH).

Kornkråke *Corvus frugilegus*
Det hekker 100-110 par i Trondheim, noe som er en solid andel av den vesle norske hekkebestanden på 267-294 par (Shimmings & Øien 2015). Kornkråkene i Trondheim er stasjonære, og kun 16 individer ble registrert i fylkets øvrige kommuner i 2014.
Funn utenfor Trondheim kommune: Opptil 4 ind. Stadsbygd, Ri. 1.1-18.5 (*JBJ, *EBJ, NGR mfl.). 2 ind. Midtsandan, Ma. 4.1 (BJT). 1 2K Kyrksæterøra, He. 24.1-23.3 (*HOL, JOB, JVU). 2 ind. Gaulosen, Mh. 24.2 (FRL). 1 ind. ptV Naustanbergan, Ma. 5.4 (SFB). 1 ad. Gjølmesfjæra, Or. 22.-26.4 (*MMA, RES). 1 ind. Vormstad, Or. 2.6 (MMA). 1 ind. Midtsandan, Ma. 20.9 (PSH). 1 ind. Gjølmesfjæra, Or. 1.10 (MMA). 1 1K Vikvarvet, Se. 9.10 (TMØ). 1 ind. Midtsandan, Ma. 20.12 (BJT).

Svartkråke *Corvus corone* <0,3>
Årets fugl ble plukket ut av kråkefelle på Mastad av Martin Pearson både 15. og 17.10. Fuglen ble sluppet fri ved begge anledninger. Dette er tredje funn av arten i fylket. De to første funn var 1 ind. Vikavatnet, Olden, Bjugn 18.4.1999 samt 1 ind. som ble registrert i Ørland de to vintrene 04/05 og 05/06.
Alle funn: 1 ind. Mastad, Fjellværøya og Jektvika, Ansnes, Hi. 15.10-20.12* (MPE, ARB).

Stær *Sturnus vulgaris*
Det er Ørland kommune som skiller seg ut med tanke på overvintrende stær i fylket, og det høyeste antallet vinterstid i 2014 var 1000 ind. Rædergården, Beian, Ø. 8.2 (MMA).

En voksen rosenstær har en umiskjennelig fjærdrakt! Årets eneste funn ble gjort på Rønneberg, Ørland, hvor dette bildet ble tatt 23. juni. Foto: Jan Ove Bratset.

Rosenstær *Pastor roseus* <1,17>
Det ble gjort ett funn av rosenstær i fylket i 2014. Forrige år med funn i fylket var 2013 (1), 2009 (2), 2008 (2), 2007 (1) og 2004 (2). Forrige observasjon av en adult fugl var fra Daløya, Frøya 12.-19.10.2008.
Alle funn: 1 ad. M Rønneberg, Ø. 8.-23.6* (EPE, JSP, SME mfl.).

Pilfink *Passer montanus*
Nevneverdige funn: 2 ind. Ervika, F. 11.1-18.4 (OSF, BST, MMY mfl.). 1 ind. Hestvika, Hi. 2.4 (GRA). 1 ind. Norddyrøya, F. 6.9 (FRL). 1 ind. Hammarvika, F. 8.9 (BST). 1 ind. Sula, F. 30.9 (FSC, TKR, TON mfl.). 1 ind. Sandstad, Hi. 10.10 (ARB). 1 ind. Sørdyrøya, F. 28.-29.10 (RRI).

Bokfink *Fringilla coelebs*
Det ble registrert 380 bokfink vinterstid i Sør-Trøndelag i 2014, av disse er 187 ind. fra januar, 28 ind. fra februar, 93 ind. fra første halvdel av mars og 72 ind. fra desember. Kommunefordeling (antall individer): Trondheim (74), Frøya (52), Rennebu (39), Hemne (34), Melhus (34), Hitra (20), Oppdal (20), Malvik (19), Bjugn (17), Rissa (16), Ørland (13), Snillfjord (12), Orkdal (8), Skaun (7), Meldal (7), Midtre Gauldal (3), Røros (2), Agdenes, Klæbu og Selbu. Av 139 kjønnsbestemte individer var 107 hanner og 32 hunner. Dette gir 77 % andel hanner i vinterforekomsten i 2014. Tilsvarende tall foregående år: 2013 (75 %), 2012 (73 %), 2011 (82 %) og 2010 (82 %).
Nevneverdig innlandsfunn vinter: 2 ind. Vintervollen, Rø. 2.2 (TSA).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*
Det ble registrert gode tall av bjørkefink for fylket å være vinterstid i 2014. Det ble registrert 453 individer, med følgende månedsfordeling: januar (330), februar (71), mars (21) og desember (31). De høye tallene fra desember 2013 (253 ind.) holdt seg inn i januar 2014. Kommunefordeling: Bjugn (111), Ørland (74), Rissa (64), Hemne (53), Frøya (48), Trondheim (32), Hitra (31), Melhus (16), Malvik (7), Oppdal (5), Agdenes (4), Orkdal (4), Midtre Gauldal (2), Selbu og Snillfjord. Forekomsten er den sterkeste siden vinteren 2006/2007, da man kunne påtreffe flokker med tresifrede antall bjørkefinker i fylket.
Innlandsfunn vinter: 1 M Kvellohaugen, Se. 2.1 (JSA). 2 ind. Støren, MG. 29.1 (ERE). **Store antall vinter:** Opptil 75 ind. Ervika, B. 4.1-4.3 (*SME, *GDY, EPE mfl.). 50 ind. Rødsjøseter, Ri. 2.2 (KRØ).

Stillits *Carduelis carduelis*
Det ble registrert 140 stillits i Sør-Trøndelag i 2014, med følgende kommunefordeling (antall individer): Malvik (45), Trondheim (20), Melhus (17), Hitra (15), Rissa (14), Frøya (11), Orkdal (7), Bjugn (5), Selbu (2), Agdenes, Hemne, Klæbu og Ørland. Månedsfordeling (antall individer): januar (62), februar (4), mars (3), april (3), mai (2), oktober (6), november (57) og desember (3). Funn (ant. ind.) foregående år: 2013 (194), 2012 (134), 2011 (145), 2010 (71) og 2009 (28). Den største flokken i 2014 var 40 ind. Midtsandan, Ma. 16.11 (PSH). Nevnes kan også obs. av opptil 15 ind. på de nærliggende fôringsplassene Brubakkhaugen 32, Høyeggen 37 og Gimsvegen 91 nord av Melhus sentrum, Mh. 4.1-10.3 (KAB, ESP, JOM, TSV), samt 15 ind. Melandsjø, Hi. 4.-29.1 (ARB, GRA, KBE).

Tornirisk *Carduelis cannabina*
Det ble en rekordartet forekomst av tornirisk i Sør-Trøndelag i 2014, med hele 237 ind. i perioden 4.4-25.10. Av disse er 183 ind. (77 %) fra Ørland. Funn (ant. ind. fylke/ant. ind. Ørland) foregående år: 2013 (146/121), 2012 (79/59), 2011 (193/166), 2010 (126/117) og 2009 (200/150). Ørland sin prosentvise andel av fylkesforekomsten har i perioden 2008-2014 variert fra 75 % til 93 %. De største enkeltforekomstene i 2014 var 41 ind. Amfiet, Grandefjæra, Ø. 16.9 (HER) og 75 ind. Djupdalen, Ø. 17.9 (SME). Det ble registrert 54 ind. i fylket utenfor Ørland kommune i 2014, med følgende kommunefordeling (antall individer): Bjugn (27), Trondheim (16), Frøya (5), Melhus (4), Rissa og Åfjord.
Funn utenfor Ørland: 1 F Prestgårdshagen, Ri. 13.4 (ORY, ABR). Opptil 2 ind. Valsneset, B. 16.4-1.6 (HER, SME). Opptil 7 ind. Tillermarka, Tr. 21.4-23.8 (EKR, TKR, EBA). 1 sy. Nes, B. 24.4 (JSP, EPE). 3 ind. Tiller, Tr. 4.5 (TKR). Opptil 4 ind. Gaulosen, Mh. 13.5-28.9 (ESÆ, TON, THE). 2 ind. Leangenbukta, Tr. 29.6 (CBE). Opptil 3 ind. Titran, F. 9.8-20.9 (TRE, MMY, EBA mfl.). 2 ind. Ust, Tr. 18.8 (KAS). 2 ind. Nypan-Skjetlein, Tr. 24.8 (TON). 4 ind. Nes, B. 28.8 (SME, HDA). 1 ind. Lauvøya, Å. 23.9 (HDA, GDY, SME). Opptil 2 ind. Sula, F. 3.-5.10 (KWO, TKR, EKR mfl.). Opptil 20 ind. Nes, B. 4.-12.10 (HDA, AER, PEL mfl.).

Bergirisk *Carduelis flavirostris*
Det ble registrert 159 bergirisker vinterstid i 2014, med 122 individer i januar-februar og 37 i desember. I innlandskommunene ble det registrert 250 individer, de aller fleste på trekk i april. Hvorvidt vårfunnene i innlandet tilhører den sparsomme fjellbestanden eller den mer tallrike kystbestanden er uvisst. Månedsfordeling innlandsfunn (antall individer): mars (2), april (221), mai (8), juni (14), juli (3) og august (2). Kommunefordeling innlandsfunn (antall individer): Oppdal (175), Rennebu (70), Tydal (3) og Meldal (2). Det mangler funn av bergirisk i innlandskommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Selbu og Klæbu dette året.
Vinterfunn: Opptil 40 ind. Grilstadfjæra, Tr. 1.1-8.2 (EBA, ØSO, JEL mfl.). 7 ind. Valsneset, B. 1.1 (GDY, SME). Opptil 40 ind. Grandefjæra, Ø. 9.1-23.2 (HER, KKJ, JSØ mfl.). 23 ind. IKEA, Tr. 19.1 (MMY, OHE). 8 ind. Storfosna, Ø. 5.2 (HDA). 1 ind. Midtsandan, Ma. 9.2

(PSH). 3 ind. Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 25 ind. Grandefjæra, Ø. 7.12 (HDA). 12 ind. Ranheimsfjæra, Tr. 25.12 (EBA). **Innlandsfunn fra hekkelokaliteter:** 3 ind. Unndalsvatnet, Op. 29.5 (ØSO, JEL). 2 ind. Slættet, Re. 2.6 (MMA). 3 ind. Vognillan, Op. 9.6 (PWB). 1 par ved reir med unger + 1 ind. Unndalen, Op. 14.6 (MMA, MKL, RES mfl.). 4 ind. Stororkelsjøen, Op. 23.-25.6 (TKO). 1 ind. Grønøysætra, Unndalen, Op. 16.7 (ARB, OSF). 1 ind. Vinstradalen, Op. 25.7 (TAN, TÅS). 1 ind. Syltjønna, Ty. 29.7 (JSA). 1 ind. Resfjellet, Md. 2.8 (FST).

Brunsisik *Carduelis cabaret*
Kun ringmerkede individer presenteres. Det ble ringmerket 21 individer og kontrollert en svenskmerket adult hann i 2014. Dette er et svært lavt antall i forhold til foregående år, men det skyldes i stor grad redusert fangstaktivitet på Nes i Bjugn. Antall ringmerkede individer foregående år: 2013 (59), 2012 (108), 2011 (260), 2010 (217) og 2009 (158). I rekordåret 2006 ble det ringmerket 901 individer i Sør-Trøndelag.
Ringmerkede individer: 8 ind. rm. Titran, F. 10.8-6.10 (TRE, MMY mfl.). 4 ind. rm. Ånegga, Re. 14.9-11.10 (RAA, ØAA). 9 ind. rm. Nes, B. 4.10 (HER, GDY, PEL mfl.). 1 2K+ M med svensk ring kontrollert Nes 4.10 (HER).

Polarsisik *Carduelis hornemanni*
Det er rapportert 54 polarsisik som ikke er bestemt til underart i 2014. Ingen er bestemt til underarten *exilipes*. Underarten *hornemanni* har egen omtale. Funnene i 2014 er utelukkende gjort i årets fire første måneder.
Månedsfordeling (antall individer): januar (14), februar (17), mars (13) og april (10).
Kommunefordeling (antall individer): Trondheim (8), Orkdal (7), Oppdal (5), Agdenes (4), Hemne (4), Midtre Gauldal (3), Rennbu (3), Skaun (3), Ørland (3), Frøya (2), Hitra (2), Meldal (2), Rissa (2), Selbu (2), Snillfjord (2), Bjugn og Malvik.
Funn foregående år (ant. ind. ub. underart + ua. *exilipes*): 2013 (89), 2012 (16), 2011 (36), 2010 (46) og 2009 (56).

Polarsisik *Carduelis hornemanni hornemanni* <0,48>
Det ble registrert 5 individer av polarsisik av underarten *hornemanni* i Sør-Trøndelag i 2014. Funn (ant. ind.) foregående år: 2013 (7), 2012 (3), 2011 (5), 2010 (9) og 2009 (3).
Alle funn: 1 ind. Kråkvåg, Ø. 5.2* (HDA). 4 ind. Linesøya, Å. 28.2* (JHE).

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*
Det ble registrert 32 individer i Sør-Trøndelag i 2014, av disse kun to individer i første halvår.
Kommunefordeling (antall individer): Frøya (17), Åfjord (5), Bjugn (3), Hemne (3), Orkdal, Røros, Trondheim og Ørland. Månedsfordeling: januar (2), august (3), oktober (9), november (17) og desember (1). Funn (ant. ind.) foregående år: 2013 (176), 2012 (19), 2011 (120), 2010 (17) og 2009 (21).
Alle funn: 2 ind. Hammarvika, F. 26.1 (JEE). 1 ind. Ljøsnåvola, Rø. 10.8 (OHE, RHA). 1 ind. Titran, F. 10.8 (ØAA, MMY). 1 ind. Innstrandfjæra, Ø. 31.8 (HDA). 5 ind. Stokkøya, Å. 11.-12.10 (NKG, SGA, MGA). 3 ind. Ervika, B. 28.10 (SME). 1 M Ringve, Tr. 31.10 (VAK). 3 ind. Holladalen, He. 1.11 (JOB). 1 FF Gangåsvatnet, Or. 3.11 (MMA). 9 ind. Titran, F. 8.11 (MMY, TRE, BST mfl.). 3 ind. Titran, F. 9.11 (MMY). 1 M Bua, F. 19.11 (JOB). 1 F Staulan, F. 11.12 (BST). **Tillegg 2013:** Opptil 10 ind. Hammarvika, F. 11.10-12.11.2013* (DRO). Det var fra før rapportert 7 ind. fra Hammarvika i dette tidsrommet. Fylkesårstotalen øker med 3 til 176 ind. i 2013.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Det ble registrert fire rosenfinker i 2014, tre syngende hanner og en 1K-fugl om høsten. Funn foregående år (antall individer): 2013 (2), 2012 (2), 2011 (6), 2010 (9) og 2009 (6).
Alle funn: 1 sy. M Fitjan, Se. 25.-26.5 (TMØ). 1 sy. M Nes, B. 1.6 (HER). 1 sy. 2K M Solem, B. 6.6 (HER). 1 1K rm. Halten, F. 28.8-16.9* (*BST, OSF, TKO mfl.).

Konglebit *Pinicola enucleator*
Det ble registrert 38 konglebit i Sør-Trøndelag i 2014, med følgende månedsfordeling: januar (3), februar (6), mars (6), oktober (3), november (11) og desember (9). Kommunefordeling: Tydal (11), Ørland (9), Trondheim (6), Hemne (4), Holtålen (3), Rennebu (3) og Selbu (2). Funn foregående år: 2013 (86), 2012 (203), 2011 (187), 2010 (533) og 2009 (63). Forekomsten i 2014 er den svakeste siden 2005 (11 ind.).
Alle funn: 3 ind. Haltdalen, Ho. 26.1 (THE). 6 ind. Leangenbukta, Tr. 14.2 (TMH). 3 ind. Nevollen, Ty. 6.3 (ISA). 3 ind. ptØ Slettestjønna, Re. 6.3 (MMA). 3 ind. Græsli, Ty. 31.10 (TMØ). 4 ind. Holladalen, He. 2.11 (JOB). 2 ind. Vassdalen, Se. 5.11 (GBA). 4 ind. Langkåsvollen, Ty. 6.11 (GBA). 1 ind. Nevollen, Ty. 13.11 (ISA). 9 ind. Vestrått, Ø. 11.12 (HDA).

Det finnes ikke stort lysere sisiker enn dette! Polarsisiker av den grønlandske underarten hornemanni *er større og mer langvinget enn vår hjemlige underart. De er brede over nakken og med en karakteristisk lys, gulbeige fargetone på hode og hals. Fuglen er fotografert på Linesøya i Åfjord 28. februar. Foto: Jon Helle.*

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*
Det ble registrert 250 kjernebitere i Sør-Trøndelag i 2014, med følgende kommunefordeling (antall individer): Trondheim (128), Oppdal (30), Melhus (29), Orkdal (11), Rennebu (11), Malvik (9), Snillfjord (8), Skaun (6), Rissa (4), Selbu (4), Hitra (3), Meldal (3), Klæbu (2), Midtre Gauldal og Tydal. Den sterke forekomsten er kun overgått av de to rekordårene i forkant. Funn (ant. ind.) fra foregående år: 2013 (254), 2012 (327), 2011 (150), 2010 (166) og 2009 (158). **Nevneverdige funn:** 1 ind. Holstrøa, MG. 26.1 (AMS). 1 ind. Mosjøen, Ty. 13.9 (AHA, PSH).

Lappspurv *Calcarius lapponicus*
Ingen vinterfunn foreligger i 2014. Fra hekkeområdene foreligger det en rekke funn fra Oppdal, samtlige øst for Drivdalen. **Tidlig vårfunn:** 1 M Strandfjæra, Hi. 27.3 (ARB, GRA). **Funn fra hekkeområdene utenfor Oppdal:** 1 ind. Syltjønna, Ty. 29.7 (JSA).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*
Det ble registrert 358 snøspurver vinterstid i 2014, med følgende månedsfordeling: januar (230), februar (12) og desember (116). Som vanlig er de største flokkene i Ørland kommune.

Tabell 5 *Forkortelser for observatører.*

Observatører

AAS	Aage Storsve	FFA	Frode Falkenberg	KNI	Knut Nilsen	RFR	Robert Fredagsvik
ABR	Alfred Brødreskift	FHO	Finn Hoff	KOH	Karl Otto Horrigmo	RHA	Ragnhild Hannaas
ABS	Anders Braut Simonsen	FRL	Frank Robert Lyngvær	KRØ	Kari Rødsjøsæter	RJA	Runar Jacobsson
ABT	Arne Bretten	FSC	Fredrik Schevig	KSC	Kjetil Schjølberg	RLE	Raymond Lervik
ABY	Arne Bysveen	FST	Frode Steffensen	KSJ	Kristin Sjøvold	RPE	Roar Pettersen
AER	Audun Eriksen	GAR	Gunnar Arntzen	KSÆ	Kjell Sæther	RRI	Ranveig Riiber
AES	Arild Espelien	GAS	Gunnar Aadne Solbakken	KTH	Karl Thorvaldsen	RSA	Rolf Sandven
AHA	Anders Hangård	GBA	Georg Bangjord	KTO	Knut Totland	RUH	Rune Haugen
AJM	Arne J. Mortensen	GBO	Gøran Bolme	KVO	Kari Viken Olsen	RWA	Rigmor Wang
ALI	Arild Lindgaard	GDY	Gunnar Dybvik	KWO	Kjell Jostein Woldvik	SBA	Sigurd Bangjord
ALO	Aida Lopez	GGU	Gunnar Gundersen	LHE	Lillian Hegseth	SBS	Sissel Bjørstad Skille
ALY	Arnold Lysfjord	GME	Geir Melum	LNO	Lorentz Noteng	SFB	Stephen F. Barstow
AMS	Anne Margrethe Sveian	GNY	Gunn Nyborg	LNV	Liv Elin Nesset Vikestad	SGA	Stig Gaarden
ANS	Andreas Søraker	GOH	Geir Otto Holmås	LSL	Lars Slettom	SGJ	Svein Gjelle
APE	Anna Peman	GOL	Geir Ove Lyngvær	MAK	Magne Klann	SHE	Sturla Hernes
ARB	Arvid Bredesen	GRA	Gøran Rabben	MAU	Martin Austad	SME	Svein Melum
ARE	Arvid Espen	GST	Gunnar Stenhaug	MGA	Mari Gaarden	SPR	Ståle Prestøy
ARR	Arne Reitan	HBR	Hans Brede	MHE	Morten Hegge	SSL	Sigrid Slungaard
AST	Arnt Stavne	HDA	Harald Dahlby	MHO	Marit Hoff	SSO	Sissel Soelberg
AWI	Andreas Winnem	HEG	Håvard Eggen	MHR	Martin Hagen Ring	SSÆ	Stian Sæther
AWR	Are Wedø Rabben	HER	Hans Einar Ring	MKL	Magnar Klingan	SPE	Steinar Pettersen
BAT	Beate Aas Thesen	HIK	Hans Iver Kojedal	MMA	Morten Martinsen	SWA	Stig Wahlberg
BBR	Bård Bredesen	HKW	Hans Kristian Werkland	MMY	Magne Myklebust	TAN	Tormod Andersen
BEB	Brit Eldrid Barstad	HLL	Håkon Lasse Leira	MPE	Martin Pearson	TAS	Tove Aspaas
BEI	Bjørn Eide	HOL	Hans Olsvik	MRE	Morten Ree	TBJ	Terje Bjerkan
BES	Beata Elisabeth B. Solbakken	HRØ	Håvard Rønning	MRØ	Marit Hegseth Rønning	TBO	Tor Bollingmo
BGS	Bård Gunnar Stokke	HTH	Helge Thun	MVA	Morten Vang	TBR	Tord Bretten
BJT	Bjørn S. Tanem	IBR	Ingvild Brevik	MVE	Morten Venås	TEH	Terje Haltstrand
BMU	Bjørn Malvin Uthus	IHA	Inge Hafstad	NGR	Norvald Grønning	TGI	Terje Gimnes
BNY	Bård Nyberg	IHE	Ivar Herfindal	NKG	Nils Kristian Grønvik	THA	Trond Haugskott
BOT	Bjørn Olav Tveit	IRØ	Ingolf Røtvei	NN	Ukjent observatør	THE	Trond Hervik
BST	Bjørg Støen	ISA	Ingebrigt Saxe Aasen	NOS	Nils Olav Siraas	THK	Torbjørn Horsberg Kornstad
BSÆ	Bernt-Erik Sæther	IST	Ingvar Stenberg	NVA	Nils Valland	TKO	Terje Kolaas
CBE	Claus Bech	JBJ	Jakob Bjørgan	OAF	Ole Andreas Forseth	TKR	Torgeir Krokan
DBS	Dagfinn Breivik Skomsø	JEA	Jan Erik Asphaug	OAI	Odd Arne Indset	TKV	Thomas Kvalnes
DOB	Dag Olav Bollingmo	JEE	Jan-Egil Eilertsen	OFR	Otto Frengen	TMH	Tor Magnus Hansen
DRO	David Robertsen	JEI	Johan Eilertsen	OHE	Oddvar Heggøy	TMO	Torstein Mostad
EAR	Elias A. Ryberg	JEL	Jan Egil Larsen	OHO	Olav Hovlandsvåg	TMY	Torstein Myhre
EBA	Erik Bangjord	JGL	Joakim Gulbrandsen Lein	OJK	Ole-Jakob Kvalshaug	TMØ	Torgeir Møst
EBJ	Elsa Bjørgan	JHE	Jon Helle	OKL	Oddmund Kleven	TON	Terje O. Nordvik
EBR	Erlend Bredesen	JLU	Jostein Lunden	ONO	Ola Nordsteien	TRE	Tore Reinsborg
ECB	Ebbe Carsten Brødreskift	JOB	Jan Ove Bratset	ORD	Ole Roar Davidsen	TRI	Torgeir Ring
EDE	Even Dehli	JOM	Jon Olav Martinsen	ORE	Odd Rune Einmo	TRØ	Tom Roger Østerås
EDY	Edvin Dybvik	JRO	Jan Rosberg	ORY	Odd Rygh	TSA	Torill Sandkjernan
EGR	Endre Grønvik	JSA	Jostein Sandvik	ORØ	Ole Rønningen	TST	Torill Stubberud
EIG	Eirik Grønningsæter	JSP	Jon Sigmund Pettersen	OSF	Oskar Sigurd Fredagsvik	TSV	Tore Staverløkk
EKL	Elisabeth Klingsheim	JST	Jan Strand	OTH	Oscar Thesen	TTH	Thorleif Thorsen
EKO	Einar Kongshaug	JSØ	Jørgen Søraker	PBU	Per Buertange	TÅS	Turid Åsenden
EKR	Emil Krokan	JVU	Jørulf Vullum	PEI	Petter Iversen	VAK	Vegard Aksnes
ELI	Eirik Lie	JØB	John Øystein Berg	PEL	Per Erik Lyngstad	VEH	Vegard Erik Hansen
EPE	Edith Pettersen	KAB	Kjell André Brevik	PJS	Peter Johan Schei	ØAA	Øyvind Aas
ERE	Eva Ressem	KAS	Kjetil Aadne Solbakken	POS	Per Ole Syvertsen	ØAS	Øyvind Aasegg
ESP	Eirik Spets	KAT	Kristin Alice Teksdal	PSH	Paul Shimmings	ØHE	Øystein Hegge
ESU	Edgar Sumstad	KBE	Kolbjørn Bekkvik	PSR	Peter Sjolte Ranke	ØJS	Ørjan Soelberg
ESÆ	Einar Sæter	KHE	Knut Hellandsjø	PWB	Per Willy Bøe	ØSO	Øyvind Soelberg
ETH	Edvin Thesen	KIS	Kjell Isaksen	RAA	Roald Aas	ÅLO	Åsmund Loe
EVI	Erling Vikan	KKJ	Kjartan Kjøsnes	RDA	Roy Dahlen		
EWE	Egil Ween	KKR	Kjetil Kroksæter	RED	Ruben Edna		
EYD	Erik Ydse	KLA	Kjell Larssen	RES	Roger Espen		

Vinterfunn: Opptil 230 ind. Grandefjæra til Garten, Ø. 4.1-12.2 (*PEL, *HDA, EBA mfl.). 11 ind. Tårnesodden, Å. 18.2 (ORY). 1 ind. Nordmyra, Tr. 20.2 (TKR). Opptil 100 ind. Grandefjæra, Ø. 4.-27.12 (HLL, HDA, SME mfl.). 1 ind. Fjellværsøya, Hi. 20.12 (ARB). 1 ind. Grilstadfjæra, Tr. 20.12 (BJT). 4 ind. Grønningsbukta, Ri. 21.12 (NGR). 4 ind. Tårnesodden, Å. 26.12 (SGA, MGA). 6 ind. Valsneset, B. 30.12 (IHE, KAT).

Dvergspurv *Emberiza pusilla* <1,34>
Det ble registrert to individer i fylket i 2014. Forekomst, tidspunkt og lokalitet er helt typisk. Funn foregående år (ant. ind.): 2013 (2), 2012 (1), 2011 (4), 2010 (0) og 2009 (0).
Alle funn: 1 1K rm. Titran, F. 23.-25.9* (*MMY, ESÆ). 1 1K rm. Sula, F. 3.-4.10* (EKR, TKR, TON mfl.).

Litteratur

Heggøy, O. og Olsen, T.A. 2015. Sjeldne fugler i Norge i 2011 og 2012. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). *Fugleåret* 2: 4-89.

Hellquist, A. 2006. Bestämning av isländsk rödspov. *Vår Fågelvärld* 65 (3): 30-39.

Newson, S.E., Hughes, B., Russell, I.C., Ekins, G.R. og Sellers, R.M. 2004. Subspecific differentiation and distribution of Great Cormorants *Phalacrocorax carbo* in Europe. *Ardea* 92 (1): 3-9.

Shimmings, P. og Øien, I.J. 2015. Bestandsestimater for norske hekkefugler. *NOF-rapport* 2015-2. 268 s.

Winnem, A. 2015. Kuhegre - ny art for Sør-Trøndelag! *Trøndersk Natur* 42 (1): 42-43.

Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. og Solbakken, K.Aa. 2010. Fugler i Sør-Trøndelag 2009. *Trøndersk Natur* 37 (2): 15-38.

Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. og Solbakken, K.Aa. 2012. Fugler i Sør-Trøndelag 2010. *Trøndersk Natur* 39 (1): 15-40.

Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. og Solbakken, K.Aa. 2013. Fugler i Sør-Trøndelag 2011. *Trøndersk Natur* 40 (1): 10-40.

Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. og Solbakken, K.Aa. 2014. Fugler i Sør-Trøndelag 2012. *Trøndersk Natur* 41 (1): 16-45.

Winnem, A., Myklebust, M., Sæter, E. og Solbakken, K.Aa. 2015. Fugler i Sør-Trøndelag 2013. *Trøndersk Natur* 42 (1): 14-41.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

NOF er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Foreningen har fylkesavdelinger i alle fylker og rundt 50 lokallag. NOF fungerer som et bindeledd mellom fugleinteresserte i hele landet og gjør et omfattende arbeid med natur- og fuglevern. Blant annet gjennom å skape og spre kunnskap om fugl og natur.

Sekretariatet

Sekretariatet sørger for den daglige driften av foreningen fra hovedkontoret i Trondheim.

Kontakt

Sandgata 30 B
7012 Trondheim
nof@birdlife.no
Nettside: birdlife.no
Facebook: fb.com/fuglevern

Tidsskrifter

NOF sentralt utgir tidsskriftene Vår Fuglefauna, Fuglevennen og Fugleåret.

Medlemsskap

Et seniormedlemskap i NOF koster fra kr. 150 og oppover avhengig av hvilke tidsskrifter som ønskes. Juniorer (under 18) betaler halv pris. I tillegg tilbys lokale tillegg med fylkesvise tidsskrifter. De lokale tilleggene er hhv. 100 og 150 kr i Sør- og Nord-Trøndelag. Som medlem i NOF inviteres du med på en rekke aktiviteter i ditt nærområde.

Internasjonalt samarbeid

NOF er partner av BirdLife International; en paraplyorganisasjon for verdens fuglevernorganisasjoner.

NOF avdeling Sør-Trøndelag

NOF avdeling Sør-Trøndelag har fem lokallag og ble stiftet våren 1958.

Styret

Thomas Kvalnes | Leder
Morten Martinsen | Kasserer
Arnt Stavne | Styremedlem
Bjørn-Steinar Tanem | Styremedlem
Vegard Aksnes | Styremedlem

Kontakt

Postboks 139
7401 Trondheim
sor-trondelag@birdlife.no
Nettside: birdlife.no/sor-trondelag
Facebook: fb.com/nof.sortrondelag

NOF Fosen lokallag

Leder: Jørgen Søraker
jssbirdman@live.no
Tlf: 954 10 119

NOF Hemne lokallag

Leder: Knut Totland
knut@hemne.as
Tlf: 944 70 485

NOF Hitra-Frøya lokallag

Leder: Karl Thorvaldsen
karl.thorvaldsen@stfk.no
Tlf: 948 67 665

NOF Orkla lokallag

Leder: Magnar Klingan
mag-klin@online.no
Tlf: 996 34 724

NOF Trondheim lokallag

Leder: Andreas Winnem
andreas.winnem@gmail.com
Tlf: 970 42 313

LRSK Sør-Trøndelag

Andreas Winnem (*sekretær*, andreas.winnem@gmail.com), Kjetil Solbakken, Magne Myklebust, Øyvind Aas og Einar Sæter.

NOF avdeling Nord-Trøndelag

NOF avdeling Nord-Trøndelag har tre aktive lokallag.

Styret

Kjell Thore Leinhardt | Leder
Kåre Haugan | Nestleder/sekretær
John Haugen | Kasserer
Arnold Lysfjord | Styremedlem
Torstein Myhre | Styremedlem
Arnold Lorentsen | Varamedlem
Henry Skevik | Varamedlem

Kontakt

Postboks 68
7501 Stjørdal
nord-trondelag@birdlife.no
Nettside: birdlife.no/nord-trondelag

NOF Namdal lokallag

Leder: Håvard Johnsen
havard.johnsen@gmail.com
Tlf: 906 40 512

NOF Sjørdal lokallag

Leder: Per Inge Værnesbranden
naturobservatoren@gmail.com
Tlf: 456 19 219

NOF Verdal og Levanger lokallag

Leder: Arnstein Indahl
ain@nofnt.no
Tlf: 958 08 287

LRSK Nord-Trøndelag

Per Inge Værnesbranden (*sekretær*, naturobservatøren@gmail.com), Tore Reinsborg, Trond Sørhuus, Bård Nyberg og Terje Kolaas.

Returadresse:
Trøndersk Natur
c\o NOF avd. Sør Trøndelag
Postboks 139
7401 Trondheim