



Skjeand hann, Hadsel. Foto: John Stenersen

23 Snadderand *Mareca strepera*

De fleste år rapporteres under tretti funn av snadderand fra Nordland. Bare et fåtall hekkefunn er kjent i fylket:

1 F med 4 unger i ei tjønn på Værøy 16.-17.7. 1980 (Fjeldså, 1982).

Hekkefuglatlasen nevner to hekkefunn fra Sortland i 1984 og 85, og ett fra Værøy i 1989.

1 F med halv voksne unger Sveavatnet, Vega 17.7 2002.

1 par med 3 ikke flygedyktige unger Vannbassenget Røst, 25.6 2008.

1 F med minst 1 unge Rognan, Sortland 1.7 2017, og 1 F med 4 unger samme sted 22.7 2019.

1 par med 8 unger Ostjønnå, Alstahaug 23.7-27.8 2017. Sistnevnte dato var det 6 F-fargede ind. i Ostjønnå.

1 F med 3 unger Åholmen naturreservat, Andøy 11.7 2020.

Observasjoner fra hekketid finnes fra egnede lokaliteter spredt i fylket, med tyngdepunkter i Lofoten/Vesterålen og på kysten av Sør-Helgeland. Trekkfugl, overvintrer hovedsakelig rundt Svartehavet til Middelhavet, og i Afrika. Om våren dukker gjerne de første opp i Nordland i midten av april. Høsttrekket er i gang allerede i juli, men etternølere ses ofte inntil utgangen av september. Det hender at enkeltfugler holder seg i Nordland utover mot jul, men mangel på funn fra perioden januar-mars kan tyde på at overvintringsforsøkene ikke lykkes spesielt godt. Samtlige kjente vinterfunn:

1 M Tverlandet, Bodø 9.12 1995.

1 M Ystneset, Røst «august - slutten av året» 2004.

1 F-farget Storvatnet, Herøy 17.12 2011-2.1 2012.

1 F-farget ved fylling Nesna havn, 2.10 2016-2.1 2017.

1 M Gravdal, Vestvågøy 28.11-1.12 2020

24 Brunnakke *Mareca penelope*

Nord-Norge har brorparten av den norske hekkebestanden, og brunnakken oppleves også som svært vanlig, spesielt om våren når man kan se flokker i høvelige fjærområder før de sprer seg for å hekke. Hekkefunn finnes over praktisk talt hele fylket, og den virker ikke spesielt kresen på hekkelokaliteter.

Trekkfugl som overvintrer i Vest-Europa. De tidligste dukker opp i Nordland i slutten av mars eller begynnelsen av april, og de fleste forlater fylket i løpet av oktober eller første halvpart av november. Hvert år rapporteres overvintrende individer og/eller småflokker fra kyststrøkene i Nordland.

En brunnakke ringmerket ved Myvatn på Island i 2.8 1930 ble gjenfunnet ved Fustvatnet, Vefsn 15.5 1933.

25 Amerikablesand *Mareca americana*

Nord-Amerika, overvintrer sør til Sentral-Amerika. 75 funn i Norge, fire funn i Nordland:

1 F Storeidvatnet, Vestvågøy 28.6-12.7 2016 og trolig samme ind. samme sted 14.7-14.8 2017

1 2K M Saltisen, Vestvågøy 27.4-3.5 2018

1 M Ilstadjæra, Bodø 9.5 2018

1 ad. M Røstlandet, Røst 29.5-8.6 2019



Amerikablesand hann, Røst 2019. Foto: Steve Baines