

Vår Fuglefauna

Årg. 13

1990

Nr. 3



Rune Roalkvam 1990

Sjeldne fugler i Norge i 1988

Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF

PER-GÖRAN BENTZ og ANDREW W. CLARKE



I 1988 ble kuhegre observert i Norge for første gang. Arten har en vid hekkeutbredelse i Sør- og Sørøst-Asia. De nærmeste hekkeområdene til Norge finnes i langt sør i Europa, eksempelvis Sørvest-Spania. Intet tyder på at denne fuglen er en rømt parkfugl, og da har den virkelig forvillet seg langt fra sine vanlige områder. Den ble observert ved Skoganvarre, Finnmark i august 1988. Foto: Anthon Sivertsen.

NSKF har i løpet av det siste virksomhetsåret behandlet 212 sjeldnetssaker. Av disse dreide 136 seg om observasjoner gjort i 1988, mens 76 var eldre saker. I denne rapporten har sjeldenhetskomitéen valgt å presentere 1988-sakene og de eldre observasjonene sammen.

Av samtlige behandlede saker ble 129 (60,9%) godkjent. Fem av disse dreide seg om arter som er plassert på B-listen, nemlig Flamingo *Phoenicopterus ruber roseus*, Mandarinand *Aix galericulata*, Balkanhøne *Alectoris chukar*, Lazulifink *Passerina amoena* og Pavefink *Passerina ciris*.

44 (20,7%) observasjoner kunne ikke godkjennes av NSKF. En av disse, en eldre sak, en mulig Langnebbpiplerke *Anthus similis* på Mølen i 1977 ble avsluttet, dessverre uløst.

39 (18,4%) saker er fortsatt under behandling. Av disse er 19 observasjoner gjort i 1988, mens 20 er eldre saker. Fire av disse sakene, nemlig tre observasjoner av

Sørjo *Catharacta maccormicki* og en Smalnebbspove *Numenius tenuirostris*, er sendt for konsultasjon til utlandet. Dessuten har NSKF vurdert 15 konsultasjonsaker fra de lokale rapportkomitéene (LRSK).

Hekking av Svartglente *Milvus migrans* på Lista i 1963, ble tatt opp til ny vurdering. NSKF mener hekkefunnet ikke kan godkjennes.

Nye arter for Norge

Totalt ble 5 nye arter for landet rapportert til NSKF i løpet av det siste året, nemlig Kuhegre *Bubulcus ibis*, Pygmé-snipe *Calidris minutilla*, Flekkdverglerke *Calandrella rufescens*, Blekspottesanger *Hippolais pallida* og Middelhavsspurv *Passer hispaniolensis*. Ved utgangen av 1988 var antallet observerte arter i Norge dermed kommet opp i 446 (A-listen).

NSKF's A-liste

Fra 1. januar 1989 skal observasjoner av Stork *Ciconia ciconia*, Lappsanger *Phylloscopus borealis* og Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus* rapporteres til NSKF. Disse artene er nå inkludert i listen *Hvilke arter/ underarter skal rapporteres til NSKF?* (som finnes lenger ute i rapporten). Stork og Fuglekongesanger har vært på NSKF-listen fram til 1984. Vi ønsker nå å få rapportert observasjoner av disse to artene fra perioden de har manglet på listen (1. januar 1985 til 31. desember 1988). Observasjoner av disse to artene og Lappsanger er så få her i landet, og NSKF ønsker derfor å dokumentere forekomsten i Norge på samme måte som i andre europeiske land.

Fra 1. januar 1989 skal hekkfunn av Dverggås *Anser erythropus* og observasjoner av Gråsisik underart *Carduelis flammea cabaret* ikke vurderes av NSKF. De er nå fjernet fra ovennevnte liste. Disse to arter skal imidlertid fremdeles innrapporteres til LRSK.

Innleveringsfrist av sjeldenhetssaker

NSKF har i samarbeid med LRSK og NOF's styre besluttet å prøve en ordning med innleveringsfrist av sjeldenhetsrapporter til NSKF. Dette vil gjøre det mulig å få presentert sjeldenhetsrapporten i Vår Fuglefauna nr. 3 hvert år. Innrapporteringsfristen for observasjoner til

Samme kuhegre som er avbildet på siden foran. Foto: Anthon Sivertsen.



NSKF, som ønskes publisert i førstkommande sjeldenhetsrapport, er satt til **1. september** året etter observasjonsåret. Men husk at rapporten skal sendes via LRSK, som trenger litt tid til å registrere observasjonen før den sendes videre til NSKF.

Råd til rapportørene

NSKF vil gjerne gjenta oppfordringene til rapportørene fra forrige sjeldenhetsrapport: Observatører av arter/ underarter som er ført opp på listen eller nye arter/ underarter for landet, bes sende utførlig beskrivelse av fuglen/e til den lokale rapportkomitéen (aktuelle adresser et annet sted i rapporten). Rapportér også funnsted (husk kommunenavn!), funndato og medobservatører! Vedlegg også eventuelle fotografier av den observerte fuglen! Selv dårlige, uskarpe og feileksponerte bilder kan være til stor hjelp ved bedømmelse av observasjonen.

NSKF's sammensetning

NSKF har hatt følgende sammensetning det siste året: Terje Axelsen, Per-Göran Bentz (sekretær), Tore Berg, Rune G. Bosy, Jan Ove Gjershaug og Gunnar Numme. Rune ble NSKF-medlem etter årsmøtet 1989 og erstatter Rolf E. Hansen som vi takker for god innsats. Etter 15 år som NSKF-medlem, trekker Per-Göran Bentz seg nå for å konsentrere seg om arbeidet som redaktør for tidsskriftet *Fauna*. En stor takk til ham for innsatsen i disse årene. Andrew W. Clarke som har fungert som internasjonal sekretær det siste året, overtar nå som sekretær.

Komiteén har hatt to medlemsmøter i 1990; i Stokke i januar og på Revtangen i juni.

NSKF's adresse

I forbindelse med at den nye sekretæren tar over, har NSKF skaffet seg en ny postboksadresse. All korrespondanse og beskrivelser av sjeldenheter sendes nå til:
NSKF, postboks 228, 3191 Horten.

Godkjente observasjoner *Accepted records*

Den systematiske rekkefølgen og artenes vitenskapelige navn er etter K.H. Voous — *List of recent holarctic bird species* (1980).

H angir hekking

* angir at belegg foreligger

M er forkortelse for hann (Maskulin *Male*)

F er forkortelse for hunn (Feminin *Female*)

Aldersangivelsen baserer seg på inndelingen i kalenderår (1K, 1K+, 2K, 2K+ osv.), men i unntakstilfeller brukes *pull*, *juv*, *subad* og *ad*:

pull er forkortelse for pullus, dvs. en reirunge eller en ikke flygedyktig unge som fortsatt er avhengig av foreldrefuglen/e.

juv er forkortelse for juvenil, dvs. en flygedyktig ungfugl i sin første komplette fjærdrakt.

subad er forkortelse for subadult, dvs. en fullvoksen fugl som ikke lenger har sin juvenile fjærdrakt, men ennå ikke er utfarget (den har ikke fått sin endelige fjærdrakt) *ad* er forkortelse for adult, dvs. en voksen (gammel) og kjønnsmoden fugl i sin endelige fjærdrakt (kan være sommer- eller vinterdrakt).

Hvis ikke annet angis, er 1 ind. observert og teller som 1 funn. Hvorvidt det dreier seg om ett eller flere funn, er ofte vanskelig å fastslå, men NSKF's vurdering angis slik:

"Mulig samme fugl/er" — (teller som forskjellige funn)

"Trolig samme fugl/er" — (teller som ett funn)

"Samme fugl/er", hvor beleggene er entydige — (teller som ett funn)

Samme fremgangsmåte gjelder for funn av samme art sett på samme lokalitet, men til forskjellige tidspunkt, inkludert fugler som forekommer årlig på samme sted eller nærliggende lokaliteter. Ved observasjoner av flere enn ett individ på samme eller nærliggende lokaliteter ønsker NSKF belegg for at mer enn ett funn skal bli registrert.

Etter hver arts/underarts vitenskapelige navn står to tall. Det første angir antall kjente funn i Norge t.o.m. 1987, det andre antall funn i Norge i 1988.

Ubest. albatross *Diomedea* sp
1988 Rogaland: 9.10. 1K+ Utsira (M. Klann).

Havlire *Puffinus puffinus*
1977 Vestfold: 1.5. Store Færder, Tjøme (J. Martinsen, T.A. Hauer). Denne arten var på NSKF's liste frem t.o.m. 1980.


Storskarv, u.a. *Phalacrocorax carbo sinensis* (Mellomskarv) 3 - 1
1987 Buskerud: 1.5. 2K+ Fiskumvannet og Vestfoss-elva, Øvre Eiker (V. Hansen, A. Hals).
1988 Telemark: 4.4. 18 ind. (2K+) Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen m.fl.).

Fuglene som ble observert ved de to tilfellene viste samtlige karakterene til underarten *Ph. c. sinensis*, som bl.a. hekker i Danmark og Sør-Sverige. Underarten har i de senere år utvidet sitt hekkeområde i Sør- og Midt-Sverige (Tyrberg 1988, Staav 1989). En nyetablert koloni på 20-30 par finnes i Vänerm (Roland Staav pers. medd.), altså i et område hvor det finnes flere gjenfunn av ringmerkete nordnorske hekkefugler av nominatformen *Ph. c. carbo*. De to underartene kommer således i kontakt med hverandre, og dette kan tenkes å påvirke spredningen av underarten *Ph. c. sinensis* nordover. Den vil trolig bli å se i større antall i Norge i årene fremover.

Rørdrum *Botaurus stellaris* 41 - 2
1987 Møre og Romsdal: 4.4.* 2K+ Bruhagen, Averøy (K. Midtflø).
1988 Buskerud: 31.10. 1K+ Drammenselva ved Eiker stua, Øvre Eiker (T. Schandy).
1988 Rogaland: 20.4. 2K+ Lomeland, Eigersund (J. Grønning).

Natthege *Nycticorax nycticorax* 8 - 1
1988 Vest-Agder: 31.5.* 3K Jåbekkvann, Mandal (R. Jåbekk, I. Flesjå).

Kuhegre *Bubulcus ibis* 0 - 1
1988 Finnmark: august* 2K+ Skoganvarre Turistsenter, Skoganvarre (A. Sivertsen).



Det foreligger etter hvert en del funn av ringand i Norge. Dette er det 21. i rekken, en 2K+ hunn ved Store Rensvikvann, Frei i Møre og Romsdal høsten 1987. Foto: Jørn Roger Gustad.

Dette er en ny art for landet. Den hekker spredt i de sørvestlige og sørøstlige delene av Europa. Arten har videre en omfattende utbredelse i Sør- og Sørøst-Asia opp til det sørlige Japan. Den hekker også spredt i deler av Afrika og Australia, og begynte tidlig i dette århundre å kolonisere Amerika. Arten er delvis trekkfugl og blir regelmessig observert i Storbritannia (Dymond 1989). Flere funn av arten i Sverige og Danmark har med stor sannsynlighet dreiet seg om rømte fangenskapsfugler. Det var først sommeren 1987 at en vill fugl ble registrert i Sverige. Den ble funnet død i Uppsala, nord for Stockholm, og var ringmerket som reirunge nær Cadiz i Sør-Spania 1986 (Stolt 1988). Fuglen i Finnmark blir plassert på A-listen, siden ikke noe tyder på at funnet ikke skulle være spontant.

Egretthegre *Egretta alba* 22 - 4

- 1987 Buskerud: 2.6. 2K+ Fiskumvannet og Måsnesmyra, Øvre Eiker (A. Hals). Muligvis ble samme fuglen sett senere samme dagen ved Gjennestad vannet, Stokke, Vestfold. Se NSKF-rapport for 1987 (Bentz 1989).
- 1988 Østfold: 18.6.* 2K+ Skinnerflo, Råde (E. Sandersen, T. Sørлие).
- 1988 Vest-Agder: 22.4. 2K+ Slevdalsvann, Farsund (K. Olsen).
- 1988 Rogaland: 18.7. 1K+ Orrevatn, Klepp (M. Kersbergen).
- 1988 Nordland: 28.-30.5.* 2K+ Eidet, Bø (B.H. Stephansen). 1.-4.6. 2K+ Kringelvatnet, Eidet i Vålen, Bø (B. H. Stephansen). De to observasjonene i Nordland dreier seg trolig om den samme fuglen.

Flamingo, u.a. *Phoenicopterus ruber roseus*

- 1988 Østfold: 7.-24.6.* 3K+ Rosnesstranda, Kurefjorden, Rygge (R. Wiggen, L. Fløseth, E.S. Hansen).
- 1988 Vestfold: 2. og 6.6.* 2K+ Hummerbakken og Mølen, Larvik (G. Klaveness, G. Numme, H. Heggland m.fl.). Dette dreier seg trolig om den samme fuglen, og funnet plasseres på B-listen.

Dverggås *H Anser erythropus*

- 1988 Nordland: 6.8. 1 par m. 5 juv. Flere detaljer holdes tilbake p.g.a. artens truede situasjon i Norge og det øvrige Skandinavia.

Rustand *Tadorna ferruginea* 35 - 1

- 1988 Nordland: 15.8. 1K+ Røstlandet, Røst (S. Baines).

Mandarinand *Aix galericulata*

- 1978 Sogn og Fjordane: april-mai* 2K+ M Fjærlandsfjorden (S. Eidsnes). Trolig en rømt parkfugl, og funnet plasseres derfor på B-listen.

Ringand *Aythya collaris* 21 - 0

- 1987 Møre og Romsdal: 2.10.-21.11.* 2K+ F Store Rensviksvann, Rensvik, Frei (J.R. Gustad, J.T. Gustad m.fl.).

Islandsand *Bucephala islandica* 4 - 0

- 1986 Sør-Trøndelag: 26. og 28.12.* 2K+ M Buvika (P.O. Syvertsen, Ø. Syvertsen, M. Bilet).
- 1987 Nord-Trøndelag: 5.-8.5. 2K+ M Stjørdalselva ved Hell, Stjørdal (T.R. Østerås, K.A. Aune m.fl.). 28.5. 2K+ M Utløpet av Figga, Steinkjer (K.A. Aune, P.I. Værnesbranden, O.M. Laugtug, T. Kristoffersen).

Observasjonene i Nord-Trøndelag er trolig av den samme fuglen. Observasjonen i Sør-Trøndelag er trolig av samme fuglen som ble sett på samme sted 22.12. 1986 (Bentz 1988).

Stivhaleand *Oxyura jamaicensis* 2 - 2

- 1988 Buskerud: 30.10. 2K+ M (3 ind.) og 1K+ F Mølen, Hurum (T. Jensen, F.O. Jensen).
- 1988 Nordland: 16.-21.5. 2K+ M (2 ind.) Engasjyen, Rana (A. Engås m.fl.).

Svartglente *Milvus migrans* 24 - 1


- 1987 Vestfold: 29.5. 2K Mølen, Larvik (B.O. Tveit, B.I. Balto).
- 1988 Vest-Agder: 18.-19.4. 2K+ Launes, Hidra, Flekkefjord (P.Ø. Grimsby).

Glente *Milvus milvus* 37 (etter århundreskiftet) - 4

- 1988 Østfold: 20.2. 2K+ Kloppa, Torsnes, Borge (S. Engebretsen, A. Larsen). Mars 2K+ Halmstad, Rygge (Å. Fjellbakk).
- 1988 Rogaland: 9.4. 2K+ Hellvik, Eigersund (A. Hadland, N.N. Larsen).
- 1988 Hordaland: 10.7. 1K+ (2 ind.) Vestvik, Sveio (F. Nilsen).



Det ble sett fem nye fuglearter i Norge i 1988. Her er en av dem — ei pygmésnipe, ved Varanki, Nesseby, Finnmark 09.06.1988. Foto: Markku Saarinen.



En av de tre godkjente observasjonene av rosenstær i Norge i 1988. Fuglen er i sitt første kalenderår, og ble observert på Utsira, Rogaland i perioden 03.-10.10.1988. Foto: H. Hegglund.

Ubest. glente *Milvus sp*

- 1988 Østfold: 21.2. 2K+ Nesparken, Borge (E.S. Hansen). Medio august 1K+ Selbak, Borge (S. Engebretsen).
 1988 Vestfold: 21.5. 2K+ Hvasser, Tjøme (J. Stenersen).
 1988 Vest-Agder: 1.5. 2K+ Paradisbukta, Mandal (M. Helberg, A. Henriksen, H. Henriksen). 25.10. 1K+ Jäbekk, Mandal (I. Flesjå).

Enghauk *Circus pygargus* 9 - 2

- 1988 Telemark: 23.5. 3K+ M Ulefoss, Nome (R.E. Hansen). 31.8. 3K+ M Jomfruland, Kragerø (E. Gregersen).

“Stenghauk” *C. pygargus/C. macrourus*

- 1988 Telemark: 27.5. 2K+ (hunnfarget) Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen m.fl.). 27.-28.5. 2K+ Jomfruland, Kragerø (R. Solvang, J. Magnussen, K. Johnsen, H.I. Nicolaysen m.fl.). Det er trolig den samme fuglen som er blitt observert ved de to tilfellene.

Aftenfalk *Falco vespertinus* - 2

- 1988 Rogaland: 8.5. 2K F Birkeland, Sokndal (J.S. Birkeland, T. Birkeland). 15.8. 2K+ F Forus, Sandnes (H. Åse).
 1988 Hordaland: 18.9. 1K Kjeiløy, Lindås (A.T. Mjøs).

Balkanhøne *Alectoris chukar*

- 1988 Vestfold: sommeren* 2K+ (2 ind.) Rødvika, Larvik (E.R. Wiborg m.fl.). Arten er et yndet jaktobjekt, og fugler har blitt satt ut av ivrige jegere i distriktet. Funnet plasseres derfor på B-listen.

Brakksvale *Glareola pratincola* 3 - 0

- 1985 Vestfold: 3.6. 2K+ Mølen, Larvik (G.Numme).

Hvitbrysto *Charadrius alexandrinus* 17 - 1

- 1988 Telemark: 29.4.-1.5. 2K+ M Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen, T. Sommer, S. Blandhol, B. G. Olsen).

Mongollo/Ørkenlo *Charadrius mongolus/Ch. leschenaultii*

- 1988 Finnmark: 22.-23.6. 2K+ Nordkapp (I.G. Lindstein).

“Beringlo” *Pluvialis dominica/P. fulva*

- 1988 Akershus: 6.9. 1K (2 ind.) Årnestangen, Nordre Øyeren, Rælingen (B.O. Tveit, B.I. Balto). Disse fuglene lot seg ikke artsbestemme, og blir derfor registrert som Beringlo (Se videre Bentz 1988).

Pygmésnipe *Calidris minutilla* 0 - 1

- 1988 Finnmark: 9.6.* 2K+ Nesseby, Vadsø (M. Saarinen, O. Trogen).

Dette er en ny art for landet. Arten forekommer som hekkefugl i de nordlige delene av Nord-Amerika, og den overvintrer langs kysten av det sørlige USA, Sentral-Amerika, de nordlige delene av Sør-Amerika og i Vest-India. Arten er observert i Europa flere ganger, bl.a. på Island, Irland, i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Finland og Østerrike (Cramp et al. 1983)!

Bonapartesnipe *Calidris fuscicollis*

- 4 (utenom Svalbard) - 0
 1987 Vest-Agder: 16.7.* 2K+ Sæviga/Tjørveneset, Lista, Farsund (N.H. Lorentzen, T.O. Hansen). 17.7. 2K+ Fuglevika, Lista, Farsund (N.H. Lorentzen). Samme fuglen begge dagene.

Alaskasnipe *Calidris melanotos* 33 - 1

- 1988 Troms: 19.-20.8. 1K+ Tromsø lufthavn, Langnes, Tromsø (W. Vader, K.B. Strann).

Hvithalesvømmesnipe *Phalaropus tricolor* 2 - 1

- 1984 Møre og Romsdal: 11.5. 2K+ F Sandblåstvågen, Fræna (J. Gylseth, G. Gaarder, B. Nygaard).
 1988 Vest-Agder: 26.7. 2K+ Nesheimvannet, Farsund (R.E. Fredriksen, K. Støle, Ø. Kvarenes, A. Rønning).



Sørnattergal (2K), fanget og ringmerket 02.05.1988 på Akerøya, Hvaler i Østfold.
Foto: R. Olsen.

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*

- 32 (på det norske fastlandet etter 1950) - 3
1983 Møre og Romsdal: 31.10. 1K+ Donkarsundet, Kristiansund (Ø. Gjeldnes).
1988 Telemark: 3.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø (R. Magnussen).
1988 Vest-Agder: 19.-23. og 30.10.* 1K Vågsvollviga og Nordhasselbukta, Farsund (K. Olsen, N.H. Lorentzen m.fl.).
1988 Nordland: 14.6.-1.7. 2K+ F Røstlandet, Røst (S. Baines).

Svarthavsmåke *Larus melanocephalus* 7 - 1

- 1985 Vestfold: 26.-27.5. 2K Mølen, Larvik (B. Brede sen, K.P. Gade, G. Numme, T. Karlsen, H. Møller).
1988 Vestfold: 16.8. 2K Mølen, Larvik (S.D. Sondbø).

Sabinemåke *Larus sabini* 42 (utenom Svalbard) - 2

- 1987 Rogaland: 19.9. 1K Revtingen, Klepp (G. Kristensen, O. Bryne, E. Overaa m.fl.). 18.10. 1K Skeie, Klepp (G. Kristensen, U. Wikenborg, K. Hansen, B.T. Ulvnes).
1988 Østfold: 2.10.* 1K Akerøya, Hvaler (R.G. Bøsy, S. Engebretsen, R. Frølandshagen, R. Olsen). 7.10. 1K Akerøya, Hvaler (R.G. Bøsy).

Ringnebbmåke *Larus delawarensis* 8 - 0

- 1986 Vestfold: 13.12. 2K Mølen, Larvik (R.E. Hansen).
1987 Vestfold: 3.10.* 1K Mølen, Larvik (V. Heibo, G. Klaveness, M. Lohne, G. Numme).

Sildemåke, u.a. *Larus fuscus graellsii*

- 1986 Vestfold: 24.3. 4K+ (2 ind.) Mølen, Larvik (R.E. Hansen, K. Johannesson, I. Lundstad). Denne fuglen viste karakterene til underarten *graellsii*.

Alpeseiler *Apus melba* 8 - 1

- 1988 Telemark: 13.6. 2K+ Jomfruland, Kragerø (R. Magnussen).

Kafferseiler *Apus caffer* 2 - 0

- 1986 Vestfold: 15.6. 2K+ (2 ind.) Eftang, Larvik (H. Heggland, S. Liverød).

Dverglerke *Calandrella brachydactyla* 20 - 1

- 1988 Rogaland: 9.-17.10. 1K+ Utsira (H. Heggland, B.O. Tveit, P. Gylseth m.fl.).

Flekkdverglerke *Calandrella rufescens* 0 - 1

- 1987 Vestfold: 7.-23.11. 1K+ Mølen, Larvik (R.E. Hansen, G. Numme, T. Nilsen m.fl.).
Ny art for landet. Den hekker i Spania, på Kanariøyene, i deler av Nord-Afrika og Midt-Østen, Lille-Asia og videre i et belte bort til Kina. Bestandene i Europa og Midtøsten er stasjonære, mens de asiatiske fuglene trekker sørover om vinteren. Utenfor utbredelsesområdet er arten bl.a. observert i Irland, i Storbritannia, Tyskland og Finland (Cramp et al. 1988).

Topplerke *Galerida cristata* 9 (etter 1977) - 1

- 1988 Buskerud: 28.-29.4.* 2K+ Hønefoss, Ringerike (A.H. Qvale).

Amursvale *Hirundo daurica* 4 - 1

- 1988 Telemark: 14.5. 2K+ Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen, R. Solvang, H. Skarboe).

Markpiplerke *Anthus campestris* 27 - 2

- 1988 Vest-Agder: 10.4. 2K+ Jåbekk, Mandal (G.K. York).
1988 Telemark: 2.6. 2K+ Jomfruland, Kragerø (H.I. Nicolaysen, E. Edvardsen).

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni* 12 - 0

- 1981 Rogaland: 4.10.* 1K+ Utsira (P. Gylseth, D. Zetterström, J.M. Reneflot).
1987 Rogaland: 19.10.* 1K+ Utsira (P.S. Hansen).

Gulerle, u.a. *Motacilla flava feldegg* 0 - 1

- 1982 Finnmark: 2.6.* 2K+ M Ekkerøy, Vadsø (R. Vikman). Denne fuglen viste karakterene til underarten *M.f. feldegg*. Dette er det første norske funnet av denne underarten som bl.a. hekker i Balkan, Lilleasia, Irak og Iran (Cramp et al. 1988).

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos* 10 - 2

- 1984 Vestfold: 10.6.* 2K+ M Sandø, Tjøme (J. Stenersen).

1988 Østfold: 2.5.* 2K Akerøya, Hvaler (M. Pettersen, R. Olsen, R. Frølandshagen).
1988 Rogaland: 6.5. 2K+ Utsira (A.T. Mjøs).

Blåstrupe, u.a. *Luscinia svecica cyaneacula* 5 - 1

1988 Vest-Agder: 14.5. 2K+ M Ådneram, Sirdal (J. Grønning, B. Hetland, R. Hetland). Denne fuglen viste karakterene til underarten *L. s. cyaneacula*, som hekker i Spania, Sentral- og Øst-Europa (Cramp et al. 1988).

Svartstrupe, u.a. *Saxicola torquata maura*

1981 Rogaland: 9.-11.10.* 1K+ M Utsira (T. Kolehm-ainen, J.M. Reneflot, P. Gylseth m. fl.).
1988 Vest-Agder: 16.10.* 1K+ Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk, I. Flesjå, J. Noddeland).
1988 Rogaland: 5. og 7.10.* 1K+ M Utsira (H. Heggland, B. O. Tveit, P. Gylseth m.fl.).

Gulltrost *Zoothera dauma* 5 - 1

1988 Telemark: 28.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø (G. Gisholt).

Ubest. trost *Zoothera sp* 3 - 0

1985 Vestfold: 11.5. 2K+ Mølen, Larvik (R. E. Hansen, K.P. Gade, V. Heibo, G. Klaveness).

Starrsanger *Locustella certhiola* 1 - 1

1988 Rogaland: 7.*-8.10. 1K Utsira (M. Kersbergen, M. Dagsland, F. Falkberget, R. Solvang, E. Karlsen, B.O. Tveit m.fl.).

Elvesanger *Locustella fluviatilis* 14 - 3

1986 Oppland: 27.6. 2K+ M Totenvika, Østre Toten (B.H. Larsen).
1988 Akershus: 7.-9.6. 2K+ Nitelva, Kjeller, Skedsmo (M. Bilet, T. Starholm. Y. Kvebæk, P.O. Syvertsen).
1988 Telemark: 13.6.* 2K+ Jomfruland, Kragerø (K. Johnsen, H.I. Nicolaysen, E. Vamraak, J. Johnsen, R. Magnussen).

1988 Møre og Romsdal: rundt 20.6.* 2K+ M Bud, Fræna (J.R. Gustad, J.T. Gustad, K.j. Schjøberg, K. Schjøberg, G. Gaarder m.fl.).

Vannsanger *Acrocephalus paludicola* 4 - 2

1988 Vest-Agder: 10.8.* 1K Slevdalsvann, Farsund (K. Olsen, T.O. Hansen). 20.-21.8.* 1K+ Jåbekk, Mandal (T. Vestøl, R. Jåbekk, J.E. Berglihn, Ø. Fjeldsgård, P. Knutson m.fl.).

Trostesanger *Acrocephalus arundinaceus* 21 - 5

1988 Østfold: 25.5.* 2K Akerøya, Hvaler (M. Pettersen, G. Møbakken).
1988 Telemark: 15.5. 2K M Jomfruland, Kragerø (R. Solvang, T. Sommer, J. Magnussen, H. Skarboe, B.G. Olsen). 16.5. 2K+ Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen, R. Solvang, B.G. Olsen, T. Sommer). 18.5. 2K+ M Jomfruland, Kragerø (R. Magnussen, T. Stølen, R. Solvang, J. Magnussen, G. Gisholt). 8.-ca. 20.6.* 2K+ Børsesjø, Skien (T. Sommer, E. Karlsen m.fl.).

Blekkspottesanger *Hippolais pallida* 0 - 1

1988 Hordaland: 11.9.* 1K+ Herdlevær, Øygarden (G.H. Systad, A.T. Mjøs).

Fuglen ble fanget og ringmerket, og arten er ny for landet. Arten hekker på den iberiske halvøya, i Nord-Afrika og videre østover bort til Pakistan. Den er en trekkfugl, som overvintrer i Afrika sør for Sahara, og er flere ganger blitt observert bl.a. i Storbritannia (Dymond 1989).

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans* 14 - 4

1988 Rogaland: 11.* og 12.5.* 2K+ F (2 ind.) Utsira (T.B. Brobakken, A.T. Mjøs, M. Sleire m.fl.). 12.5.* 2K+ M Utsira (M. Bø m.fl.). 15.5. 2K+ Utsira (P. Gylseth m. fl.). Funnene 11. og 12.5. (i alt tre) dreier seg om fugler som ble fanget og ringmerket.




Foto eller annen dokumentasjon er alltid å foretrekke når en observasjon skal vurderes av LRSK/NSKF. Men har du ikke nødvendige tekniske hjelpemidler for hånden når situasjonen er der, bør man gjøre seg ekstra flid med notisboka. Slik Tommy R. Stølen her har gjort ved å lage skisse av en hybrid mellom låvesvale og taksvale, Kolbotn, Oslo 05.04.1988.



Et bilde må ikke nødvendigvis være sylskarpt for å tilfredsstille NSKF's krav til dokumentasjon av sjeldne fugleobservasjoner. Dette bildet av middelhavsspurv på Mølen, Vestfold 13.05.1988 levner ingen tvil om hvilken art det dreier seg om. Dette er for øvrig første gang arten er registrert i Norge. Foto: Håkon Heggland.

- Østsanger** *Phylloscopus trochiloides* 18 - 3
 1988 Hedmark: 6.-24.6. og 18.-24.6.* 2K+ M (2 ind.)
 Innbygda, Trysil (B.E. Foyen).
 1988 Telemark: 9.8.* 2K+ Jomfruland, Kragerø (J. Magnussen, E. Vamraak, J. Johnsen, H.I. Nicolay-
 sen, T. Landsverk).
 1988 Vest-Agder: 13.-30.6. og 8.7.* 2K+ M Dønnestad,
 Kristiansand (T. Vestøl, P.K. Knutson m.fl.).

- Bonellisanger** *Phylloscopus bonelli* 2 - 1
 1988 Rogaland: 12.5.* 2K+ Utsira (P. Gylseth, T.B.
 Brøbakken, M. Sleire, A.T. Mjøs m.fl.).
 Fotografiet som var vedlagt beskrivelsen viser at fuglen
 har karaktertrekken til underarten *Ph. b. bonelli*, som
 hører hjemme i Sørvest-Europa og Nordvest-Afrika.

- Rødtoppfuglekonge** *Regulus ignicapillus* 22 - 3
 1987 Hordaland: 4.10. 1K+ Hauge, Os (E.V. Haug, B.
 Bjerkestrand, R. Hetteflåt). Fuglen ble fanget og
 ringmerket.
 1988 Telemark: 20.5. 2K+ F Jomfruland, Kragerø (R.
 Magnussen, T. Stølen, G. Gisholt). 23.5.* 2K+ M
 Jomfruland, Kragerø (E. Karlsen m. fl.).
 1988 Finnmark: 2.6. 2K+ Akkarfjord på Hjelmsøy,
 Måsøy (B. Henriksen). Fuglen satt og sang på en
 staur!

- Skjeggmeis** *Panurus biarmicus* 4 - 1
 1988 Telemark: 18.7. 1K+ Børsesjø, Skien (T. Lands-
 verk).

- Rosenstær** *Sturnus roseus* 39 - 3
 1972 Vest-Agder: 13.7.* 2K+ Vågsbygd, Kristiansand
 (O. Kindberg). Denne observasjonen har blitt
 revurdert og godkjent av NSKF.
 1981 Hordaland: 28.7. 2K+ Nesheim, Eksingedalen,
 Vaksdal (L.C. Halvorsen).
 1988 Buskerud: 8.1.* 2K+ Haugum gård, Skollenborg,
 Kongsberg (S.T. Johnsen).
 1988 Telemark: 17.9. 1K Jomfruland, Kragerø (V.
 Wilhelmssen, S. Sannes).
 1988 Rogaland: 3.-10.10.* 1K Utsira (P. Gylseth, A.
 Thune, O. Lund, J.K. Ness, B.O. Tveit m.fl.).

- Middelhavsspurv** *Passer hispaniolensis* 0 - 1
 1988 Vestfold: 13.5.* 2K+ M Mølen, Larvik (K.P.
 Gade, H. Heggland, G. Numme).
 Dette er en ny art for landet. Den hekker på den iberiske
 halvøya, Sardinia og i Nordvest-Afrika. Videre fore-
 kommer den som hekkefugl i Balkan, Lilleasia og i deler
 av Sørvest-Asia. Arten har blitt observert i Storbritannia
 tre ganger (Dymond 1989).

- Gulirisk** *Serinus serinus* 11 - 1
 1988 Telemark: 16.5. 2K+ M Jomfruland, Kragerø (R.
 Solvang, J. Magnussen, T. Sommer, B.G. Olsen).

- Gråsisik**, u.a. *Carduelis flammea cabaret*
 1988 Vest-Agder: 24.2. 2K+ M Vrånes, Randesund,
 Kristiansand (R.E. Fredriksen m.fl.). 16.9. 1K+
 Skarpenes, Flekkefjord (P.Ø. Grimsby, G.
 Grimsby, S. Grimsby). Høsten* 1K+ (7 ind.)
 Jåbekk, Mandal (R. Jåbekk). Disse fuglene viste
 karakterene til underarten *C. f. cabaret*.

- Hvithodespurv** *Emberiza leucocephala* 5 - 2
 1988 Vest-Agder: 7.3. 2K+ M Jåbekk, Mandal (R.
 Jåbekk). 6.7. 2K+ M Jåbekk, Mandal (I. Flesjå, R.
 Jakobsen, R. Jåbekk).

- Svarthodespurv** *Emberiza melanocephala* 9 - 1
 1988 Vest-Agder: 4.-7.8.* 2K+ M Jåbekk, Mandal (I.
 Flesjå, J. Noddeland, R. Jåbekk).

- Lazulifink** *Passerina amoena*
 1988 Finnmark: 15.5.* 2K+ M Bossekop, Alta (R.
 Vaashaug).

Denne nordamerikanske arten er en vanlig burfugl på
 kontinentet. NSKF mener at dette dreier seg om en rømt
 fangenskapsfugl, og funnet plasseres derfor på B-listen.

- Pavefink** *Passerina ciris*
 1986 Nordland: 9. evt. 10.8.* 2K+ M Balvann, Suli-
 tjelma (I.A. Bragvin, Fam. Henriksen).
 Denne nordamerikanske fuglen var ikke sky for men-
 nesker, og var med meget stor sannsynlighet en rømt
 burfugl. Funnet plasseres derfor på B-listen.

Hybrider:

Toppand x Taffeland *Aythya fuligula x Aythya ferina*
3 - 0

1985 Hordaland: 26.-27.4.* 2K+ M Tveitevann, Bergen
(S. Tofte, J.-P. Soulere, A.T. Mjøs).

1987 Hordaland: 13.-31.1.* 2K+ M Vaksdal Mølle,
Vaksdal (A.T. Mjøs).

Hybridisering mellom disse to artene er ikke uvanlig, og
er bl.a. blitt konstatert i Sverige (Hedgren 1981).

Taksvale x Låvesvale *Delichon urbica x Hirundo*
rustica 5 - 1

1988 Oslo/Akershus: 24.5.* 2K+ Kolbotn, Oslo (T.R.
Stølen, J.E. Røer).

Rettelse:

I oversikten over godkjente observasjoner i forrige rap-
port (Bentz 1989) hadde dessverre en feil sneket seg inn:
Observasjonsdato for **Enghauk** *Circus pygargus* på
Fornebu, Bærum 1987 skal være 1.-2.5.*

Ikke godkjente saker *Not accepted records*

Islom *H Gavia immer*

1988 Nordland: 1.9. 1 par m. 3 juv. Gimsøy, Vågan.

Svarthalsdykker *Podiceps nigricollis*

1988 Rogaland: 17.2. og 4.3. 2K+ Risavika, Sola.

Gulnebblire *Calonectris diomedea*

1988 Telemark: 26.9. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Gulnebb-/storlire *Calonectris diomedea*

Puffinus gravis

1986 Telemark: 2.10. 1K+ Jomfruland, Kragerø.

Wilsonstormsvale *Oceanites oceanicus*

1985 Rogaland: 17.9. 1K+ Revtingen, Klepp. Etter
konsultasjon med P. Harrison i England, har
NSKF besluttet ikke å godkjenne dette funnet.

Egretthegre *Egretta alba*

1988 Vest-Agder: 10.9. 2K+ Dragøy, Flekkefjord.

Rødfotand *Anas rubripes*

1987 Oslo/Akershus: 21.4. 2K+ Årnestangen, Nordre
Øyeren, Rælingen.

Svartglente *Milvus migrans*

1988 Vestfold: 22.5. 2K+ Helgeroa, Larvik.

Svartglente *H Milvus migrans*

1963 Vest-Agder: sommeren Lista, Farsund. Denne
hekkingen er tidligere beskrevet av Holgersen
(1964) og Haftorn (1971). Etter at nye opplysning-
er er kommet inn til NSKF, finner komitéen å
måtte underkjenne hekkefunnet.

Glente *Milvus milvus*

1987 Møre og Romsdal: 16.9. 1K+ Phillipshaugen,
Sunndal.

1988 Vest-Agder: 2.5. 3K+ Mandal.

Sivhauk *H Circus aeruginosus*

1981(ca) Oppland: sommeren 1 hekkende par Stortjern,
Gran.

Dvergørn *Hieraetus pennatus*

1988 Rogaland: 9.7. 3K+ Birkelandsvatn, Sokndal.

Rødfalk *Falco naumanni*

1979 Akershus: 28.8. 1K+ Fornebu, Bærum.

Aftenfalk *Falco vespertinus*

1987 Vestfold: 15.7. 1K+ Store Færder, Tjøme.

1986 Østfold: 14.9. 2K+ M Ryen, Tune.

Spissshalesnipe *Calidris acuminata*

1988 Rogaland: 7.8. 2K+ Nærlandsstranden, Hå.

Ubest. bekkasinsnipe *Limnodromus sp*

1986 Vestfold: 10.9. 1K+ (2 ind.) Hemskilen, Sande-
fjord.

Gulbeinsnipe *Tringa flavipes*

1987 Akershus: 2.6. 2K+ Jørholmen, Nordre Øyeren,
Fet.

Flekksnipe *Actitis macularia*

1988 Rogaland: 13.7. 2K+ Nodland, Eigersund.

Svartehavsmåke *Larus melanocephalus*

1988 Telemark: 2.10. 3K+ Jomfruland, Kragerø.

Ringnebbmåke *Larus delawarensis*

1988 Telemark: 1.5. 3K+ Portør, Kragerø.

Ismåke *Pagophila eburnea*

1988 Hordaland: 11.4. 3K+ Fedje.

Rosenterne *Sterna dougallii*

1988 Vest-Agder: 1.8. 2K+ Hille, Mandal.

Tårnugle, u.a. *Tyto alba alba*

1987 Vest-Agder: 30.1. 2K+ Jäbekk, Mandal. Denne
observasjonen har enda en gang vært oppe til
vurdering i NSKF.

Isfugl *H Alcedo atthis*

1967 Nordland: 26.6. Kull m. 4 juv. Sulitjelma.

Kalanderlerke *Melanocorypha calandra*

1988 Vest-Agder: 5.6. 2K+ Kviljobrønningen, Farsund.

Dverglerke *Calandrella brachydactyla*

1988 Rogaland: 4.10. 1K+ Utsira.

Langnebbpiplerke *Anthus similis*

1977 Vestfold: 18.6. Mølen, Larvik.

Gulerle, u.a. *Motacilla flava beema*

1985 Rogaland: 2.6. 2K+ M Orrevannet, Klepp.

Alpejernspurv *Prunella collaris*

1988 Vestfold: 20.5. 2K+ Mølen, Larvik.

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos*

1988 Vestfold: 27.-28.5. 2K+ M Rakke, Larvik.

Isabellasteinkvett *Oenanthe isabellina*

1988 Vestfold: 14.9. 1K+ Truberjordet, Yxnøy, Sande-
fjord.

Middelavssteinskvevt *Oenanthe hispanica*
1988 Vestfold: 26.5. 2K+ M Mølen, Larvik.

Gulltrost *Zoothera dauma*
1988 Hordaland: 5.9. 1K+ Fedje.

Elvesanger *Locustella fluviatilis*
1988 Vest-Agder: 16.-22.6. 2K+ M Sukkevann, Randsund, Kristiansand.

Troste-/olivensanger *Acrocephalus arundinaceus/Hippolais olivetorum*
1987 Oslo/Akershus: 14.6. 2K+ M Gressholmen, Oslo.

Rødstrupesanger *Sylvia cantillans*
1988 Vest-Agder: 18.5. 2K+ M Jåbekk, Mandal.

Brunsånger *Phylloscopus fuscatus*
1987 Vestfold: 21.-22.11. 1K+ Mølen, Larvik.

Bonellisanger *Phylloscopus bonelli*
1984 Rogaland: 16.10. 1K+ Utsira.

Gransanger, u.a. *Phylloscopus collybita tristis*
19?? Vest-Agder: ? 1K+ Austad, Flekkefjord.

Skjeggmeis *Panurus biarmicus*
1987 Akershus: 13.5. 2K+ Fornebu, Storøykilen, Bærum.

Alpekaie *Pyrrhocorax graculus*
1988 Telemark: 30.5. 2 ind. (2K+) Jomfruland, Kragerø.

"Purple finch" *Carpodacus purpureus*
1988 Rogaland: 17.11. 2K+ F Birkeland, Sokndal.

Takk

Terje Axelsen takkes for verdifulle kommentarer til manuskriptet.


Summary

REPORT ON RARE BIRDS IN NORWAY IN 1988
By the Norwegian rare birds committee (NSKF)

The NSKF has dealt with 212 records of rare birds for 1988 and earlier years, 129 (60.9 %) of which have been accepted. A total of 39 (18.4 %) for 1988 and earlier years are still under consideration and 44 (20.7 %) records were found not acceptable. Of these accepted records were 5 species new for Norway and these are now placed on Category A of the Norwegian list. New species for Norway are Cattle Egret *Bubulcus ibis*, Least Sandpiper *Calidris minutilla*, Lesser Short-toed Lark *Calandrella rufescens*, Olivaceous Warbler *Hippolais pallida* and Spanish Sparrow *Passer hispaniolensis*.

The total number of species recorded in Norway up to the end of 1988 is now 446 (Category A species).

The two numbers following the species scientific name refer respectively to the total number of records (not individuals), (1) up to and including 1987, (2) in 1988.



Elvesanger (2K+) Jomfruland, Telemark 13.06.1988.
Foto: Eivind Vamraak.

The details included for each record are (1) county; (2) date(s); (3) * if the record was complemented by photography, sound recording or other proof; (4) age and sex if known; (5) number of birds if more than one; (6) locality; (7) observer(s).

Litteratur

- Bentz, P.-G. 1988: Sjeldne fugler i Norge i 1986. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. *Vår Fuglefauna 11*: 87-95.
- Bentz, P.-G. 1989: Sjeldne fugler i Norge i 1987. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF), NZF og NOF. *Vår Fuglefauna 12*: 101-110.
- Cramp, S. et. al. 1983 & 1988: *Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa: The Birds of the Western Palearctic*. Volume 3 and 5. Oxford University Press.
- Dymond, J.N. et. al. 1989: *Rare Birds in Britain and Ireland*. T. & A.D. Poyser.
- Haftorn, S. 1971: *Norges fugler*. Universitetsforlaget, Oslo.
- Hedgren, S. 1981: En hybrid mellan vigg och brunand. *Bläcku 7*: 41-42.
- Holgensen, H. 1964: Har svartglenten ruget i Norge i 1963? *Sterna 6*: 76-77.
- Staav, R. 1989: Ny mellanskarvkoloni i Bråviken. *Fauna och flora 84*: 1-5.
- Stolt, B.-O. 1988: Kohäger *Bubulcus ibis* från Spanien funnen i Sverige. *Vår Fågelvärld 47*: 374-377.
- Tyrberg, T. 1988: Fågelrapport för 1987. *Vår Fågelvärld 47*: 378-418.
- Voous, K.H. 1980: *List of recent holarctic bird species*. BOU.

Forfatterens adresser


Per-Göran Bentz, Zoologisk museum, Sarsgate 1,
0562 Oslo 5.
Andrew W. Clarke, Grønli, Kyrresvingen 21,
3190 Horten.

LRSK-adresser

Det finnes en lokal rapport- og sjeldenhetskomité (LRSK) i hvert fylke i Norge. Alle rapporter og beskrivelser av sjeldne arter som krever godkjenning skal først sendes til LRSK, som så oversender rapporter av arter som står på NSKF's liste til sistnevnte instans. Arter som krever behandling av NSKF står også på listene til samtlige LRSK, men de enkelte LRSK har egne lister i tillegg. Disse varierer en del avhengig av hvilken landsdel det dreier seg om. Nedenfor finnes en adresseliste for samtlige LRSK i Norge.

- LRSK/Østfold**, v/Morten Vikar, Boks 1520, Glombo, 1600 FREDRIKSTAD
- LRSK/Oslo og Akershus**, Boks 1050, Biologisk Institutt, Blindern, 0316 OSLO 3
- LRSK/Hedmark**, Boks 455, 2301 HAMAR
- LRSK/Oppland**, v/Jon Opheim, 2637 HUNDER
- LRSK/Buskerud**, v/ Torgrim Breichagen, Zoologisk Institutt, AVH, Univ. i Trondheim, 7055 DRAGVOLL
- LRSK/Vestfold**, Boks 153, 3201 SANDEFJORD
- LRSK/Telemark**, Boks 1076, 3701 SKIEN
- LRSK/Aust-Agder**, Boks 449, 4801 ARENDAL
- LRSK/Vest-Agder**, v/Leif Gabrielsen, Boks 42 , 4063 VOLL
- LRSK/Rogaland**, v/Øivind Egeland, Høgevollsvn. 24B, 4300 SANDNES
- LRSK/Hordaland**, Boks 83, 5027 BERGEN
- LRSK/Sogn og Fjordane**, v/Vidar Seim, Krokane, 6900 FLORØ
- LRSK/Møre og Romsdal**, Boks 206, 6001 ÅLESUND
- LRSK/Sør-Trøndelag**, c/o Trøndersk Natur, Postboks 1719 Rosenborg, 7002 TRONDHEIM
- LRSK/Nord-Trøndelag**, Boks 68, 7501 STJØRDAL
- LRSK/Nordland**, v/Kjell A. Meyer, Almenningen 14, 8614 YTTEREN
- LRSK/Troms**, Boks 2756, Elverhøy, 9001 TROMSØ
- LRSK/Finnmark**, v/Bjørn Frantzen, Boks 30, 2966 SLIDRE
- LRSK/Svalbard & Jan Mayen**, v/Fridtjof Mehlum, Norsk Polarinstitut, Rolfstangveien 12, 1330 OSLO LUFTHAVN

Rørsanger (t.v.) og trostesanger (2K) innfanget for ringmerking Akerøya, Hvaler i Østfold 25.05.1988. Foto: M. Pettersen & G. Mobakken.



Hvilke arter/underarter skal rapporteres til NSKF?

I tillegg til alle nye arter og underarter for Norge samt alle hybrider, skal følgende vurderes av NSKF (H betyr at kun hekkefunn skal vurderes og * angir at kun funn utenfor Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen og de arktiske havområder skal vurderes):

ARTER:

Svarthalsdykker
Svartbrynalbatross
Gulnebblire
Storlire
Wilsonstormsvale
Rødfotsule
Hvitpelikan
Krøllpelikan
Rørdrum
Amerikarørdrum
Dvergørdrum
Natthege
Vinhege
Kuhege
Silkehege
Egretthege
Purpurhege
Svartstork
Stork
Bronseibis
Skjestork
Flamingo
Rødhalsgås
Rustand
Amerikablesand
Snadderand H
Gulkinnand
Rødfotand
Knekkand H
Rødhodeand
Taffeland H
Ringand
Hvitøyeand
Praktærfugl H*
Brilleærfugl
Harlekinand
Brilleand
Islandsand
Hjelmfiskand
Stivhaleand
Svartglente
Glente
Pallashavørn
Åtselgribb
Sivhauk H
Steppehauk
Enghauk
Swainsonvåk
Ørnvåk
Småskrikørn
Steppeørn
Dvergørn
Aftenfalk (f.o.m. 1987)
Lerkefalk H

Vaktel H
Myrrikse H
Sumpriske
Amerikapurpurhøne
Sultanhøne
Jomfrutrane
Dvergtrappe
Stortrappe
Stylteløper
Avosett H
Triel
Ørkenløper
Brakksvale
Steppebrakksvale
Tobeltego
Kittlitzlo
Hvitbrystlo
Mongollo
Ørkenlo
Rødbrysto
Kanadalo
Sibirlo
Sibirsnipe
Sandsnipe
Pygmésnipe
Bonapartesnipe

Gulbrystsnipe
Alaskasnipe
Spissshalesnipe
Styltesnipe
Rustsnipe
Kortnebbekkas-
insnipe
Langnebbekkas-
insnipe
Dvergspove
Damsnipe
Gulbeinsnipe
Tereksnipe
Hvithalesømmesnipe
Polarsvømmesnipe *
Polarjo H
Storjo H
Steppemåke
Svartehavsmåke
Franklinmåke
Dvergmåke H
Sabinemåke *
Kanadahettemåke
Ringnebbmåke
Rosenmåke *
Ismåke *

Sandterne
Rovterne H
Kongterne
Splitterne H
Rosenterne
Sotterne
Hvitkinnsvarterne
Hvitvingesvarterne
Brunnoddy
Steppehøne
Mongolturteldue
Skjæregjøk
Gulnebbgjøk
Tårugle
Dverghornugle
Pigghalseiler
Gråseiler
Alpeseiler
Kafferseiler
Bieter
Blåråke
Kalendarlerke
Hvitvingelerke
Dverglerke
Flekkdverglerke
Topplerke



Amursvale
 Markpiplerke
 (fr. o.m. 1987)
 Sibirpiplerke
 Tundrapiplerke
 Sitronerle
 Alpejernspurv
 Hekksanger
 Sørnattergal
 Blåstjert
 Hvitstrupenattergal
 Svartødstjert H
 Svartstrupe H
 Isabellasteinskvetvett
 Svartstrupesteinskvetvett
 Middelhavssteinskvetvett
 Ørkensteinskvetvett
 Svartsteinskvetvett
 Steintrost
 Gulltrost
 Sibirtrost
 Brunkinnskogtrost
 Gråkinnskogtrost
 Gråstrupetrost
 Bruntrost
 Taigatrost
 Vandretrost
 Starrsanger
 Stripesanger
 Elvesanger
 Sumpsanger
 Vannsanger
 Busksanger
 Trostesanger
 Blekspottesanger
 Dvergspottesanger
 Rødstrupesanger

Svarthodesanger
 Hauksanger H
 Østsanger
 Lappsanger
 Fuglekongesanger
 Viersanger
 Brunsanger
 Bonellisanger
 Rødtoppfuglekonge
 Dvergfluesnapper H
 Halsbåndfluesnapper
 Skjeggmeis
 Pirol H
 Rødhalevarsler
 Rosenvarsler
 Rødhodevarsler
 Manchuriastær
 Rosenstær
 Middelhavsspurv
 Gulirisk
 Gultykknebb
 Sangspurv
 Vinterjunko
 Hvithodespurv
 Dvergspurv H
 Kastanjespurv
 Sibirspurv
 Brunhodespurv
 Svarthodespurv
 Kornspurv
 Cisselspurv
 Rosenbrysttykknebb
 Blåtykknebb
 Bobolink
 Brunhodetripial
 Nordtripial

UNDERARTER:

Havlire u.a. *Puffinus puffinus mauretanicus*
 Mellomskarv *Phalacrocorax carbo sinensis*
 Tundragås u.a. *Anser albifrons flavirostris*
 Krikkand u.a. *Anas crecca carolinensis*
 Hønsehauk u.a. *Accipiter gentilis buteoides*
 Russevær *Buteo buteo vulpinus*
 Dvergfalk u.a. *Falco columbarius subaeson*
 Vandrefalk u.a. *Falco peregrinus calidus*
 Myrsnipe u.a. *Calidris alpina arctica*
 Myrsnipe u.a. *C. a. sakhalina*
 Blåstrupe u.a. *Luscinia svecica cyanecula*
 Svartstrupe u.a. *Saxicola torquata maura*
 Svartstrupe u.a. *S. t. variegata*
 Møller u.a. *Sylvia curruca blythi*
 Gransanger u.a. *Phylloscopus collybita collybita*
 Gulbrynsanger u.a. *Phylloscopus inornatus humei*
 Stjertmeis u.a. *Aegithalos caudatus europaeus*
 Spettmeis u.a. *Sitta europaea asiatica*
 Varsler u.a. *Lanius excubitor sibiricus*
 Varsler u.a. *L. e. pallidirostris*
 Gråsisik u.a. *Carduelis flammea rostrata*
 Polarsisik u.a. *Carduelis hornemanni hornemanni*
 Snøspurv u.a. *Plectrophenax nivalis vlasowae*

Også sjeldne underarter skal rapporteres

Observasjoner av svartstrupe i Norge kan være spennende nok for de fleste. Det finnes imidlertid flere underarter av svartstrupe. Den som oftest opptrer, og som sporadisk hekker, er underarten *rubicola*. Av denne skal hekkefunn godkjennes av NSKF, mens mange LRSK også har vanlige observasjoner på sine lister. Den mer østlige underarten, *maura*, som bl.a. hekker i deler av Sibir, forekommer også en sjelden gang i Norge. Alle funn av denne underarten skal godkjennes av NSKF.

Fuglen nedenfor er fotografert på Jåbekk ved Mandal 16.10.1988 av Runar Jåbekk. Den er bestemt til 1K+ av underarten *maura*. *Maura* har bl.a. lysere strupe enn *rubicola*.

