



Årets andre runde i Fotonøtta 2015 er historie – og vi kan slå fast at mange fortsatt er med på å kjempe om kikkerten. Av 50 deltakere svarte 32 rett på begge nøtter. Høstens utfordringer presenteres herved – og som vanlig kikker ikke konkurranseobjektene inn i kamera. Men mulighetene for riktig identifikasjon er absolutt til stede!

Konkurranseregulene

1. I Vår Fuglefauna vil det bli presentert to fuglebilder der artenes identitet ikke er oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet mener å kunne identifisere arten, kan du oppnå en viss poengsum pr. bilde. Artene skal være påtruffet i Vest-Palearktis.

2. Du kan sende inn besvarelse på begge bildene, men kun ett forslag pr. bilde! For hvert riktig svar oppnår du den poengsum som er angitt. Fra og med 2012-årgangen har vi fjernet den gamle regelen om minuspoeng ved feil svar.

3. Besvarelsene for hver gang må være innsendt til Vår Fuglefaunas redaksjon innen angitt tidsfrist. I hvert hefte kommer nye spørsmål, sammen med svarene på forrige rundes bilder og navn på vinner.

4. Bildene i hvert hefte utgjør en egen konkurranseomgang, der premien er et gavekort på kr. 350,- fra Natur og Fritid AS. Premien tilfaller den som har flest poeng i runden. Dersom flere innsendere har like poengsummer foretas trekning blant disse.

5. Sender du inn besvarelser fra flere runder, vil poengsummene dine bli lagt sammen ved årets utgang. Den som har flest poeng totalt, vinner hovedpremien – som er en kostbar Swarovski kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! Dersom flere innsendere skulle stå med lik poengsum til slutt, vil det bli ekstrarunder med bilder på internett for de involverte helt til en vinner kan kåres.

6. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av NOF, med unntak av dem som av ulike årsaker er kjent med svarene på forhånd. Redaktørens vurdering av hvem dette måtte gjelde er eneveldig. Redaktøren og fotografen av det aktuelle bilde er konkurransens jury i tvilstilfeller.

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to bildene. Svarene ser du i neste nummer, og dine svar må sendes til oss innen **1. november 2015** på e-post til vf@birdlife.no. Her er oppsummeringen av forrige runde:

1 poeng: En fugl med rødlig bein innsnevrer valgmulighetene radikalt for den quiz-sultne fuglekikker. Vi skal ikke prøve oss på en uttømmende liste her over arter med røde bein, men rødstilk, steinvender og tjeld er arter som bør nevnes. Av aktuelle arter hadde 44 deltakere peilet seg inn på **rødstilk** *Tringa totanus*. Uansett drakt er sparsommelig lengdestrekete flankesider og karakteristisk tegnet stjert typisk for rødstilk. Tverrbåndene på stjerten er mørke og markerte, mot kontrasterende hvit bunn. Legg også merke til gyllen farge på oversidens dekkfjær. Vi aner en kontrast mellom brun rygg og mer grålig hode, der hals og hodesider er streket. De fem (5) deltakerne som foreslo sotsnipe *T. erythropus* på denne har glatt oversett undergump hos sotsnipe. Unge sotsniper, som er den aldersgruppen som er aktuell her, har tett tverrbåndet undergump og flanker, alt på en skittenhvitt bunn. Oversiden er også en annen på sotsnipen, med kun svært tynne kanter på dekkfjær, disse uten varm tone. Hals og hode vil fremstå mindre kontrasterende. Én (1) deltaker prøvde lappspove *Limosa lapponica* som svaralternativ. Lappspoven har mørke bein og langt lysere mellom- og stordekkere i alle drakter. Rødstilk, 22. august 2014, Hananger, Farsund. Foto: Jonas Langbråten.

3 poeng: Trepoengeren skal være vanskelig, og denne gangen traff vi rimelig bra med det. Vi ser en fugl med få håndfaste kjennetegn. For mange



Flotte premier også i 2015!

I 2015 kan vi på nytt presentere kikkerten Swarovski CL Companion 8x30 som premie til sammenlagtvinneren i Fotonøtta! Det er Swarovski Nordic AB som raust støtter oss med denne kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid deler ut et gavekort på kr. 350,- til en av dem som oppnår flest poeng pr. omgang.



naturogfrid.no



avslørte nok fuglens form en hel del, dette dreide seg om en «småtrost», med sin runde form og korte stjert. Av mer håndfaste kjennetegn kan vi merke oss rødtone på flankene og undergump, vi ser at fuglen har fine flekker på nedre brystsider, og at mellomdekkere fremstår som en mørk rad på en ellers gråbrun overside. Dette er alle ting som passer fint med en **blåstrupe** (hunn) *Luscinia svecica*, noe 34 deltakere svarte. Av resterende svar spriker meningene, for å si det forsiktig. Gransanger *Phylloscopus collybita* (4) er riktignok også anonym å se til, men de kjennetegn beskrevet på blåstrupe vil man ikke finne på arten. Svartstrupetrost *Turdus atrogularis* (2) er et brukbart forslag: tegninger på den hunnfargete trosten er ikke ulike. Det er særlig den beige, varme tonen på oversiden som ikke stemmer med svartstrupetrost, sammen med for kontrastrike mellomdekkere og den totale mangel på flankestrekinger. Skjærpiplerke *Anthus petrosus* (1), vannpiplerke *A. spinoletta* (1) og heippiplerke *A. pratensis* (1) har alle flanketegninger, selv om disse kan være utvasket hos vannpiplerka i enkelte drakter. Tegningene på brystsiden stemmer heller ikke, og vår fugl mangler den markerte flekken på halssidene som er så typiske for de fleste drakter på piplerkene. Piplerkene kjennetegnes også på halvlang stjert. Et (1) forslag på steinskvett *Oenanthe oenanthe* og et (1) på svartstrupesteinskvett *O. pleschanka* fører oss tilbake til de såkalte småtrostene. Likheter i form/proporsjoner og mellomdekkere

med mørkt fyll er uten tvil på plass. Her er det kanskje bryststrekningene som gjør at vi utelukker disse, ingen viser tydelige avsatte streker på brystet. Hagesanger *Sylvia borin* (1) mangler alle draktkarakterer vi her har beskrevet for blåstrupen, mens gresshoppesanger *Locustella naevia* (1) foruten om å ha en del andre tegninger, også er en svært småhodet fugl, med avrundet stjert likt andre *Locustella*-arter. Vår fugl har tvert avskåret stjert. Da er gråfluesnapper *Muscicapa striata* (1) mer passende, og fluesnapperne står da også nærmere på slektstreet til småtrostene enn det trostene gjør. Merk likevel at gråfluesnapperen er en helt annen fugl, med lang stjert, og kanskje enda mer artstypisk: svært lange vinger, med lang håndsvingfjærprojeksjon. Det motsatte er tilfellet på blåstrupen. Én (1) deltaker

så en rosenfink *Carpodacus erythrinus*. Unge rosenfinker har mellomdekkere ikke ulikt vår fugl, selv om tuppene danner et mer tydelig lyst bånd. På en normalt tegnet rosenfink vil de svake lengdestrekene som begynner i strupen følge fuglen helt ned på kroppsidene. Hortulan *Emberiza hortulana* (1) var rundens siste forslag. Hortulan har en lengre stjert. Mest forskjellig er oversiden, der hortulan vil ha kraftig streket rygg. Blåstrupe, Saltdalen, Saltdal, juni 2014. Foto: Martin Eggen.

Av 32 deltakere som svarte rett på begge nøtter, ble **Ola Nordsteien, Bø i Telemark** trukket ut som vinner. Han får tilsendt et gavekort fra Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Martin Eggen

Forrige rundes fugler - i andre positurer

