


Piplerka

nr.1 - 1974

-4. årg.

Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening / Avdeling Lista.



INNHold:

Om feltobservasjoner v/ Rapportkomiteen	side 3
Klimadata for Lista 1973	4
Referat fra LOK-ekskursjoner v/O.Osaland ...	5
Fugleobservasjoner fra Lista/Lyngdal området 1973 v/Rapportkomiteen/NOF Lista	10
Hekking av rovfugl v/Torry Hægeland	24
Ved et høsehaukreir v/Torry Hægeland	26
Observasjoner angående kattuglehekking i Lyngdal og Farsund våren 1973. Av Kurt Jerstad	27
Reirfunn av POSSEKALL (kart)	31
Fossekallen ..av.Per.Grimby.....	32
Noen observasjoner av rørsanger og trostesanger på Lista. Av Kåre Olsen	37
Bestandtaksering av sivsanger i Farsund kommune i 1973. Av Kåre Olsen	40
Stillits funnet hekkende på Lista. Av L.B.	46
Rosenfink-ny rugefugl på Lista. Av L.Bergersen..	47

NOF/Avd. Lista - hvem er hvem ?

Styret:

Lars Bergersen, Kalleberg, 4560 Vanse (form.) + (red.)
Torry Hægeland, 4580 Lyngdal (nestform.)
Ottar M.Osaland, Lökkev.24, 4550 Farsund (sekr.)
Sverre Tveit, V.Hauge, 4560 Vanse (kasserer)
Andor Nötland, Havika, 4550 Farsund (styremedl.)

Rapportkomiteen/Feltutvalget:

Kåre Olsen, Brekne, 4563 Borhaug (form.)
Ottar M. Osaland (medl.)
Torry Hægeland (medl.)

Red. vil nytte anledningen til å beklage forsinkelsen av Piplerka. Det skyldes flere forhold som jeg ikke skal gå nærmere inn på her. Dessuten vil jeg gjøre oppmerksom på at noe stoff måtte utestå til neste nr. pga. plassmangel. Den oppmerkssomme leser har ikke kunnet unngå å legge merke til den "ansiktsløftning" som tidskriftet har fått. Det kan vi takke Kurt for. Han har nemlig prestert tegningen på for siden. Et eksempel til etterfølgelse! (Det gjelder forøvrig også andre områder.) Stoff til neste nr. bør være form. i Rapportkom. eller red. i hende senest 15.sept. 1974.

Selv om det er liten plass, vil jeg få takke Farsund kommune og Vanse Sparebank for kjærkomne pengebidrag! Andre banker regner visst ikke vårt arbeide som ungdoms- eller kulturarbeid, eller har vi for få innskytere(låntagere)?

Red.

FELTOBSERVASJONER.

Med fuglelivet som hobby er en sikret mange glæder og fine naturopplevelser. Først og fremst gjelder dette en selv personlig, men også i mer "vitenskapelig" sammenheng kan en amatørornitolog gjøre en betydningsfull innsats, derfor:

HAR DU OBSERVERT : En uvanlig fugl
Store flokker / Sterk trekkintensitet
Ekstreme ankomst/avreisetider vår og høst
Overvintring eller oversomring
Hekkefunn utenom det vanlige
"Unormal" oppførsel eller andre ting som kan være av interesse (Kfr. fuglebøker f.eks. Haftorn: Norges fugler, for å se hva som er kjent fra før om de aktuelle fuglearter).

NOTER MED


helst på stedet alle opplysninger om observasjonen samt dato, sted, observasjonsforhold og eventuelle medobservanter. Er det mulig så prøv å få observasjonen kontrollert av en annen fuglekjenner.

Ved utgangen av hvert år er det meningen å samle sammen alle slike spesielt interessante observasjoner og publisere dem i Piploerka. De mest interessante vil trolig også komme i Sterna.

MEN HUSK

Bare helt sikre observasjoner må sendes inn. Vis selvkritikk.

Rapportkomiteen/NOFAL



T max 73	7.6	7.6	9.4	15.4	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2	16.2
T min 73	-3.2	-2.8	-1.9	-3.9	2.0	4.5	13.4	13.0	7.8	-3.0	-4.2	-3.4	
Norm. Nedbør	85	85	41	61	49	58	92	113	121	120	125	112	1049
1973	82	83	45	62	105	40	36	77	102	60	150	80	939
ANTALL DØGN MED:													
Norm. T min < 0	18	17	15	4	0	0	0	0	0	1	4	11	70
1973	7	9	4	7	0	0	0	0	0	8	9	12	56
Norm. Vind > 6	18	14	17	14	15	14	13	13	17	18	18	19	187
1973	8	14	8	15	10	10	12	16	18	10	20	22	163
Norm. Snødekke	10	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	3	30
1973	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	15

Vi takker Meteorologisk Institutt for tilsendte data!

Referat fra LOK-ekskursjoner.

Fra LOK blei starta i 1969 og til klubben gikk inn som lokalavdeling i NOF har 6 ekskursjoner vært avvikla. Det ornitologiske utbyttet har vært bra på alle turene. Men resultatene er ikke publisert, noe jeg nå vil bøte på. Foruten at mange av observasjonene er interessante kan disse opplysningene være til nytte ved valg av framtidige ekskursjoner, og de vil i en viss grad kunne tjene som sammenlikning med observasjoner fra andre turer på de samme lokaliteter. Jeg skal her referere kort fra turene.

8/11-69.

Rute : Borhaug - Lista fyr - Sæviga - Verevågen - Slevdalsvatnet - Tjørvebukta .

Vær : Regnbyer som letta, etter hvert solskinn. Frisk bris fra SV.

6 deltakere, leder Kåre Olsen.

Observert :

2 lom spec Sæviga - 19 havsule utenfor Steinodden -
22 grågjess fløy mot SØ o. Slevdalsvatnet og ca 20 o.
Tjørve - 1 spurvehauk Vatnejordene - 1 myrnauk Groda -
vipe i flere småflokker - 13 fjæreplytt Verevågen -
1 myrsnipe Sæviga + 2 Tjørvebukta - 1 brushøne og
1 rødstilk Tjørvebukta - 2 rugde v. Slevdalsvatnet -
1 kvartbekkasin Sæviga - 1 svømmesnipe spec Tjørvebukta -
2 dvergmåke og 1 polarmåke juv Sæviga - 1 krykkje Sæviga
og 1 Verevågen - 1 linerle, 1 kornkråke og 1 steinskvett
Tjørvebukta. Dessuten : storskarv - stokkand - krikand -
brunnakke - ærfugl p havelle - kvinand - siland -
enkelbekkasin - gråmåke - sildemåke - svartbak -
fiskemåke - tyrkerdue - lerke - skjærpiplerke -

heipiplerke - stare - skjære - kaie - kråke - gjerdesmett-
gråtrost - svarttrost - rødvingetrost - gråspurv -
bjørkefink - gulspurv - sivspurv. Sum : 48 arter.

8/2-70.

Rute : Nesheimkrossen - Fuglevika - Tjörve - Borhaug.

Vær : Stort sett opphold, snø på marka, bris fra vest ,
nne dønning.

3 deltakere , leder Gunnar Langhelle.

Observervert :

4 dvergdykker , 1 horndykker og 6 bergand Borhavn -
1 falk spec o. Borhavn - 1 sothøne Bauskje + 6 Tjörvehavn -
ca 60 fjæreplytt Fuglevika, ca 45 Bauskje og 2 Borhavn -
ca 35 myrsnipe Osthasselstrand - 1 sandløper Fuglevika og
1 Bauskje - 1 rødstilk Fuglevika - 2 lørke Nordhasselbukta-
1 svartkråke Borhaug - 1 pilfink Tjörve - 6 snøspurv
Nordhasselbukta. Dessuten : skarv spec - stokkand -
ærflugl - svartand - kvinand - siland - hettemåke -
gråmåke - svartbak - fiskemåke - piplerke spec - stare -
skjære - kaie - kråke - gråtrost - kjøttmeis - gråspurv.
1 alt 30 arter + 1 underart.

20/9-70

Rute : Vågsvoll - Lista fyr - Sæviga - Groda - Borhaug.

Vær : Overskya - solgløyt. Stille.

6 deltakere , leder Kåre Olsen.

Observervert :

40 + 5 grågjess fløy SØ o. Vågsvoll - 1 gravand
Fugletjörna - 3 skjeand o. Vågsvolljordene - 3 spurvehauk
Vågsvolljordene , 1 v. Lista fyr, 1 Sæviga , 1 Fugletjörna
og 1 lebeltet(samme ex sett fler ganger ?) -
1 ♀ myrhauk Groda - 1 vandrefalk obs sammen med

1 tårnfalk og 1 spurvehauk v.Fugletjörna - 2 tårnfalk
Vågsvolljordene, 1 v.Fugletjörna og 2 lebeltet (samme
ex flere ganger ?) - 2 tundralo , 13 dvergsnipe ,
1 tundrasnipe og 2 brushöns Säviga - 1 sotsnipe
Vågsvollvågen - 1 gluttsnipe hørt Vågsvolljordene -
ca 40 lappspove Säviga - 1 varsler lebeltet - snöspurv
hørt ved Lista fyr. Dessuten : storskarv - krikvand -
brunnakke - ærfugl - siland - tjeld - sandlo - heilo -
vipe - myrsnipe - rödstilk-- strandsnipe - storspove -
enkelbekkasin - hettemåke - gråmåke - svartbak -
fiskemåke - tyrkerdue - låvesvale - lerce - heippielerke -
linerle - stare - skjære - kråke - jernspurv - steinskveit-
kjöttmeis - gråspurv - bokfink - björkefink - grönnsisik -
vornirisk - sivspurv. Sum : 51 arter.

7/3-71 .

Rute : Borhaug - Säviga - Verevågen - Slevdalsvatnet -
Borhaug.

Vær : Overskya opphold , noe tåke.Bris fra vest.

5 deltakere , leder Kåre Olsen.

Observerter :

3 dvergdykker Borhavn - 2 hegre Slevdalsåna -
7 gravand Vågsvollvågen , 1 Säviga og 2 Verevågen -
6 stokkand Vågsvollvågen , 51 Säviga og 6 Verevågen -
3 sothöne Säviga - 1 tjeld v.Lista fyr - 1 enkelbekkasin
Säviga, 1 Verevågen og 1 Slevdalsåna - 1 ringdue Groda -
1 svarttross Borhaug. Dessuten : storskarv - ærfugl -
havelle - kvinand - siland - hettemåke- gråmåke -
svartbak - fiskemåke - stare - skjære - kråke - lerce -
kjöttmeis - gråspurv - gulspurv. Sum : 25 arter.

19/3-72.

Rute : Lundevågen - Vollmona - Einarsneset - langs sjøen
til Skiphaug - Østre Hauge - Huseby - Lunde.

Vær : Pent , varmt vær. Østlig bris.

4 deltakere , leder Ottar Osaland.

Observerert :

10 + 14 Branta spec ? utenfor Einarsneset - 2 gravand
Lundevågen , 2 Einarsneset og 6 Haugestrand - 1 plaksand
Einarsneset - 1 spurvehauk over Kråkenesvatnet - 4 sandlo
Einarsneset -- 1 rugde ved Skiphaug - 1 enkelbekkasin
Lundevågen + 1 ved Skiphaug - 8 fjellerke Einarsneset -
1 kaie Østre Hauge - 1 jernspurv, 1 ♀ sivspurv og
1 shöspurv Huseby. Dessuten : skarv spec - stokkand -
krikkand - sjöorre - kvinand - tjeld - vipe - hettemåke -
gråmåke - svartbak - fiskemåke - lerke - skjærpiplerke -
stare - skjære - kråke - gjerdesmett - gråtrost -
gråspurv - grönnfink - bergirisk - gulspurv. Sum: 34 arter.

27/8-72.

Rute : Borhaug - Søviga - Verevågen - Groda.

Vær : Pent , varmt vær.

7 deltakere, leder Kåre Olsen.

Observerert :

1 hegge Verevågen - 5 grågjess fløy SØ o. Skollevoll og
1 grågås S. Søviga - 1 hönsehauk Groda - 1 tårnfalk
Vågsvollvågen, 1 Søviga, 1 Verevågen og 1 Groda -
22 dvergsnipe Vågsvollvågen + 2 Søviga - 1 tindrasnipe
Vågsvollvågen - 1 lappspove Søviga - 1 gulerle Vågsvoll,
4 ved Vågsvollvågen og 1 ved Søviga. Dessuten :

storskarv - gravand - stokkand - krikvand - brunnakke -
erfugl - tjeld - sandlo - heilo - vipe - myrsnipe -
brushöne - rödstilk - strandsnipe - storspove -
enkelbekkasin - hettemåke - gråmåke - sildemåke -
svartbak - fiskemåke - tyrkerdue - sandsvale -
låvesvale - taksvale - lerke - trepiplerke -
heipiplerke - skjærpiplerke - linerle - stare -
kaie - kråke - sivsanger - tornsanger - løv/gransanger -
buskskvett - steinskvett - gråspurv - tornirisk -
sivspurv. Sum : 49 arter.

På disse 6 ekskursjonene er bortimot 100 ulike
arter observert. Gjennomsnittlig blir det 40 arter pr.
ekskursjon.

Ottar Osaland.

FUGLEOBSERVASJONER FRA LISTA/LYNGDAL OMRÅDET I 1973.

Følgende oversikt viser observasjoner av mer sjeldne fugl, samt endel iakttagelser av spesiell interesse for dette distriktet av endel mer vanlige arter. Alle observasjoner som er gjort av NOFa's medlemmer er tilføyd initialer, se oversikt/navneliste på slutten av oversikten. Ellers er brukt observatørens fulle navn.

- Smålom : 1 ex Listahavn 15/12. KO.
- Storlom : 1 ex f. død(oljeskadd) Tjørve 1 /2. KO,TOH,SS.
2 ex Fuglevika-Havika 18/2. RP,MO,LEP.
2 ex Steinodden 15/9. NOF avd.Rogaland.
1 ex Tjørvebukta 20/10. SS.
- Lom sp. : 1 ex Steinodden 18/11. LB.
- Dvergdykker : I likhet med tidligere vintre hadde de fast tilhold i Listahavnen hele vinteren:
(7/1-2 ex,14/1-3 ex,1/2 og 11/2-4 ex,17/2, 18/2,25/2-5 ex,18/3-minst 4 ex). KO.
1 ex Kråkenesvann i fullsommerdrakt 23/4. KO.
1 ex Prestevann 15/10 og 18/11. RP,LEP.
Fra slutten av okt. og ut året ble det igjen Dvergdykker å finne i Listahavnen: (28/10-2 ex, 11/11,2/12,8/12 og 29/12-3 ex). KO.
- Horndykker : 2 og 3 ex ble obs. Tjørvebukta hele vinteren:
(7/1-2 ex,4/2-3 ex,11/2 og 18/2-2 ex,25/2 og 6/3-3 ex). KO.
3 eller 4 ex i full sommerdrakt 21/4.SS.
2 ex Tjørvebukta 2/12. KO.
- Gråstrupedykker : 1 ex Steinsviga v/Östhasselneset 28/10.

- Toppdykker : Gjorde også dette år hekkeforsök i Kråkenesvann.
1 par Kråkenesvann 20/5, 22/5, 23/5. OO,KO.
1 ex Kråkenesvann 27/5. KO.
1 par Kråkenesvann hvorav den ene lå på en flytende røransamling,sannsynlig reir.30/5. KO.
1 par Nesheimvann 3/6. NOFAL.
I tiden 4/6-8/6 ble en fugl sett daglig,liggende på reiret.
Fuglene forsvant etter en sterk kuling 9-10/6.
Reiret ødelagt av bølger?
Også utover høsten ble det gjort en del enkeltobs:
1 ex Kråkenesvann 6/9 og 7/9. KO.
1 ex Lundevågen 15/9. NOF Rogaland.
1 ex Haugestrand 27/10. OO.
1 ex Fuglevika-Havika 18/11. RP,LEP.
- Havsule : Fåttallig vår og høst,således:
3 ex Tjörve 3/2. KO.
1 ex Tjörve 6/4. KO.
2 ex Tjörve 14/4. KO.
2 ex Steinodden 24/4. KO.
2 ad. Steinodden 15/9. NOF Rogaland.
4 ad. Steinodden 16/9. NOF Rogaland +KO.SS.
5 ex utenfor Einarsneset 30/9. OO.
- Hegre : Enkeltindivider blir obs meget vanlig hele vinteren
Lista-Lyngdal.
19 ex i en flokk,Kråkenesvann 20/10. TT.
- Ringgås : 1 ex skutt Sæviga 3/10. Bevitnes KO.
- Kortnebbgås : 1 ex Skollevoll (også obs nov. 72) 21/1. KO.

- Sædgås : 1 ex funnet skutt Vollmona 1/10. KO.
- Knoppsvane : Overvintret i Nesheimvann.
 1 ad., 2 juv. Nesheimvann 14/1. ST, RP, MO, LEP.
 2 ex Nesheimvann 11/2. LB, KO.
 4 ex Nesheimvann 18/2. RP, MO, LEP.
 3 ex Nesheimvann 15/3. KO.
 3 ex Nesheimvann 18/3. LEP, RP.
 En ungfugl hadde tilhold på Nesh.vn. i slutten
 av mai/beg. av juni: 25/5-1 juv. RP, TH.
 1 juv. 3/6. NOFAL. 1 juv. 7/6. KO.
- Sangsvane : Forekom i Nesheimvann i stadig stigende antall
 utover vinteren. Største antall obs 6/3-ca.60 ex. KO
- Gravand : 3 ex Tjørvebukta 18/2. KO.
 2 ex Fuglevika-Havika 18/2. RP, LEP, MO.
 Viser tidlig ankomst under vårtrekket.
 4 ex Kviljosanden 4/11. Var antagelig etternølere
 på trekk. NOFAL.
- Krikkand : Overvintret i lite antall:
 3 ex Tjørve 5/1. TOH.
 2 ex v/Slevdalsvn. 13/1. KO.
 1 ex Nesheimvann 19/12, 25/12, 27/12. OP.
 8 ex Nesheimvann 18/3. RP, LEP.
- Stjertand : Fåtallig under høsttrekket
 6 ex Seviga/Steinodden NOF Rogaland 15/9
~~16~~ 2 ex Seviga + 2 ex Steinviga 16/9. KO.
 2 ex Seviga 18/10. OO, TT, T. Dåsnes.

- KNEKKAND : 1 par i elva v/Bringsjordneset, Lyngdal
29 - 30/4. KJ, PG, TH.
- SKJEAND : 1 hann Stave 8/7. KO.
1 ex v/Steinodden 15/9. NOF Rogaland.
- TAFFELAND : 1 hann Kråkenesvann 1/4. OO.
1 hann Kråkenesvann 8/9. KO.
4 ex Kråkenesvann 27/10. OO.
15 ex Hanangervann 28/10. OO.
- TOPPAND : Forholdsvia tallrik i januar, således f.eks.:
63 ex Hanangervann 14/1. OO.
Arten er hittil ikke funnet hekkende i
dette distriktet, men etpar observasjoner
er gjort midt i hekketida:
1 par i Fugletjønna v/Steinodden 8/6. KO.
1 hann Kråkenesvann 18/6. OO.
- BERGAND: : Forholdsvis vanlig overvintrer, bl.a.:
20 ex Hanangervann 14/1. OO.
8 ex Kråkenesvann 18/2. OO.
15 ex Nesheimvann 18/3. LEP, RP.
10 ex Kråkenesvann 18/3. OO.
En sver flokk ble obs. på Prestevannet 15/10-
hele 215 ex. LEP, RP.
- ÆRFUGL : Under vannfugltellingen 14/10 ble det obs.
usedvanlig mye ærfugl - hele 619 ex hvorav
600 på strekningen Fugleviga - Haviga. RP, LEP.
- LAPPFISKAND : 1 hunn hadde fast tilhold i Steinsviga
i tiden 14/1 - 18/2. KO, LB, TH.
- TRANE : 1 ex fløy over Slevdalsvann/Groda 20/5. NOFAL.

- FJELLVÅK : 1 ex obs. Lista 7/1 og 14/1 viser at arten kan overvintre her. KO.
- MUSVAK : 2 ex overvintret på Lista. Flere obs i tiden 13/1 - 12/3. KO,RP,LEP,MO. Se side 25.
- KONGEØRN: : 1 juv. Lista 20/10. LB.
1 ex Lista 8/11. RY.
- MYRHAUK : 1 og 2 ex overvintret Lista. Flere obs. i tiden 7/1 - 1/5. KO, TOH.
7 obs. i september viser at trekkintensiteten er størst i denne måneden. Alle obs. Lista. KO, LB, NOF Rogaland
2 obs. av enslige fugl på Lista i november og 2 obs. i desember s.s. viser at overvintring forekom også denne vinter. OP, KO.
- SIVHAUK : 1 hunn obs. Lista 30/5 og 2/6. KO.
- JAKTFALK : 1 ex obs. Lista 7/1, 13/1, 25/2. KO.
- VANDREFALK : 1 ex Lista 22/4. TOH, EM.
1 ex Lista 15/9. NOF Rogaland.
- DVERGFALK : 1 ex obs. Lista 21/3 og 27/3 viser tidlig ankomst om våren. KO. (28/3 er tidl. dato ifølge Norges Fugler).
- TARNFALK : Overvintret.
1 ex Lista 7/1. KO.
18/11 - 1 ex Lista KO, LB.
- FISKEØRN : 1 ex sett 3 dager primo sept. Spind. Opplyst av A. Svendsen.
1 ex Kvås 18/6 PG.
- HAVØRN : 1 ex Lista 30/9. OO.

- VANNRIKSE : 1 ex funnet Tjörve. \$3/2. Syk, døde. TOH.
 1 ex funnet Groda. 17/2. Overkjört. TOH.
 1 ex funnet død Buland 1/10. OO.
 1 ex Buland + 1 ex Torp 14/11. OO.
 Minst 1 ex hørt regelmessig v/Nesheimvann
 fra 29/10 og ut året. OP.
 1 ex tatt av katt Havika/Spind 16/10. AN.
- ÅKERRIKSE : 6 ex hørt noenlunde regelmessig på Lista
 i mai/juni (1 ex Vågsvoll, 1 ex Nesheim,
 1 ex Dyngvoll, 1 ex Kviljo, 1 ex Vere, 1 ex
 Stave). KO.
 1 ex Bringsjoraneset, Lyngdal 12/5. KJ,TH.
- SIVHØNE : 1 ex Kråkenesvann 25/3. NOFaL.
 1 ex Lyngsvåg 5/4. PG,KJ,TH.
 Ett hekkefunn.v/Mosvoll: 1-2 ex sett fast
 fra 6/6 og utover. TT,OO. 22/6 ble et reir
 funnet i et parti med elvesnelle, tyensynlig
 bygget av gamle snelleplanter. TT.
 1 ex Stave 8/7. KO.
 1 ex Kråkenesvann 8/9. KO.
 1/ex obs. daglig Prestevann i tiden 6/11 - 19/11.
 Den 16, 17, 18/11 var der 2 ex. RY,RP,LEP.
- SOTHØNE : Ca. 15 ex hadde fast tilhold i Nesheimvann
 i jan, febr., mars. ST,RP,LEP,MO,KO.
 2 ex Kråkenesvann 29/4. OO.
 1 par (muligens 2) Slevdalsvann 1/5. KO.
 1 ex Tjörve 19/5. TOH.
 40 ex Nesheimvann 18/11. RP.
- TJELD : Overvintret Lista i jan/febr. og nov/des.:
 1 ex Tjörvesanden 7/1, 11/2, 16/2. KO.
 2 ex Osthasselneset/Kviljoødden 14/1. ST,RP,LEP,MO.
 1 ex Haugestrand 10/11. OO.
 2 ex Tjörvesanden 16/12. KO.

- Boltit** : Noen få obs. v/Borhaug i mai:
4 ex 13/5, 16/5-6ex, 8 ex 19/5, 5 ex 20-23/5.
KO, LB, NS.
- Vipe** : Etternölere på trekk/overvintring ble påvist
Borhaug 25/11 - 25 ex og Borhaug 8/12 - 1 ex. KO.
- Tundrasnipe** : Obs. fåtallig Tjörve i sept. KO.
1 ex Fugleviga 4/11 syntes å være sent ute.
(Var sammen med 17 myrsniper) NOFaL.
- Sotsnipe** : Enkeltindiv. obs. under høsttrekket:
1 ex Brekne 25/7 og 12/8. KO.
1 ex Tjörve 9/9. KO.
1 ex Verevågen 16/9. LB.
1 ex Kråkenesvann 4/10. KO.
- Gluttsnipe** : 1 ex Mosvolltjern 22/6. TT.
- Svarthalespove** : 1 - 2 ex v/Borhaug 6/5, 12/5, 14/5. KO.
- Lappspove** : 1 ex Haugestrand 11/11.00.
- Storspove** : Overvintret fåtallig, således:
3 ex Huseby 6/1, 3 ex Hauge 28/1 og
1 ex Huseby 4/3. 00.
1 ex Haugestrand 00 + 2ex Einarsnes 11/11.T.Dåsnws.
1 ex Sevig + 1 ex Vågsvoll 18/11. KO.
1 ex Brekne 24. og 25/11. KO.
- Rugde** : Overvintrende indiv. obs Groda og Vanse, h.h.v.
3/2 og 15/2. KO.
Et reir funnet på Jørstad inneholdt egg som var
unormalt store (iflg. Haftorn). 3 egg viste
følgende mål (l/b): 51,2/32,3, 43,4/32,3,
52,3/32,0. 1 egg tatt av kråke, reiret ble
deretter skydd. LB.

Enkeltbekkasin : Flere obs. fra januar/februar:

- 1 ex Kråkenes 7/1. 00.
- 1 ex Haugestrand, 1 ex Havika, 1 ex Hananger,
- 1 ex Torp, alle obs. 14/1. 00.
- 1 ex Skiphaug 28/1. 00.
- 1 ex Tjörve 25/2. KO.

Observervert også i november/desember:

- 2 ex Brekne 27/11 KO.
- 1 ex Vatne v 1/12 og 2 ex s.s. 22/12. KO.

Kvartbekkasin : Fåttallig under hösttrekket:

- 1 ex Seviga 14/10. KO.
- 2 ex Tjörve 21/10. KO.
- 1 ex Brekne 27/10 og 28/10. KO.
- 2 ex Brekne 3/11. KO.
- 2 ex Brekne 4/11 (KO) + 1 ex Fugleviga 4/11. NOFaL.

Fjelljo : 1 ex Einarsnes 14/7. G.Langhelle m.fl.

Polarmåke : 1 juv. i 1. vinterdrakt Vågsvollviga 18/11. KO.
2 juv. Vågsvollviga 16/12. KO.

Splitterne : 2 ex Tjörvebukta 31/5. KO.

Alkekonge : 1 ex funnet död (oljeskadd) Tjörve 10/2. KO.

Teiste : Hekket sannsynligvis på Rauna dette år:

- 2 ad. obs. Tjörvebukta 26/6. EM.
- 1 unge fotografert Tjörvebukta 16/7. EM.
- 1 ad. Rauna 6/7. EM.
- 1 juv. Listahavn 14/8. KO.
- 1 ex litt utenfor Korshavn 31/5. PG,KJ,TH.

Turteldue : 1 ex Vatne v 1/5. KO.
1 ex Kalleberg 4/5. LB.
3 ex v/Lista fyr 1/7. KO.
1 ex Huseby 10/11. 00. (Juv.)

Skogdue : 2 ex Eiken 17/5. TH.

- Hubro : 2 ex obs sittende på en fjellhylle et
sted i Lyngdalsdalføret den 14/3. Fuglene
var lite sky og fløy først på en avstand av
ca 15 meter. S.Dalgaard Nielsen.
- Hornugle : Se side 24.
- Jordugle : Se side 24.
- Perleugle : 1 ex hørt fra 3/5 og utover våren til 21/6
et sted innen Farsund kommune. T1,00.
- Kattugle : Se side 27.
- Isfugl : 1 ex obs Hovden, Spind noen dager i oktober.
Meddelt ved Thyge Reisvaag.
Hørt og sett med sikkerhet første gang 29/10,
og senere obs. hele november og desember ved
Vansebekken, Vatne ø, Lydbåndopptak gjort
og avspilt NOFaL's medl.møte 25/1. Fleste
ganger 1 ex obs, men 23/12 hørt 2 ex.
29/12 hørt 1 ex ved Vatne ø, og et kvarter
senere obs 2 ex ved Bryne - ca 500 meter lengre
oppe ved Vansebekken, OP.
- Hærfugl : 1 ex Buland ca 10/6. Beskrivelse innlevert.
Trond Sörensen
1 ex skutt Kjørestad, Farsund primo oktober.
Hodeskalle og fjær fremvist på NOFaL medl.møte.
- Grønnspekk : 1 ex hørt Stokke og Buland 22/10. 00.
1 ex Mosvoll 27/10. 00.
1 ex Tjørve 26/7. EM.
- Gråspekk : 1 ex Fuglevika 4/11. NOFaL
1 ex Stavestø 18/11. Jan Olav Jermansen.
1 ex Einarsnes 2/12. T. Dåsnes.

- Svartspett : 1 ex Nötland, Spind 5/10. AN.
- Flaggspett : Etter den invasjonartede opptreden høsten 1972 ble bare få indiv. obs. utover vinteren 1973 og da for det meste enkeltindiv. Høsten 1973 var arten nesten ikke å se på Lista.
- Dvergspett : 1 ex Sunde 11/2. 00.
1 reir funnet Sævik, Spind. AN.
- Tretåspett : 1 ex Vatne ö 30/9. OP.
1 ex Bryneheia 28/10. RM.
- Fjellerke : Treffes vinterstid sparsomt, gjerne helt i sjøkanten, således:
Ca 30 ex Steinsviga, Nordhassel 14/1. KO.
Ca 23 ex Fuglevika, Osthassel 11/2. KO.
16 ex Tjörvesanden 25/2. KO.
15 ex Fuglevika 18/3. KO.
Noen höstobservasjoner tyder på en viss trekkintensitet i oktober:
7 ex Hauge ö 30/9. 00.
2 ex Sevika + 10 ex Tjörvesanden 14/10. KO.
1 ex Tjörve 19/10. SS.
68 ex Tjörvesanden 21/10. KO.
6 ex Steinsvika 28/12. KO.
- Trepipplerke : 1 reir funnet Havika, Spind i juni (5 egg). AN.
1 ad med mat i nebbet obs mellom Havik og Spindsodden 17/6. 00.
- Engelsk gulerle : 1 hann ved Slevdalsvann 12/5 og 14/5. KO.
1 par ved Nesheimvann 3/6 og 13/6. NOFaL/KO.
- Vintererle : 1 ex ved Vansebekken 15/12. OP.
- Svartryggerle : 1 ex Brekne 17/4. KO.
- Linerle : 2 ex Tjörve 22/3 TOH viser tidlig vartrekk.

Tornskate : 1 hann og 1 hunn Groda 20/5. LB,KO.
1 hann og 1 hunn Björnestad, Oyna 20/5. TT.
1 hann Jörstad 10/6. LB.
1 juv. fanget Kalleberg 19/8. LB.

Varsler : Forholdsvis mange obs. dette år:
2 ex Eiken 14/1 PG,TH,KJ.
1 ex Groda 21/2. KO.
1 ex Eiken 25/2. PG,TH,KJ.
1 ex Bringsjordneset 1/4. KJ.
1 ex v/Slevdalsvannet 23/4. KO.
Som i tidligere år synes oktober å være
måneden med størst trekkintensitet:
1 ex v/Lista flyplass 15/9. NOF avd. Rogaland.
1 ex v/Bekkeviktjern, Spind. 5/10. AN.
1 ex Hanangermona 7/10. OO.
1 ex jaget blåmeis Kalleberg 12/10. LB.
1 ex Tjörve 17/10. SS.
1 ex Eikjeland, Lyngdal, 28/10. PG,TH.
1 ex Vågsvoll 28/10. KO.
1 ex Lungevågen 1/11. KO.
1 ex Råstad 10/11. KO.
1 ex Bringsjordneset 3/12. KJ.
1 ex Nekland, Kvinesdal 23/12. KJ,TH.

Nöttekråke : 1 ex Kråkedalen 11/8. OP.
1 ex Vatne ø 16/8. OP.

Kornkråke : 1 ex Brekne + 1 ex Groda 5/4. KO.
1 ex Hauge ø 22/4. KO.
1 ex Huseby 7/10. OO.

Svartkråke : 1 ex Sunde 10/2, 11/2 og 10/3. OO.
1 ex Hauge ø 14/3 og 25/3. OO,NOFAL.
1 ex Tjörve 15/3. KO.
Fra 19/3 og utover ~~xxx~~ til juli ble 1 ex ofte
obs av flere i og ved Farsund by.
1 ex Tjörvesanden 30/6. KO.
1 ex Stave 8/7. KO.
1 ex Kalleberg 15/11 og 28/11. LB.
1 ex Sunde 2/12. TT.

- Sidensvans : Som nevnt i Piplerka 1/73 s. 29-31 var arten tallrik høsten 1972 i Farsund. Det foreligger også noen vinterobservasjoner:
2 ex Kjörestad 25/1 og 10/2. 00.
Ca 20 ex 10/2 og 8 ex 12/2 i Farsund by. 00.
Arten opptredte relativt sjeldent om høsten:
1 ex 7/11 og 22 ex 15/11 Farsund. 00.
Ca 10 ex 11/11 og 3 ex 8/12 Brekne. KO.
1 ex v/Lista fyr 16/12. KO.
1 ex hørt Nesheim 25/12. OP.
- Fossefall: : Arten opptrer sjelden på Lista, noen oktoberobs. tyder muligens på en viss trekkbevegelse:
1 ex Stokke (Hanangervann) 14/1 og 28/10. 00.
1 ex Vågsvollvåien 14/10. KO.
1 ex Buland (Kråkenesvann) 22/10. 00
Se ellers s. 31 f
- Gresshoppesanger : 1 ex Groda 15/5 - 20/5. Ringmerket. KO, LB.
2 eller 3 ex Vågsvoll + 1 ex v/Slevdalsvann 20/5. KO.
1 ex Vågsvoll 23/5 og 28/5. KO.
1 ex hørt Nordhasselmyra 7/6. LB.
1 ex Langåker 21/6. KO.
- Rørsanger : 1 syngende hann i Nesheimvann 18/6. KO.
1 ex Kråkenesvann 18/6. 00.
1 ex Slevdalsvann 7/6 og 23/6. LB.
Se ellers s. 37
- Trostesanger : 2 ex Kråkenesvann 19/6. 00, TT, T. Dåsnes.
Se s. 39.
- Gulsanger : 2 ex (1 syngende) Jörstad og 2 ex Tomstad 27/5. LB.
- Hauksanger : 1 juv. fanget og ringmerket Kalleberg 21/9. LB.
- Munk : Et par sene høstobservasjoner kan nevnes:
1 hunn Farsund 8/11. Tr.
1 hunn Buland 10/11. 00.

- Möller : 1 ad ved halvferdig reir Savik, Spind, 4/6.
Reiret ble siden forlatt. OO,TT,T.Mygland.
- Gransanger: : 1 ex obs Brekne 7/1 viser at arten kan over-
vintre. KO.
1 ex obs Huseby 25/3. NOFal. Tidligste vår-
trekkobservasjon i Norge er iflg. Haftorn
(1971) den 28/3.
- Böksanger : 1 ex hört Bjørnestad, Oyna 24/5. OO,TT.
- Fuglekonge : 1 ad matet 1 pull + nok 2 pull ? obs. Mosvoll
16/6. OO.
- Svart rødstjert: 1 ex obs. Vatne 8 28/10. OP.
- Blåstrupe : 1 ex ranget i nett Kalleberg 8/9. LB.
2 hanner + 1 hunn Brekne 9/9. KO.
1 ex Bringsjordneset 23/9. KJ.
- Ringtrost : Master sparsomt på Lista under trekket.
1 ex Kalleberg 28/4. LB.
1 ex Buland 1/5. OO.
1 ex Brekne 4/11. KO.
1 ex funnet død Nordhassel 28/12 (død minst
etpar måneder). KO.
- Duetrost : 1 ex Brekne 29/4. KO.
- Stjertmeis : 1 reir med 6 egg Nötland, Spind ~~den~~ primo mai.
Ble siden forlatt. AN.
4 ex, derav minst 2 pull. Buland 2/6. OO.
- Stillits : Mange observasjoner hele året. Funnet
hekkende. Se egen artikkel side 46.
- Rosenfink : Funnet hekkende på Lista. Se egen artikkel.s.47.

- Hortulan : 1 ad hunn fanget Kalleberg 21/9. LB.
- Sivspurv : Også dette år overvintret arten på Lista:
 3 ex Brekne 7/1. KO.
 1 ex Tjörve 14/1 og 11/2. KO.
 2 ex Tjörve 4/2 og 1 ex s.s. 25/2. KO.
 1 ex Groda 12/3. KO.
 1 ex Haugestrand 25/3. NOFaL. Tidl. vårtrekk ?
 1 ex Brekne 1/11. KO.
- Lappspurv : Forekommer forholdsvis regelmessig på Lista under vårtrekket, så også dette år:
 Ca 15 ex den 20/4 og ca 10 ex den 21/4 obs. Nordhassel. KO.
 2 hanner Nordhassel + 1 hunn Kviljo 22/4. KO.
 Ca 10 ex Brekne 25/4. KO.
 1 hann Hellemyra, Skeime övre 5/5. KO.
 Sparsom om hösten:
 1 ex Steinsviga, Nordhassel 8/9. KO.
 1 ex ved Lista fyr 16/9. KO.
- Snöspurv : Mange vinterobservasjoner fra strekningen Steinodden - Einarsnes. LB, KO, OO. Maks. ca 80 ex i en flokk obs. Tjörve 4/2. Tidlig hosttrekk konstantert 16/9, 1 ex Verevågen. LB.
 Ellers noen få obs. i november og desember i Borhaugområdet. KO.

Til denne oversikten som er bearbeidet av Feltutvalget/NOF avd.

Lista (NOFaL) har følgende medlemmer levert inn observasjoner:

Lars Bergersen - LB.	Per O. Grimsby - PG.	Tor O. Hansen - TOH.
Torrey Hægeland - TH.	Kurt Jerstad - KJ.	Andor Nötland - AN.
Even Martinsen - EM.	Kåre Olsen - KO.	Magnar Omdal - MO.
Ottar Osaland - OO.	Leif E. Pedersen - LEP.	Roy Pedersen - RP.
Oddvar Pedersen - OP.	Sverre Sandersen - SS.	Njål Sölvberg - NS.
Tore Torjesen - TT.	Sverre Tveit - ST.	Rolf Ytterdal - RY.
Rolf Moseid - RM.		

HEKKING AV ROVFUGL 1973.

Av Torry Hægeland

Jordugle Asio flammeus

Det ble konstatert 4 hekkende par + at der var minst et par hvor hekking var sannsynlig:

1 reir ble funnet på Lista 12/5. Reiret inneholdt 5 egg, hvorav det ene var råttent. Den 4 ungen ble klekket 23/5. 1 unge merket 30/5. Den 2/6 var reiret tomt, trolig røvet av rev.

1 reir med 3 store unger funnet på Lista ca. 17/6. 1 nesten flyvedyktig unge merket 28/6.

1 kull store unger funnet på Lista den 5/7. 2 unger merket 8/7.

1 koll med 3 eller 4 flyvedyktige unger ble observert et sted på Lista i begynnelsen av august.

Minst et par til med en oppførsel som tydet på reir/med unger ble observert på Lista dette året.

Hornugle Asio otus

1 reir med 6 egg funnet på Lista 23/4. 5 unger 6/5.
5 unger merket 16/5.

1 reir med 5 egg funnet på Lista. 1 egg tatt av guttunger.
Ungene hoppet ut av reiret 1/6. 3 unger merket 2/6.

1 reir funnet 22/4 i Lyngdal. 2 unger + 2 egg 8/5.
2 unger vokste opp, begge merket.

1 reir funnet 3/5 med 4 egg, i Lyngdal. 3 unger vokste opp, alle 3 merket.

På en helt annen kant av Lyngdal ble også Hornugleunger hørt denne sommeren, dette skulle tyde på enda et reir.

Kattugle se eget stykke side 27.

Hönsehauk Accipiter gentilis

1 reir med 3 egg funnet i Eiken 17/5.3 unger 7/6, som ble merket.

1 reir med 2 små unger funnet i Kvinesdal 24/5.2 store unger 14/6, som begge ble merket.

Musvåk Buteo buteo.

1 reir med tydelige tegn etter hekking ble funnet 3/7.

2 ad + 2 store unger i nærheten.

Ved et Hönsehaukreir 7/6-73.

Av Torry Hægeland.

- 6.30. Ankom reiret. 3 små unger. Hunnen fløy skrikende rundt meg. Satte meg inn i kamuflasjeteltet.
- 7.00. Hunnen landet på reiret, var meget mistenksom.
- 7.10. Den slappet av litt, pusset fjørene.
- 7.15. Hoppet lenger inn på reiret. Bedre fotohold.
- 7.25. Hun la seg ned på ungene.
- 7.40. Jeg prøvde å stikke kikkerte ut av et sidevindu i kamuflasjen, men da fløy hun av.
- 8.05. Hun satte seg i reirtreet.
- 8.20. Hun hoppet ned på reiret.
- 8.35. Hannen landet i et tre i nærheten, og lokket på hunnen som kom og hentet en trost han hadde med seg.
- 8.40. Hun landet på reiret med trosten, satt her med den noen sekunder og fløy så av med den igjen.
- 8.43. Hun kom tilbake med den, Reiv trosten i stykker og gav ungene.
- 8.48. Hun la seg ned på ungene.
- 9.05. Jeg gikk for å hente mer utstyr og skremte den dermed av.
- 10.00. Ankom igjen. Jeg verken hørte eller så noen Hönsehauk.
- 10.15. Hørte den i nærheten av reiret.
- 10.40. Landet på reiret få sekunder.
- 10.45. Hørte hannen lokke i nærheten.
- 10.48. Hunnen kom med mat, og matet ungene i ca. 3 minutter. Fløy så av reiret.
- 11.34. Landet på reiret få sekunder.
- 12.15. Landet på reiret og la seg ned på ungene.
- 12.55. Den fløy av reiret igjen, og en halv time senere gikk jeg.

SLUTT. (på moroa).

OBSERVASJONER ANGÅENDE KATTUGLEHEKKING I LYNØDAL
OG FARSUND VÅREN 1973.

Av Kurt Jerstad

Når man tar i betraktning det store antall kattuglehaner som blir hørt innen området hver vinter og vår, er det bemerkelsesverdig få reir som er funnet i de siste årene. Derfor bestemte Torry Hægeland, Per O. Grimsby og jeg oss til å gå dette forholdet litt nærmere etter i sømmene, og det viste seg som vi på forhånd hadde antatt at kattugla kan være en til dels meget vanlig hekkefugl enkelte steder der den kan finne egnede hekkeplasser og forholdene ellers passer den. 1973 var et godt smågnagerår i området, og det viste seg at det som råge~~a~~ hekket et par dersom det var hørt en han et sted. Tilsammen ble det gjort 13 hekkefunn dette året, foruten disse ble det på 2-3 biotoper obs. ugler under omstendigheter som sansynliggjør hekking i nærheten. Det må gjøres oppmerksom på at størstedelen av de "aktuelle" kattuglebiotopene ikke ble undersøkt i det hele tatt, så antall hekkende par innen de to kommunene ligger nok langt høyere, i hvert fall i et smågnagerår.

Reir 1: 18/3. Det lå ei ugle i en kasse. Den bakset litt i kassen, men fløy ikke ut da jeg dunket litt i kassen. 1/4. Jeg løftet opp ugla og talte eggene, 5 i tallet. Den reagerte nesten ikke da jeg løftet den opp, den åpnet knapt øynene.

13/4 var 3 unger klekket. 2 hele og en $\frac{1}{2}$ vånd lå ved siden av ugla.

16/4 var alle ungene utklekket. Det lå 4 mus og 8 vånd i kassen, noen var spist på. (Alle fra hodet.) Ingen av gangene reagerte ugla når vi åpnet lokket og tittet nedi.

28/4. Ungene var nå ca. 2 uker gamle og ugla hadde nå flyttet ut av kassen. Neste dag var den meget aggressiv og fløy gjentatte ganger rett i hodet på meg, en gang tok den lua mi og fraktet langt ut i et vann som lå likke ved.

8/5 hadde 2 unger forlatt reiret. Den ene satt like ved. 10/5. 4 unger hadde nå forlatt reiret og den 5 satt i åpningen. 3 unger ble merket.

Denne kassen hang ca. 2 $\frac{1}{2}$ m. oppe i ei or like ved et vann.

Reir 2: Dette reiret lå i en kasse som hang ca.220 m.fra den forrige.Den hang ca.4 m.höyt ut mot samme vannet.
3/4.Det lå ei ugle og ruget på 3 egg i kassen,denne ugla fløy heller ikke ut da vi flyttet den.
4/4 hadde ugla ikke til hold i kassen og kom heller ikke til bake til den senere.Grunnen kan muligens være territoriestrid med det andre paret,da de jo var svært nær hverandre.

Reir 3: Dette reiret lå i en kasse som hang i ei or på en elvebredd.1/4 ruget en ugle på 5 egg i kassen,den fløy ut da vi talte eggeng.
13/4 var det fremdeles 5 egg i kassen.Det lå fjær av en lerce og en st ær i kassen.
17/4 var reiret forlatt,muligens på grunn av forstyrrelser.

Reir 4:Det lå i en kasse ca.500 m. fra reir 3.Ca.1/5 ruget en ugle på 3 egg i kassen.Det er meget sansynlig at dette paret var det samme som gjorde forsök på hekking i nabokassen.3 ting peker mot det.Den korte avstanden imellom,det sene tidspunkt for egglegging og det relativt lave eggantall.
Ca.1 uke senere var 2 egg fjernet av mennesker,men ugla ruget på det ene.Enda en uke senere var også det siste egget fjernet.

Reir 5: 22/4 fant vi et reir som lå på höyet i ei løe.
Det inneholdt 5 unger,den minste var ca.2 dg. gml.
5/5 satt jeg i løa fra 1930 til 2100.På denne tida ble ungene matet 3 ganger.Kl.1931 med en vånd,kl. 2025 med en smågnager og kl.2035 med en smågnager.
6/5 var vi til stede fra kl.2000 til kl.2145.
1 gnager kl.2003,kl.2040 ble de matet med en gnager.
1 gnager kl.2045,1 gnager kl.2110 og en frosk kl. 2125.Begge disse dagene ble byttedyrene bare levert i reirgropa för ugla fløy ut igjen.Det var kamp om ~~hæ~~ matbit,bare den som sist hadde fått deltok ~~ikk~~ ikke i striden.Likevel så det ut til at musene ble slukt hele av de 4 störste etter tur.Den minste fikk aldri noe.Den kom til kort i kampen for tilværelsen.
7/5 var den minste ungen forsvunnet.Ungene fikk denne kvelden fra kl.2000 til kl.2200 4 smånagere.

22/5 hadde ungene forlatt reiret, 3 av dem ble fanget og ringmerket.

Av 12 byttedyr som disse ungene fikk var det 1 frosk og 11 smånagere, hvorav minst en var vånd. Observasjonstiden var tilsammen 285 min. og det vil si at ungene fikk et byttedyr hvert 24. minutt.

Reir 6: Det lå "normalt" i et hult tre. Reiret inneholdt ved funn den 13/5 6 egg, omtrent alle eggene var knust og reiret var forlatt.

Reir 7: Fikk høre at et reir med 5 egg var funnet ca. 19/3, 2 av eggene ble fjernet straks. Reiret lå i et hult tre. 17/4 var alle ungene utklekt. Det lå i mus i reiret. 10/5 ble alle 3 ungene ringmerket.

Reir 8: 8/4 ble vi anvist et reir av B.S., det lå i et hult tre og inneholdt 4 egg. 10/5 inneholdt reiret 4 ganske store unger. Vi hadde bare 3 ringer og de tre største ble ringmerket. Hannen brukte ei løe et stykke ifra som "overdagingsplass".

Reir 9: 8/4 fant vi etter anvisning av T.R. et reir med 3 egg. Reiret lå i et hult tre og inngangshullet lå hele 3 m. høyere i treet enn selve reirbunnen. Hannen satt i et tre ca. 15 m. ifra reirtreet. Reiret ble ikke undersøkt senere.

Reir 10: 8/4 undersøkte vi et hult tre som det vanligvis er reir i, og så også i 1973. Reiret inneholdt 4 egg. 15/5 var det 2 unger i reiret. 1 eller 2 egg sansynligvis fjernet av mennesker, da reiret er ganske godt kjent blant folk i nabolaget.

Reir 11: A.N. fortalte om et reir som det ca. 10/4 var 3 egg i. 19/4 var det bare et egg igjen, de 2 andre sansynligvis fjernet av mennesker. Uglå ruget fremdeles. Senere ble også det siste egget fjernet.

Reir 12: 3/5 fikk vi greie på via M. J. at et reir med 3 unger var funnet. ~~X~~


Reir 13: 15/5 fikk vi vite via M. J. at enda et reir med 3 unger var funnet av noen barn, 2 av disse ungene ble senere tatt og holdt i fangenskap.

Det går tydelig fram av eggantallet til kattugla at 73 var et utpreget smågnagerår. Av 6 reir undersøkt i 71 og 72 som var dårlige hva smågnagere angår, ble det et gjennomsnitt på 2,33 egg pr. reir. I 9 reir med antatt normalt fulllagte kull var det tilsammen 40 egg, det gir et gjennomsnitt på 4,44 egg, og det er jo nesten dobbelt så mange. (73) Skal man dømme etter kullstørrelsen ser det ut til at det var mer mus og vånd rundt selve Lyngdalsletta enn lenger ut mot kyåten, for det var en vesentlig forskjell på kullstørrelsen i de to områdene. I 4 reir i det "indre" området var det 6 egg i et reir og 5 egg i de 3 andre, det gir et gjennomsnitt på 5,25 egg pr. reir. I 5 av de yttre reirene var det 5 egg i et reir, 4 egg i 2 og 3 egg i 2. Det gir et snitt på 3,80 egg pr. reir, så det var ganske stor forskjell.

Våren kom tidlig i 1973 og det ser ut til at kattuglene av den grunn kom i "vårstemning" litt tidligere enn vanlig. I 3 kull med 5 egg der enten klekkedato eller leggedato ble nøye kontrollert, kan vi ved å regne tilbake konstatere at legging av første egg må ha skjedd ca. 14/3 i alle 3 reirene. Vi følger da "Haftorn" av 71 og regner at rugetiden er ca. 29 døgn. I "Haftorn" av 71 er 15/3-49 og 16/3-61 angitt som tidligrekorder i Norge. (Med ett unntak.) Selv om vi bor helt sør i landet tror jeg ikke at så tidlig hekking er vanlig. De 3 reirene som G. Langhelle undersøkte i Spind i 1970 startet således hekkingen bortimot 20 dager senere. ~~Har antydde eggstør som by byttet rart for kattugla, til det må hevnes at det i reir nr. 3 ble funnet mange fjer av~~

Som vi nå skal se er det ikke ensbetydende med stor ungeproduksjon at reirene inneholder mange egg. 10 reir med tilsammen 43 egg ble undersøkt etter at ungene var blitt ganske store, og jeg regner her med at de ungene som da var i fin form vil komme til å bli flyvedyktig. Av de 43 eggene var det bare 18 unger som vokste opp. 10 egg ble fjernet av mennesker, 14 egg ble ødelagt eller forlatt i løpet av rugeperioden, mens kun en eneste unge sakkett akterut og døde, og det er svært lite. Ingen egg var ubefruktet av dem som ikke ble fjernet eller ødelagt.

Haftorn angir at hvert uglepar må fostre gj. snittlig 2,6 unger pr. år for å motvirke den store dødeligheten som kattuglene har. 18 unger på 10 par er derfor nokså skremmende, spesielt når man tar ibetraktning at det var "museår", men det gikk sans. bedre for dem som hekket langt fra "allfarvei".



Reirfurn
av
FOSSEKALL

NOF/Avd. LISTA 32VLK

FOSSEKALLEN (Cinclus cinclus.)

Fossekallens heller stillferdige natur gjør at en ikke så ofte legger merke til den, om en da ikke er spesielt ute for å oppsøke den. Ornitologer flest holder seg vel heller lite langs elver og bekker, og sumpområder er ikke den beste biotopen for en fossekall. Dette er vel grunner for at den er blitt så lite studert jevnt over.

I Lyngdal kommune ble den registrert hekkende først i 1973. Jeg kjenner ikke til at ~~den~~ reir er funnet tidligere. Men det ble funnet hele 4 reir, og i tillegg min. et par andre forekomster. Bare det, og i tillegg flere rester etter eldre reir skulle tyde på at fossekallen er årviss hekkende her.

I vinterhalvåret sees ganske mange fossekaller i råker i elveisen eller langs breddene, men det synes som om været betyr litt fra eller til på antallet. Særlig når isen har lagt seg og det bare er råk midt i elva, vil en kunne finne observere jevnt over flere ex. enn når det er helt bart langs elva. En ting er at fossekallen synes bedre mot lys is enn ellers, men jeg har likevel inntrykk av at antallet er høyere. Særlig str. Lyngdal-Kvås (se kart), som jeg har hatt en viss oversikt over, har gitt meg det inntrykket.

Kan det tenkes at fossekallen "trekker med været", d.v.s.holder seg lenger inne i landet i milde vintre, og søker kysten når kulda setter inn?Forholdet bør undersøkes nærmere.Her er vel ringmerking av ungfugl, samt voksne langs bekkefar i vinterhalvåret de beste metodene.

Ingen notater er gjort av observasjoner frem til hekketid 1973 i Lyngdal,men på strekningen Lyngdal-Kvås,ca.20km,vil jeg anslå antallet til 8-12stk., hvilket gir en ganske bra tetthet(ca.1pr.2km.)

På Lista er bare en obs.notert av B.Osaland 14.1. ved Hanangervn.

- (1) Etter at vi,hurt Jerstad og Torry Hægeland og u.t., hadde observert etpar fossekaller ved Skolandsvn. i Lyngdal fra tidlig på våren,som fløy fram og tilbake veldig ivrige hver gang vi var der,og etter oppfordring fra S.Efteland,Kleppe(Sterna),bestemte vi oss for å undersøke saken nærmere.I 16-tida 2.5.iakttok vi begge fossekallene som drev intens matlating i en kulp i bekken 250m ovenfor vannet.Nebbet ble fylt med mat,og fuglene fløy avsted i en bestemt retning,over et furuholt istedet for å følge bekkeløpet i en sving,hver gang. Vi fulgte etter og fant reiret liggende oppå en stein i ene kanten av en 80m lang foss(stign.1:5) Reiret var kittet sammen som en torv,og flyvehullet,som vendte

ut mot fossen, lå ca. 1,5m over vann.

Reiret inneholdt 5 unger som ble anslått til å være 7-10dg.

10.5. hadde O.Osaland med ringer, men ungene kastet seg i fossen. De klarte seg fint, og 4 ble merket. Elva er åpen og steinet, 12-15m bred.

6.5. ble et par observert ved Gusevn. i Kvås, ca. 250moh. Alt tydet på at hekking foregikk, men reir ble ikke funnet og lokaliteten ble ikke undersøkt senere.

(2) 10.5. ble et annet reir funnet på brobjelken under ei bru på Rom, i ei sideelv til Lyngdalselva. Reiret var klistret sammen av samme materialer som foregående reir, men ungene var mye mindre. Antagelig 4 unger, 3-5dg.

Da jeg skulle undersøke reiret 20.5., var det borte, og det er nok trolig blitt plyndret av unggutter eller rovdyr. Elva er her lite steinet og er nesten overgrodd med oretrær. Bredden er 4-5m. Dette reiret er antakelig det ^{sør} lengst i landet som er funnet hittil.

(3) 13.5. fant vi et reir mellom steinblokkene under ei gammel bru (gamle sørlandske hovedvei) over samme elv som foregående reir, 3km lenger øst. Her var 3 unger utflyet, og en fjerde var i ferd med å ta spranget ut. Elva er her steinet og 3-4m bred.

Samme dag ble en utflyet unge matet i Lyngdalselva ved Kvås kirke. Den var stor og fløy godt. Reiret ble ikke funnet, men i Kvåsfossen, 200m lenger oppe i elva, fløy en

voksen fugl ut, og det kan tyde på at her var reir i fjellsidene langs fossen. Men her er uframkommelig for folk. Det kunne altså være to reir på den 200m strekningen.

- (4) 200m nedenfor der den ene ungen ble matet, fant vi i tillegg et reir på en berghylle 1,5m opp fra elva ved en kulp. Her var 4-5 unger, anslått til å være 6-8dg. 20.5. var reiret forlatt. Elva er 25-30m bred.

Skjematisk oversikt over reirene:

Nr: ca. 1. egg: Ant. pull: Reirbiotop:

(1)	13.4.	5	På stein i foss. Åpent
(2)	15.4.	4	Oppå brobjelken. Trangt bekkefar
(3)	13.4.	4	Gjemt under steinbru Steinete bekk
(4)	9.4.	4-5	I bergvegg, åpent ved en kulp

Rugetid: 15-18dg (17)

Reirtid: 18-24dg (20) (Haftorn 1971)

Disse funnene er interessante, først og fremst da fossekallreir aldri var registrert her før, og i tillegg den veldige variasjonen i reirbiotoper, og tid for påbegynt ruging. Tid for egglegging er en del før landsgjennomsnitt

Tettheten for hekkeforekomster er ganske stor, og det vil igjen peke derhen at flere par formerer seg innen kommunen enn de som er registrert. (8-12 reir ?)

En mer eller mindre organisert ringmerking hadde vært bra i forbindelse med ~~fosssekallens~~ en videre undersøkelse av fossekallens vaner og uvaner, og det er jo en forholdsvis lite kjent fugleart i vårt land, selv om det er nasjonal-fuglen vår.

Følgende observasjoner er gjort på Lista høsten
1973:

14.10 1ex Vågsvollvoien, Lista fyr (K.Olsen)

22.10 1ex Kråkenesvn. (O.Osaland)

28.10 1ex Hanangervn. (O.Osaland)

Er det trekkfugl? Fossekallen hekker ihvertfall
ikke på Lista.

Det har ingen hensikt å referere obs. fra Lyngdal, da
disse er spredte og derfor ikke gir noe korrekt bilde
av forholdene, slik som tetthet etc.

K.Jerstad har likevel en interessant observasjon .
30.11. gikk han langs Møske- og Lyngdalselva, der de ren
er 100-500m fra hverandre på før de møtes på Lyngdals
sletta. Møske er 1/3 så bred som Lyngdalselva, 8-12m,
og her var 10 fossekaller på en strekning av 750m,
mens det var 5ex på 2km i Lyngdalselva.
Dette er stor tetthet, og det vidner om gode næringsforhold
i de to elvene.

I år er fossekallsang hørt ved reirbiotopen i Kvås,
og en hann og en hunn (mindre) syntes å være svært så
forelsket på en stein i elva i nærheten av reirbrua i
Herdal.

P.O.Grimsbj

NOEN OBSERVASJONER AV RÖRSANGER OG TROSTESANGER PÅ LISTA.

Av Kåre Olsen

Det skjer stadig forandringer i flere fuglearters utbredelse her i Norge. Bl.a. er arter som rørsanger, myrsanger, sumpsanger, trostesanger og gresshoppesanger stadig oftere blitt observert, tildels også funnet hekkende, spesielt i området rundt Oslofjorden og på Jaren. Men også her i distriktet er det viktig å holde øynene åpne da det jo finnes lokaliteter som passer disse og beslektede arter. Nedenfor skal omtales nærmere alle kjente observasjoner av rørsanger og trostesanger herfra Lista.

RÖRSANGER (*Acrocephalus scirpaceus*).

Under Cambridge Universitets trekkundersøkelser på Lista 1950 - 1955 ble rørsanger registrert to ganger: 1 ex. ble fanget og ringmerket v/Lista fyr 25/9-1953 og 1 ex ble obs. i takrörbeltet like ved veien til Lista fyr den 12/9 1954.

Selv har jeg gjort et hekkefunn av rørsanger på Lista. En stille fin sommerkveld, den 2/7 - 1970, var jeg i området ved Sleddalsvannet. I den kraftige takrörbestanden i kanalen på nordvestsiden av området fanget en syngende fugl min oppmerksomhet. Jeg iakttok fuglen på kloss hold med kikkert 8x30 og fikk et godt inntrykk av utseende og oppførsel. Fuglen minnet om sivsanger, men manglet dennes markerte hvite øyestripe og virket dessuten brunere enn sivsanger som det var 2 - 3 ex. av i nærheten å sammenlikne med. Sangen dens skilte seg også ut fra sivsangerens, den satt også mere skjult mens den sang i motsetning til sivsangerens mer synlige sangposisjon og sangflukt.

Jeg fant etter en tids leting også et halvferdig reir opphengt mellom 3 friske takrör ca 0,8 m over vannstanden i selve kanalen. Dette reirfunnet, fuglens utseende og sangen som jeg hadde hørt lydbandopptak av tidligere, gjorde meg sikker på at fuglen var rørsanger.

Neste gang jeg hadde anledning til å besøke lokaliteten var den 1.8. og jeg fant da at reiret jeg hadde funnet den 2.7. var halvveis kantret. Det inneholdt likevel 2 kalde, forlatte egg.

Ellers obs. jeg denne gangen 2 rørsangere som holdt seg i nærheten og varslet og virket veldig engstelige. De ble også sett med mat i nebbet. Fuglene kom meg på inntil etpar meters hold der jeg sto og iakttok dem inne i rørskogen. Etter en stund ble jeg også oppmerksom på en nesten flygedyktig unge som klatret rundt i rørene. Den ble ringmerket. Jeg så bare denne ene ungen og fant heller ikke det nye reiret, men jeg hadde bare anledning til å lete langs kanalens ene side. Det forlatte reiret med de 2 eggene skar jeg ned og tok vare på som bevis.

(Også i 1966 gjorde jeg i Slevdalsvannet flere obs av en fugl som sannsynligvis har vært rørsanger. Den matet en såvidt flyvedyktig unge. Dato 30/7 og 31/7. Jeg fikk et godt inntrykk av fuglens utseende på inntil 4-5 m hold, men da jeg ikke fikk høre den synge og heller ikke fant noe reir må vel likevel observasjonen regnes som noe usikker. Rørsanger er som kjent meget vanskelig å skjeldne fra myrsanger i felt.

1 ex fanget i mist-net av Lars Bergersen på Kalleberg den 6/8 1969 har også trolig vært rørsanger. Det ble tatt utførlige mål og beskrivelse, men ut fra skisse av vingeformel kunne det ikke fastslås med 100 % sikkerhet at det var rørsanger. Overlapping med myrsangerens mål med 1/10 mm var alt som var om å gjøre i dette tilfelle.)

I forbindelse med bestandstakseringen av sivsanger ble rørsanger obs. på tre forskjellige lokaliteter i 1973.

I Slevdalsvannet obs. Lars Bergersen om kvelden den 7/6 en syngende hann. Ved et besøk samme sted den 23/6 ble den igjen hørt syngende, den ble denne gang dessuten også studert gjennom kiksert på ca 25 meters avstand.

I Kråkenesvann, i takrørbeltet mellom Torp og Huseby, obs. Ottar Osaland om formiddagen den 18/6 en syngende fugl bestemt til rørsanger både på grunnlag av sangen og på utseendet. Like før hadde han sett og hørt sivsanger. Kvelden etter ble fuglen ikke hørt.

I Nesheimvannet obs. jeg om ettermiddagen den 18/6 en syngende hann i et kraftig, men forholdsvis lite takrørfelt på vestsiden av vannet. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å besøke lokaliteten flere ganger denne sommeren.

TROSTESANGER (*Acrocephalus arundinaceus*).

Om kvelden den 19.6.1973 besøkte Ottar Osaland sammen med T. Torjesen og T. Dåsnes Kråkenesvann bl.a. for å kikke etter rörsanger (se foran).

Mens de sto og så utover takrörene kom det to størstore fugler og slo seg ned i toppen på hvert sitt takrör. Utenom störrelsen var det först og fremst öyenstripa som var iöynefallende. Sangen var dessuten ulik både sivsangerens og rörsangerens. I Europas Fugler står det at arten "plumper tungt ned i sivet". Dette fant de passet bra på disse fuglene. Etter en liten stund lettet fuglene og flöy bort. De to påfölgende kvelder besöktes stedet, men da ble ingen trostesangere sett.

BESTANDSTAKSERING AV SIVSANGER (Acrocephalus schoenobaenus)
I FARSUND KOMMUNE I 1973.

Av Kåre Olsen

KORT HISTORIKK: Sivsangeren ble registrert for første gang på Lista av A. Bernhoft-Osa i juni 1938. Han fant da anslagsvis 12 - 15 syngende hanner i Slevdalsvannet, 1 par på Gunnarsmyra ved Lista fyr og 5 - 6 par ved Kviljobrønnen. Under Cambridge University's undersøkelser på Lista i mai 1954 ble den funnet i alle takrørforekomster v/Lista fyr og Borhaugområdet.

Selv har jeg notert observasjoner av sivsanger her på Lista siden 1958. Gjennom disse årene har jeg funnet arten på en rekke lokaliteter. I størst antall hekker den i Slevdalsvannet og Gunnarsmyrområdet hvor den opptrer helt vanlig og er (sammen med sivspurv) den dominerende art i denne spesielle landskapstype.

TAKSERINGSRESULTATER 1973: Under regi av NOF, avd. Lista og som et ledd i NOF/Feltutvalgets undersøkelser på landsbasis, ble det i løpet av våren forsøkt å kartlegge sivsangerens utbredelse og bestandens størrelse innen kommunen. Det ble bestemt å utføre takseringene på grunnlag av antall syngende hanner. Det ble ikke forsøkt å finne reir, delvis fordi dette ville virke forstyrrende for fuglene og dessuten også ville være et vanskelig og svært tidkrevende arbeid. Alle lokaliteter hvor sivsanger kunne tenkes å forekomme, ble undersøkt en eller flere ganger. Dette ga følgende resultater:

Vågsvollvåien/Gunnarsmyr (UTM 570435).

Vågsvollvåien er et grunnvannsområde like i sjøkanten ved Lista fyr. Om sommeren er det gjerne bare åpen vannflate på et lite område, resten er myr som i nord og øst er bevekst med et ganske frodig takrørbelte.

På andre siden av riksvei 43 ligger Gunnarsmyra, som med tilstøtende områder består av tildels våt gressmyr delvis bevekst med takrør, mjødurt og andre våt-planter. Gjennom begge ovennevnte områder går en vegetasjonsrik kanal som kommer fra Slevdalsvannområdet.

Observasjonene ble gjort av Lars Bergersen og Kåre Olsen.

19/5 - Under et besök om formiddagen sang ca 8 ex på
Gunnarsmyra (KO).

23/5 - flere ex sang s.s. om kvelden (KO).

24/5 - Under et besök ca kl 2000 - 2130 ble registrert
3 syngende hanner i Vågsvollvåien og 12 syngende
hanner i Gunnarsmyrområdet (LB & KO).

28/5 - tilsammen 15 hanner sang i samme områdene ca kl 2200 (KO).

En bestand på ca 15 syngende hanner er av omtrent samme
størrelse (muligens litt i overkant) av hva som har vært
notert i tidligere år.

Vatnemarka (UTM 578443).

Denne lokalitet ligger ca 1 km NÖ for Gunnarsmyr og biotopen
er våt myr langs en gjengrodd kanal, bevakst med siv, gress
og større planter. I omfådet er også endel småbjørk og selje.
Observatör Kåre Olsen.

28/5 - 1 syngende hann ble observert ca kl 2145.

Tidligere år har også sivsanger hatt tilhold her, jeg har
også reirfunn herfra. (1 - 2 par)

Slevdalsvannet (UTM 588433).

Vannet ble senket og delvis utfyllt i begynnelsen av 1950
årene og er nå nærmest en stor myr med noe åpent vann i
midten. Denne vannflaten gror sommerstid nesten igjen av
vannplanter. På vest og nordsiden av vannet er det et kraftig
takrörbelte av varierende ~~lengde~~ bredde (opptil ca 300 m)
og en lengde på ca 1000 m. Östre og söndre deler av området
består av mer glissen takrörbestand samt siv, gress og større
våtplanter. Spesiellt i nordre del finner en også endel
spredte bjørke og seljebusker.

Observatörer var Lars Bergersen og Kåre Olsen og følgende
obs. ble notert:

12/5 - Vårens förste, 3 syngende hanner, ble obs. fra et
utkikksted i NV del, og like etter ble minst 3 ex
hört og sett i de söndre deler av vannet (KO).

16/5 - Hörte ca 6 ex synge i NV del ca kl 1730 (KO).

30/5 - Under et besök om formiddagen ble det hört minst
10 syngende hanner i de vestre og nordvestre deler
av takrörbeltet (KO).

- 7/6 - Taksrørbeltet i nord og øst ble undersøkt kl. 2000 - 2230.
Resultatet herfra ble 5 syngende hanner (LB).
21/6 - Ved et kort kveldsbesøk i NV del ble det registrert
minst 5 syngende hanner (K0).
23/6 - Hele vannet unntatt midtpartiet, ble undersøkt fra
kl. 0530 - 0830. 13 syngende hanner ble notert. Ett
av parene ble obs. med mat i nebbet (LB).

Da de midterste partier (anslagsvis 1/3 av taksrørbeltet) er svært våte og derfor vanskelig tilgjengelige, byr det på problemer å takserer lokaliteten fullstendig.

Å høre syngende hanner fra de tørrere deler lengre inne er også vanskelig. Dette p.g.a. avstanden samt forstyrrelser fra syngende fugler i disse innenforliggende områder.

Under denne bestandstakseringen foreligger således ingen eksakte tall fra dette midtpartiet, men erfaringer fra tidligere år tyder på at bestandstettheten er noenlunde like stor her som i de tørrere partiene av taksrørbeltet i V og NV. Det forholdsvis lave antall som ble observert syngende under takseringen den 23/6, kan muligens forklares med at den ble foretatt etter at klekkingen var begynt (ett av parene hadde mat i nebbet) og følgelig hadde trolig noen av hannene i området sluttet å synge.

De registrerte hanner fordelte seg med 10 stk. i V og NV del, 5 stk. i N og Ö og 3 stk. i S og SV del av lokaliteten. Bestanden i midterste del ble ut fra foranstående anslått til ca 6 stk. Totalt sett synes en bestand på ca 24 par å være i underkant av tidligere års bestandsvurderinger. I 1970 ble f.eks. bestanden anslått til ca 35 syngende hanner.

Meberg/Nordberg (UTM 601458).

Biotopen består av våtlendt beitemark bevokst med gress og siv. Spredt kratt av bjørk og vier.

Observatør Lars Bergersen.

22/5 - 1 hann hørt syngende i et vierkjerr.

26/6 - 1 hann sang samme sted.

Sivsanger er ikke registrert på lokaliteten tidligere.

Nesheimvannet (UTM 632409).

Vannet er forholdsvis grunt og næringsrikt. Langs nordre og nordvestre kant ligger et større sumpområde, delvis fremkommet etter to vannstandssenkninger. Det er her en finner sivsanger. Biotopen består av våt gressmyr, delvis bevokst med takrør, siv og andre våtplanter. Spredte busker og kratt med litt skog - furu og gran - i bakgrunnen.

Dette myrområdet strekker seg forholdsvis langt vestover mellom gardene Nesheim og Dyngvoll. En delvis gjengrodd kanal har et tildels tett takrørbelte i de vestre deler.

Observatører Lars Bergersen og Kåre Olsen.

24/5 - Under et besøk ca kl 2130 ble registrert 3 syngende hanner i området mellom Nesheim og Dyngvoll. Sammen med en av hannene ble også obs. nok en sivsanger (hunn?). Videre ble det observert 2 syngende hanner fra en utkikkspost ved NV kant av vannet (LB & KO).

3/6 - 2 syngende hanner ble hørt kl. 0730 under en ekskursjon av NOF, avd. Lista, langs NV og V kant av vannet. En av disse fuglene sang fra samme sted som den 24/5, mens den andre ble hørt på et nytt sted helt nord i området.

Totalt sett ble altså registrert 5 syngende hanner i hele området. Sivsanger er også funnet her tidligere år, men noe forsøk på bestandstaksering foreligger ikke.

Kviljobrønneren (UTM 645326).

Vannstanden ble senket i 1970 og lokaliteten er nå nærmest et stort myrområde bevokst med gress, siv og andre vannplanter. I sydvestre del finner en et belte av takrør og spredte busker. Det er nå lite åpen vannflate igjen.

24/5 - Under et besøk ca 2200 ble det hørt 2 syngende hanner i takrørbeltet (LB & KO).

Det synes som om bestanden av sivsanger har gått noe tilbake de siste år, muligens har dette også sammenheng med den vannstandssenkning som har funnet sted.

Prestevann (UTM 653431).

Vannet er forholdsvis næringsrikt og har flere våtlendte områder langs breddene. Flere av disse er bevokst med siv og takrør.

24/5 - Under et kort besøk ca kl. 2300 på sydsiden av vannet ble ingen sivsangere hørt (LB & KO).

24/6 - 1 hann sang i et takrørfelt på nordsiden av vannet ca kl. 0800 (LB, KO & S. Tveit).

Sivsanger er kjent fra lokaliteten også fra tidligere år.

Kråkenesvann (UTM 676406 og 679397).

Sivsanger ble ved dette vannet funnet ved to adskilte biotoper. I Stokkesundet som forbinder Kråkenesvann med Hanangervann, finnes en ganske frodig takrørbestand og en undersøkelse her foretatt av Ottar Osaland ga følgende resultat:

2/6 - 1 hann sang + nok 1 ble hørt (OO).

18/6 - 1 syngende hann ble observert (OO).

21/6 - 1 syngende hann hørt (OO, K.Jerstad & T.Hægland).

Det andre stedet hvor sivsanger ble funnet, ligger i motsatt ende av vannet og biotopen her er en bukt med et frodig belte av takrør, siv og andre vannplanter:

24/5 - Et kort kveldsbesøk ca 2245 ga negativt resultat (LB&KO).

20/6 - 1 syngende hann hørt (OO).

21/6 - 1 hann ble hørt synge samme sted (OO, K.Jerstad, T.Hægland) +

24/6 - 1 hann sang (LB, KO, S.Tveit).

Som det går fram av foranstående, hadde minst 2 syngende hanner tilhold ved lokaliteten. Om arten er konstantert ved lokaliteten tidligere er ikke kjent.

Søvikvannet, Spind (UTM 738424).

Dette er et folholdsvis lite vann med enkelte partier med takrør og ellers våtere partier med busker og kratt.

Kontrollen som ble foretatt av Ottar Osaland ga følgende resultat:

4/6 - 1 syngende hann ble obs. (medobs. T.Torjesen, T.Mygland).

20/6 - 1 hann sang samme sted (medobs. T.T. & T.Dåsnes).

Arten er ikke registrert på lokaliteten tidligere.

I tillegg til ovenstående lokaliteter ble også to andre steder hvor sivsanger er observert i tidligere år, besøkt etpar ganger med negativt resultat. Dette gjelder Røyrtjern (UTM 700388) et lite næsten igjengrodd tjern omkranset av et kraftig takrørbelte, og Kjørrefjord (UTM 673419), en grunn brakkvannsbukt med forholdsvis frodig takrørbestand.

KONKLUSJON: Sivsangeren kontrollerer på biotopotype hvor det ser ut til at spesielt en frodig takrørbestand er en betingelse. Ennen Farsund kommunen er det hovedsakelig Lista som har slike lokaliteter. Det ble funnet (for øyeblikket, ble da også anten ^{part} konstateret på Lista og da med størst bestand i vestre del av halvøya. Antall funnet og i alle deler av 1973. En gjennomgang av data for observasjon av sivsangeren som jeg har gjort fra Lista gjennom 1973 og 1974. I alle notater data for 1973. I de sivsangerstudier jeg har gjennomført i tidligere år, har eggleggingen normalt begynt i slutten av mai. Delvis på grunn av tilgjengeliggjort våren, og deretter senere enn tidligere år. Det ser ut til at det er et vel utviklet av bester på den mesters var over de bakker, og begynner som livet der i 1973, og at de registrerte reglene var utarbeidet på lokaliteten. En viss forflytning er nok likevel mulig. Det ble til sammen registrert 46 syngende hanner (anslagesvis 52 stk.) på de undersøkte lokaliteter. Antall hekkende par ligger imidlertid av forskjellige årsaker trolig noe under antall syngende hanner. Selv om det nok hadde vært ønskelig med flere kontroller på de fleste av lokalitetene skulle det likevel kunne forsvares å anslå at hekkebestanden av sivsanger på Lista i 1973 har vært minst 40 - 45 par.

STILLITS (*Carduelis carduelis*) funnet hekkende

på Lista. Av Lars Bergersen

Det har tidligere vært antydning mulighet for at stillitsen kunne hekke i Vest-Agder. (Osaland i Piplerka 1/73.) Den 10.6.-73 fikk vi det endelige beviset på hekking: Et reir med 4 pull på Lista. Jeg observerte en ad. stillits på reiret, som var "lett" å få øye på p.g.a. lyse ytterside. Da fuglen fløy av klatret jeg opp. Reiret var plassert i den øverste greinkløyta på ei svartor, 5-6 m o.m.arka. Treetoppen var så tynn at jeg ikke kunne klatre høyt nok til å se ungene, men jeg kunne kjenne 4 unger. Jeg trakk meg raskt tilbake og returnerte først den 17.6. Da var reiret tomt. Alt tydet på at ungene hadde forlatt reiret på "naturlig" måte.

Før jeg går videre i spekulasjonene omkring stillitsen hekking på Lista, vil jeg få presentere de observasjoner som er kommet inn i 1973:

- 25.2. 1 ex Brekne (KO)
- 24.3. 1 ex Brekne + 1 ex Fuglevika (KO)
- 26.3. 1 ex Brekne (KO)
- 3.4. 1 ex " "
- 5.4. 1 ex " "
- 14.4. 1 ex " "
- 16.4. 1 ex " "
- 2.5. 1 ex " "
- 10.5. 1 ex Jørstad (LB)
- 27.5. 4 ex Jørstad + 1 ex Tomstad (LB)
- 10.6. 2 ad + 4 pull Jørstad (LB)
- 25.7. 1 ex Lista flyvstasjon (LB)
- 2.9. 2 ex Kalleberg (LB)
- 3.9. 3 ex Ore skole (LB)
- 14.9. 4 ex Ore skole (LB)
- 15.9. 2 ex Nordhyuda (LB)
- 17.9. 3 ex Ore skole (LB)
- 20.9. 1 ex Ore skole (LB)
- 2.10. 4 ex Langeland (LB)
- 4.10. 3 ex V. Hauge (LB)
- 9.10. 2 ex Kalleberg (LB)
- 14.10. 6 ex Langeland (LB)
- 7.8.9.11. 1x Ore skole (LB)

Disse observasjonene skulle tyde på at det kan ha hekket mere enn ett par i 1973. Dessuten tyder det på at en del stillits har overvintret ute ved kysten, for siden å trekke lenger inn til egnede hekkelokalteter.

Hekkebiotopen hvor reir ble funnet 10.6., består vesentlig av svartor med enkelte bjørke- og eiketrær. Reirtreet stod like ved en bekk og ca. 10m fra trafikert vei. Ellers er det både beite- mark og åker og eng i nærheten. Det hadde vært ønskelig med en bedre undersøkelse av floraen i området.

ROSENFINK (Carpodacus erythrinus)- ny rugefugl på Lista.

Av Lars Bergersen.

Den 17. juni 1973 observerte Sverre Tveit og jeg en for oss ny og ukjent finkefugl. Straks etter observerte vi enda en ex.

Om utseende noterte jeg:

Størrelse: Som en bokfink.

Overside: Gråbrun med to utydlige vingebånd.

Underside: Lys grå med mørke striper.

Nebb: Kort og kraftig.

Sangen som et av individene lot fremføre, besto av korte, karakteristiske fløytetoner (plystring). Vi fikk mistanke om at det kunne være rosenfink, men vi hadde ikke "field-guiden" med oss, så vi måtte la tvilen komme tiltalte til gode-inntil videre.

En av "finkene" ble observert med strå i nebbet, og i en tornebusk fant vi et påbegynt reir av strå.

Ei stund seinere hørte vi igjen den karakteristiske flytetonen, men denne gang var vi ikke lenger i tvil: Fuglen var karminrød på hodet, brystet og overgumpen, ellers gråbrun. Det måtte være rosenfink. Denne satt og sang fra en el-ledning 50-60 m fra det stedet vi så de første "finkene". Vi observerte at hannen i prakt-drakt jaget etter en liknende de to første vi så. Vi forflyttet oss tilbake til første observasjonsplassen. Der var fremdeles to ex. Det skulle tyde på to par i området.

21.6. besøkte jeg reirplassen sammen med Sverre Tveit og Kåre Olsen. Vi hverken så eller hørte noe til rosenfinkene, men det var 2 egg i reiret. Eggene var blå m/svarte prikker. Reiret lå, som tidligere, nevnt, i en tornebusk ca. 0,9 m o. marka. Diametern på reirskåla var 65 mm. Terrenget rundt heller mot øst og ligger i ly for vestavinden. Området består av beitemark med innslag av eik, or, bjørk, ask, alm og hassel. Like i nærheten renner en bekk gjennom tildels vannsjuk skogsmark. Det går også bilvei gjennom området.

24.6.: En rosenfink fløy av reiret da vi besøkte det. 4 egg. 2-3 sangstrofer hørt.

5.7.: Sverre Tveit og Njål Sölyberg kontrollerte stedet. 4 pull i reiret. De var anslagsvis 2-3 dager gamle. Ingen ad. observert. Ca. 100 m fra dette reiret fant de et nytt, ferdigbygd reir. Også dette reiret lå i en tornebusk omkring 1 m o. marka. Det var bygd av samme materiale (strå) og på samme måte som reir nr.1. Reir nr. 2 ble ikke benyttet. (Jeg vil få føye til at jeg om høsten, etter løvfall, fant reir nr.3 i samme området. Også dette så ut til å ha stått tomt.)

14.7.: Kurt Jerstad og Torry Hægeland kamuflerte seg (i telt) i nærheten av reiret for å studere matingen og døgnrytmen nærmere. Teltet var båret satt opp kvelden før observasjonen begynte, for at rosenfinken(e) skulle bli vant med det. De nevnte herrer gjorde mange interessante og detaljerte notater så å si fra minutt til minutt. Denne delen av Jerstads notater har jeg ikke tatt med her, da jeg synes de heller burde publiseres i "Sterna". Så husk å se etter der også! Her bringer jeg hans sammendrag med refleksjoner:

"Etter en tid i kamuflasjen, ble det helt tydelig at det bare var en rosenfink som matet. I løpet av observasjonstiden ble aldri to rosenfinker verken hørt eller sett på samme tid. Mens den ene lå på reiret og varmet ungene, burde den andre dukket opp, men så

skjedde ikke. Heller ikke dukket den opp når den ene varslet ved reiret.

At det var bare en ad. til å mate ungene, var antagelig grunnen til at en av ungene bukket under. (Bare 3 pull i reiret 14/7.) Det var også tydelig at en av de tre gjenlevende ungene var mindre enn de to andre, og ikke minst, det var helt tydelig at den fikk mye mindre mat enn sine større og sterkere søsken.

Vi går ut ifra at det var den unge hannen som matet ungene. Dette fordi den hadde bare et vingebånd som var synlig, og selv dette var lite markert. Etter Haftorn-71 skal hunnen ha tydeligere vingebånd enn den unge hannen. Det er mest sansynlig at hunnen har omkommet, men det er vel også en liten mulighet for at den kan ha "stukket av" med en annen hann?

Matinger foregikk nok så regelmessig. De fleste gangene brukte den mellom 20 og 30 min. for å hente mat. Den korteste tiden var 7 min. mens den lengste var på 43 min. I løpet av observasjonstida på 810 min., matet den 31 ganger, dvs. 1 mating/ 26 min eller 2,3 mating/t.

Den matmengden den brakte med seg varierte veldig. Det så ut som den mer kom tilbake til reiret etter ei bestemt tid, enn fordi kroa var full. Således var det liten samsvar mellom lengden av travaret fra reiret og antall porsjoner som den forsynte ungene med. En årsak til dette kunne være at den noen ganger holdt noe igjen til seg selv. Det er vel også trolig at den av og til hadde en liten hvil mens den var borte fra reiret.

Gjennomsnittlig gulpet den opp 16,8 porsjoner/mating (max 29, minimum 7). Enkelte ganger ble ikke porsjonene talt, enten på grunn av at den satt med ryggen til eller fordi vi fotograferte."

Det er interessante opplysninger Jerstad her kommer med. Hvis vi regner med at 1. egg ble lagt 20.6. stemmer det bra at ungene var 2-3 dager gamle den 5.7. (S.T. med.) Ungene skulle etter dette være ca. 12 dager da jeg ringmerket dem den 15.7. Men jeg vil holde det for urimelig at ungene skulle kunne forlate reiret i løpet av de etterfølgende 2-3 dager. Dessverre var det ingen til å kontrollere reiret i den påfølgende uke, men jeg antar de først forlot reiret omkring den 21-22 juli. Etter dette antar jeg at reirtiden var 19-20 dager, markert lenger enn normalt. (Se Haftorn-71 s.778) . Det kan være at reirtiden er blitt forlenget som en følge av mindre næringstilgang. Jerstad noterte at bare en fugl matet. Hvis rosenfinken hekker her igjen, ville det være meget interessant å få sammenligne disse data med et "normalt" hekkingsforløp. Jeg håper noen tar i mot utfordringen.

Til:

Avs. NOF/Avd. Lista, Kalleberg, 4560 Vanse.