



HAVØRNA

Organ for Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland

Årgang 19 – 2008

HAVØRNA

nr. 19



Styre for NOF avd. Nordland:

Leder: Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 Nesna
Tlf.: 952 79 482, e-post: atle.i.olsen@c2i.net

Styremedl.: Harald Våge, Ramsvikvn. 147, 8370 Leknes
Tlf.: 412 74 865, e-post: harald.vage@c2i.net

Viggo Albertsen, Høglia 63, 8027 Bodø
Tlf.: 918 29 781, e-post: Viggo.Albertsen@Nfk.no

Lokallagsadresser:

Bodø	Thor Edgar Kristiansen, Hellåsvn. 5B, 8011 Bodø e-post: thor-ek@online.no
Nesna og omegn	Joakim Einmo, Bjørkveien 1, 8700 Nesna e-post: jockizz@hotmail.com
Ofoten	Harry Ødegaard, postboks 499, 8507 Narvik e-post: harryode@start.no
Rana	Per Ole Syvertsen, postboks 1301, 8602 Mo i Rana e-post: per.ole.syvertsen@helgelandmuseum.no
Sør-Salten	Raymond Birkelund, Skogholthaugen 10, 8170 Engavågen e-post: raymondbirkelund@yahoo.no
Vesterålen	Iris Berg, Langryggen, 8430 Myre e-post: irisberg61@yahoo.no
Vestvågøy	Johan Sirnes, Ramsvikvn. 267, 8370 Leknes e-post: johan.sirnes@nfk.no

Redaktører for Havørna nr.19:

John Stenersen,
Dreyers gt. 1, 8312 Henningsvær
e-post: john@tringa.no

Atle Ivar Olsen,
Skogsøy, 8700 Nesna
e-post: atle.i.olsen@c2i.net

Fylkeslederen har ordet...

I mai i år ble den nye Artsobservasjoner åpnet og den har vist seg å bli en stor suksess (se www.artsobservasjoner.no). Når dette leses så er det lagt inn over 1 million observasjoner! Dette er ment å bli fremtidens verktøy for å samle og distribuere observasjoner om fugler så vel som andre organismegrupper. Etter hvert skal dette være kanalen der blant annet alle LRSK observasjoner skal sendes, og sjeldenhetsrapportene vil bli basert på materialet i databasen.

Det er ganske enkelt å legge inn observasjoner, og John Stenersen har laget en enkel brukerveiledning et annet sted i bladet. Man må være registrert og observasjonene må være knyttet til en lokalitet, enten som allerede er lagt inn eller man lager oppføringen ganske enkelt selv. Så alle oppfordres herved til å bruke systemet og å legge inn så mye som mulig av observasjoner, også av eldre ting man måtte ha skrevet ned.

Dette skal bli det nye verktøyet for alt atlasarbeid, bestandsovervåkning og utbredelse av arter. I tillegg, og minst like viktig, er det meningen at dette skal være et viktig verktøy for alle saker om arealbruk og i vernesaker. Så den beste måten å sikre verdifulle områder eller hekkelokaliteter for f. eks hubro, er å legge observasjoner inn i databasen slik at myndighetene får kjennskap til dette (opplysningene om lokaliteten blir skjernet for "andre") og kan stanse truende utbygginger.

Ganske nylig kom det beskjed om at Fylkesrådet for kultur og miljøvern, med "miljøpartiet" SV i spissen, har sagt ja til å bygge vindkraftverkt på Solværøyene ved Sleneset i Lurøy kommune. Direktoratet for naturforvaltning har i høst fremlagt et utkast til handlingsplan for hubro i Norge, og her fremheves Solværøyene som et nasjonalt viktig hubroområde. Siste ord er neppe sagt i denne saken, men vedtaket i Fylkesrådet viser jo at hensynet til å ta vare på truede arter og viktige naturområder ikke bestandig vinner frem når det er snakk om (påstått) hensyn til arbeidsplasser og utvikling. Med mange andre vindmølleparker nå under planlegging i andre viktige og uberørte naturområder burde vi kanskje gått sammen med turistnæringen og frontet Nordland som Vindmøllefri sone? Det finnes andre miljøvennlige energikilder og mye kan og bør gjøres på energisparing og reduksjon i forbruk i stedet for en uhemmet økning. Det er i alle fall skuffende at Fylkesrådet for miljøvern tilsidesetter fylkeskommunens tidligere holdning om at en samlet plan for vindkraftutbygging i Nordland bør utarbeides før det tas stilling i konfliktfylte enkeltsaker som den ved Sleneset. Hvis viktige naturmiljø og arter blir borte får vi de aldri tilbake!

Atle Ivar Olsen
Leder NOF Nordland

Litt om Saltstraumen

av Harald Misund

Jeg bor ikke lengre vekk fra Saltstraumen enn at jeg kan følge malstrømmen der den stadig lager nye mønster utover Saltfjorden. Strømsettinga sees godt der den kommer over Saltfjorden og treffer landet langs Fenes, utenfor Seines og på Straumøya der Beiarfjorden møter Saltfjorden. Dette er områder som er næringsrike og samler mange sjøfugler hele året. Før utbyggingen av Saltstraumbroa tok jeg ofte lokalbåten over til Valnes, Beiarbåten gikk innom Alsvik (Sandhornøya), Skånland og Valnes før den fortsatte innover fjorden til Tvervik. I dårlig vær var det slett ikke en behaglig opplevelse blant solarolje og røyklukt i salongen, det var bedre og stå på dekk når været tillot det, så kunne en lettere følge med fuglelivet. Var jeg på sørsida av fjorden var en annen veg over Fjellvika til Marvold, og videre med ferge fra Tuv over Saltstraumen, en tidkrevende reiserute. En tur over Saltfjorden i godt vær kunne gi mange fine opplevelser, lokalbåtene i 60

åra hadde ingen stor hastighet, i motsetning til dagens hurtigbåter, som slett ikke kan være lett å komme seg fort nok unna for svømmende fugler som ligger i skipsleia. I dag når broene er kommet kan hele dette området gi gode turmuligheter for en som liker å se på fugl.

Saltstraumens nærområde regner jeg her fra utløpet av Saltfjorden til et stykke inn i Skjerstadvfjorden, i alle fall til Misværffjordens utløp, der strømmen har sin påvirkning for fuglene som holder til her, men ringvirkningen kan vel nå enda lenger.

Ser en på noen av fugleartene som har tilhold i Saltstraumen er flokker av ærfugl om høsten og utover vinteren noen en merker seg, især er det dager om høsten da det kan ligge opp til et par tusen fugler eller enda flere der. Hvor de store flokkene kommer fra vet jeg ikke, heller ikke hvor mange fugl det kan være totalt i et slikt fjordområde, men noen kommer sannsynligvis langveis



Bilde 1: Ærfugl i Saltstraumen 1/11-08 Foto: Harald Misund

fra. Det har vært utført sjøfugltellinger her i mange år, men jeg mener at bemanningen til å utføre en årlig telling i fjordsystemet er for svak, men noen nøyaktig telling er vel heller neppe mulig å oppnå. Et eksempel på høstsamling av ærfugl ved inngående strøm sett fra broa den 1. november i år, viser her en flokk på 1370 fugl (bilde 1).

Ærfuglen er vel en av karakterfuglene, men som hekkefugl er det kun med få par i selve Saltstraumen som på Storholmen, i det lille tjernet under broa ved fyret (bilde 2). Her er der satt opp noen ærfuglhus, men noen hekker også i vegetasjonen i området. Dette lille tjernet er jeg glad i, og jeg var heldig som medvirket til at den ikke blei fylt igjen under brobygginga, nu er den et fint lite referansepunkt for dyrelivet i framtida, og et "vaskefat" for fugl. Noen få ærfuglpar hekker langs strandlinja, men største hekking er lengre inne i fjorden på Ljøneshøya (ønsket tidligere av luftforsvaret tatt i bruk som bombemål). Tidligere hekket mange par også på Skånlandsholmen, og steder som Staurvik, Steinsøya, og i Skålbunestraumen. Bestanden har gått tilbake, minken er også kommet hit som på mange andre steder langs flomålet og i vassdragene, og broene har ført til større trafikk og stadig nedbygging og økt trafikk i strandsonen. Det er få ærfuglunger som lever opp i nærheten av selve Saltstrømmen, det ser ut til at ærfuglen tar med seg ungene til grunnere områder etter hekking. Jeg har sett slik flytting av små unger på så lang strekning som over Karlsøyfjorden, men det er mange farer som truer, ikke minst i Saltstraumen der sportsfiskernes avslitte og kastede snøre av monofilament en livsfarlig hindring.

Av skarvene er det storskarven som er den vanligste utenom hekkesesongen, den har sine faste sitteplasser for hvile og tørking



Bilde 2: Tjernet under Saltstraumbroa.

Foto: Harald Misund

av vingene på Kobbskjæret vest av broa og inne ved Skålbunes på Skarvskjæret, dette skjæret har nok vært benyttet av skarv i lang tid siden navnet finnes på kartet. Tidligere satt den også på ei fjellhille i Sunnan som kalles Skarvhammern, men siden trafikken her er økt får den ikke sitte i fred der.

Det foregår et trekk av skarv om morgenen innover Saltfjorden, det kan en se fra Hernes, og fugl som kommer fra Bodø havn eller nordfra krysser over flystasjonen, ofte i stor høyde på veg innover. Jeg kjenner ikke til noen faste overnattingsplasser innover i Skjerstadvfjorden, men jeg har sett de dratt innover fjorden over Skålbunesstrømmen om kvelden.

De nærmeste store hekkeplasser for storskarv er på Bliksvær og en mindre på Helligvær, det er sannsynlig at mange storskarvene som er her om vinteren kommer nordfra, slik også ringmerking har vist.

Småskarven (toppskarven) kjenner jeg ikke som hekkefugl inne i fjordsystemet selv om den forekommer i mindre antall. Den hekker ute i væran, så langt jeg kjenner til er den minket i antall.

Jeg regner med at minst 12 havørnpar har sin "leveveg" i det skisserte området, og når det enkelte ganger blir sprenget uer til overflata vil enda flere samle seg.

Det er en rekke arter som kan sees utenom de overfornevnnte slik som mindre flokker av havelle høst og vinter, den kan leke i større flokker i fjorden i mai, før den blir borte på fjellvatna når isen går. Enkelte vintrer er den mange alkekonge, men den er ikke lett å oppdage i dårlig vær. Det er også et økende antall hegrer som overvintrer og holder til på aksen fra Hopen til Saltstraumen, en av de første hekkestedene for disse i Bodø var i et granplantefelt på Skålbunes, nu er feltet hugget ned.

Jeg har lett etter hekkende teist i fjordsystemet, men ikke funnet de innenfor Saltstraumen, det er mulig at noen som leser dette kjenner til hekking her, jeg har funnet teisten hekkende ytterst i Beiarfjorden og på småholmene utenfor Bodø Hovedflystasjon.

Det skulle være mulighet for den å hekke i de mange kalksprekkene og under steiner i Sunnan eller lengre innover.

Av rovfugler som utnytter fuglelivet i dette området er havørna den vanligste rovfugl, men både kongeørn og jaktfalk hekker enkelte år i nærområdet, og jakter her om vinteren, en og annen hønsehauk sees også, jeg kjenner til at hønsehauken etter angrep på gråmåse har havnet sammen med denne i sjøen og druknet, den skjebne er det også mange havørner som lider i årenes løp, men slik er naturens gang.

Det har i det siste vært mye snakk om å bevare strandlinja langs Saltstraumen for kommende generasjoner, mulig kan den nedgangstida som er nu forsinke de utbyggingsplanene som nu er på trappene. Det er også trist å se at fuglene ikke lenger får være i fred i Saltstraumen på grunn av de mange hurtigbåtene som leker seg i området.



Idyll fra Saltstraumen anno 1979. Foto: Harald Misund

FUGLER I NORDLAND – 2007

LRSK-rapport
av Harald Våge

LRSK-Nordland (Lokal rapport- og sjeldenhetskomité) består fortsatt av Frantz Sortland, John Stenersen og Harald Våge (sekretær). Siden forrige rapport har medlemmene møttes en gang. I tillegg har komitémedlemmene også hatt jevnlig kontakt via telefon og e-post. I alt har LRSK behandlet 37 saker. Av disse observasjoner ble to, vaktel og vinterobservasjon av svarthalespove, underkjent på grunn av at beskrivelsene var mangelfulle slik at snarlige arter ikke kunne utelukkes. Av godkjente saker nevnes funn av to nye hekkearter: duetrost og kjernebiter.

Den nasjonale sjeldenhetskomiteen, NSKF har siden sist blant annet godkjent funn av japanstormsvale, natthege, flekksnipe, svartstrupesteinskvet, starrsanger og stripesanger, alle nye arter i Nordland. Dette betyr at det innen utgangen av 2007 er påvist/godkjent 345 ulike arter i fylket. NSKF har ikke godkjent rapportert funn av spettmeisunderarten asiatica fra 1993. (Se 2006-rapporten fra LRSK.) Grunn: det var ikke mulig med sikker underartsbestemmelse i dette tilfelle. Videre er funn av snadderand x stokkand, furusanger og rosenstær, alle fra Røst, satt på venting. Dessuten foreligger flere observasjoner som ikke er behandlet.

Av andre uvanlige funn som er med i denne rapporten nevnes toppdykker, lerkefalk, sibirlo, kanadalo, skogdue, slagugle, sibirpiplerke, tundrapiplerke, vintererle, sørnattergal, gresshoppesanger, rørsanger,

myrsanger, busksanger, østsanger, lappsanger, pirol, vierspurv og dvergspurv. Alle med maks. ti tidligere funn i fylket..

Oversikt over hvilke arter som må beskrives for godkjenning (X-arter) og hvilke som kun skal innrapporteres (O-arter), finnes i Fuglerapporteringsliste for Nordland. Denne fåes ved henvendelse til LRSK-sekretæren eller kan hentes på www.fugler-i-lofoten.no under "Rapporter Statistikk" og "LRSK Nordland". Opplysningene kan også finnes under www.artsobservasjoner.no/fugler. Eget rapporteringsskjema til LRSK/NSKF kan fåes hos sekretæren.

I artsgjennomgangen gjelder dato uten årstall observasjoner fra 2007. Dersom ikke annet er nevnt, er funnene plassert i kategori A: spontant forekommende. Kategori C gjelder fugler som naturlig hører hjemme i andre områder, men som nå, etter utsetting/forvilling reproducerer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsetninger. Kategori D betyr at en ikke vet om dette er rømte fangenskapsfugler, eller om fuglen har nådd landet ved egen hjelp. Kategori E brukes om arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler, eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten og lignende). (Kategori B benyttes om spontant forekommende fugler som ble sett i landet før 1950. Forekommer ikke i denne rapporten.) Har LRSK-

Nordland færre enn 35-50 godkjente funn av en art i sitt arkiv, er funnummeret tatt med i rapporten. (Vær oppmerksom på at Fugler i Nordland av og til opererer med et annet antall observasjoner.) Av praktiske årsaker gis funnene nummer etter hvert som de meldes inn til LRSK, og ikke etter tidspunkt fuglene ble sett. Er det flere enn tre observatører, vil det som hovedregel stå: NNN (navn på hovedobs.) m.fl. (Navn på alle observatørene fåes ved henvendelse til sekretæren). For observasjoner der informasjonen utelukkende er hentet fra internett (fugler.net eller fuglesiden.com), er navnet på observatøren(e) markert slik: (NNN)*fn*. Hvis det i artsgjennomgangen ikke er presisert begrensninger i tid og/eller sted, betyr det at alle innsendte observasjoner av arten er tatt med. Med "Kilde: POS" menes at observasjonen opprinnelig ble rapportert til Helgeland museum, naturhistorisk avdeling.

Forklaringer til artsgjennomgangen:

*/** bak datoen betyr at observasjonen er behandlet og godkjent av hhv. LRSK/NSKF
(D) betyr at observasjonen er dokumentert ved foto, video, lyd eller død fugl/del av fugl.
M = hann F = hunn (MM/FF = flertall)
ad. = voksen, utfarget fugl ind. = individ
1K/2K osv. angir fugl i sitt 1./2. kalenderår osv. 2K+ betyr at fuglen er født foregående år eller tidligere (er i sitt 2. kalenderår eller eldre.) Tilsvarende for 3K+ osv.

Saker som ønskes tatt inn i 2008-rapporten kan sendes LRSK-sekretæren når som helst, men jo tidligere jo bedre. NSKF har rapporteringsfristen 1/2-2009.

Adresse: Harald Våge, Ramsvikveien 147, 8370 LEKNES
e-post: harald.vage@c2i.net

Alle som har sendt melding om observasjoner til LRSK takkes herved. Ingen rapport uten dere.
Takk til alle de som har tatt seg tid til å lese korrektur med mer. En spesiell takk til Per Ole Syvertsen for mange gode råd – både faglige og skrivetekniske.

Denne rapporten finnes, i en "luftigere" variant, som et word-dokument på www.fugler-i-lofoten.no. Herfra kan den fritt lastes ned.

ARTSGJENNOMGANG

Knoppsvane *Cygnus olor*
Andøy: 2 ind. Risøyvatnet 17/5 (EBE).

Sangsvane *Cygnus cygnus*
Hekking unntatt Vesterålen: Ballangen: 4 par i vassdraget Grunnvatnet naturreservat (HØD).
Fauske: 1 par m/3 unger Kvitblikkvannet (MEG, BDØ)*fn*.
Flakstad: 1 par m/3 unger v/Andhopen på Moskenesøya 6/7 (HVÅ, MAR).
Meløy: Sangl par. Juni. Engevikvannet. Hekking (ØBI).
Rana: 1 par m/1 pull Langvassdeltaet 18/6 (AEN, EFU, Asmund Ravnå).
Rødøy: 1 par Brenngårdsvatnet juni (HEH) og 1 par Strandvatnet (Asmund Ravnå).
Vestvågøy: 1 par Bollemyrene m/5 unger. (HVÅ, m.fl.) Første hekking i kommunen.
Vågan: 1 par fikk fram 2 unger på Gimsøya (NVL).
Høye antall: Ballangen: ca. 80 ind. Lillevatnet på høsten (HØD).

Sommerfunn: Sørfylket: Alstahaug: 1 ad. Hamnesvalen, Offersøya 6-9/6 (PSH, m.fl.).
Lurøy: 2 ad. i elva nedstrøms fra Silavatnet, Sila 3/6 (men ikke sett 1/7) (POS).
Vefsn: 1 ad. Motjønna, Drevdalen 26/5 (men ikke sett 22/6) (POS).

Sædgås *Anser fabalis*
Alstahaug: 2 ind. Prestegården, Tjøtta 13/4 (PSH).
Herøy: 2 ind. Tenna 30/9, sammen med 21 andre grå gjess (PSH).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*
Sommerobs.: Alstahaug: 1 ad. Øvre Sundet, Tjøtta 14-20/8 (PSH, THC).
Herøy: 1 ad. ringmerket Husvær 14/7 (PSH, Frode Nilsen).
Vinterobs.: Vestvågøy: 1 ind. v/Lakselva 5-13/2, sammen med ei grågås (JOL m.fl.).

Tundragås *Anser albifrons*
Bodø: 12 ind. Rønvikjordene 17/4 (D) (TPE, THE, HEG)*fn*.
Meløy: 1 ind. Saura 19/4 (ØBI).
Røst: Røstlandet: 1 ind. 2/6 (HEG) og 3 ind. 13/9 (SBA). Ved begge observasjonen

viste fuglene karakterene til den østlige underarten *albifrons*.

Grågås *Anser anser*
Vinterobs.: Herøy: 3 ind. Tenna 18-30/12 (AIO).
Nesna: 3 ind. Skogsleira 6-7/1 (AEN, AIO, ANB).
Vega: 6 ind. i Vallsjøområdet 16/11-18/12 (JAN).
Vestvågøy: 1 ind. v/Lakselva 5-13/2, sammen med ei kortnebbgås (JOL m.fl.).

Stripegås *Anser indicus*
Herøy: 1 ind. ved flere lokaliteter i kommunen 4-19/5 (PSH, m.fl.).
Saltdal: 1 ind. Skansøyra 2/7 (JÅA).
Tysfjord: 1 ind. Hundholmen 8/6 (D), sammen med 11 grågjess (Tomas Husdal).
Funn nr. 36-38 i Nordland. Høyalpin art som naturlig hører hjemme i Sentral-Asia. Kategori E.

Snøgås *Chen caerulescens*
Andøy: 2 ind. Breivika rundt 13-14/5 (Anette Jensen).
Vega: 1 ad. sammen med grågås-kull



Grågås (t.v.) og kortnebbgås fra Vestvågøy 13/2. Foto: John Stenersen

Vallsjø 30/6 (JAN).

Funn nr. 22-23 i Nordland av denne arten som naturlig hører hjemme i Nord-Amerika. Norske funn blir som regel plassert i kategori D, men disse fuglene hører nok hjemme i E.

Kanadagås *Branta canadensis*

Vinterobs.: Alstahaug: Tjøtta: 2 ind. 1/1-24/2 deretter 1 ind. fram til 22/3 (PSH).

Vestvågøy: 2 ind. Voiepollen 25/2 (ABS, HHO, HVÅ).

Arten hører naturlig hjemme i Nord-Amerika. Plassert i kategori C.

Ringgås *Branta bernicla*

Meløy: Ca.70 ind. Kunna 14/9 (ØBI).

Røst: Henholdsvis 49, ca. 70 og 5 ind. 14,15 og /16/9. Dessuten 40 ind. 26/9 (RØF). De aller fleste, sannsynligvis alle, viste karakterene til den vestlige underarten *hrota* (D).

Saltdal: 1 ind. Skansøyra 2/7* (D). Fuglen viste karakterene til den østlige underarten *bernicla* (JÅA, MEG, BDØ).

Vestvågøy: 88 ind. i 3 flokker på hhv. 42, 14 og 32 fugler v/Eggum 2/9 (JST).

Vågan: 33 ind. Laukvik-leira i naturreservatet 23/9. Fuglene viste karakterene til den østlige underarten *bernicla* (FSO)*fn.*

Mandarinand *Aix galericulata*

Hemnes: 1 ind. Korgen 24/5 (Jan Sande. Kilde: POS).

Meløy: 1 M Æsvika 10/5 (RBI).

Røst: 1 M Røstlandet 4/5-7/9 (SBA, HEG).

Tidligere år: Moskenes: 1 M på Sørvågen i Sørvågvatnet i 2004 (2003?) og 11/5-2005 (RWA).

Funn nr. 26-30 i Nordland. Plassert i kategori C. Arten hører naturlig hjemme i Øst-Asia.



Mandarinand, Røst. Foto: Steve Baines

Brunnakke *Anas penelope*

Ny overvintringskommune: Herøy: 1 F-farget ind. Tennsundet 1/1 (AIO).

Snadderand *Anas strepera*

Alstahaug: 1 M Ostjønna, Tjøtta 26/4-19/5 og 1 M Hamnesvalen, Offersøy 22/5 (PSH).

Bodø: 1 ind. Karlsøyvær 27/5 (HEG) og 1 ind. Seinesodden 10/6 (THE)*fn.*

Dønna: 1 M Altervatnet 5/5 (AIO).

Fauske: 1 ind. Valnesfjord 25/6 (THE).

Herøy: 1 par sett flere steder Tenna og Sør-Herøy 6-27/5 (PSH).

Rana: 1 M Engasjyen naturreservat 9/5 (AEN, ANB).

Røst: 1 M 13/5 (HEG), 9/9 (SBA) og 17-27/9 (RØF).

Vega: 2 ind. Lånan 1/5 (THC)*fn.*

Vestvågøy: 1 par Lomtjønn 22/5 (HHO) og M i Storeidvatnet 13/6 (HVÅ).

Krikkand *Anas crecca*

Vinter-/tidlig vårobs.: Dønna: 1 F Dønnes, Nord-Dønna 23/2 (AIO).

Herøy: 1 M Tenna 18/3 (AIO).

Sørfold: 7 ind. Straumen 11/2 (THE, HDY).

Vega: 6 ind. Nordøytjønna, Vallsjø 28/3 og 3 ind. Viksåsleirene 30/12 (JAN).

Vestvågøy: 2 MM og 2 FF på Eggum 4-13/2 (ABS, HHO, JST).

Stjertand *Anas acuta*

Hekking: Hemnes: 1 M i våtmarkskomplekser (kroksjøer, elv m.v.) like sør for Bleikvasslia indikerte mulig hekking. Dette ble bekreftet 30/6 da to tomme reir bl.a m/fjær fra grønt vingespeil ble funnet i tillegg til observasjon 1 F m/pull samt 1 engstelig F (POS).

Vinterobs.: Rana: Sveet, Straumen: 1 M 1-7/1 (AEN, ANB, AIO) og 2/12 (AIO, COL) samt 2 MM 29/12 (AEN, ANB).

Røst: 1 F Skjæret 28/1-24/2 (SBA)*fn.*

Vestvågøy: 3 ind., 1 M og 2 FF, på Eggum 4+7/2 (ABS, HHO).

Stokkand x stjertand *Anas platyrhynchos* x *Anas acuta*

Røst: 1 M-farget hele året* (D) (SBA, m.fl.). Samme fugl som i 2006.

Knekkand *Anas querquedula*

Alstahaug: 1 M Storvatnet, Tjøtta 8/6 (PSH).

Ballangen: 1 M i elv ved Bergland, Sjøfjellet/Grunnvatnet 5/6 (D) (EBR).

Dønna: 1 M Altervatn 18/5 (AIO).

Evenes: 1M Sommarvatnet 20/5 og 1 M Nordvatnet 28/5 (Trond Magne Kjølting Haugen)*fn.*

Fauske: 1 M Kvitblikkvatnet 12/5 (AEN, ANB).

Herøy: 1 M Salvatnet 29/5 (PSH).

Rana: 1 M Engasjyen naturreservat 9/5 (AEN, ANB).

Skjeand *Anas clypeata*

Sannsynlig hekking: Vega: 1 par v/Vallsjø 10/5-27/6 (JAN).

Taffeland *Aythya ferina*

Meløy: 1 M Spildervatnet 30/9 (MFA)*fn.*

Toppand *Aythya fuligula*

Vinterfunn: Alstahaug: 1 F Storvatnet, Tjøtta 7-9/1 (PSH).

Bergand *Aythya marila*

Alstahaug: Tjøtta: 1-6 ind. i Ostjønna og Storvatnet 29/9-7/11 (PSH).

Gildeskål: 2 ind. Rosenvatnet 30/6 (JIK, Per Helge Svendsen)*fn.*

Hattfjelldal: 5 ind. (F + 4 årsunger) Ranseren 27/6 (BJV).

Meløy: 1 par Ågvatnet 1/5 (HEH, Inger Tjong).

Rana: 2 par på vårtrekk Langvatnet 21/5 (AEN, POS).

Røst: 1 M Røstlandet 28/4 (SBA) og 13/5 (HEG).

Vestvågøy: Noen få ind. i Ytre Borgpoll (Hagvåg) fra 5/5 (1 par) til 7/10 (2 ind.) (NVL).

Vågan: 1 M Gimsøya 8/6 (HVÅ) var tidenes første kjente obs. på øya.

Praktærfugl *Somateria spectabilis*

Sommerobs.: Saltdal: 1 M Skansøyra hele våren. Sist sett 6/6 (JÅA).

Lappfiskand *Mergellus albellus*

Alstahaug: 1 F Storvatnet, Tjøtta 2-8/10 (PSH).

Hemnes: 1 F-farget ind. Bygdås, Bleikvasslia 26/5 (D) (AIO).

Herøy: Salvatnet: 2 MM, en skiftet fra praktdrakt til eklipsedrakt, 23-26/6 (AIO, PSH), 1 M og 1 F-farget 11/7 (AIO), 1 M i eklipsedrakt 19/7 (PSH), 1 F-farget 28-29/7 (AIO), 2 F-fargete ind. (= hanner i eklipsedrakt) 18/8 (AIO) og 23/8 (PSH) (de foran regnes som 1 funn), samt 1 F-farget ind. 6/10 og 3/11 (nytt funn) (AIO).

Rana: 1 ad. M Auran, Mellomstraumen, Straumen 11-20/6 (AIO m.fl.).
Funn nr. 39-42 i Nordland. Hekker kun fåtallig i Norge, hovedsakelig i indre Finnmark. Se også kommentar i 2005-rapporten til LRSK.

Jerpe *Bonasa bonasia*

Hekking: Vefsn: 2 kull m/8-10 unger i hvert Ravatnet 18/7 eller 19/7 (INS).

Storfugl *Tetrao urogallus*

Meløy: 1 ind. Kalsholmen (Gunnar Lorentsen).

Smålom *Gavia stellata*

Høyt antall: Fauske: min. 50 ind. Klungset 15/4 (THE). Dessuten min 90 ind. samme sted 8/7. Også min. 50 ind. Fauske-Rognan 8/7 (THE)*fn*.

Storlom *Gavia arctica*

Høyt antall: Fauske: min. 100 ind. Klungset 14/5 (THE).

Vinterobs.: Alstahaug: 1 (2K) ind. Hamnesleira, Offersøy 9/2 (PSH).

Herøy: 2 ind. Lammholmen, Tenna 20/1 (AIO).

Islom *Gavia immer*

Sommerobs.: Vestvågøy: 1 ind.

Holandspollen 29/8 (NVL).

Alt sør for polarsirkelen: Alstahaug: 1 ind. v/Nordøya, Tjøtta 22/12 (PSH).

Vega: 1 ind. Langskjærvika 31/1 og 4/5, 1 ind. Vallkråke lykt 17/2, 1 ind. Gullsvågsjøen 7/11 og 1 ind. Langvika 3/12 (JAN).

Gulnebbblom *Gavia adamsii*

Vår-/sommerobs: Bodø: 1 ind. Kjerringøy 27/7 (Simon Rix)*fn*.

Alt sør for polarsirkelen: Nesna: 1 ind.

Litlesjona 27/1 (AIO) og 22/3 (AEN).

Vega: Langskjærvika: 1 ind. 5/1 og 9/5, 6 ind. 18/2, 4 ind. 3/3 og 17/4 samt 1 ind. Hysvær fjorden 8/4 (JAN).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Alstahaug: Tjøtta: 1 ind. (1K) Storvatnet 2/11 og 1 ad., fortsatt i sommerdrakt, Kråkvikvatnet 9/11 (PSH).

Dønna: 1 ind. Altervatnet 4/11 (AIO).

Hadsel: 1 ind. Raften, Hinnøya første halvdel av nov. (Geir Hallvard Nilssen)*fn*.


Herøy: 1 ad. Salvatnet 2/9 og 3-4/11, og 1 ind. Gotløy 17/11 (AIO).

Røst: 1 ind. Nesset Røstlandet fra 27/10 og ut året (SBA).

Vega: 1 ind. Sveavatnet 6/10 (JAN).

Vågan: 1 ind. Vinjevika, Gimsøya 24/2 (FSO).

Funn nr. 44-53 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig i Møre og Romsdal, Rogaland og i Oslofjordområdet.



Dvergdykker, Røst. Foto: Steve Baines

Toppsykker *Podiceps cristatus*

Vågan: 1 ind. i Vinjevika, Gimsøya 19/4 (HVÅ).

Funn nr. 10 i Nordland av denne arten som hekker fåtallig i Nord-Trøndelag, Rogaland (Jæren) og på Østlandet.

Gråstrupedykker *Podiceps grisegena*

Andøy: 1 ind. Andenes 28/12 (EBE).

Bodø: 2 ind. Soløyvatnet 15/6 (Harald Misund).

Fauske: 4 ind. Klungset 14/5 (THE)*fn*.

Nesna: 1 ind. i vinterdrakt Litlesjona 4/10 (AIO).

Vega: 2 ind. Langskjærvika 3/4 (JAN) og 2 ind. Omnøy 14/5 (PSH).

Vestvågøy: 1 ind. i Borgvåg 24/2 (Børge Klevstad, John Gunnar Juliussen, ABS).

Vågan: 1 ind. Vinjevika, Gimsøya 19/4 (ABS).

Fra 1949: Træna: 1 voksent ind. som viste karakterene til underarten *holboellii*, ble skutt 28/1 (?)** (D). Fuglen finnes i dag utstoppet i samlingen til Høgskolen på Nesna og ble oppdaget ved en tilfelleighet av (AIO). Dette er det første, og hittil eneste, norske funnet av denne underarten i Norge. Underarten er hjemmehørende i Nord-Amerika og Nordøst-Asia. Se *Havørna 18* (fra 2007) for flere detaljer.

Horndykker *Podiceps auritus*

Vinterobs.: Alstahaug: 1 ind. v/Ytterstranda, Tjøtta 13/1 og 2 ind. Hamnesleira, Offersøy 9/2 (PSH).

Narvik: 1 ind. Håvikleira 25/2 (Turid N. Strøm).

Vega: 1 ind. Viksåssjøen 1 og 18/1, samt 1 ind. Hysvær fjorden 29/3 (JAN).

Vågan: Overvintre i Vinjevika, Gimsøya. 2 ind. her 19/2 og 1 ind. 25/2 (HVÅ).

Havhest *Fulmarus glacialis*

Høyt antall: Røst: Ca. 3500 trakk forbi Røstlandet 5/9. 3000 mot vest og 500 mot øst (MEG, HEG)*fn*.

Grålire *Puffinus griseus*

Røst: 22 ind. trakk mot vest 18/9, mens 16 ind. ble sett 26/9. Totalt over 50 ind. denne høsten (RØF).

Vågan: 2-4 ind. sør og øst for Skrova 18/10 (JST).

Havlire *Puffinus puffinus*

Røst: 1 ind. 12/9, 2 ind. 18/9, 1 ind. 25/9 og 3 ind. 26/9 (RØF).

Havsvale *Hydrobates pelagicus*

Utenom Lofoten/Vesterålen: Lurøy: 3 ind. ringmerket Lovund hver av dagene 7+8/9 (POS, Kjetil Olsen).

Rødøy: 1 ind. Myken 28/9 (Joakim Einmo, AIO).

Japanstormsvale *Oceanodroma monorhis*

Tidligere år: Røst: 1 (2K+) ind. ringmerket Hernyken 13/8-2006** (D) (Tycho Anker-Nilssen m.fl.). Første funn i Nordland (3. i Norge) av denne arten som hekker i det nordvestlige Stillehavet. Overvintre i tropiske deler av Stillehavet og Indiahavet.

Havsule *Morus bassanus*

Værøy: Min. 100 ind. på Skittenskarvholmen (flest) men også på Skarvholmen i sommer. v/Mosken 4-6/7 (FCH). Usikkert om hekkingen var vellykket. Dette betyr at arten nå er tilbake i det området der arten først ble funnet hekkende i Nordland. Havsulene hekket på Skittenskarvholmen fra 1964-65, men lokaliteten ble forlatt i 1977.

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Ferskvannsobs.: Vestvågøy: 1 ind. i hekkedrakt i Skjerpvatnet 14-15/4 (HVÅ, JOL, Sol Øverås).

Natthege *Nycticorax nycticorax*

Røst: 1 ind. (1K) Røstlandet 29/10** (D) (SBA). Første funn i Nordland (knappt 15 i Norge) av denne arten som nærmest hekker i Mellom-Europa.



Nattergal, Røst. Foto: Steve Baines

Egretthegre *Ardea alba*

Tidligere år: Røst: 1 ind. mellom Røstlandet og Øran 10/5-2006** (SBA). Funn nr. 12 i Nordland (ca. 95 i Norge). Arten hekker nærmest stedvis i Sentral- og Sørøst-Europa.

Myrhauk *Circus cyaneus*

Hattfjelldal: 1 F-farget ind. Ranseren 27/8* (BJV). Funn nr. 16 i Nordland av denne rovfuglen som i Norge hekker spredt i de sentrale delene av Sør-Norge fra Rørosområdet til Hallingdal.

Fiskeørn *Pandion haliaetus*

Hattfjelldal: 1 ind. Ranserdalen 26/8* (BJV). Funn nr. 42 i Nordland av denne rovfuglen som i Norge først og fremst er å finne i skogstraktene i de sørøstligste delene av landet.

Tårnfalk *Falco tinnunculus*

Vinterobs.: Hadsel/Vågan: Flere obs. på nordsida av Austvågøya både i januar, februar og desember (FSO). *Vega:* 1 ind. Kjul 1/1 (JSU). *Vestvågøy:* 1 ind. Høines 18/1 (FSO). *Vågan:* 1 ind. Ulvåg, Store Molla i januar-februar og 1 ind. v/Lyngvær 18/1 (FSO).

Dvergalk *Falco columbarius*

Vinterobs.: Herøy: 1 F-farget ind. Dammen, Tenna 24/12 (AIO).

Vestvågøy: 1 ind. (2K?) (F?) Hornsbakken, Gravdal 12/3* (D) (JOL, Ruben Larsen).

Lerkefalk *Falco subbuteo*

Vestvågøy: 1 ind. (1K) v/Storeidvatnet 17/8* (HVÅ) og på Tussan 2/9* (ABS). Regnes som ett funn. Ny kommuneart. 6. funn i Nordland. Hekker fåtallig sørøst i Norge.

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Vinterobs.: Bodø: 2 ind. Saltstraumen 14/1 (HDY) *Vega:* 1 ind. Sundsvoll 28/2 (RJO).

Vandrefalk *Falco peregrinus*

Innlandsobs.: Fauske: Par i samme område hele våren (JÅA).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

Alstahaug: Tjøtta: ferske fotspor av 1 ind. i snøen ved grøft 13/2, 1 ind. hørt v/Ostjønna 12/10, 1 ind. hørt v/Storvatnet 26/10, 1 ind. Ostjønna 2+8/11 og 2 ind. samme sted 13/11 (PSH). Dønna: 1 ind. Dønnes 23/2 (AIO). Herøy: 1 overvintrende F (3K+) ringmerket Øksningen 1/1, 1 ind. Langåsen, Sør-Herøy 2/10 og 2 ind. hørt v/Storvatnet, Nord-Herøy 3/11 (AIO). *Vestvågøy:* 1 ind. i Lomtjønn, Offersøy 25/10 (FSO). Funn nr. 2 i kommunen. *Vågan:* 1 ind. Rosøyfjæra, Laukvik 25-28/10 (FSO). Ny kommuneart.

Sothøne *Fulica atra*

Hekking: Vestvågøy: Hekket for 6. år på rad år i Lomtjønn, Offersøy. 1, muligens 2 par i 2007. Første obs. 21/4 (Jørn Amundsen). Størst antall: 7 ind. (4 ad. + 3 juv.) 29/8 (HVÅ). Dessuten 4 pull. 11/7 (HVÅ). Siste obs.: 1 ind. 26/10 (ABS, HVÅ). Andre obs.: Alstahaug: Tjøtta: 1 ind. Kråkvikvatnet 13-17/4 (THC, PSH) og 1

ind. (det samme?) Storvatnet 25/4 (PSH). Bodø: 1 ind. Kjerringøy 10/5 (Kjell Ove Karlsen)*fn.* *Fauske:* 1 ind. Kvitblikkvatnet 1/7 (MEG, BDØ)*fn.* *Herøy:* 1 ind. Storvatnet 22/6 (AIO). *Sømna:* 1 ind. i utløpet av vatn i Sund 20/4 (Arne Follestad, Alv Ottar Folkestad og JSU).

Trane *Grus grus*

Hekking/obs. før mail/alt nord for polarsirkelen: Alstahaug: 4 ind. Tjøtta 18/4 (PSH). Bodø: 5 ind Seinesvatnet 29/4 (THE, HDY), 2 ind. Skjelstad 10/5 (Linda Nilsen), 2 ind. Kåsmo, Skjerstad min. 3 uker fra ca. 12/6 (Rolf Hilmarsen) og 2 ind. Evenseth, Skjerstad 11/8 (HDY), *Fauske:* 1 ind. Valnesfjord 14/5 (THE,HDY). *Meløy:* 1 par Halsamyran 25/4, hekkende 5/6 (ØBI). 2 ind. Småvatnan 28/4 (Normann Andre Birkelund)*fn* og 2 ind. Halsamyra 1/5 (RBI, Ole og Asle Birkelund)*fn.* *Nesna:* 1 ind. Stranda 25/4 (AIO). *Rana:* 2 ind. Røssvoll 27/4 (AEN). I Langvassdeltaet gikk tre par til hekking, men kun to av parene fikk fram unger (én hver) (Asmund Ravnå). *Rødøy:* 1 ind. Langåsdaalen 16/4 (HEH). *Røst:* 2 ind. Røstlandet 28/5 (SBA). *Saltdal:* 1 ind. over Nestbyholmen 27/5 (JÅA). *Sømna:* 2 ind. v/Sund 22/4 (Arne Follestad, Alv Ottar Folkestad og JSU). *Tidligere år:* Grane: 2 ind. Trofors 26/4-2006 (ESH. Kilde: POS).

Tjeld *Haematopus ostralegus*

Sen høst-/vinterobs.: Alstahaug: 2 ind. Tjøtta 25/2 og 3 ind. Søvik 27/2 (PSH). *Herøy:* 1 ind. Tennvalen 24/2, 1 ind. Flostad, Sør-Herøy 3/11+8/12 og 1 ind. på gammel søppelplass, Tenna 17/11 (AIO).

Meløy: 1 ind. Reipå 17/1 (Meløyavisa) og 1 ind. Øra 26/2 (JIK)*fn.* *Vega:* 3 ind. v/Vallsjøen 25/2 (JAN). *Avvikende ind.:* Herøy: Taska, Silvalen: Samme delvis albino ind. har hekket på liten holme siden ca. 2005 (AIO). *Vega:* 1 ad. m/grå rygg v/Viksjoen 30/6 (JAN).

Sandlo *Charadrius hiaticula*

Tidlig vår: Alstahaug: 6 ind. Nordøya, Tjøtta 17/3 og 3 ind. Søvik 31/3 (PSH). *Herøy:* 3 ind. Tenna 18/3 (AIO). *Vega:* 1 ind. Viksleirene 8/3 (RJO).

Sibirlo *Pluvialis fluva*

Røst: 1 ad. Røstlandet 28/6-4/7** (D) (SBA). Funn nr. 5 i Nordland (alle på Røst) av denne arten som hekker i Nord-Sibir og Vest-Alaska.

Kanadalo *Pluvialis dominica*

Tidligere år: Røst: 1 M (ad.) Røstlandet 15-19/7-2006** (D) (JST). Funn nr. 3 i Nordland (alle på Røst) av denne arten som hekker i Nord-Amerika og overvintrer i Sør-Amerika.



Kanadalo, Røst. Foto: John Stenersen

Heilo *Pluvialis apricaria*

Tidlig vår: Herøy: 2 ind. sør for Storvatnet, Nord-Herøy 28/3 (PSH).

Røst: 3 ind. v/kirkegården, Røstlandet 29/3 (SBA).

Tidligere år: *Vinterobs.*: *Alstahaug*: 1 ind. Tjøtta 19/2-2003 (PSH). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008).

Tundralo *Pluvialis squatarola*

Andøy: 2 ind. Dverberg 15/5 (EBE)*fn.*

Herøy: 3 ind. søppelplassen, Tenna 23/9 (AIO).

Røst: Røstlandet: 1 ind. v/kirkegården 4/6. På samme sted 1-3 ind. i perioden 16/9-6/10, bortsett fra 17/9 da hele 14 fugler ble sett (RØF).

Vestvågøy: 1 ind. i Ytre Haldsvågen 20/9 (HVÅ, ABS) og 2 ind. i Hagvåg 23/9 (ABS). *Vågan*: 5 ind. v/Laukvik 23/9 og 2 ind. 28/10 (FSO).

Vipe *Vanellus vanellus*

Vinterobs.: *Herøy*: 1 ind. Silvalen, Nord-Herøy 24/12 (Bjørn Åge Remman).

Røst: 1 ind. Grimsøya 24/2 (SBA) *fn.*

Værøy: 2 ind. Sørland 24/2 (FCH)*fn.*

Vågan: 1 ind. Kabelvåg 18/2 (Finn Oluf Henriksen).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Vinterobs.: *Herøy*: 1 ind. Tennvalen 21/1 (AIO).

Sandløper *Calidris alba*

Tidlig sommer: *Røst*: 4 ind. Røstlandet 3/6 (HEG) *fn* og 1 ind. Øran 4/6 (SBA) *fn.*

Dvergsnipe *Calidris minuta*

Sen vår-/tidlig sommerobs.: *Herøy*: 1 ind. Tenna 9/6 (AIO).

Røst: 3 ind. Røstlandet 1-4/6 (HEG, SBA) *fn.*

Vestvågøy: 8 ind. i Svanvatnet (travparken) 30/5 (HHO, ABS).

Temmincksnipe *Calidris temminckii*

Sene vårobs: *Alstahaug*: 1 ind. Ostjønna 27/5 (PSH).

Bodø: 2 ind Karlsøyvær 27/5 (THE, HEG) og 3 spillende ind. v/Ljøsnhammarsetra 31/5 (JÅA).

Rana: Engasjyn naturreservat, Ytteren: 1 ind. 20/5 (Steve Bickford), 2 ind. 22/5 (AEN m.fl.), min. 10 ind. 26/5 (AIO) og 6 ind, 29/5 (POS). Lista er trolig ikke utfyllende for lokaliteten. Også 7 ind. Hauan (Langvatnet SØ) 23/5 (POS).

Saltdal: Skansøyra: Hørt 22/5, min. 2 ind. 27/5, 1 ind. 3+6/6 og 3 ind. 20/6 (JÅA).

Alaskasnipe *Calidris melanotos*

Herøy: 1 ad. M Tennvalen 15-16/7** (D) (AIO, COL).

Funn nr. 13 i Nordland (hvorav 8 på Røst, til sammen rundt 125 funn i Norge) av denne vaderen som hekker i Nord-Amerika og Nordøst-Sibir.

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Tidlig sommerobs.: *Røst*: 1 ind. Røstlandet 3/6 (HEG) *fn* og 1 ind Øran 4/6 (SBA) *fn.*

Myrsnipe *Calidris alpina*

Vinterobs.: *Herøy*: 2 ind. Tennvalen 1/1 (AIO). Se og 2006-rapport.

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus*

Andøy: 1 ind. Sellevoll 1/6* (Bjørn Olav Tveit).

Bodø: 1 ind. Karlsøyvær 27/5* (D) (HEG).

Funn nr. 15-16 i fylket av denne arten som i vårt land hekker sparsomt i sentrale og østlige deler av Finnmark og Sør-Norge.

Brushane *Philomachus pugnax*

Hekking: *Herøy*: 1 F og 1 pull (ringmerket) Langvalen, Tenna 30/6 (PSH).

Vågan: 1 F på reir på Gimsøymyrene 21/6 (HVÅ).

Kvartbekkasin *Lymnocyrtus minimus*

Alstahaug: Tjøtta: 1 ind. Ostjønna 12/2 og 16/7, samt 1 ind. Storvatnet 13/2 (PSH).

Herøy: 1 ind. Flostad, Sør-Herøy 9-10/2, 1 ind. Indre Øksningen, Øksningen 10+24/2 og 8/12, 1 ind. v/kirken Sør-Herøy 11/2, 1 ind. Johusvågen, Nord-Herøy 11/2, 2 ind. Flostad 22-25/2 (1 ind. siste dag), 1 ind. Nord-Herøy 23/2 og 1 ind. Storvatnet 6/10 (AIO).

Nesna: 1 ind. Stranda 22/1, 5/2 og 30/11, samt 1 ind. Skogsøy 16/8 (AIO). Dessuten 1 ind. Skogsleira 6/1 (AEN, ANB).

Røst: 1 ind. 15/9, 25-26/9 og 6/10, samt 2 ind. 29/9 (RØF).

Vestvågøy: 1 ind. Klevstad midt i september (D) (Nordis Klevstad). Funn nr. 3 i kommunen.

Vågan: 1 ind. v/Laukvik 28/10 (FSO).

Enkeltbekkasin *Gallinago gallinago*

Vinterobs.: *Alstahaug*: Ostjønna eller Storvatnet, Tjøtta: 1 ind. 19/1 og 12+15/2, 2 ind. 5/2 og 5 ind. 13/2 (PSH).

Dønna: 1 ind. på hver av følgende lokaliteter 23/2: Teistadvika, Titternes på Nord-Dønna og Volnes på Nord-Dønna (AIO).

Herøy: Observert på knapt 10 ulike lokaliteter i perioden 20/1-24/2, med opptil 6-7 ind. på samme lokalitet (AIO). Også observert 8/12 med 1 ind. (AIO).

Meløy: 3 ind. Dalsbekken 12/2 (MFA) *fn.*

Nesna: 1 ind. Revsnes 6/1, 1 ind. Stranda 22+24/1, 1 ind. Nesna 30/1 (AIO). Dessuten 1 ind. Nesna sentrum 17/2 (AIO, Stefan Obytz). Videre 1 ind. Remmå 18-19/2 (AIO, COL).

Rødøy: 1 ind. Sleipnes 14/1 (HEH, Kjell Bjarne Hammer).

Vega: Vallsjø: 2 ind. 13-14/1 og 1 ind. 20/1 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. v/ Svanvatnet (travbanen) 26/2 (ABS).

Tidlig hekking: *Vega*: reir m/4 egg Vallsjø 29/4 (JAN).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

Bodø: 6 MM i spill v/Østerdalselva (Havvamohkki) 6-7/6 (JÅA).

Fauske: Valnesfjord: 5+2 ind. (2 leiker) 10/6 (D) (THE) og 3 ind. 22/6 (MEG, BDØ)*fn.*

Rana: min. 3 ind. Mogressfjellet 23/6 (ny lek funnet) (AEN, ANB, Annbjørg Engås) og 27/6 (POS). Min. 4 spillende ind. i Virvassdalen 1/6 (Annette Sønvisen) samt 8 ind. Kaldvatnet (kjent lokalitet for arten) 25/6 (Annette Sønvisen m. fl.).

Rugde *Scolopax rusticola*

Vinterobs.: *Bodø*: 1 ind. Bliksvær 10/2 (Alf Pedersen).

Herøy: 1 ind. Nord-Herøy 21/1, 1 ind. Silvalen 9-11/2, 1 ind. Vikerenget, Nord-Herøy 10-11/2 og 1 ind. Langåsen, Sør-Herøy samme datoer (AIO).

Svarthalespove *Limosa limosa*

Alstahaug: 3 ind. Ostjønna 12/5 (THC)*fn.*

Andøy: Svært få obs. Hekking ikke registrert i 2007 (EBE).

Bodø: 1 ind. Rønvikjordene 15/5 (D) (THE). Viste karakterene til underarten *islandica*.

Herøy: 2 ind. som viste karakterene til underarten *islandica*, Langvalen, Tenna (PSH, Kjell Isaksen) og 1 ind. Vangen, Nord-Herøy (PSH), begge 8/5.

Røst: 1 ind. 17/4 (SBA) *fn.* Opptil 10 ind. på Røstlandet i mai, flere inn i juni, den siste 26/6. Hekkeadferd på flere (HEG, SBA, THE). De fleste fuglene, kanskje alle, viste karakterene til den islandske underarten *islandica*.

Vega: Valen: 2 ind. 4/5, 5 ind. 8/5 og 1 ind. 9-10/5, samt 1 ind. Vallsjø 26/8 (JAN).

Vestvågøy: Sett i perioden 2/5-13/6 i Saltisen og v/Storeidvatnet (NVL). Kun 1 ind. på hver av lokalitetene, men sannsynligvis hekket et par v/Storiedvatnet (JST, HVÅ). Resultat ukjent. De fleste, kanskje alle, fuglene viste karakterene til den islandske underarten *islandica*. Ser ut til å avta i antall. **Vågan:** 1 ind. Saupstad, Gimsøya 4/5 JST). Fuglen viste karakterene til den islandske underarten *islandica*.

Lappspove *Limosa lapponica*

Sommerobs.: **Meløy:** 1 ind. Måløya 28/7 (ØBI, Dagfinn Kolberg). **Narvik:** Håvikleira: Opptil 31 ind. i perioden 13-26/6. Dessuten min. 1 ind 29-30/7 (EBR)*fn.* **Vestvågøy:** 1 ind. i Svanvatnet (travbanen) 27/6 (MEG, BDØ). **Røst:** 1 ind. Røstlandet 3/6 (HEG)*fn.* **Vinterobs.:** **Herøy:** 1 ind. Tennvalen 1/1-18/3 (AIO). Se og 2006-rapport.

Sotsnipe *Tringa erythropus*

Vår-/tidlig sommer-/høstobs.: **Narvik:** Min. 25 ind. på trekk Håvikleira 24-25/5 (EBA)*fn.* **Røst:** Meland 29/4, Nesset 11/6 og Røstlandet 7/10, alle steder 1 ind. (SBA)*fn.*

Skogsnipe *Tringa ochropus*

Fauske: 1 spillende ind. Kvitblikkvatnet 12/5 (AEN, ANB). **Hemnes:** 2 ind. Bleikvasslia 26/5 (AIO). **Vega:** 1 ind. Sveavatnet 1/5 (JAN). **Rana:** 2-4 ind. Stordalen 25/5 (AEN, Kristian Sivertsen) og 2 ind. Heimertjønna 30/5 (AEN, EFU).

Grønnstilk *Tringa glareola*

Lofoten-Vesterålen: **Vågan:** 1 ind. Osen, Laukvik 19-20/8 (FSO). Ny kommuneart. **Røst:** 1 ind. Røstlandet 22-25/9 (RØF).

Strandsnipe *Actitis hypoleucos*

Tidlig obs.: **Rana:** 3 ind. Røssvoll 27/4 (AEN).

Flekksnipe *Actitis macularius*

Bindal: 1 ind. Bogadalen 27/6** (Å. G. Thingstad, Per Gustav Thingstad [rapportør]). Første funn i Nordland (6. i Norge) av denne nære slektningen til strandsnipe. Hører hjemme i Nord-Amerika.

Steinvender *Arenaria interpres*

Vinterobs.: **Bodø:** 6 ind Helligvær 25/2 (TPE).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

Hekkeadferd: **Røst:** 5 ind. sett i juni. To av disse skal ha hatt hekkeadferd (HEG).

Polarjo *Stercorarius pomarinus*

Alstahaug: 1 ad. Austbø 26/6, vestsiden av øya (PSH). **Røst:** Min. 9 fugler sett trekkende 12/9-10/1, av disse var 7 1K (RØF). **Øksnes:** 1 ind. Stø 29/6 (MEG, BDØ)*fn.*

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Indre strøk: **Fauske:** Hekkende for femte år på rad i indre del av Valnesfjord (THE). **Rana:** 1 ad. (mørk fase) Røssvoll 23/5 (POS). Samme dag 1 ad. (mørk fase), kanskje samme fugl, Engasjyen naturreservat (Steve Bickford).

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Vår: **Meløy:** 2 ind. Glomfjellet 25/5 (Kjetil Larsen). **Vågan:** 1 ind. Henningsvær 27/5 (JST) og 1 ind. Henningsvær fyr 7/6 (Haakon F. Stenersen). **Høyt antall:** **Grane:** 12 ad. Børgefjell 2-5/8 (Thomas Grønn)*fn.*

Storjo *Stercorarius skua*

Hekking: **Røst:** Tre par hekket i 2007 (Tycho Anker-Nilssen, Tomas Aarvak). Flere streifindivider sett sommer og høst (RØF). **Andre obs:** **Bodø:** 1 ind. Helligvær 8/8 (TPE). **Værøy:** 2 ind. Nord av Mosken 4-5/7 (FCH)*fn.*

Dvergmåse *Larus minutus*

Alstahaug: 2 ad. Storvatnet, Tjøtta 30/5 (PSH). **Ballangen:** 5 ad. Sjøfjellet/Grunnvatnet 5/6* (EBR). **Bodø:** 1 ind. Bodøsjøen 4-11/2* (D) (THE). 2. funn i kommunen. **Hemnes:** 1, kanskje 2, ad. Stormyrbassenget 26/5 (AIO). **Vefsn:** 1 ad. Fustvatnet 26/5 (AIO). **Tidligere år:** **Andøy:** 1 ind. (2K) Baråa 31/5-2003 (JHM). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008). Funn nr. 34-39 i Nordland av denne østlige måsen.

Sabinemåse *Larus sabini*

Røst: Røstlandet: 1 ind. 12/9** (MEG), 1 ind. 18/9** (SBA, MEG, THE) og 7 ind. 26/9** (MEG m.fl.), alle ungfugler (1K). Funn nr. 11-13 (eller 11-19 om NSKF teller 7 funn 26/9) i Nordland av denne høyarktiske arten som hekker fåtallig på Svalbard.

Sildemåse *Larus fuscus*

Tidlig obs.: **Røst:** 1 ind. 17/3 (SBA)*fn.* **Sen obs:** **Herøy:** 2 ad. Tennvalen 6/10 (AIO).

Grønlandsmåse *Larus glaucoides*

Alt sør for polarsirkelen: **Alstahaug:** 1 ind.

(2K) ved fiskebåt utenfor Søvik 31/1, sett fra Hurtigruten (AIO), 1 ind. (2K) (samme fugl?) Søvik 2/2 (PSH), 1 ind. Tjøtta 16/9 (AEN, ANB) og 1 ind. (1K) Hestsund, Tjøtta 20/11 (PSH). **Rana:** 1 ind. Engasjyen naturreservat 21/6 (AEN).

Polarmåse *Larus hyperboreus*

Sommerobs: **Røst:** 1 ind. Røstlandet 15/6 (SBA)*fn.* **Alt sør for polarsirkelen:** **Alstahaug:** 1 oljeskadd ind. (2K) Søvik 2/2 (PSH). **Nesna:** 1 ind. (2K) Skogsøy 15/4 (AIO).

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Innlandshekkking: **Ballangen:** Hekking i Grunnvatnet Naturreservat. Antall ukjent (HØD). **Sen obs.:** **Alstahaug:** 1 (1K) ind. Hamnesleira, Offersøy 7/11 (PSH). **Røst:** Siste obs. 10/10 med 2 ind. (2 ad., 1 K) Røstlandet (SBA)*fn.*

Ubestemt rødnebb-/makrellterne *Sterna paradisaea/hirundo sp.*

Vestvågøy: Sen fugl: 1 ind. ved Jangaard, Stamsund 31/10 (Rolf Larsen).

Polarlomvi *Uria lomvia*

Nesna: 1 ind. Skogsøy 28/1 (AIO, COL).

Skogdue *Columba oenas*

Alstahaug: 1 ind. v/Flåten, Tjøtta 2/4 (PSH). **Nesna:** 2 ind. Engen, Skogsleira 15/9 (AIO, COL). Funn nr. 8-9 i Nordland av denne arten som i Norge først og fremst forekommer i lavereliggende strøk på Østlandet.

Ringdue *Columba palumbus*

Høyt antall: **Nesna:** Min. 133 ind. Handå 24/9 (AIO).

Vinterobs.: *Bodø*: 3 ind. Rønvikjordene 7/1 (THE, HDY).

Tyrkerdue *Streptopelia decaocto*

Alstahaug: 1 ind. Novikveien, ved Ura skole, Sandnessjøen 27/2 (PSH).

Bodø: 5-8 par i sentrum og på Hunstadmoen, mot 20-30 par for bare noen år siden (THE)*fn*.

Herøy: 1 ad. Tenna 24/6 (AIO).

Meløy: 1 ind. Forøy 9/5 (Eli Brattland) og 31/5 (RBI)*fn*.

Nesna: 2 ind. Engen 2-14/1, så 1 ind. sporadisk 28/1-12/5 og 27/8-16/11 (AIO m.fl.). 1 ind. Strandveien i mai (Siw-Elin Eidissen).

Røst: 1 ind. Bombehagen, Røstlandet 9-29/5 (SBA)*fn*.

Sortland: 2 ind. Sortland fra 1/1 til i det minste 12/2 (Gunnar Jan Holhaugen).

Sømna: 1 ind. Berg 26/5 (AIO).

Vega: 13 ind. Gladstad 9/3 (ORD, TKO)*fn*, 3 ind. Gladstad 21/4 og 6 ind. (3 par) i hage øst for Gladstad 1/6 (AIO). Arten hekker nok fortsatt i området Gladstad-Kolstad (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. Leknes 14/6 (Mads Tanden) og 2 ind. Gravdal 2/9 (Torbjørg Zakariassen).

Vågan: Min. 1 ind. i Henningsvær og på Sauøya hele året (JST). 1 ind. Årstein 9/7 (Sol Øverås).

Turteldue *Streptopelia turtur*

Herøy: 1 ind. Silvalen 11/7 (AIO).

Røst: Røstlandet: 1-2 (1K) dukket opp i september og holdt seg til ut i oktober (D) (RØF). En av disse fikk ring. Et nytt ind. dukket opp 7. okt. (THE m.fl.).

Træna: 1 ind. Husøy 11-12/10 (ORD, TKO)*fn*,

Øksnes: 1 ind. (2K+) Myre 28/10* og 30/10* (D) (Isak Isaksen).

Snøugle *Nyctea scandiaca*

Meløy: 1 ind. Halsatuva 25/12 (Linas Solhaug).

Haukugle *Surnia ulula*

Innrapporterte hekkefunn i 2007:

Andøy: Forfjorddalen (Ole Jørgen Jørgensen).

Grane: 2 (1K) ind. Majavatn 13/7. Hekking i området (MEG, BDØ)*fn*.

Vågan: Hekking på Sandslett og et aggressivt par Strømnes-Laukvik (FSO). 1 par m/2 unger på Klepstad 29/5 (Adrian Kresten og Finn Oluf Henriksen).

Andre obs.: *Rana*: Syngende enkeltindivider Krokstrand 17/3 (AEN, EFU, Kristian Sivertsen) og i Røvassdalen 21/3 (POS).

Rødøy: 1 ind. Kila 11/12 (Marit Haugtveit, Kurt Nilsen).

Saltdal: Syngende M og varslende F v/ Gamfossen 15/3. 1 ind. sett flere ganger v/ Jarbruvatnet i september/oktober (JÅA).

Tidligere år: *Moskenes*: 1 ind. på Sørvågen i 2005 (RWA).

Spurveugle *Glaucidium passerinum*

Innrapporterte hekkefunn i 2007:

Saltdal: 7 pull. i kasse på Nestby og 5 i kasse på Medby (JÅA).

Sommerobs.: *Vefsn*: 1 syngende ind. v/ Spellrem 25/8 (Lars Thomas Poppe).

Tidligere år: *Nordfylket*: *Narvik*: 1 ind. Rombak v/Narvik 7/1-2006 (Edgar Edvardsen).

Slagugle *Strix uralensis*

Tidligere år: *Vågan*: 1 ind. sett 4-5 ganger Øyhelle, Store Molla i perioden 30/9-5/10-2006* (Baard Olav Sortland, m.fl.). Ny kommuneart. Funn nr 3 i Nordland (30 år etter nr. 2) av denne østlige ugla som her til lands er en uvanlig hekkefugl ved svenskegrensen (Hedmark).

Hornugle *Asio otus*

Innrapporterte hekkefunn i 2007:

Hattfjelldal: 1 ad. + 1 juv. Grubben (Arnholdt Øyås til INS).

Saltdal: 5 unger i gammelt skjærereir i furu i hage Potthus. De to siste forlot reiret 30/6 (JÅA).

Vågan: Ropende ind. på 7 lokaliteter i kommunen, 6 på Austvågøya og 1 på Store Molla. Hekking på min. 4 lokaliteter der ungeantall er kjent på 3 (2+3+3). På senhøsten ble arten også sett på 3 andre lokaliteter 1 på Store Molla, 1 i Raftsundet og 1 nord på Austvågøya (FSO).

Andre obs.: *Andøy*: En død fugl funnet i Forfjord ultimo januar (Knut og Monica Paulsen).

Hattfjelldal: 1 ind. Iverrud, Susendal 30/3 (AIO).

Nesna: 1 ind. Stranda 10/10 (AIO), 1 ind. Skogsøy 6/11 (AIO) og 29/12 (COL).

Tidligere år: *Hekking*: *Vefsn*: 1 par Bjørndalen i 2003, sett m/2 unger som trolig var flydyktige (ESH . Kilde: POS).

Jordugle *Asio flammeus*

Sen høst-vinterobs: *Meløy*: 1 ind. Halså 22/11 og 1 ind. Vallsjøen 28/12 (ØBI).

Røst: 2 ind. Røstlandet 29/10 (1 ind. dagen før) (SBA)*fn*.

Perleugle *Aegolius funereus*

Kysthekking: *Sortland*: Osvolddalen (Edon og Karin Hansen).

Hærfugl *Upupa epops*

Vestvågøy: 1 ind. i Valberg 18+26/6 og 3+7/7 (Walter Larsen, Asbjørg Hjemvoll).

Gråspett *Picus canus*

Alstahaug: Søvik: 1 M v/Myrvang 14/4 og 1 ind. v/fergekaia 30/9. Dessuten følgende: Tjøtta: 1 M v/Prestegården 19/9,

1 ind. Faksholmen 1/10, 1 ind. Svines 9/10 (Tom Hjelldal), 1 F v/kirka 11/10, 1 ind. Parkveien og 1 F Parkveien 2/12. Til slutt 2 ind. v/Alstahaug kirke 4/10. (PSH).

Bindal: 1 F v/ferjeleiet Holm 4/10 (JSU).

Dønna: 1 ind. Teistad 10/6 (AIO) og 1 M Breivika 30/9 (PSH)*fn*.

Grane: 1 F Fiplingdal 9/2 (Johan Solbakken. Kilde: POS)*fn*.

Herøy: 1 M Staulen 8/12 (AIO) og 1 M Langvalen 25/9 (PSH)*fn*.

Meløy: 1 ind. Halså 11/11 (ØBI).

Nesna: 1 M Straumsteinneset, Nesna 21/9 (Oddbjørn Haugland), 1 ind. Bjørndalen, Nesna 30/9 (Siw-Elin Eidissen) og 1 ind. Revsnes (AIO m.fl.).

Rødøy: 1 ind. Langåsdaalen 5/10 (Kilde: NOF Sør-Salten lokallag).

Saltdal: 1 M v/Rognan ca. 20/10 (Aud og Arild Ellefsen), 1 M i Nestbyholmen 25/11 (JÅA).

Grønnspekk *Picus viridis*

Meløy: 1 ind. Halså 30/8 (Sverre Birkelund).

Grane: 1 F Fiplingdal 7/2 (Johan Solbakken. Kilde: POS)*fn*.

Svartspekk *Dryocopus martius*

Hemnes: 1 ind. Auringmoen, Korgen 21/3 (Jan Sande. Kilde: POS).

Rana: 1 ind. Fallhei 20/3 (AEN), 1 ind. Ytteren 20/3 (AEN) og 25/3 (AEN, ANB), 1 ind. hørt Ildgrubheia 8/9 (AEN, ANB) og 1 ind. Bustneslia 16/9 (AEN, ANB). Dessuten sportegn v/Tverråga (Klokkerhagen) på høsten (POS).

Vega: 1 ind. Nes 28/9 (JSU). Ny art for kommunen.

Dvergspett *Dendrocopos minor*

Beiaren: 1 par på Troli gård 11/7 (Per-Ove Troli. Kilde: POS).

Bodø: 1 ind. m/reir Mjøneshodden 29/4 (NOF Bodø lokallag). Første registrerte hekking i kommunen.
Saltdal: Vellykket hekking i orestubbe i Nestbyholmen (JÅA).

Tretåspett *Picoides tridactylus*

Hekking: *Nesna*: 1 par m/reir i osp Strandåsmyra: observert 28/5-12/6 (AIO).
Alt nord for polarsirkelen: *Andøy*: Hakking hørt 3 ulike steder samtidig i Forfjorddalen, Hinnøya først i mars (Ole Petter Bergland).
Ballangen: 1 ind. Bjørkåsen i oktober (HØD).
Meløy: 1 ind. Neverdal 28/5 (JIK)_{fn} og 1 ind. Spildra 12/6 (MFA)_{fn}.
Saltdal: Trommende F Botnvatn 26/2, 1 F vest for Vikheia 28/7 (JÅA).
Vågan: 1 ind. i Svolvær 4/2 (FSO, Oddvar Hansen).

Fjellerke *Eremophila alpestris*

Tidligere år: *Røst*: 2 ind. Røstlandet 18/9-2003 (Kjell Ruud Mjølshes). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008). Funn nr 12 i Nordland. I Sør-Norge kan arten finnes hekkende i høyfjellet mellom 1100 og 1500 over havet. Ett hekkefunn er kjent fra Nordland.

Sandsvale *Riparia riparia*

Hekking: *Saltdal*: Min. 7-8 reirhull mellom Øksengård og Vik. 12-15 ind. sett (JÅA).
Vestvågøy: Koloni med 23-30 reir på Utakleiv sist i juni (HVÅ). Hekker sannsynligvis også v/Lakselva (HVÅ).
Vågan: Hekker Gimsøymyrene, Gimsøya (HVÅ).

Tartarpiplerke *Anthus richardi*

Gildeskål: 1 ind. (1K?) v/Svalvatn 3/8* (ØBI).

Røst: 1 ind. dukket opp 4/10 (MEG), for så å øke til 2 ind. dagen derpå. Fra 6/10 ble opptil 4 ind. sett sammen (THE, MEG, SBA). Siste observasjon rundt 10/10. Regnes som 1 funn.
Funn nr. 20 - 21 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i Sibir.

Sibirpiplerke *Anthus hodgsoni*

Røst: 1 ind. Røstlandet 5/10** (MEG).
Funn nr. 4 i Nordland, alle på Røst, av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland.

Tundrapiplerke *Anthus gustavi*

Tidligere år: *Røst*: 1 ind. Grimsøya 22/9-2006** (D) (MEG m.fl.). Røst er kronlokaliteten for arten her i landet med 6 funn. Antall funn i Nordland er 8, mens det er 16 i Norge av denne piplerka som nærmest hekker nord i Russland. Alle funn er fra perioden 7/9-13/10.

Heiipiplerke *Anthus pratensis*

Tidlige og sene obs.: *Alstahaug*: 2 ind. v/Gjerdevatnet, Tjøtta 6/11 (PSH).
Herøy: 2 ind. Dammen, Tenna 28/3 (PSH).
Røst: 1 ind. Røstlandet 2/11 (SBA) _{fn}.
Vega: 1 ind. Vallsjø 25/3 og 1 ind. Viksås 2/12 (JAN).

Lappiplerke *Anthus cervinus*

Røst: Røstlandet: 1 ad. Røstlandet 5/10* (D) (SBA, MEG).

Gulerle *Motacilla flava*

Kysthekking: *Røst*: 1 par sør på Røstlandet, trolig underarten *thunbergi* (HEG).
Lofoten(-Røst)/Vesterålen: *Vågan*: 1 ungfugl sist i september v/moloen i Laukvik (FSO).

Høstobs.: *Røst*: 1 ”østlig” ind. (underart ikke kjent) Røstlandet 4-6/10 (MEG, SBA).

Vintererle *Motacilla cinerea*

Rana: 2 ind. (1K) Ytteren 12/9* (AEN).
Funn nr. 6 i Nordland av denne arten som i Norge er en fast hekkefugl i første rekke i lavereliggende strøk på Østlandet.

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Sen vår-/sommerobs.: *Rana*: 3 ind. Ytteren 2/7 (AEN, ANB).
Saltdal: 1 ind. i Nestbyholmen 28/7 (JÅA).
Vefsn: 3 ind. Ravatnet 18 eller 19/7 (INS).
Vestvågøy: 2 ind. Hagskaret 29/5 (ABS), 2-3 ind. Holandsmælen 14/6 (HVÅ, MAR), 1 ind. på Berg 20/8 (HVÅ), ca. 7 ind. Stamsund 26/8 (Pål Eikås) og 2 ind. Sandberg 31/8 (JSI).
Tidligere obs. av hekking: *Grane*: Simskardet, Børgefjell NP:2003: 21/7: 1 par m. reirbygging, ved Simskardhytta. 26/7: Hunnen ruger, blir mata av hannen. 5/8: Fuglene borte, reiret tomt (Øyvind Spjøtvoll, Svein Karlsen). 2004: 19/7: 2 ind. med reirmateriale, og 3 ind. lenger inn. Før Simskardhytta. 22/7: 4 eller 5 ind. Et reir med rugende hunn. 9/8: Sett på minst 5 lokaliteter, inkl. reirlokalitet. 14/8: Nytt reir lenger fram i dalen, store, nesten flygedyktige unger i begge reir. 22/8: Minst 15 utfløyne unger, mata av voksne (Alt Øyvind Spjøtvoll. 14/8 også Inger Johanne Bjørhusdal).

Gjerdessmet *Troglodytes troglodytes*

Vinterobs.: *Alstahaug*: 1 ind. en rekke steder i Tjøttaområdet 5/1-19/2 og 7-31/12 (2 ind. 15/2 og 15/12, dessuten 3 ind. 7/12) (PSH).
Bodø: Rønvikjordene: 1 ind. 4/2 og 4 ind. sist i november (THE).

Dønna: Nord-Dønna 23/2: 2 ind., ikke sammen, Tittersnes og 2 ind. Brandsnes (AIO).

Herøy: Observert på knapt 10 ulike lokaliteter i perioden 20/1-17/3, med 1-2 ind. på samme lokalitet, dog flest med 1 ind. Også observert 8-9/12 samt 26/12 (AIO).

Meløy: 1 ind. Kjøvdalen 17/2 (JIK)_{fn} og Spildra 4/12 (MFA)_{fn}.

Nesna: 1 ind. Leirholmen 6/1, 1 ind. Revsnes 6+27/1, 1 ind. Havna, Nesna og 2 ind. Finnvikdalen, Tomma 10/12 (AIO).

Rana: 1 ind. Båsmoen 6/12 (AEN).

Vega: 2 ind. Vallsjø 21/1 og 1 ind. 26/1 (JAN) og 1 ind. Vegstein 31/1 (RJO).

Vågan: 1 ind. Svolvær 18/2 (FSO, Sondre Sortland).

Rødstrupe *Erithacus rubecula*

Vinter-/tidlig vårobs.: *Herøy*: 1 ind. Silvalen, Nord-Herøy 17/3 (AIO).
Meløy: 1 ind. Vallsjøen 30/1 (Jan Ole Tindvik).
Moskenes: 1 ind. på Sørpågen 10-12 dager fra 26/2 (RWA).
Sortland: 1 ind. Steia, Sortland 3/1 (Ole Dagfinn Berntsen).
Træna: 1 ind. Husøy 2/1 (IJO, VJO)_{fn}.
Vestvågøy: 1 ind. Stamsund 29/1 (ABS).
Vågan: 1 ind. Laukvik fra midt i november og ut året (FSO).
Øksnes: 2 ind. Lifjorden midt i februar (Grete Ødegård).

Sørnattergal *Luscinia megarhynchos*

Røst: 1 ind. (1K) Grimsøya 4-6/10** (D) (MEG, SBA, THE).

Funn nr. 2 i Nordland av dette som er den ”egentlige” nattergalen. Nordligste funn i landet. Hekker i Mellom- og Sør-Europa.

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Røst: 1 F-farget ind. Nesset, Røstlandet 29/10* (D) (SBA).

Træna: 1 ind. Husøy 7/5* (D) (IJO, VJO)*fn.*

Funn nr. 13-14 i Nordland av denne arten som i Norge hekker fåtallig, særlig rundt Oslofjorden.

Buskskvett *Saxicola rubetra*

Uvanlig lokalitet: Lurøy: 1 ind. Lovund 9/9 (AIO, POS). Kun få obs. er kjent fra øya.

Sen obs.: *Røst:* 1 ind. Røstlandet 6/10 (MEG)*fn.*

Steinskvett *Oenanthe oenanthe*

Sene obs: *Bodø:* 1 ind. Rønvikjordene 14-21/10 (THE),

Rana: 1 ind. Vika, Mo 11/10 (AEN).

Røst: 1-6 ind. Røstlandet i perioden 12-29/10. Høyest antall den 29. (SBA) *fn.*

Vega: 1 ind. Eidem 8/10 (JAN).

Vestvågøy: 1 ind. Holsmoen 6/10 (HVÅ).

Svartstrupesteinskvett *Oenanthe pleschanka*

Røst: 1 M (1K+) Røstlandet 2/11 (SBA).

Første funn i Nordland (ca. 10 i Norge) av denne steinskvetten som nærmest hekker ved Svartehavet.



Svartstrupesteinskvett, Røst. Foto: Steve Baines

Ringtrost *Turdus torquatus*

Vinterobs.: *Vestvågøy:* 2 ind. Rokkvika v/hotellet, Stamsund 14/1 (ABS).

Vågan: 1 M v/Gimsøy kirke 22/1 (JST) og 1 M Laukvik 23/1 (FSO).

Rødvingetrost *Turdus iliacus*

Ny underart: *Herøy:* 1 ind. som viste karakterene til underarten *coburni*, ringmerket Gåsvær 22/9* (D) (AIO, THC). Denne underarten, som hekker på Island og Færøyene, er gjennomgående større, har lengre vinger, er mørkere på oversiden og er kraftigere streket på bryst og flanker enn vår underart (nominantformen). Dette er første gang LRSK-Nordland har fått melding om underarten. Det er imidlertid ikke usannsynlig at den opptrer "regelmessig" på Nordlandskysten. En av grunnene til at den ikke er registrert tidligere, kan være at den ikke er nevnt i de mest brukte fuglebøkene.

Vinterobs.: *Alstahaug:* 2 ind. Nordøya, Tjøtta 8/1 (PSH).

Bodø: Rønvikjordene: 1 ind 4/2 og 2 ind 26/12 (THE).

Vega: 1 ind. Vallsjø 23/1 (JAN).

Værøy: 3 ind. Sørland 24/2 (FCH)*fn.*

Vågan: 2 ind. Laukvik 7/1 (FSO) og 1 ind. Sauøya, Henningsvær 16/1 (JST).

Duetrost *Turdus viscivorus*

Hekking: *Grane:* Reir med ca. ukegamle unger funnet Holmvassdalen, 350 moh 11/6* (Jostein Lurås). 4 unger ringmerket 13/6* (POS). Dette er første kjente hekkefunn i Nordland.

Andre obs: *Bindal:* 1 ind. Terråk 27/5 (AIO).

Lurøy: 1 ind. Vassvika, Lovund 23/4* (Lars Thomas Poppe).

Rana: 1 ind. Straumen 19/4* (AEN).

Tidligere år: *Andøy:* 1 ind. Dverberg 26/5-2003 (JHM). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008). Funn nr. 8-12 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Østlandet.

Stripesanger *Locustella lanceolata*

Meløy: 1 ad. M Valøy (Mesøy) 1-16/7** (D) (Gustav K. Andersen m. fl.).

Første funn i Nordland (knappt 10 i Norge) av denne arten som finnes i et belte, sentralt gjennom Eurasia fra Finland til Nord-Japan.

Starrsanger *Locustella certhiola*

Tidligere år: *Røst:* 1 ind. (1K+) Grimsøya 27/9-2006** (Gunnar Gundersen).

Første funn i Nordland (vel 10 i Norge) av denne østlige arten som hekker i store deler av Asia.

Gresshoppesanger *Locustella naevia*

Alstahaug: 1 syngende ind. Offersøy 9/6* (Hege Rølvåg til PSH) og 1 syngende i området Ostjønna/Flåten/Flyplassen, Tjøtta 16/6 (PSH). Regnes som 2 funn.

Funn nr 9-10 i Nordland av denne sangeren som er blant de sjeldneste hekkefuglene i den norske faunaen. Norsk kjerneområde er Jæren.

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*

Røst: 1 ind. Røstlandet 28/8 (MEG m.fl.).

Funn nr.7 i Nordland av denne sangeren som i Norge hekker langs kysten fra Rogaland til svenskegrensa og i fylkene rundt Oslofjorden.

Myrsanger *Acrocephalus palustris*

Røst: 1 ind. ringmerket 11/9, 1 nytt ind. ringmerket 22/9 (MEG m.fl.), samt 2 ind.

28/9 der den ene dreide seg om samme som 22/9. Altså 3 ind. totalt. (1D) (RØF).

Funn nr. 10-12 i Nordland av denne sangeren som i Norge hekker spredt langs kysten fra og med Rogaland til svenskegrensa, samt på Østlandet.

Busksanger *Acrocephalus dumetorum*

Tidligere år: *Røst:* 1 ind. Ystnes 25/6-2006** (D) (SBA m.fl.).

Funn nr. 2 i Nordland, begge på Røst (knappt 50 i Norge), av denne arten som hekker fra Finland og østover.

Munk *Sylvia atricapilla*

Mulig hekking: *Alstahaug:* 1M varslende 26-30/6 Parkveien, Tjøtta (PSH).

Vinter-/tidlig vårobs.: *Bodø:* 1 ind. Rønvikjordene 9/1 (TPE) og 1 ind på foringsbrett Bodø sentrum 30/12 (Britt Andersen).

Herøy: 1 F-farget ind. Silvalen, Nord-Herøy 1/1 og 1 F 17/3 (AIO).

Meløy: 1 ind. Reipå 22/1 (Kolbein Krokstrand).

Sortland: Min. 1 M Sortland flere steder fra slutten av januar til midt i februar (Ole Dagfinn Berntsen m.fl.).

Vestvågøy: 1 F-farget ind. Trollstien, Gravdal i januar (HHO, ABS, HVÅ).

Vågan: 1 F Laukvik 15/10-2006 - 21/1 (FSO).

Høyt antall: *Røst:* Min. 35 ind. Røstlandet 6/10 (MEG) *fn.*

Hagesanger *Sylvia borin*

Sen obs.: *Røst:* 11 ind. Røstlandet 4/10 (MEG) *fn.*

Hauksanger *Sylvia nisoria*

Nesna: 1 (1K) ind. ringmerket Skogsøy 15/8 (AIO).

Rødøy: 1 ind. Myken 29/9 (TKO, ORD)*fn.*

Træna: 1 ind. Husøy 11/10 (TKO)*fn.*
Vågan: 1 ind. (1K) Laukvik 25-27/8 (FSO).

Møller *Sylvia curruca*

Bodø: 1 ind. ringmerket Rønvikjordene 6/8 (D) (TPE).

Dønna: 1 ind. Dønnes 10/6 (AIO).

Lurøy: 1 ind. Lovund 9/9 (AIO, POS).

Rana: 1 syngende ind. på kirkegården Ytteren kirke 6-7/6+14/6 (AEN), på Bosmoen 7+22/6 samt i hage på Ytteren 9+18/6 (AEN, ANB). Sannsynligvis samme individ. Lengste avstand mellom lokalitetene ca. 2,5 km.

Rødøy: Myken: min. 2 ind. 27/9 og min. 4 ind., herav 2 ringmerket, 28/9 (AIO, m.fl.).
Røst: Røstlandet: Nesten daglig i perioden 7/9-19/10. Høyeste dagsantall var 7 ind. 6/10. I alt 10-15 ind. denne høsten. Flere fugler hadde hodetegninger og rygg som tydet på østlig opprinnelse (RØF).

Træna: 1 ind. Husøy 11/10 (ORD, TKO)*fn.*

Vågan: 1 ind. Laukvik 18-20/8 (FSO).

Tornsanger *Sylvia communis*

Mulig hekking: *Alstahaug*: 1 varslende, engstelig F nordenden Ostjønna, Tjøtta (PSH).

Tidligere år: *Nord for polarsirkelen*:

Moskenes: 1 ind. Sørvågen 5/5-2005 (D) (RWA).

Østsanger *Phylloscopus trochiloides*

Tidligere år: *Vågan*: 1 ad. Laukvik 26/6-4/7-2002** (D) (ringmerket 2/7) (FSO). Funn nr. 2 i Nordland av denne arten som hekker i NØ-Europa og Asia.

Lappsanger *Phylloscopus borealis*

Saltdal: Sang på 3 forskjellige lokaliteter sørvest for Rognan. Lokalitet 1 v/Skard 3+10/6*, lokalitet 2 v/Jarbruvatnet 24/6* og lokalitet 3 v/Ingeborgvatnet 1+3/7*

(JÅA). På den siste lokaliteten ble en fugl også sett. Funn nr. 6-8 i Nordland av denne arten som nærmest hekker i Sverige i nærheten av Abisko. I Norge hekker arten fåtallig øst i Troms og i Finnmark.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*

Rødøy: 1 ind. Myken 29/9 (TKO, ORD)*fn.*

Røst: Røstlandet: Første ind. 15/9 (MEG, THE). Høyeste antall: 6 ind. 22/9 og 7 ind. 28/9 (3D) (RØF). Min. 15 ind. denne høsten. Arten hekker fra Uralfjellene og østover.

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*

Alstahaug: 1 ind. Parkveien, Tjøtta 9/9 (PSH).

Saltdal: Syngende ind. hørt Dverset 1/6 (JÅA).

Røst: 2 ind. Røstlandet 15/9 (RØF).

Løvsanger *Phylloscopus trochilus*

Sen høst: *Røst*: 1-2 ind. Røstlandet 1-5/10 (MEG, SBA)*fn.*

Fuglekonge *Regulus regulus*

Vinterobs: *Herøy*: 1/1 v/Storvatnet, Nord-Herøy og på Engan. 2 ind. begge steder. Dessuten 2 ind. Vikvatnet, Nord-Herøy 25/12 (AIO).

Gråfluesnapper *Muscicapa striata*

Sen høst: *Røst*: 1-2 ind. Røstlandet 1-5/10 (MEG, SBA)*fn.*

Svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca*

Sen høst: *Røst*: 1 ind. Røstlandet 1+5/10 (MEG, SBA, THE)*fn.*

Stjertmeis *Aegithalos caudatus*

Alstahaug: Tjøtta: 5 ind. v/Russerkirkegården 4/12 og 3 ind. Øvre Sundet 31/12 (PSH).

Dønna: 1 ind. Titternes 6/10 (Eivind Smørvik) *fn.*

Meløy: 3 ind. Bjærangsfjord 2/10 (Ole Birkelund, RBI) *fn.* og 3 ind. Åmnes 28/10 (Laila Setvik Loe).

Narvik: 3 ind. Narvik 25/10 (Edgar Edvardsen).

Saltdal: 1 kull i Nestbyholmen 2/7 (JÅA).

Vega: 4 ind. Sundsvoll 22/10 (JAN).

Løvmeis *Parus palustris*

Meløy: 1 ind. Bjæringen 21/10 (ØBI) og 1 ind. Spildra 22/12 (MFA)*fn.* Fortsatt eneste kommunen i fylket der arten sees regelmessig.

Toppmeis *Parus cristatus*

Meløy: 1 ind. Ørnes sommeren 2007 (Karl Birger Strann). Ca. 15 funn i Nordland, men arkivet til LRSK er mangelfullt for denne arten som hekker i barskogsområder over hele landet sør for Nordland.

Svartmeis *Parus ater*

Hekking: *Nesna*: 2 ad.m/8 unger Strandåsen sist i mai – først i juni (AIO).

Vågan: Min. 6 ind. Jorden, Laukvik 25-26/3 og 3 ind. 24-26/11. Min. 2-3 par hekket (FSO).

Spettmeis *Sitta europaea*

Nesna: 1 ind. Nesna medio sept.* (Jensine Remmen). Funn nr. 9 i Nordland av denne arten som er utbredt sør for Trondheimsfjorden.

Pirol *Oriolus oriolus*

Brønnøy: 1 ind. (1K) Brønnøysund 21/10* (D) (Brynjar Harsvik).


Funnet er nr. 7 i Nordland av denne arten som registreres årlig i de sydligste delene av landet.

Trekryper *Certhia familiaris*

Kysten og nordfylket: *Alstahaug*: Parkveien, Tjøtta: 1 ind. 22/10, 3/11 og 10/12 samt 2 ind. 26/10 (PSH).

Meløy: 1 ind. Engavågen 14/1 (RBI) *fn.*

Røst: 1 ind. Røstlandet 17/9 (MEG, SBA, THE) og 22/9 (MEG, HEG). Ny art for Røst.



Trekryper, Røst. Foto: Martin Eggen

Tornskate *Lanius collurio*

Herøy: 1 (1K) ind. Gåsvær 1/9 (AIO) og 22/9 (ringmerket) (AIO, THC). Sannsynligvis samme fugl.

Rødøy: 2 (1K) ind. Myken ringmerket 27-30/9 (AIO, m.fl.). Muligens et 3. ind. på øya.

Røst: 1 (1K) ind. Røstlandet 7/10 (THE, MEG, SBA).

Træna: 1 ind Husøy 11/10 (ORD, TKO) *fn.* Funn nr. 28-31 i Nordland. I Norge hekker arten i Rogaland, Agderfylkene og på Østlandet.

Varsler *Lanius excubitor*

Grane: 1 ind. Dunfjell, Majavatn 15/7 (Bjørn Berg)*fn.* og Fellingfors 15/10 (JIK)*fn.*

Rana: 1 ind. (1K) Nevernes, Dunderlandsdalen 11/8 (POS, Johannes E. Anonby).

Røst: 1 ind. Røstlandet 9/5 (SBA).

Vågan: 1 ind. Jorden, Laukvik 21/1 (FSO).

Tidligere år: **Vefsn:** 1 ind. Bjørnådal en gang i 1984 (ESH. Kilde: POS).

Lavskrike *Perisoreus infaustus*

Vefsn: 3 ind. Ravatnet 18/7 eller 19/7 (INS). Omtales som "helt vanlig" i Eiterådalen (ESH. Kilde: POS).

Nøttekråke *Nucifraga caryocatactes*

Hemnes: 1 ind. Valla 8/9 (Ole-Bernt Monsen via Jan Sande. Kilde: POS). Dessuten 2 ind. i Korgen 19/9. Disse fuglene kan ha vist karakterene til den smalnebbete underarten *macrorhynchos* "sibirnøttekråke" (Jan Sande. Kilde: POS).

Nesna: 1 ind. Nesna flere dager midt i sept. (Johanne Oppland til AIO). Arten ble også sett her i feb. 2000 og da var det vissnok et bilde i lokalavisa (Kilde: AIO).

Rana: 1-2 ind. som viste karakterene til den smalnebbete underarten *macrorhynchos* "sibirnøttekråke" i Meyerparken i sentrum av Mo i Rana 3-19/9* (kanskje også tidligere) (D) (POS m.fl.). Dessuten 1 ind. Ytteren 5/9 (underart ikke meldt inn) (AEN).

Saltdal: 1 ind. flygendeforbi Høyjarfallmoen 6/10 (JÅA).

Kaie *Corvus monedula*

Nesna: 1 ind. Nesna 16/3 (AIO).

Rana: 2 ind. Utskarpen 1/6 (POS, HVÅ, MAR).

Træna: 4 ind. Husøy 6-8/11 (IJO, VJO)*fn.*

Vestvågøy: 1 ind. Leknes v/ungdomshuset 28/1 (Pål Eikås).

Vågan: 1 ind. Henningsvær 3/4 (JST).

Kornkråke *Corvus frugilegus*

Alstahaug: 1 ind. Tjøtta 27/4 (PSH, Brynjulf Liland).

Dønna: 2 ind. Skei 21/6 (Eivind Smørvik)*fn.*

Meløy: 2 ind. (ad + juv.) Bjæringen 21/4 (Sverre Birkelund).

Lurøy: 1 ind. (2K?) på fotballbanen Sleneset 5/4 (D) (Frode Johansen. Kilde: POS).

Vega: 1 ind. Kirkøy ca. 14/3 (TKO).

Vestvågøy: 1 ind. Ballstad 4/4 (John Inge Berg, ABS, HHO) og en fugl, sannsynligvis den samme, på Leknes omtrent samtidig (John Nyvoll).

Værøy: 1 ind. Sørland 17/2 og 28/3. Ble også sett i oktober 2006 (FCH)*fn.*


Rosenstær *Sturnus roseus*

Herøy: 1 ind. (1K) Gåsvær 23/9** (AIO, THC).

Vågan: 1 ind. Vinje, Gimsøya fra månedsskiftet sept./okt. til 5/11** (D). Da døde den etter å ha vært pusk noen dager (Johan Helge Gjendal m.fl.). Ny kommuneart. Se og Havørna fra 2007. Fuglen er innlemmet i samlingene ved Helgeland museum, naturhistorisk avdeling i Mo i Rana.

Tidligere år: **Røst:** 1 ind. Røstlandet 24/9-4/10-2006** (D) (SBA).

Funn nr.22-24 i Nordland. Arten hekker nærmest fra Svartehavet og østover.



Rosenstær, Gimsøy. Foto: John Stenersen

Pilfink *Passer montanus*

Tidligere år: **Narvik:** Håvikleira: 1 ind. 8/9 og 3 ind. 9/9-2003 (Jan Erik Berglihn). (Dette er en presisering/justering av 2003-rapporten. Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008).

Bokfink *Fringilla coelebs*

Vinterobs.: **Alstahaug:** 1 M Parkveien, Tjøtta 17/1 og 31/12 (PSH).

Herøy: 2 MM på foringsplass Tenna 8/12 (AIO).

Meløy: Halså: 1 ind. 3/2, 1 F 2/12 og 1 M desember (ØBI).

Bjørkefink *Fringilla montifringilla*

Vinterobs.: **Meløy:** 1 ind. Meløya 8/1 (Hegge) og 1 ind. Halså 14/1 (ØBI).

Nesna: 1 ind. Nesna 18/2 (Bjørn Sture Pedersen).

Saltdal: 2 MM Høyjarfallmoen i hele desember (JÅA).

Sortland: 1 ind. Strand 22/1 (Edon Hansen).

Vega: 2 ind. Marken i jan. (T. Pedersen).

Vestvågøy: 2 ind. på Toftan 5/1 (HVÅ). 1 ind Hornsbakken, Gravdal 28/1 (JOL).

Øksnes: 1 ind. Myre 20/1 (Per Olsen).

Grønnsisik *Carduelis spinus*

Vinterobs.: **Alstahaug:** Parkveien, Tjøtta: 1 par 10/1, 1 (2K) F ringmerket 11/1, 1 (2K) M ringmerket 12/1 og 1 F 18+20/1 (PSH). **Moskenes:** Opptil 5 ind. (begge kjønn) Sørpågen mange dager fra 30/10 til 13/12 (RWA).

Rana: 9 ind. Ytteren: 9 ind. 1/1, 5 ind. 7/1 og 1 ind. 13/1 (AEN).

Saltdal: Småflokker i Rognan første del av januar (JÅA)*fn.*

Tornirisk *Carduelis cannabina*

Tidligere år: **Andøy:** 1 ind. Dverberg 2/6-2003 (JHM). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008). Funn nr. 11 i Nordland etter 1955.

Bergirisk *Carduelis flavirostris*

Vinterobs.: **Herøy:** 13 ind. Tenna 1/1 (AIO).

Meløy: 3 ind. Bjæringen 16/1 (Kjell Birkelund) og 10 ind. Halså samme dag (Harald Wolden).

Vågan: 2 ind. Gjersvold, Laukvik 13/1 (FSO) og 1 ind. Engøya, Henningsvær 21/1 (JST).

Brunsisik *Carduelis (flammea) cabaret*

Hemnes: 1 ind. Røssvatn nord 30/7 (AEN).

Herøy: 1 ind., sammen med 8 gråsisik Silvalen, Nord-Herøy 1/1, 1 M Åsen 28/7 (AIO).

Meløy: 1 ind. Halså 22/1 (ØBI).

Nesna: Ungfugler ringmerket Skogsøy: 1 ind. 21/8 og 2 F-fargete ind. 16/9 (AIO).

Røst: 1 ind. Røstlandet 16/9 (RØF).

Vestvågøy: 1 ind. ringmerket Toftan 26/8 (HVÅ).

Etter å ha gått fra å bli regnet som en underart av gråsisik til å få status som egen art, er pendelen nå i ferd med å svinge tilbake igjen, og *cabaret* betraktes ikke lengre som egen art i for eksempel Sverige. Det har vist seg at formen ikke kan skilles fra gråsisik ved hjelp av DNA-analyser, selv om mange individer kan feltbestemmes.

Gråsisik *Carduelis flammea rostrata*

Herøy: 1 ind. (1K) Gåsvær 22/9** (D) (AIO). Fuglen viste karakterene til underarten *rostrata*. Dette er første godkjente observasjon av denne vestlige

underarten i Nordland. Det er imidlertid ting som tyder på at denne varianten av gråsisik ikke er så uvanlig som dette skulle tilsi. Det er rapportert om flere "ikke-innsendte" funn fra Lofoten (Røst og Vestvågøy) og Troms (Karl-Birger Strann til HVÅ). Gråsisikkomplekset (gråsisik-brunsisik-polarsisik) er i det store og hele et område hvor det ikke hersker enighet om hva som er art og hva som er underart.

Polarsisik *Carduelis hornemanni*

Alstahaug: Parkveien, Tjøtta: 1 (2K) M 17/1, 1 (2K) F 20/1, 1 (2K+) F 27/1 og 1 M 28/1 (PSH).

Bodø: 2 ind. Evenseth 14/1 (HDY).

Rana: 1 M i gråsisikflokk Straumen 27/1 (POS, EBU, AEN).

Herøy: Silvalen, Nord-Herøy: 4 ind. i flokk 1/1 (AIO), 1 ind. ringmerket, Åsen 20/1 og 1 M samme sted 10/2. Dessuten 2 ind. 4/3 og 1 F 18/3 (AIO).

Meløy: flere ind. Vallsjøen i januar (Jan Ole Tindvik).

Moskenes: 1 ind. Sørvågen 17/2 (RWA).

Nesna: Min. 2 ind. på foringsplass Skogsøy 13-14/1 (AIO, COL). Min 3 ind. (begge kjønn), samme sted 23-28/1 (AIO).

Rødøy: 6 ind. Myken 27/9 og 1 ind. ringmerket dagen etter (AIO, m.fl.).

Røst: Observert fra 15/9 til 6/10 (RØF).

Toppnotering med 20 ind. 19/9. Flere



Polarsisik med karakterer til underarten hornemanni, Røst. Foto: Martin Eggen

dager med 10 ind. Den 29/9 ankom en ny flokk på 10 ind. der samtlige ble ringmerket. Opptil 15 ind. daglig først i oktober. Min. 30-35 ind. totalt denne høsten. Sannsynligvis mange fugler av den vestlige underarten *hornemanni*.

Vega: 1 ind. Vallsjø 20-24/1 (JAN).

Vestvågøy: Min. 1 ind. Toftan 11/1 (HVÅ) og 1 ind. i Stamsund 27/1 (ABS).

Tidligere år: *Røst*: Forekomsten i månedsskiftet september/oktober 2006 var mildt sagt uoversiktlig. Opptil 15 fugler som viste karakterene til underarten *hornemanni* kan ha oppholdt seg på øya i perioden. Av disse ble 9 sendt NSKF - alle godkjent. Se 2006-rapporten for flere detaljer.

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*

Bodø: 2 ind. (1K?) tatt av katt Helligvær 16/7 (Ståle og Halvor Prestøy).

Furukorsnebb *Loxia pytyopsittacus*

Hekking: *Rana*: 1 par m/4 unger 27/6 (AEN).

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*

Røst: Totalt 4-6 ind. Røstlandet 8-24/9. Maks. 2 ind. på en dag (1D) (RØF). Regnes som 4 funn (RØF). Funn nr. 24-27 i Nordland av denne arten som i Norge hovedsakelig hekker på Sør- og Østlandet.

Konglebit *Pinicola enucleator*

I slutten av 2006 og begynnelsen av 2007 var det en stor invasjon av konglebit i blant annet Nordland. I vårt fylke ble særlig mange fugler registrert i Salten og Lofoten. Se også Havørna for 2007. *Andøy*: 1 M Forfjord 16/2 (Ole Petter Bergland).

Bodø: Dukkert opp i Bodø-området høsten 2006. På nyåret i 2007 økte opptreden, og det toppet seg i januar med 208 ind.

26/1 (TEK, HDY).

Flakstad: Ca. 40 ind. på Vareid 27-28/1 (Frithjof Henriksen)

Hadsel: Min. 25 ind. Hanøy 5/2 (FSO)*fn*. Flere obs. Børøya i februar (Jens-Are Johansen).

Herøy: 1 F-farget ind. Johus, Nord-Herøy 21/1 (AIO).

Meløy: 3 ind. Åmnes 14/1 (Laila Setvik Loe, Ola Arnfinn Loe). Maks. 10 ind.

Neverdal 14/1 og 1 ind. samme sted 27/1 (JIK)*fn*.

Moskenes: En liten flokk på Sørvågen 13-15/2 (RWA). Sett av andre litt tidligere.

Narvik: 4 ind. (1M og 3FF) i Narvik 11/1 (Roar Dahl). Ankenesstrand: 2 ind. noen dager fra 20/1 og 6 ind. (4 1K + 2 FF) 5-10/2 (Turin N. Strøm). Min. 5 ind. Håvik 10/2 (EBR).

Rana: 1-2 ind. i sentrum av Mo i Rana flere dager i perioden 6/2 – minst 2/3, men min. 3 forskjellige ind. involvert (2 [2K] MM og 1 F) (POS m.fl.). 2 ind. Dalselv 23-26/2 (Anja Baines)*fn*.

Saltdal: 7 ind. Rognan 18/1 (D) (JÅA).

Vestvågøy: Hornsbakken, Gravdal: 3 ind.

1/2, 1 ind. 13/2, minst 7 ind. 14/2 og minst 5 ind. 17/2 (JOL, sammen med Ruben Larsen 17/2). Ingen av fuglene var helt røde. 20-30 ind. på Evjen 6/2 (ABS). 4 ind. v/Fygle skole (Johan Sirnes) og 6 ind. på Sandberg (Reidun Sirnes) 6/2. Også 3 ind. på Sandberg 11/2 (Johan Sirnes). 10-15 ind. i Stamsund 15/2 (Pål Eikås). En død fugl funnet i Gravdal sentrum ca. 20/2 (Jermund Liljedal). Ny kommuneart.

Vågan: Invasjonen starter 18/1 med 8 ind. i Henningsvær (JST) og 10 ind. Kvitfossen (FSO). Så fulgte 44 ind. i 3 flokker fra Kvitfossen til Hadselsand 21/1 (FSO), 121 ind. i Laukvik 22/1 (FSO), 1 ad. M Gimsøya 22/1 (JST), min. 40 ind. i flere

flokker Vestpollen-Lakselva 24/1 (JST), min. 45 ind. Kabelvåg 30/1 (JST), min. 40 ind. på nordsida av Store Molla 4/2 (FSO), 5 ind. Sauøya, Henningsvær (JST) og 3 ind. Laukvik (FSO) 5/2, min. 30 ind. i Raftsundet 5/2 (noen av disse i Hadsel kommune) (FSO), 3 ind. i Kabelvågmarka 12/2 (Jens-Edvard og Adrian Henriksen), 1 F v/Rørvikvatnet 12/2 (JST), 1 M Laukvik og 4 ind. på Sandsletta 14/2 (FSO) og til slutt 3 MM i Laukvik 25/2 (FSO). *Øksnes*: 1 ind. Myre 28/1 (Isak Isaksen).



Konglebit, ung hann, Kabelvåg.

Foto: John Stenersen

Dompap *Pyrrhula pyrrhula*

Uvanlig område: *Værøy*: Et sjeldent syn i kommunen var 4 ind. (2 par) Sørland 17/2. (FCH)*fn*.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Hekking: *Vefsn*: Bjørnådal: 1 M 12-24/2 + 11/4 og 3/5. 1 par i "vårleik" 9/5. En eller begge fuglene sett flere ganger 17/5-27/6. Sannsynligvis også en unge 16/6. Sikker obs. av 1 unge som ble matet av foreldrene 17-18/6*. Hunn sett mate 2 unger 19/6*. Siste obs. av familien var

altså 27/6 (ESH. Kilde: POS). Dette er første kjente hekkefunn i Nordland.
Andre obs.: *Rana:* 1 ind. Brennslettveien, Selfors fra ca. 27/3 til 3/4 (Grener Forshei. Kilde: POS). 2 ind. Mo i Rana 24/3 (Terje J. Hansen)*fn*, 1 ind. Selfors 20/5 (Lillian Arntsen. Kilde: POS)*fn*, 1 F Brennslettveien, Selfors 10/6 (D) og 1 ind. 26-28/6 (Bjørn Leirvik. Kilde: POS).
Saltdal: 1 ind. Høyjarfallmoen 15/3-4/4. Hørt syngende de siste dagene (JÅA).
Træna: 1 ind. Husøya 28/4 (IJO)*fn*.
Øksnes: 1 ind. Myre ca. 1 uke fra 9/6 (D) (Isak Isaksen m. fl.)

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

Hekking: *Røst:* 4 ind. om sommeren, minst 1 par hekket (HEG). Dessuten sett nesten hver dag siste halvdel av september med min. 20 ind. 23/9 (RØF).

Snøspurv *Plectrophenax nivalis*

Vinterobs.: *Alstahaug:* 1 ind. hørt Søvik 4/2 (PSH, THC), 2 ind. Prestegårdsstranda, Tjøtta 8/2 (Lise Hatten) og 1 ind. o/ Svarthaugen 19/2 (PSH).
Bodø: 14/1 Bodøsjøen: 1 ind., 14/1 og 18 ind. 11/02 (THE),
Hadsel: 3 ind. Morfjordneset 18/2 (FSO)*fn*.
Herøy: 1 F-farget ind. Tennvalen 21/1 (AIO).
Nesna: 1 F-farget ind. Revsnes, Nesna 27/1 (AIO).
Rødøy: 3 ind. Sleipnes 28/1 (Cecilie Sandnes, HEH).
Røst: 1 ind. Kalvøya 28/1 (SBA)*fn*.
Vågan: 7 ind. Laukvik havn 24/1 (JST).

Gulspurv *Emberiza citrinella*

Lofoten/Vesterålen: *Hadsel:* 1 par Børøya 15/2 (Jens-Are Johansen). Sett her 3 år på rad.
Sortland: 1 ind. Selnes 18/2 (Marian Leonardsen).

Vierspurv *Emberiza rustica*

Rana: 2 MM i sommerdrakt Leirbakken, Altermark 7/5* (Hege Rølvåg). Fuglene var i en flokk på 10, sannsynligvis alle *Emberiza*, men LRSK har ikke nok informasjon til å avgjøre hvilke(n) art(er) de siste 8 tilhørte (vierspurv kan ikke utelukkes). Funn nr. 5 i Nordland av denne arten som i Norge har sitt viktigste hekkeområde i Hedmark.

Dvergspurv *Emberiza pusilla*

Nesna: 1 M Stranda, Skogsøy 13-28/6. Ringmerket* (D) (AIO, m.fl.).
Røst: 1 ind. Bombehagen, Røstlandet 5/10 (MEG).
Tidligere år: *Røst:* 1 ind. Røstlandet 19/9-2003 (Kjell Ruud Mjølunes, Oddgeir Djøseland, John Grønning). Uteglemt tidligere. (Er tatt med hos NFKF: Fugler i Norge 2003. Se *Ornis Norvegica* Vol. 31, nr. 1-2008).
 Funn nr. 10-12 i Nordland av denne spurven som i Norge bare er påvist hekkende i Finnmark.

Sivspurv *Emberiza schoeniclus*

Tidlig og avvikende ind.: *Vestvågøy:* En delvis albino fugl på Toftan 20-21/3* (D) (MAR, HVÅ).



Sivspurv, delvis albino, Toftan.
 Foto: Harald Våge

Observatørliste:

ABS-Ann Britt Pilegaard-Simonsen
 AEN-Arne Engås
 AIO-Atle Ivar Olsen
 ANB-Anni Breivik
 BDØ-Beathe Dømbe
 BJV-Bernt Jarle Vatland
 COL-Cecilia Olsen
 EBE-Espen Andre Bergersen
 EBR-Eivind Braseth
 EFU-Einar Furuheim
 ESH-Eldfrid Strompdal Henriksen
 FCH-Frank Christensen
 FSO-Frantz Sortland
 HDY-Helge Dypfest
 HEG-Håvard Eggen
 HHO-Helge Emil Holand
 HEH-Helga Saksen Hammer
 HVÅ-Harald Våge
 HØD-Harry Ødegaard
 INS-Inge André Grubben-Strømnes
 IJO-Ivar Johansen
 JAN-Johan Antonsen
 JIK-Jan Inge Karlsen
 JOL-Jon Olav Larsen

JSI-Johan Sirnes
 JST-John Stenersen
 JSU-Jon Suul
 JHM-Jørn Helge Magnussen
 JÅA-Johan Åge Asphjell
 MAR-May Arild
 MEG-Martin Eggen
 MFA-Magnar Fagerli
 NVL-NOF Vestvågøy lokallag
 ORD-Ole Roar Davidsen
 POS-Per Ole Syvertsen
 PSH-Paul Shimmings
 RBI-Raymond Birkelund
 RJO-Ronny Johansen
 RWA-Robert Walker
 RØF-Røstfolket
 SBA-Save Baines
 THC-Thomas Holm Carlsen
 THE-Thor Edgar Kristiansen
 TPE-Torbjørn Pedersen
 TKO-Terje Kolaas
 VJO-Viviann Johansen
 ØBI-Øystein Birkelund



Hybrid stokkand x stjertand, hann - Røstlandet. Foto: Steve Baines

Utflukt til Tomma på Villblomstens dag

NOF Nesna og Omegn Lokallag

av Tom Kenneth Sandvær

Tomma, en søndag i juni. Nesna Ornitologiske Forening skal på tur til en av de tre øyene i kommunen. Siden det også er villblomstens dag, har vi med oss en botaniker. Målet er Husbymarka Naturreservat. Her er et mangfoldig fugleliv, men også verdens rikeste forekomst av den sjeldne tresorten "smalasal".

Vi går langs hovedveien nordover fra Husby Gård, engang hovedsete for det enorme Giske-godset. Gåsbuen flyr i en stor sirkel og varsler med sin karakteristiske gjennomtrengende låt. Den har nok unger

et sted på åkeren. Fire skvat-tjeld sitter på gjerdepålene og vipper med hodet. Lokalkjente Peter Engbakk forteller om storbonden som bodde her i gamle dager, da han fikk anlagt en egen lysthage for sin datter som kom tilflyttende søranifrå, og importerte ulike plantevekster fra hennes hjemsted for at hun skulle finne seg til rette på Tomma.

Vi svinger oss inn på en overgrodd traktorvei. En gammel gråor står og vokter på andre siden av grøfta. Fuglekvisitteret øker i volum. Et par av fugleentusiastene



En av de litt yngre friluftsentusiastene, Magnus Eidissen, benytter kaffepausen til å ta en liggende bøk i nærmere øyesyn. Foto: Tom Kenneth Sandvær

stopper opp et minutt og lytter. Vi hører både gransanger, sivspurv, rødvingetrost og måltrost blant flere av de vanligere småfuglene. Vi har så vidt begynt å gå igjen da det rasler noe voldsomt i et kratt langs stien før noe stort farer opp og forsvinner inn i skogen. En orrfugl.

Gresset er vått etter natten. Strandrør, engreverumpe, skogburkne og sumphaugeskjegg slikker oss langs føttene og legger igjen fuktige visittkort i form av blader og frø, mens de minste konsentrerer seg om ikke å trå på skogssneilene - for da blir det jo regn.

Botaniker Unn Tveraabak lyser opp og går bort til en omfangsrik istervier. Den er knall gul. Solen gjør at den skinner som om den stod i flammer. Til lydhøre turdeltakere forteller hun velvillig om plantene vi møter langs stien. Skogstorknebb, hvitbladtistel, jonsokkoll, ormetegl, vårerteknapp og liljekonvall. Hun bøyer seg ned foran noe hun kaller smalkjempe og forteller at den en gang var en vanlig kulturplante, men at den nå er utrydningstruet. Foruten et par tilfeller på Løkta og i Alstadhaug, har hun aldri sett den så langt nord før. Engbakk leder oss inn på en mindre sti. Det føles som om vi går inn i en jungel. Her er små bekker, planter og buskevekster i alle varianter. En diger bøk har falt over ende, kanskje i fjor, men spirer for fullt allikevel.

Vi vandrer videre langs en hasselskog, som for øvrig er meget sjelden på disse breddegrader, og deretter gjennom en svær granskog. Trærne er gigantiske. De må være plantet for veldig lenge siden. Vi øyner et håp om å støte på reir til hønsehauk eller annen rovfugl i den tettvokste skogen, og speider optimistisk langs stammene som

strekker seg bestemt opp og forsvinner mot oven. Noen få lysglimt presser seg igjennom, akkurat nok til at konturene av greinene lar seg forme.

Der! - et reir. Kikkerten bekrefter oppdagelsen, men avslører samtidig to reir til. "Det der må være kråke" - mener noen, eller "skjære" sier andre. Jeg må si meg enig. Ingen hønsehauk denne gangen altså. Fangstfellene til de små spindelkunstnerne med kors på ryggen kleber seg til ansiktet mellom hver gran vi passerer. Det klør over alt når vi er ute i lyset igjen.

To ravner utstøter korte skrik idet de passerer et stykke over oss på vei mot



Joakim Einmo studerer fargene i den giftige planten firblad. Foto: Tom Kenneth Sandvær

fjellet. Terrenget åpner seg. En gjerdesmett diskuterer med en artsfrende litt lenger bort, mens en jernspurv proklamerer sine strofer fra et tre. Tveraabak plukker opp en plante jeg aldri har lagt merke til før og forklarer at dette er firblad, tilhørende giftliljefamiljen. ”Denne bør man ikke koke suppe på”. Hun tar frem et par luper så alle kan få nærmere innsyn i de fantastiske fargene som utbroderer seg i hjertet av den struttende planten.

Fuglekvitteret fra de tallrike sangerne og den endeløse summingen fra insektene avbrytes av stemmen til Engbakk, som nå kan avsløre at vi nærmer oss noen fine eksemplarer av den eksklusive smalasalen, - arten Nesna Kommune fikk i oppgave å ta spesielt godt vare på av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

De vakre smalasalene er i full blomst nå. De stikker seg frem i en skråning hovedsakelig bestående av almskog. Treet kan minne litt om rogn på denne årstiden, så det er på avstand litt vanskelig å skille artene når

de slynger seg rundt hverandre mellom almen. På nærmere hold derimot, ser man at smalasal er langt mer krokete i greinene og har taggete blader.

Det totalfredede treet vokser kun to steder i hele verden. Noen få individer vokser enkeltvis på ulike steder i Nordland og i Sogn på vestlandet, men Tomma besitter altså den desidert hyppigste forekomsten, så området her har derfor uvurderlig vitenskapelig interesse. ”Husbymarka Naturreservat er helt spesielt i biotopisk sammenheng, landskapet rundt hagemarksskogen lager en slags parableffekt, som sammen med det rike kalkinnholdet i grunnfjellet gir meget gode vekstvilkår for artene i området”, forklarer Tveraabak.

Vi drikker opp kaffen og bestemmer oss for å sette kursen hjemover. Fem låvesvaler seiler bekymringsløst på luftstrømmene mens de plystrer sine lekke toner. Undertegnede trekker inn noen ekstra dype magedrag med de herlige duftene fra alskens vekster og tenker at livet er fint på Helgelandskysten.



Smalasal finnes to steder i hele verden, hyppigst er forekomsten på Tomma. Foto: Tom Kenneth Sandvær

Møtet med spurveugla – høsten-07

av Helga Saksen Hammer

Søndag 21. oktober bestemte jeg meg for å gå en lengre søndagstur siden det for en gangs skyld var oppholdsvær denne høsten. Med sekk og kikkert startet turen fra Kila til Langåsdalen over fjellet på Tjongsfjordhalvøya i Rødøy, for de som er lokalkjent.

Etter 3-4 timers vandring og et par kaffepauser begynte jeg å nærme meg Steintuva og ”Trollhålan”. Ikke spesielt mye fugl så sent på året, så egentlig var det en trøst å komme nær ei stakkars havørn på utkikk etter mat. Havørna kom seilende i lav høyde over tretoppene og omtrent på samme høyde som meg ettersom jeg fulgte høydedraget på Langåsen. Ei stund beveget vi oss parallelt framover. Fordelen med å gå på høyden utover er nettopp utsikten over ”Trollhålan” og myrene i Langåsdalen. Det er tett blandingsskog og sitkagran hele åssiden opp mot Steintuva og et yndet område for spetter, hauk og korsnebb. Lite ante jeg hva jeg hadde i vente.

Klokka nærmet seg seks på ettermiddagen og en viss skumring fortalte at det var på tide å komme seg heimover, men først ville jeg lokke på spettene. Jeg gikk ut på kanten på rasteplassen til steintuva og plystret mot Trollhålan. Gjentok plystresignalene flere ganger, men ikke et pip. Siden det er en post på denne rasteplassen satte jeg meg ned for å skrive i turboka. Det er helt stille og ei nesten trolsk stemning i skumringa. Plutselig kommer ei skarp rekke korte fløyt så jeg nesten skvetter opp. Min første tanke var – er det en mobiltelefon.. Jeg reiser meg opp- og går sakte i den

retningen lyden kommer fra og hermer de 6-7 korte fløytesignalene så godt jeg kan. Med ett kjenner jeg lufttrykket fra en fugls vinger mot hodet mitt og ser straks etter at fuglen lander på ei grein i treet rett foran meg. Jeg stirrer. Dette er den minste uglen jeg har sett . . den er jo bare på størrelse med en dompap. Jeg gjentar fløyterekken og tror knapt hva jeg hører når den svarer. Hva i all verden er dette for en skapning. Jeg fomler forsiktig fram mobiltelefonen og ringer Øystein Birkelund, og han er ikke i tvil når jeg gjentar fløytesignalene og beskriver skapningen. Dette er en spurveugle, bare den har de karakteristiske skarpe korte fløytesignalene. Idet jeg prater flyr spurveugla opp i toppen på ei gran like ved og nekter og gi lyd fra seg. Men straks samtalen er avsluttet kommer spurveugla tilbake og lander på nærmeste grein i hodehøyde. Det er akkurat som den vil ha kontakt. Jeg kan vanskelig beskrive dette øyeblikket . . det er nesten magisk med bare ugla - meg og stillheten i tussemørket.

Etter minutter i stillestående forundring går jeg bort de metrene som er bort til posten med boka, for den holder jeg fortsatt i handa. Da letter ugla og kommer etter og setter seg i samme bjørka som postkassen bare et par meter høyere. Jeg lager fløytesignalene nærmest for å takke henne for opplevelsen da hun overraskende svarer meg. Dette var bare helt fantastisk . . den virket jo ikke redd i det hele tatt. Etter enda flere minutter må jeg begynne heimturen, det er nesten mørkt nå. Da opplever jeg altså at ugla forflytter seg etter meg og kommuniserer villig nesten femti meter.

Det ramler meg ikke inn at jeg kan fotografere henne. Fra en tidligere episode med fotografering av ei perleugle på 90-tallet hadde jeg dårlig erfaring med blits. Det er en annen historie, men kan nevne at da Henrik Engen fikk ei hekkende perleugle i kvistetasjen syntes han det var så spesielt at han tilkalte stedets journalist. Jeg var med for å bestemme uglearten. Jeg glemmer vel heller aldri synet av ugla som trykket på ungene sine innerst på denne kvisten. Dessverre oppdaget familien, som bodde i huset at det ble så lite å se til ugla etter besøket vårt. Det viste seg etter hvert at perleugla hadde fått hjertestans og lå død over de døde ungene sine.

Heldigvis ble ikke spurveugla på Steintuva skremt, og jeg har ved senere anledninger sett etter den uten resultat. Kanskje en dag er hun der igjen, til da lever jeg på minnene.

Vel heime om kvelden kunne jeg lese om den tillitsfulle fuglen: ”I stor grad aktiv i skumringen (Mangelfullt mørkesyn når det er nesten mørkt). Ganske uredd og kan lokkes fram ved imitasjon. Sitter ofte i grantopper. Lever av å drepe troster og spetter, så slik sett bodde den midt i matfatet. Og fugleboka (Gyldendals store fugleguide) stemte på alle punkter.



Spurveugle. Foto: John Stenersen

FØRSTE SØNDAG I ADVENT

av Harald Misund

I dag en det en nokså grå dag med lette snøbyger i Bodø, det er tidligere kommet ca. 30-40 cm snø som dekker marka. Men på denne tid av året kan regn og vind fra vest fort forandre landskapet å gjøre det enda mørkere slik som ofte skjer i desember.

Jeg sitter og ser på et fuglebrett utenfor vinduet mitt, de første meisene, kjøttmeis, blåmeis, granmeis og ei svartmeis er på plass mens det enda er ganske mørk. Så dukket skjærene opp, iblant kan det være så mange som 15-16 i tallet, fire nøtteskriker er også gjester på foringsplassen. Nøtteskrikene er noen som lager veg i vellinga på meisebollene, og har bedre balanse i kroppen enn sine slektninger skjærene. På lysstolpen sitter ett par kråker som hører til i vårt kosthold, når de flyr fra toppen av stolpen kan jeg se en liten bevegelse i lysarmaturen, så de har litt vekt etter god foring bestående av hundemat. Hund har jeg ikke lenger, men det er ingen forandring i innkjøp av hundemat. Kråkeparet er blitt så husvant at de kommer på altanen utenfor vårt soverom og tigger etter mat rund klokka seks om morgenen, glad den slipper å fly inn til Viken (søppelplass) og ende sine dager i en hagleskur.

Det har vært mye rognebær i Salten i år, trærne bugner slik jeg ikke kan minnes å ha sett dem tidligere, og her holder enda store flokker med gråtrost sammen med stadig flere sidensvanser etegilde på tre etter tre. Det merkelige er at de foretrekker enkelte av rognebærtrærne fremfor andre, mulig er

smaken forskjellig på bærene og de tar de mest velsmakene først.

Ute i byen er det enda mye urørte bær på svensk asalen, så det er enda noe å ta av, mulig varer bærene fram til jul, men da er vel de fleste av fuglene alt dratt lengre sydover. Gråtrosten med en og annen rødvingtrost i følge ser jeg fly inn i granplantefeltet i Messiosen for natta, mens andre flokker kan sitte andre steder, men som sagt jeg mener at det var mange flere av dem i tidligere år.

Det er sikkert en hard tid for mange av småfuglene, men mange er flink til å fore dem, i går så jeg ei velkjent dame som kom med en heil bæreposer med brødsmler utenfor Glasshuset i Bodø, der satt minst 80-100 gråspurv og venta, men så har denne foringsplassen vært brukt over flere år. Ikke alle er like glad for at fuglene blir foret midt i byen da maten også tiltrekker dueflokker.

Men det er ikke slik at vi bare kan velge fuglene vi synes godt om på en foringsplass, men foruten småfugler som gråspurven må vi regne med byduene, kråke, skjære og en og annen gråmåse som skal lindre sulten.

Dagene er korte på denne tiden, alt før klokka tre er det mørkt og ingen fugler er lenger på fuglebrettet. En liten flokk grønnfink landet i et nærstående rognebærtre, og spiste noen bær før de fant seg et trygt sted for natta, i morgen er det også en dag med kamp for føden.

KJERNEBITEREN I NORDLAND: FRA STOR SJELDENHET TIL HEKKEFUGL

av Per Ole Syvertsen

Fra å være en svært sjelden gjest i Nordland, har kjernebiteren i seinere år forekommet så hyppig at det har blitt vanskelig å holde seg oppdatert om funnene. Arten opptreter gjerne i bebyggelse, og den er så spesiell av utseende at den blir lagt merke til og korrekt identifisert av mange som ellers ikke har mye kunnskap om eller interesse for fugler. Sannsynligvis blir bare et utvalg av observasjonene som gjøres kjent for rapport- og sjeldenhetskomiteen. Kjernebiter observeres i Nordland i hovedsak på våren, men spredte funn foreligger fra de fleste måneder. I denne artikkelen sammenfattes observasjonsmaterialet fra fylket til og med 2007, herunder det første hekkefunnet som ble gjort i Vefsn i 2007.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes* har alltid vært regnet som en av de sjeldnere hekkefuglene i Norge. Fra tiden før midten av forrige århundre foreligger det kun to kjente hekkefunn: 1 nettopp flydyktig unge skutt ved Rotvoll, Trondheim 5. juli 1884 og 1 hunn med to flydyktige unger som ennå ble matet i Slottsparken, Oslo 27. juni 1925 (Haftorn 1971). Etter ca. 1950 har arten blitt observert langt mer hyppig, særlig i lavlandet rundt Oslofjorden og langs kysten vest til Rogaland. Under NOFs kartlegging av hekkefuglenes utbredelse i Norge på 1970- og 1980-tallet, ble kjernebiter fremdeles i hovedsak registrert langs kysten fra Oslofjorden til Rogaland, med enkelte innlandsfunn (også hekkinger) på Østlandet (Øien 1994). Det er påfallende at utbredelseskartet i atlasboka ikke har noen plott i kystfylkene fra Hordaland og nordover. Arten har imidlertid i alle fall siden slutten av 1980-tallet vært et årvisst innslag i faunaen i Trøndelagsfylkene på vårvinteren, og et hekkefunn ble gjort ved Melhus sør for Trondheim i 1991 (Øien 1994).

Utbredelse av fugler vinterstid i Norge var

gjenstand for kartlegging i perioden 1994–2003. Resultatene viser en utvidelse av artens forekomstområde sammenlignet med hekkefuglprosjektet to tiår tidligere, spesielt mot vest og nord. I vinterkartleggingen ble det gjort en rekke funn i Trøndelag og spredte funn videre nord til Bardufoss i Troms (Jørgensen 2006).

Sterkt økende forekomst i Nordland

Da Svein Haftorns bok Norges fugler utkom i 1971 var det kjent bare ett funn av kjernebiter i Nord-Norge, et individ som ble observert i Narvik i begynnelsen av mars 1962 (Enevoldsen 1962, Haftorn 1971). Det skulle gå tjue år før det ble gjort et nytt funn i Nordland (et individ i Melbu, Hadsel 20. juni 1982; Fagerli m.fl. 1987). Etter nye tjue år kunne Meyer (2004) oppgi at det var kjent til sammen 28 observasjoner i fylket til og med 2002.

En ny opptelling av kjente funn viser at det til og med 2007 foreligger omlag 80 funn av kjernebiter i Nordland (Tabell 1, Figur

Tabell 1. Fordelingen av kjernebiterfunn på de enkelte kommuner i Nordland 1962–2007. Manglende kommuner er uten kjente funn. Skjerstad ble i januar 2005 slått sammen med Bodø.

Kommune/region	Ant. funn	Funnår
Brønnøy	1	1992
Grane	2	2004-05
Hemnes	4	1985, 2004, 2006
Nesna	1	2006
Rana	19	1987-89, 1994, 2000-01, 2004-07
Rødøy	1	2006
Træna	3	2005-07
Vefsn	2	2006-07
Vega	2	1997, 2003
Helgeland	35	
Beiam	2	2001, 2003
Bodø	1	1988
Fauske	1	2003
Gildeskål	1	2005
Meløy	10	1993, 1996, 1998, 2000, 2002-03, 2005
Narvik	1	1962
Saltdal	10	1997, 1999, 2000, 2004-07
Skjerstad (nå Bodø)	1	1985
Steigen	1	1997
Tysfjord	2	1994, 2004
Salten og Ofoten	30	
Flakstad	1	2002
Hadsel	1	1982
Røst	2	1993, 2005
Vestvågøy	4	2000, 2003, 2005
Værøy	1	2004
Vågan	4	1993, 1995, 2004
Øksnes	2	2004, 2007
Lofoten og Vesterålen	15	

1). Arten er observert i alle deler av fylket, med kjente funn i 25 av de 44 nåværende kommunene. Klart flest observasjoner foreligger fra Rana (19), Meløy (10) og Saltdal (10); ingen andre kommuner har mer enn fire funn. Regionen Helgeland har flest funn, etterfulgt av Salten og Ofoten, med færrest funn fra Lofoten og Vesterålen. Det er rimelig å forvente at denne sørlige arten ved en spredning nordover først vil øke i opptreden i de sørligste delene av fylket, noe funnmaterialet synes å bekrefte. Noe klart geografisk mønster framtrer ellers ikke. Med kun to funn på Røst, som har god observasjonsdekning, og fravær av funn i flere kystkommuner på Helgeland, kan det se ut til at kjernebiter bare i beskjeden grad streifer ut til kysten.

En gjennomgang av materialet tiår for tiår nyanserer bildet av forekomsten. Gjennom hele 1980-tallet ble det gjort til sammen bare åtte funn. Foruten fylkets andre funn, i Hadsel i 1982, ble to funn gjort nord for Saltfjellet, i Skjerstad og Bodø. De øvrige funnene fra tiåret er fra Rana (4) og Hemnes (1). Først litt inn på 1990-tallet begynner funnmengden å ta seg opp. Ingen funn er kjent fra 1990-91, men fra og med 1992 er kjernebiter rapportert



fra Nordland i alle år (se Asphjell 2002 om funnet i 1999). Funnene fra dette tiåret har stor geografisk spredning, faktisk med langt flere funn gjort nord for Saltfjellet (11) enn på Helgeland (3). Det var ingen år på 1990-tallet med mer enn fire funn.

På 2000-tallet har kjernebiterens opptreden i Nordland fortsatt å øke kraftig. Rundt 72% av alle kjente funn i Nordland er gjort i perioden 2000–2007. Det foreløpig beste året er 2005 da 12 funn ble registrert. Funnmassen er, samlet sett for perioden, nokså likt fordelt mellom funn nord og sør for Saltfjellet.


Fordeling på kjønn og gruppestørrelse

De fleste funnene gjelder enkeltindivider. Som regel er det ikke kjent om fuglen var en hann eller en hunn, men i de tilfellene hvor dette er rapportert har det dreid seg om ti hanner og fire hunner. Par eller to fugler i lag er rapportert fra Skjerstad (1985), Rana (1987, 1988, 2001 og 2007), Meløy (2000), Saltdal (2000 og 2004), Vestvågøy (2003), Grane (2005), Træna (2005) og Vefsn (2006 og 2007). For ett funn foreligger det ingen opplysninger om antall individer.

Funn av flere enn to voksne fugler sammen har bare vært rapportert ved to anledninger: tre individer Vallsjø, Meløy 27. april 1998 og inntil ni individer på fóringplass i Bjørnådal, Vefsn 8. januar – 8. april 2006. Med Bjørnådalfunnet fikk Nordland for første gang en liten forsmak på «sørnorske tilstander»!

Kjernebiter, Nesna, 7/5-2006.

Foto: Atle Ivar Olsen



Figur 1. Kjente funn av kjernebiter i Nordland pr. år i perioden 1980–2007.


Sesongmessig fordeling og stasjonære fugler

April og mai er de klart beste månedene for kjernebiter i Nordland, med til sammen rundt 70% av de daterte funnene (Figur 2). De få funnene som ikke er datert stammer også fra våren. Bare åtte funn – omlag 10% – er gjort i løpet av de sju månedene fra juli til januar, men allerede i februar og mars finner det sted en svak økning. Om sommeren og høsten gjør arten lite av seg og kan lett overses, men det nesten totale fraværet av vinterfunn er kanskje likevel noe uventet. I Sør-Norge er kjernebiterne gjerne på sitt mest iøynefallende når de opptrer på fóringplasser i hager på vinteren. Det er vanskelig å forestille seg at arten kan overleve en nordnorsk vinter på annet vis enn ved å oppsøke slike lokaliteter, og det er derfor rimelig å anta at fuglene i all hovedsak forlater landsdelen i løpet av

høsten. Økningen i forekomst allerede fra februar av er kanskje en indikasjon på at de ikke trekker så veldig langt – kan hende til Midt- og Sør-Norge?

Mange av funnene gjelder observasjoner på kun én enkelt dato. Det første funnet hvor fuglene – forøvrig et par – ble registrert over flere dager, stammer fra Selfors i Rana 21.–28. mai 1987, av LRSK notert som funn nr. 8 i fylket. Funn nr. 7 gjelder også et par på Selfors, på ikke nærmere fastsatt dato eller datoer i begynnelsen av mai 1987. Det er ikke urimelig å anta at disse to funnene kan gjelde de samme fuglene.

Siden 1987 har det vært kun to år helt uten kjente funn av arten i Nordland (1990 og 1991, jf. Figur 1). Rapporter om fugler som har vært stasjonære over flere dager har vært nesten like regelmessige, men mangler fra 1989, 1992, 1996 og 1998. Gjennomsnittlig



Figur 2. Månedsfordeling for kjente funn av kjernebiter i Nordland 1962–2007. I tillegg kommer to udaterte vårfunn (Brønnøy i 1992 og Vega i 2003).


lengde på periodene fuglene har vært til stede har også økt. I femårsperioden 1987–1991 var det bare to funn av stasjonære fugler (hhv. 8 og 4 dager), mens antall slike funn hadde økt til 12 i perioden 2002–2006 med en gjennomsnittslengde på over 14 dager (Figur 3). Fra både 2006 og 2007 er det kjent fem funn av stasjonære fugler i Nordland. Funn av eksepsjonelt lang varighet ble gjort i Vefsn begge disse årene, noe vi skal komme tilbake til i neste kapittel.

Hekkefunn i Vefsn

I perioden 2. januar – 8. april 2006 hadde et varierende antall kjernebitere tilhold i nabolaget hos Eldfrid Strompdal Henriksen i Bjørnådal i Vefsn. Den første observasjonsdagen så hun kun ett individ,

men fra 8. januar til begynnelsen av april var inntil åtte kjernebitere til stede. På den aller siste observasjonsdagen var det ni individer. Arten viste seg imidlertid ikke noe mer på stedet denne våren.

I februar 2007 dukket arten igjen opp på fôringsplassen i den samme hagen. En hann hadde da tilhold der 12.–24. februar. Etter dette ble det en pause i observasjonene, men hannen ble registrert igjen 11. april og 3. mai. Den 9. mai ble omsider et par observert, i hva ESH (pers. medd.) beskriver som «vårleik», altså kurtise og eventuelt paring. Deretter fulgt flere observasjoner av én eller begge fuglene i perioden 17. mai – 6. juni. I perioden 9.–15. juni økte aktiviteten, med paret så å si i «skytteltrafikk» mellom hagen og et skogholt i nærheten. Dette var selvsagt en meget sterk indikasjon på at fuglene hekket i området. All eventuell tvil



Figur 3. Kjente funn av stasjonære kjernebitere i Nordland fordelt på femårsperioder, og gjennomsnittlig antall dager funnene berører. Det første relevante funnet ble gjort i 1987. Kun ett funn strakk seg over et årsskifte (Reinforshei, Rana jula 2001 – 30. januar 2002). For flere av funnene er antall dager omtrentlig.

om hekking ble feid til side de etterfølgende dagene. Den 16. juni ble paret sett sammen med det som sannsynligvis var en unge, 17.–18. juni ble foreldrefuglene observert mens de matet en utfløyet unge, og 19. juni matet hunnen to utfløyne unger. Den siste observasjonsdatoen var 27. juni, da hele familien fremdeles hadde tilhold i området.

Disse observasjonene fra mai og juni 2007 utgjør den første kjente hekkingen av kjernebiter i Nordland. Funnet er godkjent av LRSK. Det samme året ble det imidlertid gjort også et par andre observasjoner som er verdt å trekke fram.

På Selfors i Rana kan kjernebiter ha hekket i 2007. Arten er notert fra Mo i Rana 24. mars

(2 individer), og deretter enkeltindivider på Selfors av ulike observatører 27. mars – 3. april, 20. mai og 10.–28. juni (i tillegg foreligger det observasjoner fra det samme området som ikke er datofestet; Espen Dahl pers. medd.). Funn så langt inn i juni er i seg selv uvanlig, og i tillegg ser det altså ut til at arten hadde tilhold over en lengre periode helt fra mars av. Det ble imidlertid ikke rapportert om observasjoner av unger eller voksne som fraktet mat.

På Høyjarfallmoen i Rognan, Saltdal ble et individ observert i perioden 15. mars til 4. april 2007, de siste dagene syngende. Saltdal er en av de fremste kommunene for kjernebiter i Nordland, og det er neppe grunn til å bli overrasket om det skulle bli rapportert hekking her de nærmeste årene.

Takk

Takk til Harald Våge som har levert en oversikt over funn av kjernebiter i Nordland basert på LRSKs arkiver. Oversikten utgjør det primære datagrunnlaget for denne artikkelen, men har i tillegg blitt kontrollert mot publiserte LRSK-artikler i tidsskriftene *Sterna*, *Vår Fuglefauna* og *Havørna*, LRSKs upubliserte stensilrapporter og grunnlagsmaterialet for boka *Fugler i Nordland*.

Referanser

Asphjell, J.Å. 2002. *Fugler i Saltdal*. Upublisert rapport. (36 s.).
Enevoldsen, A. 1962. Kjernebiter i Narvik. *Sterna* 5 (4): 168.
Fagerli, M., Meyer, K.A. og Asphjell, J.Å.

1987. Avifaunistisk rapport fra Nordland 1979–1983. *Vår Fuglefauna* 10 (3): 165–174.

Haftorn, S. 1971. *Norges fugler*. Universitetsforlaget, Oslo. (XX+862 s.)
Jørgensen, F. 2006. Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*. S. 418 i: Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. og Sæbø, S. (red.). *Norsk VinterfuglAtlas*. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim.

Meyer, K.A. (red.). 2004. *Fugler i Nordland*. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Nordland. (159 s.)

Øien, I.J. 1994. Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*. S. 490 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red.). *Norsk fugleatlas*. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.



Årets NOF-treff ble holdt på Eggum Sjøhus (over). Utflukten søndag gikk bl.a. ut til Sandøya (t.h) Foto: Johan Sirnes

NOF-treff og årsmøte 29-31 aug. 2008

Treff nr 29 – Eggum i Lofoten.

Årets treff ble arrangert av Lofoten lokallag. Møter og innkvartering foregikk på Eggum sjøhus som ligger på Lofotens ytterside. Av fylkets 7 lokallag var tre representert: Rana (1), Nesna (2) og Lofoten (12).

Fredag kveld var været gunstig og etter mørkets frembrudd ble det satt opp nett på stranda mot storhavet og kasettspiller med havsvalelyder satt på. Resultatet ble to havsvaler som ble ringmerket.

Lørdag kjørte vi en rundtur til fuglelokaliteter sørover på Vestvågøy hvor næringsrike vann, brakkevannsområder og fjærområder er de viktigste. Trekket av vadere som vanligvis er på det rikeste på denne tiden, var dårlig. Bare noen få myrsnipper og sandlo ble sett.

Etter årsmøte og middag ble det flere foredrag: James Wilson presenterte et prosjekt som han deltar i, hvor man fanger (kanonnett!) og merker et stort antall polarsnipper under vårtrekket i Finnmark.

John Stenersen viste bilder fra turer i Polen og Marokko.

Johan Sirnes viste bilder som illustrerte Lofotens naturhistorie. Hvorfor har landskapet blitt slik det er?

Harald Våge avsluttet med en konkurranse med nøtter fra både inn og utland.

Søndag formiddag hadde vi en tur nord på øya: Eggum hvor vi bl.a. fikk sett havsule og Sandøya hvor det ikke var mye fugl å se. Men været var bra!



RØSTRAPPORT 2008

av Martin Eggen

Denne rapporten dekker det åttende året på Røst. Rapporten er blitt en fast tradisjon, og har vært med på å bygge opp Røstlandet som en god observasjonlokalitet, med årlige rapporter og oppdatert funnstatistikk.

Våren ble stort sett dekket av Steve Baines, men også Thor Edgar Kristiansen, Håvard Eggen og John Stenersen besøkte øya. Steve vil nok huske sommeren for en usedvanlig fin observasjon av rosenmåke, funn av Norges første svartvingespove samt en voksen (evt. 3K) sabinemåke. Vi andre vil også huske funnene med entusiasme, og kanskje litt godhjertet misunnelse? Gratulerer til Steve!

Rapporter fra Røstlandet naturreservat og den resterende våtmarka (to ulike rapporter) ble utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen for å kartlegge hekkefuglen på Røstlandet, med fokus på våtmarksfugler.

På høsten kom det tilreisende fuglekikkere 12. september, først ute var Kjell R. Mjølssnes og Thor Edgar. På det meste var det 17 observatører samlet på øya. Uke 39 var som vanlig best besøk. Martin Eggen holdt stand helt til 12. oktober, akkapanjert av Thor Edgar og Steve med ferie, og sørget for observasjonsvirksomhet sammenhengende på høsten i en måned.

Som i fjor er malen for hva som er tatt med under skjerpet inn. For total oversikt over observasjoner på Røst i 2008 må man supplere med den lokale sjeldenhetsrapporten for Nordland (LRSK-rapport Nordland).

Nye arter for Røst i 2008 ble: rosenmåke, svartvingespove og rustsnipe. 280 arter er nå sett i Røst kommune.

Et andregangsfunn av dverglerke

(september) nevnes også, sammen med Røsts 2. hekkefunn av sitronerle (hann dannet par sammen med hunn gulerle). Dette var Norges 3. hekkefunn. Svartbrynalbatross, også denne sett av Steve Baines fra sjøfuglbua, ble høstens store bombe! Dette var et andrefunn for Røst, men fuglen fra 80-tallet er ikke forelagt NSKF.

Kontakt: Martin Eggen
mobil: 90565108
calidriissuperstar@yahoo.no

ARTSGJENNOMGANG:

Hvitkinngås *Branta leucopsis*

Massivt trekk på ettermiddagen 29. sept., med 2550 individer som passerte på en time (RF). Kun mindre flokker et par andre dager ultimo sept., men trolig i stor grad oversett.

Polargås *Branta hutchinsii hutchinsii*

Trakk sammen med hvitkinngås 29. sept (SBA). Andre funn for Røst, med forbehold om at fuglen fra 2007 blir godkjent.

Gravand *Tadorna tadorna*

Et par hekket i 2008, og fikk frem 3 unger. Har hekket hvert år siden 2005. En ungfugl holdt seg på Røstlandet til ultimo sept. (RF).

Snadderand *Anas strepera*

Enkelt ind. sett i mai og juni, opptil 7 ind. daglig. Hekket ved vannbassenget, Røstlandet. Her ble 5 pull. sett 25. juni (SBA), dette var første hekkefunn på Røst..

1 hann sett Røstlandet 25. sept og medio okt. (RF).

Stokkand *Anas platyrhynchos* x *stjertand*

Anas acuta - hybrid

1 M-farget fra nyttår til og med juli (SBA, MEG m.fl.).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

2 ind. Nesset, Røstlandet fra nyttåret til medio februar (SBA).

Horndykker *Podiceps auritus*

2 ind. Røstlandet 20.-22. juni (SBA). 7. funn på Røst.

Svartbrynalbatross *Thalassarche melanophrys*

1 ad. passerte Langneset, Røstlandet 29. sept. (SBA). 2. observasjon på Røst.

Grålire *Puffinus griseus*

52 ind. trakk mot vest 26. sept, ny dagsrekord på Røst. Ellers stort sett observert daglig ved sjøfuglkikking i september, men sjeldent tosifret antall (RF). Opptil 20 ind. sett rundt båten medio sept. av lokal fisker.

Sothøne *Fulica astra*

1 ind. Røstlandet 19.-30. mai (TEK og SBA).

Sibirlo *Pluvialis fulva*

1 2k+. Røstlandet 10.-14. juli (SBA). 7. funn av sibirlo på Røst.

Svartvingespove *Limosa haemastica*


1 hann Røstlandet 24. juni (SBA, AAR, TAN) var ny art for Røst og Norge. Årets bombe på Røst!

Svarthalespove *Limosa limosa islandica*

5 ind. med tilhold store deler av mai og juni. Det så ut som om to par skulle gå til hekking, med det ene paret gav opp. (HEG, SBA, TEK). I slutten av juni ble hekking konstantert ved det gamle vannbassenget, dette var første hekkefunn for Røst (TAN, AAR).

Svømmesnipe *Phalaropus lobatus*

1 par hekket trolig i naturreservatet i år. (RF). Sen observasjon: 1 ind. i naturreservatet 20 sept. (KMJ).



Nye arter for Norge er ikke hverdagskost - selv ikke på Røst! Landets første svartvingespove - her sammen med svarthalespove -24/6-08. Foto: Steve Baines

Polarsvømmesnipe *Phalaropus fulicarius*
9 1K+ trakk V. Røstlandet 22. sept. (MEG, SBA, KMJ) og 1 1K+ tr V. Røstlandet 26. sept. (MEG, SBA, TEK, KMJ). Dessuten 2 1K+ 11. okt. (MEG, Oddvar Heggøy) og 2 1K+ 12. okt. (MEG, Oddvar Heggøy). Totalt 14 ind. denne høsten. Tidligere foreligger bare et rent høstfunn (utrolig nok): 1 1K+ 1. okt. 2002 (MEG).

Fjellmyrløper *Limicola falcinellus*
1 2K+ Røstlandet 10. juni (TKV og SBA).

Alaskasnipe *Calidris melanotos*
1 2K+ Røstlandet 10.-12. juni. (TKV og SBA).

1 1K Røstlandet 9. sept- 12. sept. (svenske, TEK, SBA), 1 ny (størrelse m.m.) 1K 19. sept. (KMJ, Andreas Gullberg m.fl.), økende til 2 1K 22. sept., 4 1K 23.-24. sept. For så endelig 5 1K i flokk 25.-26. sept. Siste observasjon var to individer 2. okt. (MEG). Totalt 1 ind. på sommeren og 6 ind. på høsten i 2008.

Rustsnipe *Tryngites subruficollis*
1 1K Røstlandet 25. sept.-16 okt. (Tor A. Olsen, Thomas Bentsen m.fl.). Denne fikk 11. okt. følge av nytt ind. 12. okt. ble disse sett ilag, og de holdt sammen til de forsvant etter 16. okt. (S. Baines, Oddvar Heggøy, MEG). Den siste fuglen kan ha hatt et lengre opphold uten at det ble registrert at det dreide seg om to fugler.

Storjo *Stercorarius skua*
Tre hekkende par også i 2008. (TAN, AAR). Flere streifindivider sett sommer og høst, opptil 5 ind. daglig på høsten (RF).

Rosenmåke *Rhodostethia rosea*
1 2K Kårøya 29.-30. mai (Kari og Roald Olsen, Steve Baines). Ny art for Røst!



2K rosenmåke. Foto: Steve Baines

Sildemåke *Larus fuscus*
Fortsatt har cirka 6-8 par av den britiske underarten *grællsii* tilhold på sommeren, og hekker trolig.

Dvergmåke *Larus minutus*
3K Røstlandet 7. juli- 15. aug. (AAR, MEG, JST, SBA, TEK m.fl.)

Sabinemåke *Larus sabini*
Sommer: 1 ad. Røstlandet (evt. 3K) 9. juni (SBA). Fuglen ble sett ved vannbassenget. Også rapportert med 1K 19. sept. og 2 1K 20. sept., da fra sjøfuglbua på Langneset (Egil Ween).

Turteldue *Streptopelia turtur*
Sett i perioden 22. sept-3. okt. 25 sept. ble 4 ind. sett på Røstlandet. Altså: minst 4 ind. i høst., alle ungfugler.

Flaggspett *Dendrocopus major*
Minst 3 ind. dukket opp på Røstlandet rundt 10. sept, og holdt seg til medio okt. (RF). Det var da cirka 10 år siden forrige observasjon.

Vendehals *Jynx torquilla*
1 ind. Røstlandet 14. sept. (KMJ m.fl.), samt 1 nytt ind. ringmerket 20.-24. sept. (RF). 4.- og 5. funn på Røst.

Dverglerke *Calandrella brachydactyla*
1 ind Røstlandet 23. sept. (KMT og MLP). 2. funn for Røst.

Tartarpiplerke *Anthus richardi*
1 ind. Røstlandet 19.-29. sept. (RF).

Gulerle *Motacilla flava*
Hekket sammen med sitronerle, og produserte unger. Dette skjedde på Ystneset, Røstlandet (MEG m.fl.). Fuglen ble ikke underartsbestemt. Ellers flere observasjoner av gulerle gjennom året, også i sept. og okt.

Sitronerle *M. citreola*
1 ad. M hekkende Ystneset sammen med gulerle, oppdaget 9. juli (MEG). Hybridunger (1-2 ind. funnet i området ulitmo juli (SBA). 1 ad. F Røstlandet 21. august (Håvard Eggen). 1 1K og 1 ad. F Røstlandet 30. august (SBA). 1K (diskutert hybrid) Ystneset 17.-23. sept. (Andreas Gullberg m.fl.), 1 1K ved flyplassen Røstlandet 18. sept. (KMJ). 4- 6 ind. involvert.

Blåstrupe *Luscinia svecica*
1 par hekket ved kirkegården. Ny hekkeart for Røst (S. Baines).

Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*
1 ind. Røstlandet 20. september (RF). Mulig samme fugl på Røstlandet 2. okt. (MEG). 8. funn på Røst.

Busksanger *A. dumetorum*
1 ind. ringmerket Bombehagen, Røstlandet 24. sept. (PSR, TKV m.fl.) 4. funn på Røst og 5. for Nordland. Funnene på Røst samler seg fint mellom 21.-25. sept.

Hauksanger *Sylvia nisoria*
1 1k Røstlandet 16. sept. (KMJ) og 1 1K

25.sept.-05. okt. (JMA, KBE, MEG m.fl.). 2. okt ble 2 1k loggført (TEK, MEG), og høstens total var dermed 3 fugler.

Gulbrynsanger *Phylloscopus inornatus*
Første dukket opp 10 sept. (SBA). Høyeste dagsnotering 12 ind. 25. sept. (RF). Totalt minst 22 ind. i høst, 7 ind. ble ringmerket.(RF).

Bøksanger *Phylloscopus sibilatrix*
Totalt 4 ind. i sept. og okt., 2 ind ringmerket. (RF).

Rosenstær *Sturnus roseus*
1 ad. Røstlandet 26. juli. (SBA). 10. NSKF-godkjente funnet på Røst.

Tornskate *Lanius collurio*
1 1K Røstlandet 12.-13. sept. (TEK, SBA, KMJ)

Båndkorsnebb *Loxia leucoptera*
1 2k+ M Røstlandet 20. juli (SBA)

Bergirisk *Carduelis flavirostris*
1 ind. Røstlandet 26. januar (SBA).

Polarsisik *Carduelis h. hormemanni*
En sikkert observasjon av den grønlandske underarten i år: 1 1K rm Røstlandet 2.-3. okt. (MEG, TEK). Også flere vanlige polarsisik, samt noen mulige grønlandske.

Rosenfink *Carpodacus erythrinus*
Kun en observasjon i 2008: 1 ind. Røstlandet 26. sept. (JMA). Muligens var det samme individ som ble sett 3. okt. av Martin Eggen.

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*
1 ind. Røstlandet 26. april (SBA).

Dvergspurv *Emberiza pusilla*

1 ind. Røstlandet 16. sept. (KMJ), samt
1 ind. Røstlandet 25. sept. (TEK, MEG).
Dessuten 1 ind. Røstlandet 29. sept. (KJO,
CLI). 2- 3 ind. i høst.

Lappspurv *Calcarius lapponicus*

1 hann sang ved fotballbanen i år (Håvard
Eggen m.fl.).

OBSERVATØRLISTE

SBA Steve Baines
MHE Morten Helberg
CLI Christian Lie
KMJ Kjell R. Mjølunes
MEG Martin Eggen
PSR Peter S. Ranke
KJO Kjetil Johanessen
JMA Jarl Marius Abrahamsen

JST John Stenersen
TEK Thor Edgar Kristiansen
KMT Klaus Maløya Torland
TAN Tycho Anker-Nilssen
AAR Tomas Aarvak
MLP Martin Lie Pedersen
TKV Thomas Kvalnes
KBE Kjetil Bekkeli
RF "Røstfolket"



En av tre nye arter for Røst i 2008 – rustsnipe. Foto: Martin Eggen

RAPPORTSYSTEMET FOR FUGLER

av John Stenersen

Rapportsystemet for fugler er den nye nasjonale databasen for fugleobservasjoner. Den vil omfatte alle typer ornitologiske registreringer, og bli det viktigste verktøyet for lokale og nasjonale rapport- og sjeldenhetsutvalg for fugler. Alle kan legge inn observasjoner via nettet ved å registrer seg på www.artsobservasjoner.no/fugler.

Her følger en enkel brukermanual for å komme i gang med å bruke databasen:

- Gå inn på www.artsobservasjoner.no/fugler
- Du må registrere deg: klikk på **Logg inn** til høyre i øverste rekke
- Registrer deg med eget brukernavn og passord

Nå har du opprettet din egen konto. For å kunne rapportere, må du legge inn lokalitet først. Ta gjerne for deg de lokalitetene du besøker regelmessig og legg dem inn. Kun et utvalg lokaliteter i de forskjellige fylkene er registrert som såkalte superlokaliteter. Disse er tilgjengelige for alle brukere. Øvrige lokaliteter registrer du selv og de er da tilgjengelige for deg som rapportør.

Slik går du fram for å registrere lokaliteter:

- Klikk på **Rapportere** i øverste linje
- Klikk på **Nytt funnsted** i andre linje

Her kan du opprette en ny lokalitet. Forstør først kartet ved å velge fra skalaen til høyre (normalt er ruten i midten passe). Når du klikker i ruten blir den rød, og du klikker så på den delen av kartet som du vil zoomme inn.

For å kunne opprette en lokalitet må du zoomme deg inn til den største eller nest største forstørrelsen. Når du har gjort det blir det lille ikonet klikkbart. Klikk først på ikonet, så på kartet der lokaliteten ligger.

Kartserveren regner automatisk ut koordinatene til det punktet du la inn på kartet. Det gjelder også kommune og fylke. Når du klikker på den nye lokaliteten får du to valg. Du kan enten velge å opprette en ny lokalitet, eller bruke en allerede eksisterende lokalitet i nærheten av punktet du har registrert.

Kartet foreslår de ti nærmeste allmenne⁽¹⁾ lokalitetene som du kan velge i nærheten av din plass. Om du velger å skape en ny lokalitet så blir den personlig⁽²⁾.

⁽¹⁾ En Allmenn lokalitet kan brukes av alle rapportører i systemet. LRSK administrerer disse lokalitetene for sine respektive fylker. Under fliken "Kontakt" finner du kontaktopplysninger til LRSKene.

⁽²⁾ En Personlig lokalitet kan bare benyttes av den som har opprettet den. Flere personer kan riktignok ha samme lokalitet som personlig, men LRSK kan gjøre lokaliteter tilgjengelig for alle.

- I dette vinduet finner du kart og en størrelsesskala med fem trinn. Klikk først på skalaens midterste trinn, dernest på kartet der lokaliteten ligger
- Du får nå opp et kart omtrent på kommunenivå. Gjenta prosedyren ved å klikke på øverste nivå av forstørrelse og deretter på lokalitetens plassering
- Klikk på uglesymbolet og deretter nøyaktig på lokalitetens plassering
- Du får nå opp et rundt symbol på kartet som viser lokaliteten, og nedenfor står ”Resultatet av dit valg”. I rubrikken ”Vil du benytte lokaliteter i nærheten” kan du sjekke om lokaliteten allerede er registrert eller er superlokalitet. Da finner du lokaliteten i trekkned-menyen
- Hvis lokaliteten ikke finnes fra før, markere du ”Opprett ny lokalitet” og skriver navnet på lokaliteten

Nå er du klar for å legge inn observasjonene:

- Klikk på **Rapportere** i øverste linje
- Velg fylke og lokalitet fra trekkned-menyen, klikk deretter på **Rapportér** i andre linje
- Du får nå opp et skjema. Fyll i artsnavn (eller hent det fra trekkned-menyen), antall individer, alder og kjønn (hvis det lar seg bestemme). I feltet Aktivitet finner du den mest dekkende betegnelsen for fuglenes aktivitet. Dato ligger automatisk inne for den dagen observasjonen registreres, men hvis detter er en observasjon fra tidligere, må dato endres. Eventuelle kommentarer legges til i kommentarfeltet.

- Fyll inn for neste art på neste linje. Når du har rapportert de artene du vil legge inn, klikker du på **Lagre**

Det finnes en rekke andre funksjoner i rapportsystemet, og du finner en god og systematisk brukerveiledning under **Manual** i øverste linje.

En funksjon som nok har interesse for mange, er muligheten til å laste inn bilde til observasjonen:

- Klikk på **Vis funn** i øvre linje. Fyll ut den arten det gjelder (her kommer det gjerne opp flere alternativer, underarter etc, der du må markere ett valg), og klikk **Administrer funn**
- Her vil du se at din observasjon er uthevet, og at det finnes et biledsymbol til høyre.
- Ved å klikke på biledsymbolet får du opp et vindu der du kan bla igjennom og finne bildefilen. Etter å ha skrevet eventuell kommentar til bildet klikker du **Last opp bilde**
- På samme måte kan du eventuelt korrigere innlagte observasjoner ved å krysse av i boksen til venstre for observasjonen og klikke **Rediger**

For å lese daglig innrapporterte observasjoner, trenger du ikke være innlogget. Du går ganske enkelt inn på **Dagens observasjoner**. Her kommer de mest interessante observasjonene for dagen opp, sortert etter det som kalles ”Filtrert etter rapporteringsmal”. Du kan her velge en tidligere dato, velge observasjoner fra ett fylke, velge filtrering (f.eks. bare sjeldenheter som skal rapporteres til NSKF, eller alle observasjoner) og sortering i fire forskjellige trekkned-menyer.

Du kan også gå direkte til det fylket du er interessert i ved å klikke i dette på kartet på startsidene. Tallet i fylket angir hvor mange observasjoner som er lagt inn for dagen.

Fra startsidene kan du også gå inn og se på **Siste bilder**, eller gå inn på fotografers egne gallerier under **Bildegallerier**.

Dette er en enkel innføring for hvordan du kan komme i gang og bruke rapportsystemet for fugler. Etter hvert vil du se at det inneholder mange flere muligheter, og de er beskrevet i manualen.

Mange bruker i dag lokale nettsteder som legger ut observasjoner fra region eller fylke, eller de legger inn observasjoner på fugler.net. Dette er helt utmerket, men vi vil oppfordre alle til å bruke rapportsystemet i tillegg.

Det viktigste er at du kommer i gang med å bruke systemet. Gjennom å registrere observasjonene dine her, kommer de forskning og forvaltning til gode. Og ikke minst bidrar du til arbeidet som gjøres i de lokale og nasjonale rapport og sjeldenhetskomiteene for fugler.

Ha et riktig godt fugleår i 2009 – og la oss se det på www.artsobservasjoner.no/fugler!

Stoff til Havørna neste år må være redaktørene i hende senest 15. november 2009.

Forside: Hubro

Foto: Atle Ivar Olsen

INNHold:

Adresser	2
Leder	3
Litt om Saltstraumen	4
Fugler i Nordland 2007 – LRSK-rapport	7
Utflukt til Tomma på Villblomstens dag	34
Møtet med spurveugla	37
Første søndag i advent	39
Kjernebiter i Nordland	40
NOF-treff og årsmøte på Eggum i Lofoten	47
Røstrapport 2008	48
Rapportsystemet for fugler	53



Alaskasnippe, Tennvalen, Herøy 16/7. Foto Atle Ivar Olsen