

Fugl på Værøy

Tore Berg

januar 2022



Innledning

Dette er tredje utgave av rapporten 'Fugl på Værøy' og bygger på de foregående utgavene som ble ferdigstilt i februar 2020 og mars 2021. Nytt i denne versjonen er enkelte språklige rettelser, noen uteglemte tidligere observasjoner, fotos samt en rekke nye observasjoner fra 2021.

I fuglesammenheng forbindes nok Værøy helst med fuglefjell og havørn. Spesielt lunden som hekker i Måstadjellet Naturvernområde har fått mye fokus og er blant annet sentral i kommunevåpenet til Værøy kommune. Havørna forbindes nok helst med den spesielle håndfangsten som ble utført på Værøy i årtider. Historisk sett har nok den ornitologiske aktiviteten på Værøy vært konsentrert rundt taksering av fugl i fuglefjellene. Kunnskap om resten av fuglefaunaen har tilsynelatende vært relativt begrenset og svært lite informasjon er publisert selv om Værøy figurerer i både Norsk Fugleatlas (1994) og Norsk VinterfuglAtlas (2006). Blar en gjennom Havørna (det ornitologiske lokaltidsskriftet for Nordland) finner en at ornitologiske registreringer fra Værøy er bortimot fraværende. På www.fugler-i-lofoten.no er der imidlertid publisert en artsoversikt over fugler på Værøy. Utover å være en oppstilling av fugler registrert på Værøy (per juni 2016) har denne oversikten ingen detaljer rundt forekomsten, og bygger i stor grad på en upublisert rapport satt sammen av Jon Olav Larsen. I tillegg finnes et par rapporter fra NINA som gir litt mer informasjon om noen flere arter enn de rene fuglefjellsartene. Noen helhetlig rapport eller oversikt over fugle-forekomsten på Værøy har ikke vært tilgjengelig.

Denne rapporten er et forsøk på å samle alle tilgjengelige fugleregistreringer fra Værøy, og presentere dem i en så fullstendig som mulig oversikt over forekomsten av fugl på Værøy fram til og med utgangen av 2021. Selvsagt er denne oversikten ufullstendig. Når det gjelder høsttrekket (spesielt september måned) gir den nok et representativt bilde av forekomstene. Men tilgang på data utenom høsttrekket er svært mangelfull (se under) og rapporten gir nok et svært unyansert bilde av den reelle forekomsten av fugl i vinter-, vår- og forsommer sesongen.

Håpet er at denne rapporten vil være med å sette Værøy på det ornitologiske kartet og være en inspirasjonskilde til ytterligere feltsatsing både fra lokale og tilreisende slik at kunnskapen om fuglelivet på Værøy vil øke i årene som kommer.

Historikk

Værøys fuglefjell ha vært viden kjent over lang tid. Historisk sett har fuglefjellet vært viktig for lokalbefolkningen på Værøy, ikke minst i den lille grenda Måstad. I tidligere tider ble spesielt lundeforekomsten benyttet i husholdet og store mengder lunde ble sanket i Måstadjellet. Opptil 8 tonn lunde kunne bli saltet ned på tønner per sesong noe som utgjør i størrelsesorden 20000 fugler. Både kjøtt og fjær ble benyttet. Denne fangsten er for lengst historie, men lunde finnes fremdeles i Måstadjellet, om enn i betydelig mindre antall. I dag organiseres turer for turister som får en mulighet til å studere denne fantastiske fuglen.

Ellers er det vel den berømte eller berykta havørnfangsten som har satt Værøy på kartet. Denne spesielle fangsten, som ved hjelp av skjul (ørnehus) og åte, ble gjort med hendene. Fangsten ble beskrevet allerede på 16 hundretallet av den italienske presten Francesco Negri. Målet for fangsten var både å redusere bestanden av ørn som man mente var ødeleggende for saueholdet på øya, samt på 1800 og 1900 tallet å tjene noen kroner i skuddpremie. I tillegg ble nok fangsten ansett som en sport eller til og med en manndomsprøve her på Værøy. Vingene skal visstnok ha blitt brukt som sopelimer. Fangsten var svært utbredt og store antall ørn ble fanget, hovedsakelig havørn, men også kongeørn skal ha gått med. På det meste ble det på et år utbetalt skuddpremie for hele 252 ørn på

Værøy. Fangsten avtok nok litt gjennom 19 hundretallet, men varte helt fram til 1974. De siste 6 årene (etter at havørn og kongeørn ble fredet i 1968) ble et fåtall fugl innfanget for ringmerking.

Fuglefjellet var målet for den tidlige ornitologiske aktiviteten på Værøy. Einar Brun takserte lunde og lomviforekomsten på 1960 tallet (Brun, 1966 og 1969). Ellers ble øya kun sporadisk besøkt av fuglefolk på 1970, 1980 og 1990 tallet. Lite data er publisert og hvis informasjonen på Artsobservasjoner.no (AO) er representativ dreier dette seg stort sett om tilfeldige observasjoner eller en-dagsbesøk. Et hederlig unntak er Roar Olsen som besøkte øya i lengre perioder fra mai til august 1982, og står for ca. 75 % av de registrerte observasjonene (totalt 418) på AO i årene før år 2000. En begrenset feltaktivitet må der allikevel ha vært, for i Norsk Fugleatlas (1994) figurerer Værøy med 34 arter som er konstatert hekkende eller har hekket i kommunen, samt 18 sannsynlige eller mulige hekkearter. Men en forholdsvis lav dekningsgrad kan ytterligere illustreres med at kun 25 arter er registrert på Værøy i forbindelse med Norsk Vinterfugl Atlas prosjektet fra 1994 til 2003. Tilsvarende for Røst som burde være sammenlignbar er nesten det dobbelte. Stort bedre ornitologisk aktivitet var det heller ikke på starten av 2000 tallet. I perioden 2000 til 2010 har det vært mulig å spore opp kun 260 observasjoner som stort sett er basert på korte en-dagsbesøk, hovedsakelig i sommermånedene. Nytt nå er imidlertid noen få men interessante bidrag fra et fåtall lokale Værøy boere (innsamlet av Jon Olav Larsen).



Figur 1 Ørnehus i Rømdalen

Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretok også noe ornitologisk feltarbeid og gav ut to publikasjoner med data fra Værøy i denne perioden, blant annet Viltkartlegging på Værøy (2006) initiert av Værøy kommune. Begge har i stor grad fokusert på sjøfugl og våtmarksfugl. Det første tegn til endring i feltsatsingen kom i 2010 da øya ble besøkt av flere fuglefolk blant annet Jon Olav Larsen (juli) og Bjørn Olav Tveit (september), som publiserte utfyllende lister med fugleobservasjoner på AO. Disse registreringene viste at Værøy hadde et betydelig ornitologisk potensial, spesielt i trekktiden. Den store endringen i feltaktivitet kom imidlertid i 2011 da rogalendingen Kjell Mjøltnes lanserte idéen om ornitologiske undersøkelser på Værøy for et lite knippe rogalendinger. Tanken bak dette var selvsagt at også Værøy måtte få sin del av alle de vanlige og uvanlige artene som hadde blitt

registrert på Røst de siste 10-20 årene. Dette resulterte i et 9 dagers besøk på øya i september 2011 (Kjell Mjøltnes, John Alsvik, Even Mjåland, Geir Kristensen og Tore Berg). Resultatene fra dette første besøket motiverte til videre satsing, og rogalandsgjengen (i varierende antall) med tilskudd av Egil Ween (Rogaland) og Simon Rix (Oslo) har besøkt Værøy hver høst fram til og med 2021. Resultatene fra denne satsingen har videre ført til at en rekke andre fuglekikkere har besøkt øya for kortere perioder (spesielt i september/oktober) de siste årene. I forhold til tidligere år har observasjonsmengden (på AO) nærmest eksplodert, og i perioden 2011 til 2021 har det blitt lagt til ca. 11000 nye fugleobservasjoner fra Værøy.




Figur 2 Voksen havørn Skiphalsen september 2019



Figur 3 Ung Havørn Nordland september 2017

Lokaliteter

Værøy kommunes landareal utgjør 18,6 km² (Fig.4), hvorav selve Værøy utgjør den desidert største delen. Observasjoner fra kommunen er i all hovedsak gjort på selve Værøy, selv om noen få stammer fra øyene og havområdene rundt.



Figur 4 Værøy kommune



Figur 5 Bebyggelsen på Nordland


De mest egnede fuglelokalitetene ligger på Nordland, fra Teisthammaren i øst til Skiphalsen i vest (Fig.8) og i sentrale deler av øya fra Kvalneset og Røssnesvågen i sør til Marka i nord (Fig.8). Sistnevnte område inkluderer Sørland med hoveddelen av bebyggelsen. Disse områdene har den klart beste dekningsgraden og kun et fåtall observasjoner er gjort i områdene vest for Marka som inkluderer Sørlandshagen, Håheia og Måstadhalvøya. Områdene på Nordland er de mest oversiktlige områdene på Værøy når det gjelder fuglekikking og er nok det området på Værøy som har blitt best dekket. Her er en relativt begrenset bebyggelse med stort sett oversiktlige hager (Fig.5). I tillegg er utmarka i Nordlandshagen med sine myrområder samt strandlinjen fra Skiphalsen til Teisthammaren (Fig.6) rimelig oversiktlige områder selv om det dekker et stort areal. Her har en og utsikt ut mot Nordlandsflaget. Dette området, og spesielt Skiphalsen (Fig.7) er mest benyttet for registrering av trekkende sjøfugl.



Figur 6 Strandlinjen på Nordland



Figur 7 Skiphalsen og Nordlandsflaget



Figur 8 Kart over Værøy



Figur 9 Sørland

Sørland (Fig.9) har den klart største bebyggelsen på Værøy. Området har mange frodige hager med stort potensiale for fugl. Men arealet er stort, og antallet hager er mange og det har vist seg å være vanskelig å få en god oversikt over hva som skjuler seg i disse. De best dekkete områdene her er de sentrale deler og strekker seg fra Sørlandsvågen og nordover til Marka. De store myrområdene i

Marka er mer oversiktlige, men har mindre fugl. Unntaket her er bebyggelsen og hagene langs veien som har vist seg å kunne holde en del fugl. Lengst nord i Marka ligger Plantefeltet og 'Gamleskogen' (Fig.11). Plantefeltet (foreløpig småvokst furu og gran) har blitt benyttet til nettfangst og ringmerking. 'Gamleskogen' er en blanding av relativt storvokst gran, furu og løvtrær og er nok den lokaliteten på Værøy hvor en er sikrest å finne fugl, selv på dårlige dager. Strandområdene rundt Sørland (Sørlandsvågen og Sprengern (Fig.10) har fått relativt mye oppmerksomhet, men har overrasket med relativt små mengder våtmarksfugl.



Figur 10 Utsikt fra Sprengern mot Marka og Håheia




Figur 11 Marka og Gamleskogen

Dekning


Ut fra tilgjengelige data var Værøy lite besøkt av fuglekikkere fram til år 2000. Med unntak av Einar Bruns arbeid med alkefugl på 1960 tallet er første tilgjengelige fugleregistrering fra 22 mai 1976. Fram til år 2000 foreligger kun 418 registreringer fordelt på 57 dager. De fleste av disse registreringene er fra 1982 med observasjoner fra 38 dager, brorparten gjort av Roar Olsen. De fleste observasjonsdager er i perioden april til slutten av august. Hovedsakelig juni, juli og august og kun en observasjonsdag er fra september. Den lave besøksfrekvensen fortsatte fram til ca. 2009 (Fig. 12) da det ble en viss økning av besøkende fuglekikkere. Gjennom 2010-tallet har en hatt økning i antallet observasjonsdager og de siste årene har det ligget på over 50 per år (Fig. 12). Toppåret så langt er 2021 med registreringer fra 54 dager. Den positive utviklingen skyldes i hovedsak innsatsen fra en liten gjeng rogalendinger. En del av de registrerte dagene har en bare enkeltobservasjoner. For å gi et noe bedre bilde av den generelle dekningsgraden, dvs. dager med antatt mer feltinnsats viser Figur 12 også fordeling av dager med mer enn to registreringer (røde kolonner). Figur 12 viser at fuglekikkingsaktiviteten på Værøy fram til ca. år 2010 i beste fall kan defineres som marginal, eller nærmest som en kuriositet.

Den sesongmessige fordelingen av observasjonsdager gjennom 2000-tallet (Fig. 13a) viser en liten topp i juli, men er i det store og hele dominert av aktiviteten i september. September, med 193 observasjonsdager, står for nær halvparten av observasjonsdagene gjennom 2000-tallet. Denne dominansen er ytterligere forsterket om man ser på dager med mer enn to registreringer (dager med antatt mer satsing på fuglekikking, røde kolonner). Men bildet er mer nyansert enn som så. Zoomer en inn på september og oktober (Fig. 13b) ser man en sterk konsentrasjon av observasjonsdager i siste halvdel av september. Denne fordelingen er nok styrt av erfaringer fra Røst hvor en gjennom årene har hatt en topp i antall sjeldenheter i denne perioden.

Fordelingen av observasjonsdager gjennom sesongen viser en klar underrepresentering gjennom det meste av året, spesielt i perioden fra november til mai (Fig. 13a).



Figur 12 Årlig fordeling av observasjonsdager på Værøy gjennom 2000-tallet



Figur 13 Sesongmessig fordeling av observasjonsdager på Værøy




Figur 14 Mosken sett fra Nordland

Systematisk gjennomgang av fugl observert på Værøy

Nedenfor presenteres en oversikt over fugler observert på Værøy innen 31.12.2021. Oversikten er stort sett basert på publiserte data (se over) og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av den reelle forekomsten. Data kan være publisert i artikler og/eller databaser som har vært utilgjengelige eller som jeg ikke kjenner til. På bakgrunn av svært mangelfull dekning gjennom store deler av året vil denne oversikten heller ikke gi noe korrekt bilde av den reelle forekomsten av fugl i vinter og vårsesongen. For en rekke arter er diskusjonen og presentasjon konsentrert rundt forekomsten under høsten i årene fra 2011 til 2021. Dette er helt naturlig siden en har den klart beste dekningen i dette tidsrommet. Den sesongmessige fordeling av forekomsten (i løpet av høsten) er presentert grafisk for et utvalg arter. Fordelingen er selvsagt sterkt preget av observasjonsintensiteten. For å få et mer nyansert bilde av trekkutviklingen om høsten blir noen arter også presentert med en normalisert forekomst. Det vil si antall fugl observert delt på antall observasjonsdager. Datagrunnlaget er imidlertid lite (spesielt utenom september og begynnelsen av oktober) og tilfeldigheter kan naturligvis påvirke distribusjonen.

Det må påpekes at ikke alle observasjonene presentert i denne rapporten har gått gjennom de rette kanalene når det gjelder validering av funnene (LRSK/NSKF). Godkjente observasjoner er merket med *. For å gjøre rapporten mest mulig oversiktlig har jeg valgt å utelate observatørens navn etter observasjonen. Ønsker en å finne dette kan en gå tilbake til Artsobservasjoner.no (AO). Unntaket her er et fåtall observasjoner som ikke er registrert i AO.

Ved utgangen av 2021 teller artslisten for Værøy 228 arter (Fig. 15). Dette står selvsagt i sterk kontrast til de 149 artene som var registrert ved utgangen av 2010. Med tanke på den økte feltinnsatsen i hovedtrekkperioden om høsten fra 2011 er økningen i antall arter på ingen måte uventet og selvsagt var økningen størst de første par årene. Men både 2016 og 2017 produserte henholdsvis 11 og 9 nye arter for Værøy. Den relativt svake økningen i 2018 og 2019 (2 arter) kan delvis skyldes ugunstige værforhold i den beste trekkperioden både lokalt og regionalt. I 2020 og 2021 ble det registrert henholdsvis 7 og 5 nye arter. Noe overraskende var det at fem av de syv nye funnene i 2020 kom i sommermånedene, en periode hvor dekningen var sporadisk. De fleste av de 'nye' artene var forventet, men selvsagt har det blitt overraskelser også, som for eksempel Norges første funn (og kun tredje funn i Vest-Palearktis) av mugimakifluesnapper (som kommer fra sørøst Sibir), Norges (og Skandinavias) andre lundtrupial (som kommer fra Nord Amerika) Norges tredje funn av blåkinnbieter (7 ind.) (som kommer fra Nord Afrika og Midtøsten) og Norges andre funn av einersanger (som kommer fra Kaukasus).



Figur 15 Utvikling av antall arter observert på Værøy siden 2010

Ringgås (*Branta bernicla*): Kun 10 observasjoner; 1 ind. (1K) Langholmen 30-31.10.2010* (AES), 7 ind. rastende Nordland 20.9.2016, 55 ind. trekkende mot sørvest forbi Nordland 25.9. 2015, 45 ind. trekkende mot sør forbi Nordland 17.9.2018* og 88 ind. trekkende mot sør forbi Nordland 17.9.2019*. Arten var spesielt tallrik i 2020 med 209 loggførte individer på 5 dager i perioden 7 – 23.9*. Med unntak av 4 rastende ungfugler (Nordland) under sterk storm 23.9 var de resterende

fuglene direkte trekkere (7, 8, 9 og 14.9). Alle underartsbestemte fugler har vært lysbukete ringggjess (*B. b. hrota*).

Hvitkinngås (*Branta leucopsis*): Tre ind. sammen med grågås Nordland 13-14.6-2008 (FCH). Om høsten observert 22 dager fra 2011 til 2020 i perioden 9.9 (2020) - 16.10 (2018). Kun registrert 2013, 2014, 2015, 2018, 2019 og 2020. Stort sett direkte trekkende fugler (mot S), men et rastende ind. Langholmen 16.10.2018. Enkelte år passerer arten Værøy i stort antall. Den 21 og 22.9-2014 gikk et betydelig trekk forbi Værøy med henholdsvis 1850 og 1500 ind. de to dagene. I september 2020 var arten enda mer tallrik og 3444 trekkende individer ble loggført i perioden 9.9 – 2.10. Blant annet passerte 3050 ind. øya 24.9-2020 som også er største dagsantall.

Grågås (*Anser anser*): Hekkefugl. Arten har hatt en eksplosiv utvikling på Værøy. Shimmings (2017) estimerte kommunens hekkebestand til 5-10 par. I 2019 blir arten omtalt nesten som en pest av lokalbefolkningen uten noen bestandsreferanse, men 250 ind. observert Skiphalsen og 'mange' på Sørland 25.5-2019. Minst 100 ind. talt opp på Sørland 25.5-2021. Tidligste funn er 2 ind. Kvalneset 9.3-2020 og 2 ind. 31.3-2004. Fuglene forlater/eventuelt trekker forbi øya i august og registreres kun sporadisk i september. Seneste funn er 1 ind. 25.9.2013 og 4 ind. 25.11-1.12-2005 (FCH). Største dagsantall ca. 500 ind. 20.8.2017.

Taigasædgås (*Anser fabalis*): Første sikre funn av arten var et ind. på Sørland 7.10-2021. I tillegg tre til fire funn av ubestemte sædgjess (før arten ble splittet). 6-8 ind. i oktober/november 2005 (FCH), 3 ind. 27-28.1-2006*, 2 ind. 18.2 -ultimo mars 2006* (FCH), 1 ind. rastet Austervågen men trakk etter kort tid over Sørland 23.9.2013*.



Figur 16 Kortnebbgås Sørland september 2012

Kortnebbgås (*Anser brachyrhynchus*): Observert 30 dager i fra 2010 - 2021 i perioden 19.9 (2014 og 2018) - 16.10 (2018). Svært varierende forekomst og kun registrert 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 og 2021. Stort sett direkte trekkende fugler, men 1 ind. rastet Sørland 20.9-2012, 35 ind. rastet

på Sørland 24-27.9.2018 og 2 ind. rastet Sprengern 30.9-17.10-2021. Enkelte år passerer arten Værøy i stort antall. Den 25 og 26.9-2013 gikk et betydelig trekk forbi Værøy med henholdsvis 2700 og 800 ind. de to dagene som også er største dagsantall for Værøy. I tillegg et vårfunn med 1 ind. Sørland 2.6-2021.



Figur 17 Tundragås Sprengern september 2021

Tundragås (*Anser albifrons*): En adult fugl av den grønlandske underarten *A. a. flavistrostris* hadde tilhold i Sprengern 13.9-7.10-2021* og var første funn på Værøy.

Knoppsvane (*Cygnus olor*): To individer observert i oktober 1983* (Nordlandposten). Et ind. holdt til i Sprengern i perioden 4.9-7.10-2021.



Figur 18 Knoppsvane Sprengern september 2021

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): Kun registrert fire ganger, 1 ind. (2k) Lamholmen 26.6-5.7-2013, ind. lå opp i myra i Nordlandshagen 25-26.9-2013, 1 ind. Sørlandsvågen 28.1 2014 og 1 ind. Sørlandsvågen 14.12.2016.



Figur 19 Sangsvane Nordlandshagen september 2013

Gravand (*Tardona tardona*): Kun seks observasjoner. 1 ind. Nordland 23.9.2014, 1 ind. Nordland 28.5.2019 og 1 ind. Nordland 11.7-2020. To individer i par 4.6-2020 kan ha vært hekkefugler. Et ind. Langholmen, Sørland 25.5 og 11.6-2021 kan ha vært samme individ.

Mandarinand (*Aix galericulata*): En hann i begynnelsen av mai 2007 (FCH). Trolig samme som dukket opp på Røst 4 mai samme år.

Knekkand (*Spatula querquedula*): Ifølge Norsk Fugleatlas (1994) funnet hekkende. Kan være samme registrering (15.6-1980) som finnes i artsdatabasen (NOF-NINA-DN). Ikke registrert etter dette.

Snadderand (*Mareca strepera*): En hunn med 5 pull registrert Sandtjønna, Nordland 10 og 22-23.7-1989* (H. Misund). Også registrert i Nordlandshagen 1.8-1995 (K.B. Strann) samt Værøy 15.6-1980 (NINA).

Brunnakke (*Mareca penelope*): Er nevnt som hekkefugl i Nordlandshagen (Strann et. al, 2006) uten mer detaljer samt i Norsk Fugleatlas (1994). Tre pulli i Sandtjønna, Nordlandshagen 10.7-1989 er eneneste sikre hekkefunn. Usikkert om arten hekker i dag. To vårfunn, 3 ind. Sørland 25.5-2019 og 1-2 ind. Sørland i passende habitat 25.5-6.6-2021 kan være hekkefugler. Registrert hver høst siden 2010 med unntak av 2012 og 2019. Forekomsten er fåtallig og utgjør sannsynligvis ikke flere enn 1 - 10 individer per høst. Største dagsantall 8 ind. 29.9-2020. Tidligste og seneste høstfunn er henholdsvis 5.9-2021 og 29.10-2015.

Stokkand (*Anas platyrhynchos*): Hekkefugl. Blant annet pull observert juli 2010, men hekker nok årvisst. Regelmessig og moderat forekomst gjennom høsten. Antatt liten utskiftning av fugl og høstforekomsten dreier seg sannsynligvis om lokale fugler og færre enn 100 individer per sesong. Største dagsantall 55 ind. Nordland 15.10-2018. Tidligste og seneste høstfunn: 5.9-2020 og 29.10-2015.

Stjertand (*Anas acuta*): Hekkefugl. Pull observert juli 1989, juni 2000 og juli 2010 og 5 1K i juli 2012. 1 par 24.4.2017 og 2 hanner 26.5.2019 og hann 3.6-2020. 11.7.2020 ble et ind. registrert i Røssnesvågen og 6 ind. i Sørlandsvågen. Opptil 4 ind. registrert Sørland i slutten av mai og i juni 2021. Med unntak av 2016, 2019, 2020 og 2021, registrert hver høst fra 2011 til 2021 i perioden 18.8 (2013) - 3.10.(2018) med 1 til 2 ind. (juv). Disse fuglene har stort sett vært stasjonære over flere dager og hovedsakelig observert i Sprengern.

Krikkand (*Anas crecca*): Er nevnt som hekkefugl i Nordlandshagen (Strann et. al, 2006). Par i passende hekkebiotop på Nordland 10.5-1984. Sommerfunn, hann Holmen 21.6 2010, 2 ind. 3.6-2020, 2 ind. Austervågen 10.7-2020 og 2 ind. Sørland 25.5 og 2.6-2021 kan være hekkefugler, men ingen pull registrert. Registrert fåtallig hver høst (2011-2021) i perioden 3.9 (2012) - 16.10 (2018). Fugler raster gjerne over flere dager og forekomsten utgjør sannsynligvis ikke flere enn 20 ind. per høst. Største dagsantall 12 ind. Sørlandsvågen 26.9.2018.



Figur 20 Stjertand i Sprengern september 2011

Toppand (*Aythya fuligula*): Eneste observasjon er 3 ind. trekkende mot sør forbi Røssnesvågen 11.7-2020.

Bergand (*Aythya marila*): Kun to observasjoner. Trekkende fugler ble observert ved Buholmflaget 3.5-2005 (Strann et.al, 2006) og 3 hanner mot sør forbi Skiphalsen 12.7-2020.

Ringand (*Aythya collaris*): Eneste registrering er en ungfugl som rastet kort tid i en liten dam ved Sprengern 29.9-2021.



Figur 21 Ringand (1K) Sprengern september 2021

Ærfugl (*Somateria mollissima*): Hekkefugl. Høstforekomst i moderate antall. Største dagsantall 150 ind. 20.9-2016. Strann et. al (2006) rapporterer at arten overvintrer i stort antall på Nordlandsflaget (mer enn 3000 ind.) og Buholmflaget (rundt 2000 ind.).

Praktærfugl (*Somateria spectabilis*): Tre ind. 11.2-2001. Hunn med hekkeadferd (engstelig) Holmen 21.6-2010*. Sannsynligvis samme individ i havna på Sørland med fiskesnøre rundt seg 20.7-2010* og 23.7-2010. Også et eldre funn av 8 ind. 9.4-1982. Også registrert en rekke ganger i sjøområdene rundt Værøy på 1980 tallet ((NINA). Strann et. al (2006) reporterer at arten overvintrer i stort antall på Nordlandsflaget (rundt 500 ind.) og Buholmflaget (rundt 800 ind.). Anker-Nilssen (2006) rapporterte om 3386 overvintrende individer innenfor Værøys grenser.

Sjøorre (*Melanitta fusca*): Et sommerfunn; 16 ind. mot sør forbi Skiphalsen 11.7-2020. Veldig sparsom forekomst hver høst 2011-2021 med unntak av 2016 og 2017 (ingen registreringer). Totalt 19 funn i perioden 14.9 (2020) til 16.10 (2018). Antall individer per høst varierer fra 1 (2021) til 19 ind. (2018), med maks dagsantall 11 ind. 30.9-2018. Strann et. al (2006) registrerte trekkende flokker ved Buholmflaget primo mai 2005.

Svartand (*Melanitta nigra*): Totalt 32 funn etter 2010. Et sommerfunn; 4 ind. Skiphalsen 11.7-2020. Resterende 31 funn er alle høstfunn i perioden 8.9 (2021) til 14.10 (2017). Med unntak av 2012 og 2020, registrert hver høst fra 2011 til 2021 i lite antall (1 - 5 observasjoner). Funnene dreier seg om enkeltindivider eller få ind. (opptil 14) sammen. Anomalien i funnmassen er 150 ind. næringssøkende på Nordlandsflaget 10.10-2015. Det er mulig at større antall samles her sent på høsten, men manglende observasjonsaktivitet på senhøsten kan ikke verifisere dette. Strann et. al (2006) registrerte trekkende flokker ved Buholmflaget primo mai 2005.




Figur 22 Havelle ved Tjuvneset september 2011

Havelle (*Clangula hyemalis*): Totalt 39 funn hvorav 35 fra 2011 til 2021 og loggført alle år i denne perioden. Med unntak av 2 eldre funn (3 ind. 31.3-1982 og 20 ind. 10.5-1982) og 2 ind. 29.5-2017 er alle funn fra høsten i perioden 17.9 (2017) til 16.10 (2018). Funn varierer fra 1 til 7 per år. De fleste registreringer dreier seg om få individer (2-15), men observasjoner av 110 ind. 12.10-2017, 150 ind. 14.10-2017, 200 ind. 15.10-2017, 320 ind. 16.10-2018 og 60 ind. 7.10-2021 kan indikere at en større andel fugler passerer seint i sesongen, eventuelt ankommer for overvintring. De aller fleste fuglene tidlig på høsten passerer øya direkte. Strann et. al (2006) rapporterer at arten overvintrer i stort antall på Nordlandsflaget (rundt 200 ind.) og Buholmflaget (rundt 200 ind.).

Kvinand (*Bucephala clangula*): 1 ind. Nordland 18.9-2017, 2 ind. Nordland 7-15.9-2019 og en ung hann Sprengern 19.9-2.10-2020 er eneste observasjoner.

Laksand (*Mergus merganser*): Et lite antall fugl synes å oversomre regelmessig langs kysten. 12 sommerfunn siden 2010; henholdsvis 1 hann Nordland 22.6-2010, 5 ind. Nordland 20.7-2012, 5 ind. Teisthammaren 1.7-2013, 1 ind. Nordland 18-19.8-2013, 8 ind. Nordland 9.7-2014, 3 ind. Nordland 29.6-2015, 10 ind. Kvalneset 19.6-2016, en hann 3.6-2020. Den 10 og 11.7 2020 ble arten registrert i Sørlandsvågen, Austervågen og Skiphalsen med henholdsvis 2, 7 og 14 individer. Seks ind. (2 hanner 4 hunner) registrert forskjellige steder på øya i perioden 25.5-24.6-2021. Høstforekomsten er svært begrenset og utgjør 1 hunnfarget fugl sammen med siland i Skjersvika og Breivika i perioden 9-15.9 samt 25.9-2019. og 1-3 individer sammen med siland på Nordland 5-19.9.2020, 1-2 ungfugler Nordland 4-12.9-2021 samt en ungfugl Sprengern 29.9-2021. I tillegg 9 trekkende ind. mot NØ forbi Nordland 3.10-2020.

Siland (*Mergus serrator*): Hekkefugl. Pull registrert juli 2010 og 2012 men hekker nok årlig. Opptil 15 ind. 2.6-2021. Registrert nesten daglig hver høst siden 2010 i moderate antall, normalt opp til 30 ind., med 55 ind. 24.9-2011 som høyeste notering. Det er tilsynelatende lite utskiftning i løpet av høsten og høstfuglene representerer muligens lokale hekkefugler og avkom.



Figur 23 Siland Nordland oktober 2020

Lirype (*Lagopus lagopus*): Et individ Rømdalen 6.10-2004 og 2 ind. Håheia 18.3-2020 (VT) er eneste observasjoner.

Tårnseiler (*Apus apus*): 6 ind. Sørland 1.7-1982 er eneste observasjon.

Gjøk (*Cuculus canorus*): Mulig hekkefugl. Skal være hørt i Marka år om annet. 1 ind. 16.6-1989. 1 adult Marka 21.7-2010, 1 ind. Sørland 26.5-2019, 1-2 ind. Marka 4-5.6-2020 og 1 ind. Nordlandshagen 11.7-2020.

Bydue (*Columba livia domestica*): Opp til 10 ind. i dueslag Sørland 2011-2019. Ingen fugler registrert i 2020, men en fugl 25 og 26.9-2021.

Ringdue (*Columba palumbus*): Et ind. Sørland 25.5-2019 og 2 ind. 3.6-2020 er eneste vår-observasjoner. Om høsten registrert 53 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden fra 2011 - 2021 i tidsintervallet 14.9 (2021) - 15.10 (2017). Dagsantall som regel under 10, men opp til 25 ind. i perioden 11-15.10-2017, 15 ind. 24.9-2016 og 2.10-2018 og 13 ind. 3-7.10-2021. Spesielt fåtallig høsten 2020 med kun 1 – 2 ind.

Turteldue (*Streptopelia turtur*): Et ind. i fiskehjellene ved Fyret 22.9-2011*, 1 ind. 3-4.7-2013 (FCH), 1 ind. Nordland 21-22.9-2013*, 1 ungfugl Nordland 17-20.9-2016* og funnet igjen Stølen 23 og 24.9-2016, 1 ungfugl Marka 24.9-2019, 1 ind. 5.10-2019* og 1 voksen fugl Nordland 5-9.9-2020*.

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*): Kun fem observasjoner. To ind. Marka og Sørland henholdsvis 5.5-1982 og 1.7-1982 kan være samme fugler. Et ind. 18.9-2017, 1 ind. Nordland 10 og 11.9-2019* og 1 ungfugl Sørland 21.9-2020*.



Figur 24 Turteldue Stølen september 2016



Figur 25 Tyrkerdue Nordland september 2019

Vannrikse (*Rallus aquaticus*): Et svært rufsete individ ble skremt opp fra en bekk på Nordlandsanden 17.9-2020*. Denne fuglen ble registrert samme sted 22.9*. Et nytt individ (strøket i fjærdrakten) skremt opp i høyt gress ved Skybakken 24.9.2020*.

Sivhøne (*Gallinula chloropus*): Eneste funn er i ind. 19.5-2004* (FCH) og en ungfugl Sørland 7.10 2021*.

Sothøne (*Fulica atra*): Eneste funn er 1 ind. april/mai 2001 eller 2002 (FCH).

Trane (*Grus grus*): Et ind. observert flyvende i Sørlandsvågen 3.4-2016.


Dvergdykker (*Tachybaptus ruficollis*): Et ind. i havna ved Teisthammaren, Nordland 24.9-2011* er eneste observasjon.

Gråstrupedykker (*Podiceps grisegena*): Kun seks observasjoner av arten. To ungfugler Nordland 17-24.9-2011*, 2 ind. Nordland 25.9-2012*, 1 ind. Havna på Nordland 23.9-2013, 1 ind. 14.10-2017, 1 voksen fugl 23.9-2019* og 1 ind. trekkende sør ved Skiphalsen 24.9-2020*.

Tjeld (*Haematopus ostralegus*): Hekkefugl. Blant annet 30 ind. Sørland 2.6-2021. De fleste fuglene har forlatt øya innen utgangen av august. Registrert ytterst fåtallig (1-7 ind.) i september de fleste år. Enkelte av fuglene har holdt seg over lengre tid, Blant annet 1-2 ind. Nordland 7-17.9-2019. 11 ind. 14.9-2020 er største høst antall. Seneste observasjon er 1 ind. 14.10-2017. Tidlige vårfunn er 6 ind. Nordland 10.3-2009 samt observert samme sted 5.3-2010.

Vipe (*Vanellus vanellus*): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Usannsynlig at arten hekker i dag. To ind. 19-31.3-1982 (JBE), 2 ind. 15.6-1985. To ind. Sørland 24.2-2007* (FCH), 1 ind. Sprengern 22.9-2013 og 3 ind. 3.6-2020 er eneste 'nyere' observasjoner. Sistnevnte viste ingen tegn til hekkeadferd.

Heilo (*Pluvialis apricaria*): Vårfunn av 8 ind. Skiphalsen 25.5-2019, 1 ind. 4.6-2020 og 5 ind. 6.6-2021 samt 1-2 ind. i mai og juni 1982. Eneste sommerfunn er 1 ind. Nordlandshagen 12.7-2020. Ellers observert 80 dager (av 239 observasjonsdager) under høsttrekket i perioden fra 2011 til 2021 (Fig. 29). Tidligste observasjon 2 ind. 7.9-2019 og seneste observasjon 1 ind. 6.10-2021. Også to funn fra henholdsvis 2010 og 2004. Sistnevnte fra 6.10-2004 er seneste registrering av arten på Værøy. Vanligvis i dagsantall under 10 ind., men 30 ind. 24.9-2016 og 60 ind. 24.9-2013. Høsten 2020 var arten spesielt fåtallig med kun et registrert individ. Fig. 29 viser den årlige og sesongmessige fordelingen av funn i perioden 2011 til 2020.



Figur 26 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av heilo i perioden 2011-2021.

Tundralo (*Pluvialis squatarola*): To eldre funn; 4 ind. Måstadjellet 10.8-1082 og 2 ind. Håheia 16.8-1982. Kun observert om høsten siden 2010. Tre ind. 25.9-2010, 1 og 2 ind. 21-24.9-2011, 1 ind. 22.9-2013, opptil 4 ind. i perioden 16-22.9-2017, 1-3 ind. Nordland 29.9-3.10-2020 og 1 ind. Sprengern 22.9-2021.

Boltit (*Charadrius morinellus*): To individer 11.5-2019 (RS). Og 8 ind. trekkende mot sør over Hornet 12.9-2019* er eneste observasjoner.



Figur 27 Heilo Nordlandshagen september 2017



Figur 28 Tundralo Skipphalsen september 2017

Sandlo (*Charadrius hiaticula*): Hekkefugl. Direkte eller indirekte indikasjon på hekking observert juli 2010, 2012, 2013, 2014 og 2020. Et ind. Sørland 8.5-2021 er tidligste vårfunn mens 5 ind. Sørland

25.5-2019, 9 ind. 4.6-2020, 1 ind. Sørland 25.5 og 2.6-2021 og 1 ind. Nordland 3.6-2021 kan være hekkefugler. Moderat forekomst på høsttrekket og registrert 116 dager av 239 observasjonsdager fra 2011 til 2021 i perioden 11.8 (2016) - 6.10 (2010). Flere av disse observasjonene kan nok dreie seg om samme individer. Vanligvis å finne på Nordland, Skiphalsen og Sørlandsvågen. Dagsantall normalt under 20 ind., men største dagsantall 35 ind. 7.9-2019 og 12.9-2020 og 38 ind. 16.9-2017.

Småspove (*Numenius phaeopus*): Vårfunn; 1 ind. 25.5-2019, 5 ind. 3.6-2020 og 8 ind. Sørland 25.5-2021. 1-2 ind. juni 2010 og 2011 viste ingen tegn til hekkeadferd og kan være sene vårtrekkere. Strann et. al (2006) nevner arten som hekkefugl i Nordlandshagen. 2 ind. Nordlandshagen 11-12.7-2020 og opp til 10 ind. Nordland i juni 2021 kan være hekkefugler, men viste ingen indikasjon på hekkeadferd. Begrenset høstforekomst med 9 observasjoner, de fleste (5) ultimo juli. 1 ind. observert 20 og 22.9-2014. To og et ind. trakk mot SV forbi Skiphalsen henholdsvis 5 og 8.9-2020. Største dagsantall 24 ind. Nordlandshagen og 2 ind. Skybakken 20.7-2012.

Storspove (*Numenius arquata*): Hekkefugl. Fugl med pullus eller hekkeadferd registrert både på Nordland, Sørland og Marka juni/juli flere år. Hekkebestand 1-3 par. Regelmessig i lite antall på høsttrekket i perioden ultimo juli til 31.10-2009. Dagsantall sjelden fler enn 10-12 ind., men 14 ind. 21.9-2013 og 6.9-2021. Vinterfunn; 4 ind. 11.2-2001, 1 ind. 5.2-2004 og 2 ind. 18.2-2006 (FCH), men skal visstnok overvintre regelmessig.

Lappspove (*Limosa lapponica*): Et vårfunn av 1 ind. Nordland 2-3.6-2021 samt et sommerfunn av 13 ind. Skjersvika 12.7-2020. Registrert 70 dager (av 239 observasjonsdager) i september og oktober i perioden 2011-2021. Arten var fraværende 2014, 2015 og 2016. De aller fleste observasjonene stammer fra Nordland og dreier seg om 'long stayers', blant annet 3 ind. Nordland fra 20.9-5.10-2019 og 1 ind. samme sted 5-24.9-2020. Forekomsten dreier seg neppe om flere enn opp til 10 ind. per sesong. Største dagsantall 6 ind. Nordland 7.9-2019. Tidligste og seneste funn henholdsvis 3.9-2012 og 6.10-2004.



Figur 29 Lappspove Sprengern 2011

Svarthalespove (*Limosa limosa*): Strann et. al (2006) nevner arten observert fåtallig (sjelden) i Nordlandshagen. Eneste oppgitte registreringsdato 30.7-1995. Ingen ytterligere observasjoner.

Steinvender (*Arenaria interpres*): Sommerobservasjoner. Registrert 26-6-1982 (NOF-NINA-DN) og på Mosken 12.8-1982 (NINA) samt 1 ind. Svinkammen 10.7 og 1 ind. Sjøbakkan 11.7-2020. Overraskende fåtallig og kun registret 9 dager i løpet av høsten i perioden 2011 til 2021. 1 ind. 23.9-2013, 1 ind. 19.9-2016, 1 ind. 8.9-2018, 1 ind. 20.9-2018, 2 ind. Nordland 7.9-2019, 1 ind. Nordland 12.9-2019, 1 ind. 24.9-2019, 9 ind. trekkende mot S ved Skiphalsen 8.9-2020 og 1 ind. trekkende mot S samme sted 8.9-2021.

Polarsnipe (*Calidris canutus*): Kun sporadisk forekomst (9 observasjoner). Seks ind. 24.9-2011, 1 ind. 23.9-2013, 1 ind. 1.10-2013, 5 ind. direkte trekkende 20.9-2014, 1 ind. direkte trekkende 21.9-2014, 12 ind. Nordland 15.8-2016, 1 ind. Nordland 9.9-2019, 5 ind. Nordland 12.9-2019 og 1 ind. Fyret 16.9-2019.

Brushane (*Calidris pugnax*): Et eldre funn 6 ind. Håheia 21.8-1982. Med unntak av 2014 og 2020 (ingen funn) er arten registrert fåtallig hver høst siden 2011. Kun et ind. 2018, 2019 og 2021. Mer tallrik i 2017 med blant annet 25 ind. 20.8 og 10 ind. 16-17.9. Tidligste og seneste høstfunn henholdsvis 11.8-2016 og 23-9-2017.



Figur 30 Brushane Skiphalsen september 2017

Tundrasnipe (*Calidris ferruginea*): Kun fem observasjoner. 1 ind. Langholmen 28.8-2012, 1-4 ind. Langholmen 17-19.8-2013, 1 ind. (1k) Sørlandsvågen 19-20.9-2014, 1 ind. (1k) Sørlandsvågen 19-20.9-2017 og 2 ind. Sørlandsvågen 10.7-2020.

Sandløper (*Calidris alba*): Kun høstobservasjoner og er observert hver høst fra 2010 til 2021. Registrert 41 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 11.8 (2016) - 6.10 (2004), de fleste i siste halvdel av september. Normalt 1-3 ind., men 7 ind. 10.9-2020. De fleste fuglene er funnet på Nordland



Figur 31 Tundrasnipe Sørlandsvågen september 2017



Figur 32 Sandløper Nordland september 2013



Figur 33 Myrsnipe Sørlandsvågen september 2014

Myrsnipe (*Calidris alpina*): Overraskende fåtallig. Vårfunn; 2 ind. 5.6-2020 og sommerfunn 6 ind. Langholmen 12.7-2020. Registrert i lite antall hver høst fra 2010 til 2021. Arten er registrert totalt 63 dager (av 239 observasjonsdager) i tidsrommet 18.8 (2013)- 3.10 (2014). Dagsantall normalt under 5 ind., men 14 ind. 23.9-2011, 19 ind. 16.9-2017 og 34 ind. 8.9-2020 er klart høyeste dagsantall. Vanligvis funnet på Nordland, men også registrert i Sørlandsvågen og Sprengern.

Fjæreplytt (*Calidris maritima*): Observert Mosken 12.8-1982 (NINA) og 2 ind. Skittenskarvholman 14.8-2013. Vårobservasjoner 21 ind. 19-31.3-1982 og 20 ind. 17-29.3-1985 (JBE) samt en sommerobservasjon; 9 ind. Røssnesvågen 11.7-2020. Om høsten kun registrert 21 dager hvorav 20 i perioden 2011 til 2021. Arten ble ikke registrert i 2015 og 2016 og kun 1 ind. i 2019. Observasjonene er spredt over tidsintervallet 14.8 (2013) - 18.10 (2018). Normalt 1-4 ind., men største dagsantall 10 ind. 31.10-2009, 12 ind. 23.9-2011 og 15 ind. 6.10-2004. Skal være vanlig overvintrer, men ingen data.

Dvergsnipe (*Calidris minuta*): Registrert 14 dager perioden fra 2012 til 2019, i tidsintervallet 11.8 (2016) - 19.9 (2017). 2 ind. Langholmen, Sørlandsvågen og 1 ind. Nordland 28.8-2012, 5 ind. og 12 ind. Langholmen, Sørlandsvågen henholdsvis 17 og 19.8-2013. 1 ind. 18-19.9-2014, 2-3 ind. Sørlandsvågen 11 og 14.8-2016, 4 og 1 ind. Sørlandsvågen henholdsvis 16 og 19.9-2017, 2 ind. Sørlandsvågen 10-12.9-2019 og 1 ind. Nordland 12.9-2019 og 2 ind. Sørlandsvågen 6.9-2021. Arten ble ikke registrert i 2015, 2018 og 2020.

Rustsnipe (*Calidris subruficollis*): En ungfugl på Nordland og Skiphalsen 23 og 24.9-2011* er eneste funn.

Alaskasnipe (*Calidris melanotos*): En ungfugl skremt opp i Sørlandsvågen og senere funnet igjen i Sprengern 22.9-2014*.



Figur 34 Fjæreplytt Nordland september 2012



Figur 35 Dvergsnipe Sørlandsvågen september 2019




Figur 36 Alaskasnipe Sprengern september 2014



Figur 37 Rustsnipe Skiphalsen september 2017

Rugde (*Scolopax rusticola*): Fire vårfunn. 2 ind. Sørland 26.5-2019 og 1 ind Sørland 25.5.2021. Begrenset høstforekomst og registrert 27 dager fra 2011 til 2021 i perioden 4.9 (2015) - 29.10 (2015). Funnet de fleste år siden 2011 med unntak av 2012 og 2018. Største dagsantall 2 ind. flere dager. I tillegg vinterobs: 1 ind. Kvalneset februar 2018 (MKH) og 1 død (mot vindu) Sørland primo februar 2018 (LGW).

Kvartbekkasin (*Limnocryptes minimus*): To vårobservasjoner, 1 ind. Nordland 26.5-2019 og 3 ind. Marka 28.5-2019. Registrert hver høst fra 2011 til 2021 i lite antall. Totalt registrert 64 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 10.9 (2019) - 14.10 (2017), men kun en observasjon hver i 2012 og 2015 (Fig. 40). Vanligvis 1-3 ind., men største dagsantall 5 ind. 20 og 22.9-2017 og 17.9-2021. Arten var spesielt tallrik i 2017 med antatt 23 forskjellige individer. Fig. 38 viser henholdsvis den årlige og den sesongmessige fordeling av funn (antatt forskjellige individer) i perioden 2011 til 2021.



Figur 38 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av kvartbekkasin i perioden 2011-2021



Figur 39 Kvartbekkasin Nordland september 2017

Enkeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Hekkefugl. Tre pulli funnet på Nordland 21.7-2020 er eneste bekreftet hekkeobservasjon. Registrert Håheia og Sørland mai, juni, juli 1982. Enkeltindivider juni 2010 og 2011, 2 ind. juli 2014 kan være hekkefugler. I juni 2021 registrert både i Håheia (1 ind.) og

Sørland (3 ind.). Skal være hørt flere ganger på Sørland i hekkesesongen (EB). Vårfunn; 1 ind. 25.5-2019, 1 ind. Håen 18.4-2021 og 2 ind. Sørland 25.5-2021. Regelmessig (nesten daglig) i moderat antall høst 2011 til 2021 i perioden 14.8 (2016) -30.10 (2015 og 2016). Dagsantall normalt under 10 ind. men opptil 15 ind. flere dager.

Polarsvømmesnipe (*Phalaropus fulicarius*): Et ind. kom trekkende fra vest og la seg på sjøen ved Nordlandssanden 3.10-2020*.

Strandsnipe (*Actitis hypoleucos*): Overraskende fåtallig forekomst. 1 ind. Håheia 12.6-1982, 2 ind. ved Tjuvneset 5.9-2011, 1 ind. overflygende Buholman 2.6-2013 og 1 ind. Måstad 15.8-2013 er eneste observasjoner.

Rødstilk (*Tringa totanus*): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Også rapportert som hekkefugl i Nordlandshagen av Strann et. al, (2006). Sannsynligvis også hekkefugl i dag: Voksne fugler med hekkeadferd Holmen og Sørland juni/juli 2010. Enkeltindivider også registrert Austervågen, Langholmen og Nordlandshagen i juli 2020. Også registrert juni 2011, 2012, 2020 og 2021 samt 25.5-2019 og 4 ind. Sørland 25.5-2021. Om høsten kun observert 1 ind. 23.9-2011, 1 ind. Nordland 11-28.9-2018, 1 ind. Fyret 13.9-2018, 3 ind. Nordland 7.9-2019, 1-2 ind. Nordland 12-13.9.2020 og opp til 10 ind. Nordland i perioden 6-12.9-2021. Vinterfunn 2 ind. 11.2-2001, men skal visstnok overvintre regelmessig.

Grønnstilk (*Tringa glareola*): Et ind. Langholmen 11.7-2020 var første funn av arten på Værøy.

Sotsnipe (*Tringa erythropus*): Kun registrert 4 ganger. 3 ind. Holmen 28.8-2012, 1 ind. Sprengern 17.9-2012, 2 ind. Holmen 19.8-2013 og 1 ind. Sørlandsvågen 11.8-2016.

Gluttsnipe (*Tringa nebularia*): Eneste observasjoner er 1 ind. Sprengern 18-20.9-2016 og 1 ind. Skiphalsen 2.6-2021.

Krykkje (*Rissa tridactyla*): Hekkefugl. Strann et. al (2006) rapporterte ca. 11000 par hekkende i Måstadjellet. Arten skal imidlertid gått betydelig ned i antall siden, men nye antall ikke tilgjengelig. Tallrik høst. I perioder store mengder næringsøkende i Nordlandflaket. Største dagsantall 1750 på trekk sør 23.9-2018. Seneste registrering 300 ind. 15.10-2017. I 2019 og 2020 var høstforekomsten sterkt dominert av voksne fugler, kanskje så mye som 80 % eller mer, noe som indikerer en svært dårlig hekkesesong. Mer fåtallig høsten 2021, men andelen ungfugler betydelig opp i forhold til foregående år og utgjorde kanskje så mye som 30-40 % av de registrerte fuglene.

Hettemåke (*Chroicocephalus ridibundus*): Seks vårfunn med 1 ind. 19-31.3-1982, 1 ind. Håheia 6.6-1982, 1 ind. Bjørgan 23.4-2017, 1 ind. Sørland 25.5-2019, 1 ind. 5.6-2020 og 1 ind. Sørland 25.5-2021. Sommerfunn 1 ind. Nordlandshagen 20.7-2012, 18 ind. Skiphalsen 27.7-2019 og 1 ind. Røssnesvågen 11.7-2020. Sporadisk høstforekomst (7 funn) med 1 ind. 17-19.9-2011, 3 ind. 24.9-2013, 1 ind. 18.9-2015, 1 ind. 30.10-2015, 1 ind. 26.9-2018*, 1 ind. (1K) Nordland 15.9-2020 og 1 ind. (ad) Nordland 27.9-2020.

Fiskemåke (*Larus canus*): Hekkefugl. Blant annet 40 ind. Torvvågan 10.6-2011. Også 200 ind. Skiphalsen 25.5-2019 og 100 ind Sørland 25.5-2021. Ifølge lokalbefolkningen sterk nedgang i hekkebestanden, men fremdeles tallrik. De fleste fuglene forlater nok Værøy i løpet av august. Begrenset forekomst i september/oktober. Normalt 1-5 ind., men opptil 21 ind. 12-15.10-2017 og 20 ind. 25.9-2020. Seneste observasjon er 1 ind. 29.10-2015.



Figur 40 Fiskemåke (1K) Røssnesvågen september 2021

Svartbak (*Larus marinus*): Hekkefugl. Opp mot 300 par hekker i kommunen (NINA). Ca. 100 ind. Skiphalsen 25.5-2019. Opptrer i stort antall året rundt. Blant annet 350 ind. 25.9-2014. Lite energi brukt på å tallfeste arten.



Figur 41 Polarmåke (1K) Marka september 2013

Polarmåke (*Larus hyperboreus*): Antatt vanlig vinter/vår forekomst, men kun få registreringer; 1 ind. 11.2-2001 (TEK), 1 ungfugl 8.1-2008 og 1 ind. (3k+) 27.2-2019 og 1 ind. (ung) Torvholmen 16.4-2009. Sporadisk høstforekomst: Åtte funn siden 2011. 1 ind. (1K) 23-24.9-2012, 1 ind. (1K) 21-30.9-2013, 1 ind. (3k) og 1 ind. (4k) 20.9-2014, 1 (2K) 17.9-2017, 1 ind. (adult) 23.9-2017, 1 ind. (1K) 11.10-2017 og 1 ind. (1K) 1.10-2019.



Figur 42 Grønlandsmåke (1K) Røssnesvågen september 2021



Figur 43 Kumlienssmåke (2K) Nordland september 2017

Grønlandsmåke (*Larus glaucooides*): Eneste høstfunn av nominat rasen *L. g. glaucooides* er 1 ind. (1K) Skjersvika 27.9-2018, 2 ind (1K) Røssnesvågen 14.11-2020 og 1 ind. (1K) Røssnesvågen og Sørland 28-30.9-2021. Sannsynligvis regelmessig overvintrer. 1 ind. 17-29.3-1985 (JBE), 1 ind. 11.2-2001, 3 ungfugler 8.1-2005 (FCH) 8-10 ind. 1.2-2005 og 2 ind. (2k) Røssnesvågen 12.1-2008. 1 ind. (3K+) av underarten *L. g. kumlieni* 25.9-2010* og en (2K) fugl av samme underart Nordland og Sørland 18.9-14.10-2017.

Gråmåke (*Larus argentatus*): Hekkefugl. Opptrer i stort antall året rundt. Om høsten i antall på opptil 1500 ind. (25.9-2014). Lite energi brukt på å tallfeste forekomsten.

Sildemåke (*Larus fuscus*): Hekkefugl? Blant annet 30 ind. Skiphalsen 25.5-2019, 10 ind. 3.6-2020 og 30 ind. Sørland 4.7-2020. Begrenset høstforekomst. 1 ind. (1k) 28.9-2010, 1 ind. 21.9-2013, 1 ind. (1k) 24.9-2013, 1 ind. 20 og 24.9-2014, 1 adult 19.9-2015, 1 (1k) 12.10-2017, 1 adult Sprengern 14.9-2018, 1 ind. (1K) 23.9-2020 og 1 ind. (1K) Skiphalsen 8.9-2021. Ikke registrert høsten 2019. Underarten *L. f. graellsii* registrert med 2 adult 20.7-2010, 1 og 2 adult Sørland 18-20.7-2012, 2 adult Sjøbakken 20.7-2012, 1 adult Nordlandshagen 20.7-2012 1 adult Nordland 3.7-2017 og 2 adult Værøy Havn 8.7-2019. Underarten *L. f. fuscus* 1 ind. Sørlandsvågen 10.7-2005. Underarten *L. f. intermedius* Sørland 19.7-2012.

Makrellterne (*Sterna hirundo*): Et fåtall (17) observasjoner i juni og juli kan indikere hekkefugler. Opptil 6 ind. Nordland 2-3.6-2021. Også rapportert som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Største dagsantall er 10 ind. Sørland 19.7-2012 og 19 ind. Røsthavet 11.6-2018. Arten er ikke nevnt av Strann et. al (2006). De eneste høstobservasjonene stammer fra 2020 med 4 ind. (2 ad, 2 1K) Skiphalsen 5.9, 3 ind. (2 ad, 1 1K) Nordland 13.9 og 1 ad Breivika 17.9 samt 1 ind. Vestfjorden 19.8-2021 og 1 ind. (1K) Nordlandsanden 21-23.9-2021.


Rødnebbterne (*Sterna paradisaea*): Konstatert hekkefugl ifølge Norsk Fugleatlas (1994). Opptil 4 ind. Håheia mai-juli 1982. Et fåtall 'nyere' observasjoner av 1-2 ind. i juni/juli (2004 (1), 2009 (1), 2011 (1), 2012 (4) og 2021 (3)) kan indikere sporadisk hekking, men ingen ungfugler registrert. Uvanlig mange fugler ble registrert 11-12.7-2020 med 15 ind. Skiphalsen, 20 ind. Teisthamaren og 10 ind. Røssnesvågen. Arten er ikke nevnt av Strann et. al (2006). Svært fåtallig høst. Et ind. (1k) Nordland 27.9-2014, men 4 observasjoner av trekkende fugler i september 2021; 6.9 (4 ind. Vestfjorden), 8.9 (5 ind. Skiphalsen), 13.9 (2 ind. Skiphalsen) og 18.9 (23 ind. Skiphalsen).

Storjo (*Stercorarius skua*): Fåttallig vår/sommerforekomst med 12 observasjoner (1979, 1982, 2000, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 og 2020). Arten hekker på Røst. Registrert 18 dager (33 ind.) om høsten fra 2011 til 2021 (2014, 2016, 2018, 2019, 2020 og 2021) i perioden 7.9 (2020) - 29.9 (2018). Største dagsantall 7 ind. Skiphalsen 14.9-2020.

Tyvjo (*Stercorarius parasiticus*): Ikke påvist hekking, men observasjoner av voksne fugler i juni og juli 2010, 2012, 2013 og 2020 samt eldre funn fra sommeren 1982 kan være hekkefugler. Vanlig høst i moderat antall (nærmest daglig i september), de fleste næringsøkende over Nordlandsflaget. Normalt i dagsantall på under 10 ind., men 79 og 28 ind. trekkende mot sør henholdsvis 17 og 23.9-2018. Tidligste funn 5.9-2011 og seneste funn 14.10-2017. I 2021 var arten påfallende fåttallig med kun tre funn i løpet av september.

Fjelljo (*Stercorarius longicaudus*): Totalt 8 funn. 1 ind. Vestfjorden 29.5-2017, 1 ind. (ad) 2.7-2017, 8 ind. 13.7-2017, 1 ind. Skiphalsen 17.9-2018*, 1 ind. (1K) Nordland 29.9-2018* og 2 ind. næringsøkende Nordland (ad + 1K) 23.9-2019*, 1 ind. på sjøen utenfor Værøy 10.8-2020* og 1 ind. (1K) Mosken 14.8-2020*.

Polarjo (*Stercorarius pomarinus*): To vårfunn; 3 ind. på havet sør for Værøy 1.6-2006*. 1 ind. 25 nautiske mil SØ av Værøy 12.6-2012 (ONO). På høsten registrert 20 dager (79 ind.) i perioden 15.9 (2012) - 18.10 (2018) (Fig. 43). Siden 2011 påvist i 2012, 2014, 2015, 2018 og 2019 i svært varierende antall (Fig. 39). Beste år 2014 med observasjon av arten 9 dager (37 ind.) og 2019 med observasjon av arten 8 dager (23 ind.). Ikke uventet flest i siste del av september (Fig. 39), en periode som også har best dekning.



Figur 44 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av polarjo i perioden 2011-2021

Alkekonge (Alle alle): Overraskende fåtallig, men skyldes nok få observasjonsdager seint i sesongen. En eldre observasjon 31.3-1983. Et ind. Nordland 27.9-2014, et næringsøkende ind. Kvalnesodden 22.11-2015 og 7 ind. Røsthavet 2.11-2020 er eneste nyere observasjoner.

Polarlomvi (*Uria lomvia*): Observert på strekningen Knappen-Buneset-Måstadjord 20.6-1966 (NINA – Det nasjonale sjøfuglkartverket/SEAPOP). Observert på strekningen Knappen-Buneset-Måstadjord 15.6-1984 (NOF-NINA-DN – Norsk hekkefuglatlas) og 1.7-1984 (NINA – Det nasjonale sjøfuglkartverket/SEAPOP). 1 ind. Værøy 26.6-1999 (EDE) samt et ubekreftet funn 3.7-2001 (DR)

Lomvi (*Uria aalge*): Hekkefugl i Måstadjellet. Bestanden i Måstadjellet ble estimert til 2400 par i 1964 (Brun, 1969). I 1985 ble det registrert 387 hekkende par. Anker-Nilssen (2006) rapporterte 309 par i 2005. Bestanden har gått kraftig tilbake, men blant annet ca. 500 ind. 11.6-2011. Ingen nyere data tilgjengelig. Fuglene forlater hekkeplassen i løpet av august og kun fire observasjoner i løpet av høsten (2011-2021): 1 ind. 14.10-2017, 1 ind. 2.10-2018, 1 ind. 23.9-2019 og 1 ind. 20.9-2021.

Alke (*Alca torda*): Hekker i Måstadjellet. Få data tilgjengelig. Ifølge Anker-Nilssen hekket 118 par i kommunen 2005. Et grovt estimat på ca. 1000 ind. i Måstadjellet naturreservat 11.6-2011. Observeres regelmessig mai - juli i lite antall rundt Værøy. Utenom hekkesesongen, begrenset høstforekomst i perioden 19.9 (2018) - 15.10 (2017) med største dagsantall 8 ind. 19 og 23.9-2018. En del ubestemte alkefugl på trekk er antatt å være hovedsakelig denne arten.

Teist (*Cephus grylle*): Hekkefugl. Strann et. al (2006) rapporterte minimum 125 hekkende par i kommunen, de fleste på Mosken. Få nyere data, men registrert i lite til moderat antall i sommermånedene. Blant annet 50 ind. Sørland 25.5-2019 og 20 ind. Nordland 25.6-2021. Moderat forekomst høst, men lite energi brukt på å tallfeste arten. Største dagsantall 70 ind. 24.9-2011 og 100 ind. 3.6-2020. Seneste observasjon 31.10-2009, men arten er sannsynlig overvintrer. Strann et. al (2006) rapporterte overvintrende teist på Nordlandsflaget.


Lunde (*Fratercula arctica*): Hekkefugl. Hekket i stort antall i Måstadjellet og ble brukt som viktig matressurs i bygda Måstad. Lundebestanden har gjennomgått en dramatisk nedgang. Dagens

situasjon ikke kjent, men i 1964 ble bestanden taksert til ca. 80000 par (Brun, 1966). I 2005 var bestanden på ca. 43000 par (Anker-Nilssen 2006). Seneste anslag er fra 2009 med 42500 par (NOF). Arten har og hekket i lave antall (25-35 par) på hver av Skittenskarvholman, Tjeldholmen, Buholman og Skarvholman (Strann et. al 2006). Fuglene forlater koloniene i august og arten forekommer kun sporadisk etter dette, noe som gjenspeiles i kun 13 observasjoner (19 ind.) i september fra 2011 til 2021. Seneste observasjon 1 ind. 27.9-2019.

Smålom (*Gavia stellata*): Den klart vanligste lomearten med registrering 91 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021. Den totale funnmassen utgjør 1261 individer hvorav mer enn 95 % dreier seg om direkte trekkende fugler. Flest fugler ble registrert i 2020 med 411 individer på 21 dager. Største dagsantall 237 ind. mot sør 19.9-2020. Arten er tidligst registrert 8.9 (2018 og 2021) og senest 18.10 (2018), men flest imellom 10 og 25 september (Fig. 21). De fleste fuglene trekker mot SV langs nordvest siden av Værøy, skjønt et fåtall passerer over Nordlandsflaget mellom Værøy og Mosken.



Figur 45 Smålom Nordland september 2020




Figur 46 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av smålom i perioden 2011 til 2021.

Storlom (*Gavia arctica*): Totalt 32 registreringer av 75 ind. Registrert hver høst i perioden 2011 til 2021 med unntak av 2015 og 2016. De fleste fuglene er direktetrekkere, men et fåtall observert på sjøen på Nordland, blant annet 2 ind. 23.9-2017, 24.9-2019, 13.9.2020 og 1 ind. 24.9-2021. Alle fugler registrert i tidsintervallet 9.9 (2020) til 15.10 (2017). Flest funn er gjort i 2019 med 6 observasjoner av 23 ind. Høyeste dagsantall 7 ind. trekkende mot sør ved Skiphalsen 12.9-2019.

Islom (*Gavia immer*): Totalt 38 observasjoner av 55 ind. fra 2011 til 2021 og observert hvert år i perioden. Syv sommerfunn, henholdsvis 2 ind. Skiphalsen og 1 ind. Sørlandsvågen 26.7-2012, 3 ind. Nordland 27.8-2012, 1 ind. Nordland 19.8-2013, 2 ind. Skiphalsen 9.7-2015, 1 ind. Røsthavet 11.06.2018 og 1 ind. 4.6-2020. Flest registreringer i 2018 med 9 observasjoner av 15 ind. Største dagsantall 5 ind. 21.9-2016. Flere av funnene er gjort av næringssøkende individer på sjøen utenfor Nordland.

Gulnebbblom (*Gavia adamsii*): Funnmassen utgjør 26 observasjoner mellom 9.9 (2020) og 31.10 (2009) av 40 individer (1 ind. 2009, 3 ind. 2013, 6 ind. 2014, 2 ind. 2017, 14 ind. 2018, 1 ind. 2019, 9 ind. 2020 og 4 ind. 2021). Totalt 27 av disse var voksne fugler. Minst 19 av observasjonene (32 ind.) er gjort av direkte trekkende fugler (i sørlig retning). Et ind. på sjøen på Nordland 26 og 27.9-2014 og 1 adult fugl rastende ved Skiphalsen 21.9-2021. Tidligste observasjon var av et direkte trekkende ind. 12.9-2019 og seneste var to trekkende ind. 17.10-2018. Flest individer ble registrert i 2018 med 14 ind., hvorav de fleste ble gjort rundt midten av oktober. Anker-Nilssen (2006) rapporterer 8 overvintrende individer rundt Værøy. Et vårfunn; 1 ind. 9.5-2001.



Figur 47 Årlig og sesongmessig fordeling av funn av gulnebbblom i perioden 2011 til 2021.

Havsvale (*Hydrobates pelagicus*): Sannsynlig hekkefugl Mosken og muligens også Værøy. Totalt 34 sikre observasjoner av totalt 122 individer. Første observasjon 5 ind. hvorav 2 ind. ringmerket Kalklauven 27.8.1982. 25 av observasjonene er gjort i perioden 13.6 (2011) til 19.8 (2021), de aller fleste i juli, blant annet en observasjon av 25 ind. næringsøkende utenfor Mosken 13.7-2017. De resterende funn stammer fra perioden 17.9 (2019) til 28.9 (2018). Sporadiske forsøk med nettfangst og lyd ved Skiphalsen har resultert i 21 ringmerkete individer, Blant annet 7 ind. 28.9-2018, 7 ind. 17.9-2019 og 6 ind. 21.9-2019 og arten er åpenbart vanligere enn funnmassen skulle tilsi. I tillegg ble 37 ind. registrert på overfarten fra Moskenes til Røst 17.7-2001.

Stormsvale (*Hydrobates leucorhous*): Observert på 'havet' 10.8-1980 samt på Mosken 12.8-1980 (NINA) og 15.6-1985 (NOF-NINA-DN). G. Lid oppga arten som trolig hekkende på Mosken i 1982. Forsøk med lydavspilling på Skiphalsen flere ganger i september 2014 -2019 har ikke gitt noe resultat.

Havhest (*Fulmarus glacialis*): Hekkefugl. Et fåtall par hekker i Måstadjellet. Forholdsvis vanlig i havområdene rundt Værøy, blant annet 100 ind. Røsthavet 13.6-2011 og 30 ind. Moskenes til Værøy 25.7-2019, men overraskende få observasjoner fra Værøy om høsten. Største dagsantall observert

fra Værøy 72 ind. 10.9-2020, 115 ind. 14.9-2020 og 145 ind. 8.9-2021 alle trekkende mot SV. Seneste observasjon 1 ind. Røsthavet 2.11-2020. Mer enn halvparten av 66 registreringer er gjort i perioden mai til august.



Figur 48 Havsvale fanget Skiphalsen september 2019

Grålire (*Ardenna griseus*): Totalt 20 observasjoner av totalt 41 individer. Med unntak av 1 ind. Røsthavet 5.8-2000, 3 ind. 8.8-2009 og 2 ind. 24.9-2010 er alle observasjonene gjort i fra 2014 til 2021. Tidligst 19.9 (2014) og senest 28.9 (2016). De aller fleste observasjonene er gjort fra Skiphalsen. I perioden 2011 til 2020 ble arten registrert i 2014 (5 ind.), 2015 (1 ind.), 2016 (1 ind.), 2018 (5 ind.), 2020 (18 ind.) og 2021 (5 ind.). Største dagsantall var 7 ind. 18.9.2020.

Havlire (*Puffinus puffinus*): 1 ind. Vestfjorden 31.7-2004 og 1 ind. Røsthavet 10.8-2020 er eneste detaljerte observasjoner. Ellers foreligger visstnok flere udaterte observasjoner fra havområdene rundt Værøy.

Havsule *Morus bassanus*): Arten hekker på Buholmen og i 2008 hadde kolonien 126 par. Hekker muligens også på Skittenskarvholmen. Registreres regelmessig i gode antall fra Værøy iallfall fra april til ut oktober. Størst antall trekkende fugler rapportert fra slutten av september og i oktober med blant annet 500 ind. 15.10-2017, 910 ind. 23.9-2018, 800 ind. 26.9-2018 og 1500 ind. 16.10-2018. Vinterobservasjon; 2 ind. ved Flyplassen 17.1-2005 (FCH).

Storkarv (*Phalacrocorax carbo*): Hekkefugl. Ifølge NINA hekket ca. 500 par i kommunen i 2005 (NINA rapport 201). Tallrik i trekkperioden september/oktober med maks antall 400 ind. 19.9-2011 og 300 ind. 20.9-2017. Lite energi brukt på å tallfeste forekomsten under trekket. Et større antall fugler sitter ofte på skjær og holmer utenfor Nordland.

Toppskarv (*Gulosus aristotelis*): Hekkefugl. Totalt 117 par hekket i kommunen 2005 (NINA rapport 201). Tallrik i trekkperioden september/oktober med maks antall 500 ind. flere dager. Lite energi

brukt på å tallfeste forekomsten under trekket. Et større antall fugler sitter ofte på skjær og holmer utenfor Nordland.

Skjestork (*Platalea leucorodia*): 3 ind. Stranda 4.9-1998. To av disse fuglene holdt seg helt fram til 12.10-1998* (B og M Grindhaug). Dette var første funn av arten i Nordland.

Gråhegre (*Ardea cinerea*): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Ti 'nyere' sommerfunn av 1-2 individer i perioden 14.5 (2019) - 18.8 (2013). Usikkert om arten hekker i dag. Regelmessig i mindre antall (opptil 20 ind. men som regel færre enn 10) i september/oktober og registreres nesten daglig. Største dagsantall 36 ind. 1.11-2009 som også er seneste registrering av arten. I følge Norsk VinterfuglAtlas (2006) også registrert om vinteren.



Figur 49 Gråhegre Kvalneset september 2020

Egretthege (*Ardea alba*): Et ind. næringsøkende Kvalneset 4-5.5-2016* er eneste observasjon.

Silkehege (*Egretta garzetta*): Et ind. fotografert innerst i Austervågen 10.10-2016.

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): Et ind. kom trekkende inn på Nordland og forsvant mot sør 21.9.2013*.

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*): Et ind. 23.5-2008 (FCH) og en 2K fugl Håheia 8.6-1982 er eneste funn utenom høsten. Regelmessig i mindre antall høst og observert hele 76 dager fra 2011 til 2021. Største dagsantall 4 ind. 22.9-2013 og 1.10.2019. Tidligste og seneste observasjon henholdsvis 28.8-2012 og 14.12-2016. Fuglen ultimo august var uvanlig tidlig, og arten dukker som regel opp fra midten av september. Den totale forekomsten per høst dreier seg neppe om flere enn 4-6 individer. Funnmassen synes å være en god blanding av alle årsklasser.

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): Hekkefugl. Ifølge NINA rapport 201 (2006) hekket 4 par i kommunen på begynnelsen av 2000 tallet. Ingen nyere hekkedata, men 15 ind. Måstad 10.7-2010 (David Kihlberg). Forekommer hele året. Vanlig høst i antall opp til 20 ind. Ofte i gode antall på skjær og holmer utenfor Nordland.

Spurvehawk (*Accipiter nisus*): Registrert november/desember 2001 samt mars 2006. Ut over dette kun høstobservasjoner i perioden 8.9 (2019) til 30.10 (2015). Arten er regelmessig men fåtallig og registrert 70 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021. De fleste individer passerer øya direkte. Totalforekomsten per år vanskelig å anslå, men funnmassen indikerer neppe fler enn 15 observerte individer per år. Vanligvis enkeltindivider, men største dagsantall 5 ind. 21.9-2013. Spesielt fåtallig i 2016 med kun 3 ind.

Hønsehawk (*Accipiter gentilis*): Et ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ) og 1 ind. ved Flyplassen 11-21.2-2009 (FCH) er eneste vinterfunn. 1 ind. 24.9-2010. Fra 2011 til 2021 er arten registrert 32 dager. Funnmassen indikerer 19-21 forskjellige individer fra 2011 til 2021 i tidsrommet 8.9 (2019) - 8.12 (2017). Årene 2013 og 2017 er tilsynelatende de beste årene med 4 forskjellige individer. De fleste fuglene passerer raskt og er bare observert en dag, eller et fåtall ganger 2 dager. Unntaket er en ung hann som holdt seg på øya fra 8-29 september 2019. Største dagsantall er 2 ind. 27.9-2013, 29.9-2019 og 2.10.2020.




Figur 50 Hønsehawk Marka september 2019

Fjellvåk (*Buteo lagopus*): Kun syv observasjoner. 1 ind. Håheia 1.5-1982, 1 ind. 17.9-2015, 1 ind. Marka 16 - 18.9-2016 og 1 ind. Nordland 20-24.9-2019. Sistnevnte ble for øvrig sett med en rotte i klørne. I tillegg to vårfunn med 1 ind. 5.6-2020 og 1 ind. 26.5-2021. Et varslende individ primo august 2021 kan indikere hekking.


Musvåk (*Buteo buteo*): Eneste observasjon er 1 ind. som trakk over Breivika 25.9-2017*. Denne fuglen ble for øvrig også observert på Røst samme dag.

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Et sommerfunn av 1 ind. 20.7-2012. Registrert totalt 53 dager (av 239 observasjonsdager) under høsttrekket i perioden (2011 - 2021). Tidligst observert 16.8-2013 og senest 2.10-2018. Stort sett enkeltindivider, men 3 ind. 22.9-2013 og 21.9-2014. De fleste fuglene passerer nok øya direkte, men enkelte har holdt seg i flere dager, blant annet 1 ind. Nordland 19-22.9-2019. Flest fugler er registrert i siste halvdel av september, men dette skyldes nok helst den høye dekningsgraden i denne perioden (Fig 51). Den registrerte forekomsten dreier seg neppe om flere enn 8-10 ind. de beste årene. Et vinterfunn: 1 ind. i bosscontainer Skjersvika 10.01.2017 (GAO).



Figur 51 Tårnfalk - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)

Dvergfolk (*Falco columbarius*): Med unntak av havørn, den mest registrerte rovfugl på Værøy. Tre vårfunn: 2 ind. 17.5-2008, hunn 25 og hann 28.5-2019 er mulige hekkefugler. Eldre funn inkluderer enkeltindivider i juni og august 1982. Observasjoner av 1 ind. Flyplassen 11.7-2010, 1 hann 5 og 27.7-2016 (JGR) og 1 hunn 3.6-2020 kan indikere hekking. Øvrige funn er fra høsten og arten er registrert 116 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021 i perioden 11.8 (2016) - 21.10 (2018). Regelmessig i mindre antall i september og observeres nesten daglig, hovedsakelig enkeltindivider, men 4 ind. 20.9-2014 og 18.9-2018. Den totale høstforekomsten er vanskelig å anslå, men ligger muligens på 10 - 20 ind. per høst.



Figur 52 Dvergfolk - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)

Jaktfalk (*Falco rusticolus*): Totalt 8-9 individer registrert om høsten fra 2012 til 2019. Enkeltindivider 21.9-2012, 25.9-2013, 21.9-2014, 16 og 18.9-2016 (mulig samme ind.), 27.9* og 16.10-2017*, 25-26.9-2019*, 5.10-2019* og 1 ind. Marka 16.9-2020*. Alle aldersbestemte ind. har vært ungfugler. I tillegg to vinterfunn; 1 ind. Fyret 17.2-2007 og 1 ind. på Sørland 19.2-2009.



Figur 53 Dvergalk Nordland september 2019



Figur 54 Ung jaktfalk i Marka september 2020


Vandrefalk (*Falco peregrinus*): Observasjoner av en voksen fugl 3.7-2017 og 11.7-2020 kan være hekkefugler. I følge Strann et.al (2006) fåtallig hekkefugl i kommunen. Eneste vårfunn 1 ind. 17-18.4-

2004 (FCH). Regelmessig men fåtallig om høsten og observert 52 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021 i perioden 16.8 (2016) til 21.10 (2017). Enkelte fugler holder seg tilsynelatende flere dager, og den registrerte forekomsten dreier seg sannsynligvis ikke om flere enn 3-6 individer per høst. Største dagsantall 3 ind. 20.9-2017, 21.9-2016, 23.9-2017 og 11.9-2019.



Figur 55 Ung vandrefalk i Marka september 2014

Haukugle (*Surnia ulula*): Mange individer ble observert tidlig på 1990 tallet (FHC). Med unntak av 2014, registrert hvert år siden 2012 i perioden 13.8 (2016) - 22.10 (2017), og registrert 49 dager av 239 observasjonsdager (Fig. 48). De fleste år utgjør funnmassen opp til 5 ind. per år, men ca. 10 individer i 2017 og sannsynligvis 15 - 20 individer i 2013. Største dagsantall 9 individer 22.9-2013. I 2018 og 2019 kun 1 ind. Enkeltindivider er ofte observert på Nordland først for neste dag å dukke opp i Gamleskogen.



Figur 56 Årlig fordeling av funn av haukugle og sesongmessig fordeling av alle observasjoner fra 2011 til 2021



Figur 57 Haukugle Nordland september 2012

Perleugle (*Aegolius funereus*): To ind. sammen i Marka 24.9-2012. Et ind. Stølen dagen etter er antatt å være et nytt individ.



Figur 58 Spurveugle Nordland september 2011



Figur 59 Perleugle Marka september 2012

Spurveugle (*Glaucidium passerinum*): Et ind. Nordland 18.9-2011 og 1 ind. Plantefeltet, Marka 12.10-2015*.

Hornugle (*Asio otus*): Et ind. fløy inn i bussen ca 1991 (FCH) og finnes utstoppet. Fjær av arten funnet i Gamleskogen 19.9-2011*. Et ind. Sørland 25.9-2013*.

Jordugle (*Asio flammeus*): To vårfunn: 1 ind. Marka 3.6-2020 og 1 ind. Nordland 3.6-2021. Registrert sporadisk høstene 2011, 2015, 2017, 2019 og 2020 med totalt 8-11 ind.). Fjærfunn av arten 19.9-2011, 1 ind. Plantefeltet, Marka 20.9-2011, 1 ind. Nordland 24.9-2011, 1 ind. 7.10-2015, enkeltindivider Marka 21 og 23.9-2017 samt 1 ind. funnet død Marka i oktober samme år. 1 ind. Nordland 25.9-2019, 1 ind. Marka 30.9, og 4-5.10-2019 og 1 trekkende ind. Marka 28.9-2020.

Snøugle (*Bubo scandiacus*): Et ind. observert i juni 2000 (GJO). Arten ble for øvrig registrert flere ganger på Røst denne sommeren. Et til to individer skal ha blitt observert på Håheia på slutten av 1990-tallet.

Hubro (*Bubo bubo*): Et 'sjusket' ind. ble jagd av kråker i september ca. 2003. (FCH).

Hærfugl (*Upupa epops*): Et ind. i lia over Gamleskogen 5.6-2020* er eneste funn.

Blåkinnbieter (*Merops persicus*): Totalt 7 næringssøkende individer på Tjuvneset 4.6-2021* gav en sjokkartet opplevelse for en heldig observatør. Dette var tredje funn av arten i Norge.




Figur 60 Blåkinnbieter Tjuvneset 4.6-2021 (Foto John Alsvik)

Bieter (*Merops apiaster*): 1 ind. Vardan 22.6-2004 (FCH). Ikke behandlet av NSKF. Et ind. ble for øvrig sett Røst påfølgende dag.

Vendehals (*Jynx torquilla*): Et ind. Nordland 18.9-2016. Et ind. ringmerket i Plantefeltet, Marka 24.9-2016 og 1 ind. næringssøkende Nordland 27.9-2017 er eneste høstfunn av arten. I tillegg et overraskende sommerfunn av 1 ind. Gamleskogen 12.7-2020*.



Figur 61 Vendehals fanget i Plantingen september 2016



Figur 62 Flaggspett Nordland september 2013

Flaggspett (*Dendrocopos major*): Et ind. 6.10-2004. Etter 2010 kun registrert 2013, 2015 (ca. 10 ind.), 2016 (1 ind.), 2017 (2-3 ind.) og 2021 (1 ind.) i perioden 16.8 (2013) - 15.10 (2017). I 2013 var arten uvanlig tallrik. De første fuglene ankom allerede 16.8. Det store rushet kom i perioden 21-26.9 med dagsantall på opptil 20 ind. 22 og 25.9. Arten ble regelmessig registrert fram til 4.10 dette året og den totale forekomsten kan ha vært i størrelsesorden 100 ind. Et vinterfunn med 1 ind. på foringsplass, Sørland 1.2-2021 (KSL).

Gråspett (*Picus canus*): Tilfeldig forekomst med 6-7 individer. Et ind. Nordland 29.9-2016, 1 hann forskjellige steder på øya 28.9 - 3.10-2018*. Et nytt ind. trekkende inn fra Mosken 4.10-2018*. Et ind. Breivika 15.10-2018*, 1 ind. Marka 2.10-2020, 1 ind. Sørland 7.10-2021 og 1 ind. Sørland 17.10-2021.

Tornskate (*Lanius collurio*): Tilfeldig forekomst. Loggført 10 dager, men forekomst dreier seg bare om 5 ind. 1 ind. Breivika 6.10-2004, 2 ind. (1k) sammen Nordland 17-18.9-2011* og et ind. (samme) samme sted 20.9-2011*, 1 ind. (1K) Nordland 24-27.9* og 1.10-2014* (samme fugl uten stjert), 1 ind. (adult) Røssnesvågen 25.9-2014*.



Figur 63 Tornskate Nordland september 2013

Varsler (*Lanius excubitor*): Et ind. Plantefeltet, Marka 17-18.9-2015, 1 ind. (1K) Nordland 26.9-2019* og 1 ind. Nordland 4.6-2020* er eneste observasjoner.

Nøtteskrike (*Garrulus glandarius*): Kun registrert i 2013 med 3 ind. 17.10, 4 ind. 19.10 og 12 ind. 17.11*, alle på Sørland. Arten hadde for øvrig en større invasjon i Lofoten dette året.

Skjære (*Pica pica*): Ifølge Norsk Fugleatlas (1994) konstatert hekkefugl. Usikkert om arten hekker nå, men noen få inngrodde individer. To ind. dukket opp på Værøy på begynnelsen av 2000 tallet, hvorav den ene døde etter få år (GJO). Registrert hvert år siden 2010 med unntak av 2014. Normalt 1-3 ind. (fastboende, registrert vinterstid), men 10 ind. 10.10-2012 og 5 ind. 14.10-2017 viser et visst tilslag av nytt blod.



Figur 64 Skjære Sørland september 2021

Kaie (*Corvus monedula*): Et gammelt funn av et ind. i perioden 17-29.3-1985 og 1 ind. fotografert 20.3-2021 er eneste observasjoner.

Ravn (*Corvus corax*): Hekkefugl. Observeres hele året. I høstsesongen gjerne opp mot 50 ind. eller fler. Største dagsantall 100 ind. 21.9-2013.

Kråke (*Corvus cornix*): Hekkefugl. Observeres hele året. I høstsesongen gjerne opp mot 50 ind. Største dagsantall er 65 ind. 28.9-2018, men lite energi brukt på å tallfeste arten.



Figur 65 Svartkråke Marka september 2017

Svartkråke (*Corvus corone*): Et ind. fartet rundt på Sørland, Marka og Gamleskogen i perioden 16.9 - 15.10-2017*.

Kornkråke (*Corvus frugilegus*): Kun fire til fem funn. Et ind. 1.10-2006 (FCH), 1 ind. 17.2* og 28.3-2007* (FCH) og 1 ind. forskjellige steder på Sørland, Marka og Kvalnesodden i perioden 29.8 - 4.12-2016. En voksen fugl observert jevnlig i perioden 25.5 – 21.11-2021 er antatt å være samme individ. Fuglen holdt seg hovedsakelig på Nordland, men ble også observert på Sørland og i Marka.



Figur 66 Kornkråke Nordland september 2021

Svartmeis (*Periparus ater*): Registrert kun i 2015, 2017 og 2020. En liten invasjon i september/oktober 2015 med 12-31 ind. i perioden 17-20.9, og 2-6 ind. 3-10.10. I tillegg 1 ind. 18.9-2017 og 1 ind. Gamleskogen og Plantefeltet 1-3.10-2020*.

Granmeis (*Poecile montanus*): Skal være registrert på Værøy i Vinter Atlas perioden (1993-2004). Ingen ytterligere detaljer.

Blåmeis (*Cyanistes caeruleus*): Et overraskende sommerfunn med 1 ind. Marka 11.7-2020. Om høsten kun registrert 2015, 2017 og 2018. Opptil 10 ind. 5 og 6.10-2015, 1 ind. Nordland og 1 ind. Sørland 10.10-2015, 3 ind. Sørland 14.10-2017 og 2 ind. Sørland 6.10-2018*. I tillegg 1 ind. på foring på Sørland 31.1-2021 (KSL).

Kjøttmeis (*Parus major*): Hekkefugl. Blant annet bebodd reir 22.7-2012 og 10 ind. 25.5-2019. Om høsten regelmessig (daglig) i moderate antall i perioden 13.8 (2016) - 1.11 (2010). Normale dagsantall opp til 20 ind., men opptil 30 ind. er ikke uvanlig i siste halvdel av september. Største dagsantall 60 ind. 20.9-2014, 75 ind. 23.9-2014 og 110 ind. 22.9-2013. Arten overvintrer og er blant annet registrert Sørland 26.1-2008 (2 ind.), 27.1-2019 (6 ind.) og 31.1-2021 (6 ind.).

Stjertmeis (*Aegithalos caudatus*): Sjelden høstgjest. 14-16 ind. 14.10-2005*, 7 ind. Svingen, Sørland 29.9-2013*, 5 ind. Plantefeltet, Marka 4.10-2013*, 5 ind. 29.10-2016, 7 ind. 13.10-2017* og 10 ind. Gamleskogen 15.10-2017* er eneste registreringer av arten.

Sidensvans (*Bombycilla garrulus*): Sett januar 1996 (GJO) og 2 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL). Vår/sommerfunn; 15-25 ind. Sørland 11-14.6-2008, 15 ind. Sponga 22.5-2019, 4 ind. Sørland 25.5 og 9 ind. Nordland 26.5-2019 og 4 og 15 ind. henholdsvis 4 og 5.6-2020. Sporadisk forekomst om høsten, men registrert hvert år siden 2014 med unntak av 2021. Påvist 21 dager som fordeler seg over perioden 18.9 (2016) - 29.10 (2016). Normalt under 10 ind. per observasjonsdag, men 14 ind. 24.9-2014 og ikke mindre enn 100 ind. 29.10-2016.



Figur 67 Sidensvans Sørland september 2014


Sanglerke (*Alauda arvensis*): Status som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994) vurderes nå som usannsynlig. Et ind. 15.6-1980 (NOF-NINA-DF). Enkeltindivider 20.9-2011, 22.9-2013 og 29.10-2016 er eneste 'nyere' funn av arten.

Sandsvale (*Riparia riparia*): Sett sommeren 1992 (GJO) og 1 ind. 6.8-2001. Kun et nyere funn av 2 ind. Sørlandsvågen 11.7-2020.

Låvesvale (*Hirundo rustica*): Hekket Prestegården, Nordland i 1984. Registrert juni/juli 1982, 1985, 2005. Av nyere observasjoner 3 ind. 9.6-2011, 3 ind. Nordland 5.6-2020, 2 ind. Sørland 25.5-2021 og opp til 6 ind. Nordland i juni 2021. Ellers observert sporadisk og fåtallig (1-7 observasjoner) hver høst siden 2011 med unntak av 2015 i perioden 20.8 (2013) - 17.10 (2018). Største dagsantall 6 ind. 26.9-2017 og 10 ind. Tabbisodden 28.9-2020.

Taksvale (*Delichon urbicum*): Tre ind. Sørland 1.7-1982, 1 ind. 16-18.6-1989, 2 ind. Røssnesvågen 21.9-2013, 1 ind. Nordland 26.9-2013 og 1 ind. Sørland 22.9-2016 er eneste registreringer av arten.

Bøksanger (*Phylloscopus sibilatrix*): Nesten årviss i lite antall. Siden 2011 registrert alle år med unntak av 2014 og 2017. Observert totalt 53 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 13.8 (2016) - 4.10 (2018). Antallet individer er betydelig færre da flere av fuglene har holdt seg over flere dager, Blant annet 1 ind. Gamleskogen 8-13.9-2019. En ringmerket fugl fra Plantefeltet, Marka 15.9-2018 dukket opp på Nordland 18.9-2018 (ringnummer verifisert). Forekomsten 2011 - 2021 dreier seg sannsynligvis om 25 forskjellige individ (Fig. 74). Flest funn i 2021 med 6 individer. Største dagantall 2 ind. 19.9-2016, 16.9-2018 og 10.9-2019 og flere dager i 2021. Tretten av fuglene er funnet i perioden 16-25 september, men denne dominansen er nok preget av dekningsgraden. Flest funn er gjort i Gamleskogen.



Figur 68 Bøksanger - årlig og sesongmessige fordelingen av den reelle forekomsten 2011-2021




Figur 69 Bøksanger Gamleskogen september 2021

Gulbrynsanger (*Phylloscopus inornatus*): En signatur art for Værøy som er den klart beste lokaliteten for arten i Norge. Gulbrynsanger ble første gang registrert på Værøy 6.10-2004. Etter dette ble 6-10 ind. observert i perioden 24-28.9-2010. Fra 2011 til 2021 er arten registrert 165 dager (av 239


observasjonsdager) i perioden 3.9 (2015) - 15.10 (2017). Totalt ble 1747 individer loggført i denne perioden. Enkelte fugler har beviselig holdt seg over flere dager, bl.a. et ringmerket ind. i Gamleskogen som holdt seg på lokaliteten en uke i 2019. Ringmerking (353 individer) har imidlertid gitt overraskende få lokale gjenfangster (de fleste senest dagen etter merking) og få fugler er observert med ring (1-2 %) i eller utenfor fangstfeltet. Store variasjoner i antall fra dag til dag viser også at de fleste fuglene passerer raskt gjennom øya. Forekomsten disse ti årene er antatt å ligge på rundt 1600 - 1700 individer. Den årlige forekomsten viser store variasjoner fra 13 loggførte ind. i 2021 til 396 ind. i 2013 (Fig. 75). Nest beste år var 2016 med 341 loggførte ind. De fleste fuglene er registrert i perioden 16-25 september (Fig. 77), blant annet 811 ind. i femdagersperioden 21-26 september. Denne sesongmessige fordelingen er delvis en effekt av dekningsgraden (antall observasjonsdager og antall observatører). Deler man antall loggførte individer på antall observasjonsdager i femdagersperiodene (Fig. 76) blir bildet mer nyansert og viser at hovedtrekket (iallfall enkelte år) starter allerede fra femdagersperioden 6-10 september. Gulbrynsangeren kan i realiteten opptre i gode antall fram til rundt 5 oktober og er kun unntaksvis registrert etter dette. Seneste observasjon var 1 ind. i Marka 16.10-2018.

Den eksepsjonelle forekomsten i 2013 varte i realiteten kun 6 dager i perioden 21-26 september (96% av loggførte ind.) med dagsantall fra 12 til 160 ind. Den 22.9 dette året ble det loggført ikke mindre enn 160 ind. Arten ble i realiteten funnet over alt på øya, gjerne flere ind. sammen. Blant annet ble ca. 15 ind. observert sammen mens de varslet på en haukugle i Gamleskogen. I 2016, det nest beste året, varte toppen i 11 dager i perioden 17-27 september (91% av loggførte ind.) med dagsantall fra 9 -70 ind. Høsten 2021 ble imidlertid et skikkelig antiklimaks med kun 11-13 individer og bekreftet et veldig svakt innsig av østlige (sibirske) arter denne høsten.

Sporadisk nettfangst var forsøkt i 2014 men ble intensivert i 2016. Fram til og med 2021 er 353 individer ringmerket. Flest merkinger ble gjort sesongen 2018 med 108 ringmerkete ind. (40% av alle loggførte ind. dette året). Nettfangsten har vist at fuglene, i det minste i perioder, passerer raskt gjennom øya og mange ville forblitt uoppdaget uten fangst. På gode trekkdager er det høyst sannsynlig at arten er underrapportert. De beste fangstdagene er 25.9-2017 med 30 ind. og 13.9-2018 med 28 ind.



Figur 70 Årlig fordeling av alle observerte gulbrynsangere på Værøy i perioden 2011 – 2021



Figur 71 Sesongmessig fordeling av alle observerte gulbrynsangere og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)



Figur 72 Gulbrynsanger Plantefeltet september 2019

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): Ingen direkte hekkefunn, men observasjoner av syngende individer både på Nordland, Sørland og Gamleskogen i juni/juli 1989, 2004, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2020 og 2021 indikerer hekking. Vanligste *Phylloscopus* gjennom høsten og observert regelmessig (daglig) i moderate antall i perioden 11.8 (2016) - 29.10 (2015 og 2016). Vanlig i dagsantall mellom 10-30 i september og 5-10 ind. i oktober. Største dagsantall 50 ind. 22.9-2013.

'Sibir' Gransanger: Fugler som viste draktkarakterer og lyd til den østlige grå rasen *P. c. tristis/abietinus* er registrert med 1 ind. ringmerket Plantefeltet, Marka 21.9-2014, 1 ind. 3.10-2015, 1 ind. 11.10-2015, 1 ind. 29.10-2015, 3 ind. 24.9.2019*, 15.9-2020* og 29.9-2020. To av fuglene i 2019 holdt seg på samme sted, henholdsvis Trerekka, Nordland fram til 30.9- 2019 og Plantefeltet, Marka fram til 1.10-2019. Sistnevnte ble også innfanget og ringmerket. Underarten er høyst sikkert underrapportert.



Figur 73 Gransanger av den østlige underarten *P.c. tristis/abietinus* Trerekka, Nordland september 2020



Figur 74 Brunsanger Nordland september 2021

Brunsanger (*Phylloscopus fuscatus*): Et ind. Nordland 29.9-2021 er eneste funn.

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): Hekkefugl. Observeres regelmessig i hekketiden flere steder på øya. De fleste fuglene forlater/passerer øya i august. Få observasjoner fra denne måneden, men 30 - 40 ind, Marka, Nordland og Måstad 13-16.8-2016. Registrert fåtallig i september og uvanlig i oktober

fram til 12.10 (2017). Totalt 74 observasjonsdager (av 239) i september og oktober. September forekomsten utgjør neppe fler enn 20-40 ind. per år.

Einersanger (Phylloscopus nitidus): Et ind. i Gamleskogen i perioden 4-14.9-2021. Den 9.9-2021 hang fuglen tilfeldig i et nett i plantefeltet og ble ringmerket. Dette var andre funnet av arten i Norge.



Figur 75 Einersanger ringmerket Plantefeltet september 2021



Figur 76 Lappsanger Gamleskogen september 2020

Lappsanger (*Phylloscopus borealis*): Et ind. fotografert Gamleskogen 3.9-2015*. To ind. Gamleskogen 15.9-2020*. En av fuglene holdt seg samme sted fram til 17.9-2020*.

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Hekkefugl. 1 ind. 19.6-2005. Syngende fugl Røssnesvågen 21.6-2010 samt syngende og fugl med mat til unger Langholmen, Sørland Juli 2012. 2 ind. Nordlandshagen 11.7-2020. Opptil 3 ind. Nordland 3-4.6-2021 og 4 ind. Sørland i passende hekkebiotop 6.6-2021. Høstforekomsten begrenser seg til observasjon av fire individer. Et ind. ved bensinstasjonen, Sørland 23.9-2012, 1 ind. Plantefeltet, Marka 17-20.9-2016 og 2 ind. Svingen, Nordland 20.9-2016.

Busksanger (*Acrocephalus dumetorum*): Totalt 6 individer er registrert. Et ind. Kvalneset 22-23.9-2012*, 1 ind. Nordland 19-21.9* samt et nytt ind. på samme lokalitet 21.9-2016, 1 ind. Nordland 27.9-2017*, 1 ind. Sørland (Svingen) 15.10-2017*, 1 ind. Barnberget, Nordland 25.9-2018* ble innfanget og ringmerket. En ubestemt *Acrocephalus sp.* som trolig var denne art observert kort på Nordland 10.9-2019.



Figur 77 Busksanger fanget Barnberget september 2018

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): Et ind. innfanget og ringmerket Trerekka, Nordland 9.9-2019*.

Starrsanger (*Locustella certhiola*): Et ind. Nordland 21 og 23.9-2016* er eneste observasjon av arten.

Stripesanger (*Locustella lanceolata*): Et ind. Barnberget, Nordland 24.9-2016*. Fuglen ble innfanget og ringmerket.

Gresshoppesanger (*Locustella naevia*): Et ind. Plantefeltet, Marka 20.9-2013* er eneste observasjon av arten.

Sumpsanger (*Locustella luscinioides*): Et ind. Barnberget, Nordland 22.9-2017* er eneste observasjon av arten.




Figur 78 Rørsanger fanget Nordland september 2019



Figur 79 Stripesanger fanget Barnberget september 2016

Munk (*Sylvia atricapilla*): Enkeltindivider Sørland og Gamleskogen henholdsvis 3 og 4.6-2021 er første vårobservasjoner og sannsynligvis på trekk. Regelmessig i mindre antall i perioden 30.8 (2015) - 30.10 (2015). Totalt registrert 118 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 - 2021. Normalt i dagsantall på 1 - 5 ind., men opptil 10 ind. ikke uvanlig. I slutten av september 2018 var arten mer tallrik enn vanlig med høyeste dagsantall på 30 ind. 27.9-2018. Verd å merke seg er og 16 ind. så sent

som 15.10-2018 og 17 ind. 29.10-2015. Arten var for øvrig spesielt fåtallig i 2020 og forekomsten utgjorde neppe fler enn 10 ind. En vinterobservasjon, 5 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Figur 67 viser den sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall observasjonsdager).




Figur 80 Munk sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)




Figur 81 Hagesanger Nordland september 2018

Hagesanger (*Sylvia borin*): Regelmessig i lite antall om høsten i og registrert 79 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021 i tidsrommet 4.9 (2021) - 15.10 (2018). Også et tidligere funn 1 ind. 6.8-2001 som også er tidligste registrering av arten. Dagsantall vanligvis 1-3 ind. og antall over 5 ind. er uvanlig. Største dagsantall 10 ind. 27.9-2018. Figur 65 viser den sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall observasjonsdager) og viser en markert topp i forekomsten i siste halvdel av september.



Figur 82 Hagesanger - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)

Hauksanger (*Curruca nisoria*): Registrert i lite antall hver høst fra 2012 til 2021. Arten er observert 36 dager med en estimert totalforekomst på 25 individer. Flere av fuglene har holdt seg i mer eller mindre samme bærbusk over flere dager. Den sesongmessige fordeling av observasjoner er vist i Figur 70 og viser stor dominans i 10 dagers perioden 16-25.9 som også er det best dekkete tidsintervallet. Tidligste funn er 1 ind. Nordland 3.9-2015 og seneste 1 ind. 11.10-2017. Flest fugler ble registrert i 2015 med antatt 6 forskjellige individer. Forekomsten har vært betydelig svakere de siste årene, selv med bedre dekning og kun registrert med et ind. hver de siste tre årene (2019-2021) Største dagsantall er 3 ind. 19, 20 og 22.9-2014. Alle registrerte fugler har vært ungfugler.




Figur 83 Hauksanger - årlig fordeling av forskjellige individer og den sesongmessige fordelingen av alle observasjoner



Figur 84 Hauksanger Marka september 2021

Møller (*Curruca curruca*): Eneste vårfunn er 1 ind. 4-5.6-2020 og 3 ind. Nordland og 1 ind. Sørland 3.6-2021. Regelmessig i lite antall hver høst fra 2011 til 2021 i perioden 4.9 (2015) - 29.10 (2016). Totalt 74 observasjonsdager (av 239) i perioden 2011 - 2021. Forekomsten i perioden 2011 til 2021 er vurdert å være minimum 87 individer med 15 ind. hver i toppårene 2013, 2016 og 2018. Kun 1 ind. 2015, 2 ind. 2017 og 3 ind. 2021. Det høyeste dagsantallet er 9 ind. 22.9-2013. Figur 68 viser den årlige fordeling av estimert årstotal, samt den sesongmessige fordelingen av alle observerte ind.



Figur 85 Møller - årlig fordeling av forskjellige individer og den sesongmessige fordelingen av alle observasjoner

Tornsanger (*Curruca communis*): Arten registrert kun tre ganger; 1 ind. Sørland 24.9-2012*, 1 ind. Trerekka på Nordland 16.9-2018* og 1 ind. samme sted 10.9-2019*.

Fuglekonge (*Regulus regulus*): Har muligens hekket. 2 syngende ind. 18.5-1977. Regelmessig i lite antall om høsten i perioden 8.9 (2019) - 29.10 (2015), men svært variabel forekomst fra år til år. Loggført 119 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 til 2021. Vanligvis færre enn 10 ind. per dag, men antall på opp mot 20 eller 30 ind. som regel noen dager hver høst. Største dagsantall 45 ind. 18.9-2015 og 1.10-2020. Klart mest tallrik i siste halvdel av september. Et vinterfunn 1 ind. Skogen 8.12-2017. Flest observasjoner av arten i Plantefeltet og Gamleskogen.

Gjerdsmett (*Troglodytes troglodytes*): Hekkefugl. Registrert syngende i passende hekkebiotop i juni/juli flere år. Forekommer nesten daglig i moderate antall i perioden ultimo august - 20.10 (2016). Vanligvis i dagsantall på under 20 ind., men antall på opp mot 30 ind. ikke uvanlig i siste halvdel av september. Største dagsantall 40 ind. flere dager. Høsten 2019, 2020 og 2021 var arten uvanlig fåtallig med dagsantall stort sett under 20 ind. Regulær vintergjest (FCH), blant annet 2 ind. Nordland 12.1-2008 og 3 ind. Sørland 16.1-2009.

Trekryper (*Certhia familiaris*): Tilfeldig forekomst med 8 observasjoner. 2 ind. Gamleskogen 25.9-2013, 1 ind. Gamleskogen 22.9-2014, 1 ind. Nordland 10.10-2015, 1 ind. Nordland 27.9-2016, 1 ind. ringmerket Plantefeltet, Marka 27.9-2017, minst 1 ind. Gamleskogen 5-27.9-2020 1 ind. Gamleskogen 19-23.9-2021 (ringmerket) og 1 ind. Gamleskogen 29-30.9-2021 (ringmerket).

Rosenstær (*Pastor roseus*): En voksen fugl fotografert på Sørland 4.7-2020*. En voksen fugl på Sørland 7.6-2021* og på kirkegården, Nordland 27.6-2021* kan teoretisk være samme fugl.

Stær (*Sturnus vulgaris*): Hekkefugl. I løpet av høsten vanligvis noen få flokker som holder seg over lengre tid. Normalt 50 -200 ind. Største dagsantall 350 ind. 11.10-2015. Også vinterfunn, blant annet 5 ind. 1.1-2005, 6 - 22 ind. Sørland 16-24.2-2007, ca. 30 ind. 1.1-2008, minst 30 ind. 8.1-10.3-2009 (FCH) og 11 ind. Sørland 31.1-2021 (KSL).



Figur 86 Trekryper Gamleskogen september 2011

Gulltrost (*Zoothera aurea*): Et ind. Gamleskogen 24-27.9.2016*. Dette var for øvrig Norges første 'kryssbare' individ. Et ind. ble observert kort i Plantefeltet 28.9-2020*. Fuglen ble ikke funnet igjen til tross for iherdig leting, men 2.10* hang sannsynligvis den samme fuglen tilfeldig i et av ringmerkingsnettene i Plantefeltet.




Figur 87 Gulltrost Plantefeltet oktober 2020

Sibirtrost (*Geokichla sibirica*): 1K hunn havnet tilfeldig i et fangstnett og ble ringmerket i Plantefeltet 25.9-2017*.



Figur 88 Sibirtrost (1K hun) Plantefeltet september 2017 (Foto John Alsvik)

Måltrost (*Turdus philomelos*): En syngende fugl Skiphalsen 1 og 3.7-2016, 1 ind. 3.6-2020 og 1 ind. Gamleskogen 4.6-2021 kan være hekkefugl. Om høsten regelmessig i moderate antall i perioden 4.9 (2021) - 30.10 (2015). Registrert 141 dager (av 239 observasjonsdager) fra 2011 – 2021 og i september nesten daglig. Dagsantall som regel under 10 ind., men dagsantall 10-20 ikke uvanlig. Største dagsantall 30 ind. 24.9-2013.



Figur 89 Måltrost - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)

Duetrost (*Turdus viscivorus*): To ind. Nordland 26.5-2019* er eneste observasjon av arten.


Rødvingetrost (*Turdus iliacus*): Fugl med mat til unger observert 6.6-2021 er første konkrete observasjon av hekking, men arten er antatt å hekke spredt. Observasjoner av fugler (bl.a. syngende) i juni og juli 2010, 2011, 2016, 2017 og 2021 kan være hekkefugler. Også 20 ind. Skiphalsen 25.5-

2019 og ca. 20 ind. spredt rund på øya 3.6-2020. Tidligste vårfunn 1 syngende fugl Marka 18.4-2021. Regelmessig i varierende antall om høsten i perioden ultimo august til 29.10 (2016). Som regel i dagsantall på færre enn 100 ind., men forekommer i økende antall i slutten av september og oktober og dagsantall på 200-300 ind. er ikke uvanlig. Største dagsantall 2000 ind. 28.9-2019. Enkeltindivider av den islandske underarten *T. i. coburni* observert Torrvågan, Sørland 26.9-2018 og ringmerket Plantefeltet, Marka 28.9-2018. Vedvarende vestlige vinder tilsier nok at et betydelig større antall av fuglene denne høsten tilhørte denne underarten. Vinterfunn; 3 ind. Sørland 24.2-2007 FCH), 1 ind. Sørland 25.1-2009 (KSL) samt 10 ind. Gamleskogen 8.12-2017.

Svarttrost (*Turdus merula*): Et ind. 11.6-2011, 1 ind. 25.5-2019, 2 ind. 3.6-2020, 2 ind. Gamleskogen 11.7-2020 og 2.6-2021 kan være hekkefugler. Fem voksne fugler ringmerket 8 og 10.9-2018 og kontrollert flere ganger utover i september, kan være lokale fugler. Regelmessig i lite antall om høsten i perioden 8.9 (2019) - 29.10 (2016). Totalt 136 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. Dagsforekomsten dreier seg normalt på 1 - 5 individer og kun 7 dager har dagsantallet oversteget 6 ind.; 35 ind. 29.10-2016, 20 ind. 29.10-2015, 8 ind. 17.9-2011 og 10 ind. 6.10-2004 og 6 ind. 9 og 28.9 2021 og 7.10 2021. Vinterfunn, 1 ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ), 1 ind. 12.02.2014 (KRØ), 2 ind. Sørland 27.1-2019 (KSL), 1 ind Sørland 31.1-2021, 1 ind. Stølen 3.2-2021 samt 5 ind. Gamleskogen 8.12-2017.

Gråtrost (*Turdus pilaris*): Registrert som hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Observasjoner av arten mai/juni 1982, 18.6-1989, 10.6-2005 (NOF-NINA-DN), 1.7-2013, 10.7-2014, 25.5-2019 3.6-2020 og 10-11.7-2020 og mai/juni 2021 kan være hekkefugler. Regelmessig høst i moderate antall i perioden 4.9 (2021) - 29.10 (2015, 2016). Totalt 162 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. Dagsantallet varierer mye, men sjelden over 50 ind. Største dagsantall 200 ind. 6.10-2015, 21.10-2017 og 28.9-2019. Vinterfunn, 15 ind. Sørland 25.1-2009 (FGJ), 70 ind. Sørland 8.12-2017.

Ringtrost (*Turdus torquatus*): En karakterart for Værøy. Hekkefugl. Flere registreringer juni/juli 1982, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 og 2021, blant annet mating av fugler utenfor reir. Om høsten regelmessig (daglig august og september) i moderate til store antall, men svakere forekomst 2017-2020. Totalt 166 observasjonsdager (av 239) fra 2011 - 2021. Registrert i perioden ultimo august til 15.10 (2017). På grunn av artens habitatvalg, vanskelig å tallfeste, men som regel dagsantall på færre enn 50 ind. Dagsantall på hundre eller fler er imidlertid ikke uvanlig. Største dagsantall 300 ind. 21.9-2013, 250 ind. 23.9-2013 og 250 ind. 19.9-2014. Figur 62 viser den sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på obsdager). Et tidlig vårfunn; 2 ind. Nordland 10.3-2009.



Figur 90 Ringtrost - sesongmessige fordeling av alle observasjoner og den normaliserte sesongmessige fordelingen (totalantall delt på antall obsdager i 5 dagers perioder)



Figur 91 Ringroost Nordland september 2014

Rødstrupe (*Erithacus rubecula*): Sannsynlig hekkefugl. Observasjoner av voksne fugler 11.6.2009 og 25.5-2019 samt voksen og ungfugl Gamleskogen 11-14.8-2016 indikerer hekking. Ringmerking av 4 ind. i tilnærmet pullus drakt 8 - 14 9-2019 og gjenfanget flere ganger fram til 25.9 er og antatt å være lokale fugler. Regelmessig i lite antall om høsten i perioden 4.9 (2021) - 1.11 (2009). Sjeldent dagsantall på flere enn 5 ind. Største dagsantall 12 ind. 21.9-2011. Eneste vinterfunn er 1 ind. vinteren 2007 (GJO).



Figur 92 Blåstrupe Nordland september 2019

Blåstrupe (*Luscinia svecica*): Hekkefugl. Blant annet funnet hekkende Måstad (2010), Sørland (2012) og Bjørgan (2016). Tre hanner Nordland og 3 hanner Sørland ultimo mai 2019 samt enkeltindivider Skardsura, Nordland og Måstad 14-16.8-2016 er og muligens hekkefugler. Opp til 12 ind på Sørland og Nordland 6.6-2021. Tidlig vår observasjon 2 ind. (par) 17-18.4-2004 (FCH). Tilfeldig forekomst om høsten med kun 7 observasjoner; 1 ind. Kvalneset 19.9-2012, 2 ind. Nordland 20.9-2014, 1 ind. Nordland 21.9-2014, 1 ind. Plantefeltet, Marka 24.9-2016, 1 hann Nordland 7.9- 2019, 2 ind. (1K hann) Nordland 10.9-2019 og en ungfugl Nordland 23.9-2019.

Blåstjert (*Tarsiger cyanurus*): Seks funn. En ungfugl Gamleskogen og Plantefeltet 19 - 22.9-2012*, 1 ungfugl Gamleskogen 20.9-2013*, 1 ungfugl Plantefeltet, Marka og Gamleskogen 24.9-2013*, en ungfugl Nordland (Svingen og Trerekka) 27-28.9-2018* 1 ungfugl (veldig blast individ) Gamleskogen 25 og 28.9-2020* er antatt å være samme fugl. Ytterligere et ind. (kraftig farget) ble registrert i plantefeltet 28.9-2020*.



Figur 93 Blåstjert Gamleskogen september 2012

Mugimakifluesnapper (*Ficedula mugimaki*): En ungfugl, trolig hunn Svingen, Sørland 12-13.10-2017*. Dette var første og så langt eneste norske funn.

Dvergfluesnapper (*Ficedula parva*): Sporadisk forekomst høst. Påvist hver høst siden 2012 med unntak av 2017, 2018 og 2020 i perioden 7.8 (2016) til 6.10 (2021). Totalt 11 forskjellige ind. 1 ind. (1K) Gamleskogen 18-19.9-2012*, 2 ind. (1K) Marka 25.9-2012*, 1 ind. (2K+ hann) Marka 22-26.9-2013*, 1 ind. (hunnfarget) Marka 26.9-2013*, 2 ind. Gamleskogen 4.10-2013*, 1 ind. (1K) Plantefeltet, Marka 22.9-2014*, 1 ind. 5.10-2015*, 1 ind. (ad hann) Gamleskogen 7 og 11-16.8-2016* og 1 ind. (hunnfarget) samme sted 14 og 16.8-2016*, 1 ind. (1K) Gamleskogen 9.9-2019*, 1 ind. (1K) Nordland 28-30.9-2019*, 1 ind. (1K) Gamleskogen 30.9-2021* og 1 ind. (1K) Sørland 6.10-2021*.



Figur 94 Dvergfluesnapper Gamleskogen september 2012

Svarthvit Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*): Hekkefugl. Blant annet hekkefunn juli 2005 Nordland, 2010 Sørland, 2012 (Sørland), 2017 Gamleskogen og 2020 Gamleskogen. Også 8 ind. 26.5-2019 som er høyeste dagsantall. Tidligste funn 1 ind. 17.5-2004. Sparsom forekomst om høsten og registrert hver høst siden 2012. Loggført 67 dager av 239 observasjonsdager fra 2011 til 2021 i perioden 11.8 (2016) – 1.10 (2020). De fleste fuglene er registrert i september og høstforekomsten har variert fra 3 (flere år) til 12-15 ind. (2019). Største dagsantall om høsten 7 ind. 8.9-2019.

Gråfluesnapper (*Muscicapa striata*): Vårfunn; 2 ind. Gamleskogen 13.6-2011, 1 ind. Sørland 25.5 og Marka 28.5-2019 og 2 ind. Gamleskogen og 1 ind. Nordland 4.6-2020. Fåttallig høst og loggført 29 dager fra 2011 til 2021 i perioden 13.8 (2016) - 10.10 (2012). Flere av fuglene har holdt seg over flere dager (e.g. 1-2 ind. Gamleskogen 8-16.9-2019) og forekomsten siden 2011 utgjør neppe fler enn 18-20 ind. Registrert hvert år siden 2011 med unntak av 2013 og 2014. Flest fugler loggført i 2017 med 5 ind. Ved flere anledninger observert 2 ind. sammen. Høyeste dagsantall 3 ind. 4.6-2020.

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Hekkefugl. Funnet hekkende Gamleskogen juli 2017. Voksne fugler 6.8-2009, ultimo mai 2019 og 4.6-2020 er og mulige hekkefugler. Ellers sporadisk opptreden om høsten. Fra 2011 til 2021 observert hver høst med unntak av 2011 og 2018. Registrert 30 dager av 239 observasjonsdager i perioden 14.8 (2016) - 5.10 (2019). Vanligvis enkeltindivider, men 2 ind. 24.9-2013, 20.9-2014 og 30.8-2015, 3 ind. 23.9-2021 og 4 ind. 29.9-2021. Noen av fuglene har holdt seg i flere dager, blant annet en voksen hann i Gamleskogen og Plantefeltet 17-24.9-2019. Forekomsten dreier seg sannsynligvis ikke om flere enn 24-28 ind. fra 2011 til 2021, flest i 2021 med 7-9 ind.

Svartrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): En hunnfugl Nordland 4-5.6-2020 er eneste funn.



Figur 95 Gråfluesnapper Gamleskogen september 2019

Buskskvett (*Saxicola rubetra*): Et ind. Sørland 2-3.6-2021 er muligens vårtrekk. Et ind. 9.7-2004 og 2 ind. 19.6-2005 kan være hekkefugler. Svært fåtallig høst; 1 ind. Håheia 20-8-1982, 1 ind. ved Flyplassen 14.8-2007 (K.M.Olsen), 1 ind. Sprengern 19 og 21.9-2011, 1 ind. 20, 22 og 24.9-2014, 1 ind. 20-21.9-2016, 1 ind. 16.9-2018, 1 ind. 19.9-2019, 1 ind. Nordland 5.9-2020 og 1 ind. Teisthammaren 24.9-2020.



Figur 96 Asiasvartstrupe (russe/taigasvartstrupe) Nordland september 2012

Asiasvartstrupe: En ungfugl Breivika 24.9-2010*, 1 ungfugl Nordland 21.9-2012*, 1K hann Svingen, Nordland 26-27.9-2017*. Asiasvartstrupe ble i 2021 splittet i to arter, russesvartstrupe og taigasvartstrupe. Per i dag kan ingen av asiasvartstrupene fra Værøy artsbestemmes nærmere.

Steinskvett (*Oenanthe oenanthe*): Hekkefugl. Antatt vanlig med flere indirekte eller konkrete hekkefunn, bl.a. 2005, 2010, 2012, 2016 og 2021. Største dagsantall sommer 23 ind. 1.7-2013. Regelmessig i lite antall høst i perioden medio august til 30.10 (2015 og 2016). Registrert 94 dager (av 239 observasjonsdager i løpet av høsten i perioden 2011 - 2021. Normalt færre enn 5 ind. per dag, men 20 ind. 22.9-2013, 13 ind. 7.9-2019 og 8 ind. 23-24.9-2021. I forbindelse med to kraftige vestlige stormer 21 og 23 september 2020 dukket arten opp i større antall enn normalt og i perioden 22-26.9 varierte antallet fra 15 til 32 individer. Disse fuglene var kraftige og lyse og tilhørte sannsynligvis den grønlandske underarten *O. o. leucorhoa*.

Fossefall (*Cinclus cinclus*): Et ind. 21-22.10-2017 og 1 ind. Breivika 30.9-2018*.

Gråspurv (*Passer domesticus*): Hekkefugl. En liten flokk på 15-20 ind. har holdt stand på Nordland siden 2011. Ellers flokker av varierende størrelse på Sørland og Røssnesvågen. Normalt loggført 50-150 ind., men lite energi brukt på å tallfeste arten. Største dagsantall 350 ind. 20.9-2014. Et ind. 21.9-2019, 17 og 24.9-2020 (Stølen) samt 24 (Stølen) og 27.9-2021(Sørland) viste karakterer som samsvarer med hybridisering med pilfink og er antatt å være samme 'inngrodde' fugl.

Pilfink (*Passer montanus*): Eneste observasjon er 1 ind. sammen med gråspurv ved heliporten 19.9-2015.

Jernspurv (*Prunella modularis*): To ind. Nordland 1-9.7-2013 kan indikere hekking. Vanlig i moderat antall om høsten i perioden 8.9 (2019) - 15.10 (2018). Ringmerking ved hjelp av lyd har vist at arten er mer tallrik enn opprinnelig antatt og har resultert i 252 ringmerkete ind. i perioden 2014-2021, blant annet 94 ind. i 2019. Største dagsantall 26 ind. hvorav 17 ind. ble ringmerket.



Figur 97 Sitronerle Sørland september 2014

Sitrerle (*Motacilla citreola*): Voksen hunn Måstadveien, Sørland 17-9-2011, 1 ungfugl diverse steder på Sørland 20-25.9-2014*, 2 ungfugler sammen på Sørland 19.9-2015* og 1 ind. Nordland 7.9-2019*.

Gulerle (*Motacilla flava*): Overraskende fåtallig. Kun seks observasjoner. En ungfugl Sørland 16.9-2011*, 1 ind. 19.9-2012*, 2 ind. Langholmen 12.7-2020, 1 ungfugl Nordland 9-11.9-2020, 1 ind. (hunn) Nordland 4.6-2021 og 1 ind. Marka 11.9-2021.

Vintererle (*Motacilla cinerea*): Enkeltindivider 29.10-2015* og 29.10-2016*. Enkeltindivider Nordland 28* og 30.9.2019* antas å være samme fugl.


Linerle (*Motacilla alba*): Hekkefugl. Tidligste funn 1 ind. 7.4-2004 (FCH) og 1 ind. Røssnesvågen 30.3-2020. Vanlig i moderate antall høst i perioden august og september. Normal dagsforekomst ligger under 20 ind. Største dagsantall 30 ind. 18.9-2016. Avtar i antall i siste halvdel av september og etter september er arten fåtallig og seneste observasjon er 1 ind. 21.11-2013.

Tartarpiplerke (*Anthus richardi*): Totalt fire funn. To direkte trekkende ind. over Nordland 19.9-2012*, 1 ind. Nordland 24-25.9-2013*, 1 ind. Stølen 26.9-2013* og 1 ind. 30.10-2015*.

Heipiplerke (*Anthus pratensis*): Hekkefugl. Vanlig i moderate antall høst og registreres daglig. Største dagsantall 250 ind. 20.9-2016. Seneste observasjon 3 ind. 31.10-2009.

Trepiplerke (*Anthus trivialis*): Overraskende fåtallig og med unntak av 2 ind. 4.9-2021 kun enkeltindivider registrert 9 dager fra 2011 til 2019 i perioden 10.9 (2018) - 10.10 (2012). Tre observasjoner i 2017 og 2 i 2013. Ellers enkeltobservasjoner i 2012, 2014, 2016, 2018 og 2021.

Sibirpiplerke (*Anthus hodgsoni*): Registrert totalt 41 dager og påvist alle år i fra 2011 til 2020 i perioden 13.9 (2018) - 15.10 (2017). Den totale forekomsten er vurdert å dreie seg om minimum 43 forskjellige individer av hvilke 14 ind. er ringmerket. Beste år er 2017 og 2019 med minimum 10 forskjellige individer. Over 90 % av fuglene er registrert i perioden 16 - 27 september. Forekomsten er vist i Figur 54. Økningen i antall fra 2017 til 2019 knyttes opp mot lydavspilling og nettfangst. I 2019 ble for eksempel 7 av 10 ind. fanget og ringmerket ved hjelp av lyd. 2021 ble første året uten at arten ble registrert siden 2010 og gjenspeiler den nesten totale mangelen på innsig av østlige (sibirske) arter denne høsten.



Figur 98 Årlig fordeling av funn av Sibirpiplerke og sesongmessig fordeling av alle observasjoner fra 2011 til 2020

Tundrapiplerke (*Anthus gustavi*): Totalt 3 ind. Et ind. Vågen (v/Fiskarheimen) 18.9-2012*, 1 ind. Nordland 22.9-2016*, 1 ind. Marka 26-27.9 og trolig samme ind. samme sted 1.10-2016*.

Lappiplerke (*Anthus cervinus*): En voksen fugl Vardan, Sørland 21.9-2016* og 1 voksen fugl Nordland 20 og 21.9-2019* er eneste registreringer av arten.



Figur 99 Sibirpiplerke Sørland september 2011

Skjærpiplerke (*Anthus petrosus*): Hekkefugl. Flere observasjoner i hekketiden. Blant annet 10 ind. henholdsvis 11.7-2017, 25.5-2019, 3.6-2020, 10 ind. Sørland 25.5-2021 og 8 ind. Nordland 2.6-2021. Vanlig og tallrik om høsten. Lite energi brukt på å tallfeste forekomst. Største registrerte dagsantall 65 ind. 5.9-2020, men sannsynligvis betydelig høyere antall på gode dager. Seneste daterte observasjon 30.10-2016, men arten skal overvintre regelmessig (FCH), bl.a. 6-8 ind. Nordland 12.1-2008.



Figur 100 Skjærpiplerke Nordland september 2020

Bokfink (*Fringilla coelebs*): Et ind. 25.5-2019 og 2 ind. 4.6-2020 er eneste loggførte fugl utenom høstsesongen. Regelmessig i moderate antall om høsten. De første fuglene ankommer tidlig i september. Fra midten av september mer tallrik med normale dagsantall på 10-30 ind., men 40-50 ind. ikke uvanlig. Største dagsantall 120 ind. 23.9-2014. Seneste registrering av arten er 25 ind. 29.10-2016.

Bjørkefink (*Fringilla montifringilla*): To vårfunn; enkeltindivider 25.5-2019 og 4.6-2020. Også registrert om sommeren med 1 ind. 11.7-2010. Vanlig om høsten og observeres nesten daglig i september og oktober. De første få ind. allerede i august, blant annet 1 ind. Måstad 16.8-2016. De fleste fuglene passerer i september og begynnelsen av oktober. Seneste registrering 2 ind. 29.10-2015. I september og oktober normale dagsantall på opp mot 50-100 ind., men antall på 100 - 200 ikke uvanlig. Største dagsantall 300 ind. 20.9-2019, 25.9 og 29.9-2021. Vinterfunn, 1 ind. Sørland 25.1-2009 og 1 ind. samme sted 30.1-2011(KSL).

Kjernebiter (*Coccothraustes coccothraustes*): Eneste observasjoner er 1 ind. 17.5-2004 (FCH) samt en ungfugl på Nordland om morgenen 30.9-2020*. Sistnevnte fugl dukket opp i Plantefeltet senere samme dag og ble ringmerket. Sannsynligvis samme fugl ble sett igjen i Plantefeltet 2.10-2020*.



Figur 101 Kjernebiter ringmerket Plantefeltet september 2020

Dompap (*Pyrrhula pyrrhula*): Fåttallig og sporadisk forekomst om høsten. Skal være registrert 2002 men ingen dato (GJO). En hann Sørland og 1 ind. Gamleskogen 1.11-2009 (AES). Med unntak av 2012, 2015 og 2021, registrert hver høst fra 2011 til 2021 med totalt 34 observasjonsdager. Flere av fuglene har nok holdt seg over flere dager, blant annet en hunn i Gamleskogen 24.9-2.10-2020 og forekomsten per høst dreier seg om 2 - 10 ind. Største dagsantall 6 ind. 26.9-2013. Vinterfunn, 4 ind. (2 par) Sørland 17.2-2007.

Rosenfink (*Carpodacus erythrinus*): Totalt 12 funn. En syngende hann Marka 10 og 13.6-2011*. En ungfugl Marka 22 og 23.9-2014, 1 ungfugl Nordland 3.10-2014*, 1 ind. Sørland 6.10-2015*, 1 ungfugl ringmerket Plantefeltet, Marka 23.9-2017*, 1 ungfugl Marka 25.9-2018*, 1 ungfugl ringmerket Plantefeltet, Marka 8.9-2019*, 1 ungfugl ved Gullaksla 26.9-2020* og en ungfugl på Nordland 29.9* og 1.10.2020* var sannsynligvis samme fugl. 2021 topper forekomsten med tre funn (alle ungfugler); 1 ind. Nordland 4.9*, 1 ind. Nordland 10.9* og 1 ind. Marka 7.10*.



Figur 102 Rosenfink Plantefeltet september 2019

Grønnfink (*Chloris chloris*): Hekkefugl. Mating av unger 22.7-2012. Mating av unger utenfor reir registrert så seint som 12.9-2020. Ellers registrert syngende juni/juli 2010 og 2011 samt opp til 6 ind. juli 2020. Også 10 ind. Sørland 25.5-2019 og 10 ind. juni 2021. Vanlig om høsten i lite til moderat antall i perioden primo september til ultimo oktober. Seneste observasjon 50 ind. 29.10-2015. Normalt i dagsantall på under 25 ind., men årlig dager på opp mot 50 eller fler. Største dagsantall 130 ind. 22.9-2011. Arten overvintrer, blant annet 20 ind. Sørland 26.1-2008 (FGJ), 6 ind. Sørland 25.1-2009 (KSL) og 4 ind. Sørland 27.1-2019 (KSL).

Bergirisk (*Linaria flavirostris*): Hekkefugl med flere observasjoner i juni/juli blant annet 2 ind. som drev med reirbygging ved Skiphalsen 22.7-2020, 20 ind. 9.7-2015 og 20 ind. 3.7-2017. Vanlig om høsten i perioden primo september til 30.10 (2015 og 2016). Dagsantall normalt under 50 ind. fram til midten av september. I siste halvdel av september er dagsantall 100 - 300 vanlig. Største dagsantall 500 ind. 22.9-2013. Vinterfunn, 7 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL).

Gråsisik (*Acanthis flammea*): Ingen konkrete hekkefunn, men observert både tidlig og seint i juni og juli flere år. Også 8 ind. 25.5-2019. Vanlig på høsttrekket fra medio august til ut oktober. Også et funn av 10 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Opptrer invasionsartet med svært varierende antall fra år til år. Normalt i dagsantall på under 100 ind. Høsten 2017 var arten spesielt tallrik med dagsantall på 200 - 500 i siste halvdel av september og første halvdel av oktober. Største dagsantall 700 ind. 26-9-2017. Svært fåtallig i 2019 og spesielt i 2020, men forekomsten tok seg noe opp i 2021. Vinterfunn; 40 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL).

Etter vedvarende sterk vestavind høsten 2018 ble to store, mørke individer fanget i Plantefeltet, Marka 27.9-2018. Disse to ind. viste draktkarakterer og mål som samsvarer med den Grønlandske underarten *A. f. rostrata*. En tilsvarendefugl stor og mørk ble fanget i Plantefeltet 26.9-2020, igjen etter vedvarende sterk vestlig vind. Også i 2021 (27.9) ble et individ av denne Grønlandske underarten fanget og ringmerket i Plantefeltet.

Brunsisik (*Acanthis cabaret*): Fem ind. Sørland 20.9-2014. Enkeltindivider fanget og ringmerket i Plantefeltet, Marka 12 og 13.9-2018, 19.9, 24.9 og 25.9-2021 samt 2 ind. 30.9-2021.

Polarsisik (*Acanthis hornemanni*): Fugler tilhørende den Fennoscandiske rasen *A. h. exilipes* er regelmessig i lite antall om høsten og med unntak av 2014 loggført alle år siden 2010. Loggført 49 dager fra 2011 til 2020. Tidligst registrert 1 ind. Plantefeltet, Marka 8.9-2019 og senest 1 ind. 29.10-2015. Også 1 ind. Gamleskogen 8.12-2017. Arten er normalt fåtallig med dagsantall på 1-5 ind. I 2013 var imidlertid arten mer tallrik med dagsantall på 15 - 75 ind. i perioden 21 - 26.9. Største dagsantall 75 ind. 22.9-2013. Vinterfunn; 4 ind. Sørland 30.1-2011 (KSL). Fugler som viser draktkarakterer til den Grønlandske underarten *A. h. hornemanni* loggført 19 dager; 2 ind. Sørland 25.9-2010*, 2 og 3 ind. Marka henholdsvis 24* og 25.9-2012*, 10 ind. (de fleste ved Fyret) 20 og 21.9-2013, 5 ind. 24 og 25.9-2013, 3 ind. Sørland 19.9-2014, 2 ind. Sørland 3 og 7.10-2015* og 1 ind. 14.10-2017*, 2 og 1 ind. Svingen, Nordland 15* og 20.9-2020* og 4 ind. Marka 19.9-2020*. I 2021 ble arten loggført 5 dager: 2K+ hann Plantefeltet 17.9*, 2 (2K+ hann og 1K, begge ringmerket) Plantefeltet 24.9*, 4 ind. Marka 6.10*, 1 ind. 7.10* og 1 ind. Sørland 17.10*.



Figur 103 Polarsisik av den Skandinaviske underarten *A.h.exilipes* Tabisodden september 2013



Figur 104 Polarsisik av den Grønlandske underarten *A.h.hornemanni* Plantefeltet september 2021

Furukorsnebb (*Loxia pytyopsittacus*): Sporadisk forekomst. 10 ind. 28.9-2010, 6 ind. 24.9-2013 og 6 ind. 24.9-2014. I 2017 og spesielt i 2019 var arten tallrik. I 2017 registrert 12 dager i perioden 16.9-21.10 i antall på opptil 40 ind. (13.10). I 2019 registrert 20 dager i perioden 7.9 - 5.10. Sterkt varierende dagsantall indikerer en del utskifting og ankomst av nye fugler og den totale forekomsten denne høsten kan ha vært så stor som 500 ind. Største dagsantall var 180 ind. 10.9. De fleste av disse fuglene (flere mindre flokker) slo seg ned i Plantefeltet, Marka en kort tid før de forsvant ut av området. Totalt 17 ind. ble ringmerket denne dagen. I tillegg 9 ind. Plantefeltet 19.9 og 13 ind. samme sted 29.9-2021

Grankorsnebb (*Loxia curvirostra*): Tilfeldig høstforekomst med kun 13 observasjonsdager. 8-12 ind. Sørland 1-5.9-2009 (FCH), 4 ind. 24.9-2010, 2 ind. Sørland 10.10-2012, 3 ind. 21-22.9 og 1 ind. 23.9-2013 begge Plantefeltet, Marka, 25 og 5 ind. Nordland henholdsvis 2 og 3.10-2013, 1 ind. 19.9 og 9 ind. 23.9-2014, 7 ind. 16.9 og 1 ind. Plantefeltet, Marka 21.9-2017, 2 ind. Plantefeltet, Marka 14.9, 2 ind. Nordland 15.9-2019 og 1 ind. 29.9-2021. Et sommerfunn 9.7-2004 (BK).

Båndkorsnebb (*Loxia leucoptera*): Kun to funn. En liten flokk på 1 voksen hann og 3 ungfugler flere steder på Sørland 21-27.9-2013* og ett overflygende ind. Gamleskogen 15.9-2017*.

Grønnsisik (*Spinus spinus*): Eneste funn utenom høsten er 4 ind. Marka 10-11.6-2011, 3 ind. 3.6-2020 og 3 ind. Marka 11.7-2020. Registrert i lite antall hver høst fra 2011 til 2021 og loggført 38 dager (av 239 observasjonsdager) imellom 8.9 (2018) og 18.10 (2020). Med unntak av to funn primo september alle fugler registrert i siste halvdel av september og i oktober. Forekomsten er marginal og har variert fra 1 ind. (2012 og 2016) til 50-60 ind. (2021) per år. Største dagsantall 20 ind. Marka 7.10-2021.



Figur 105 Furukorsnebb Gamleskogen september 2017



Figur 106 Båndkorsnebb Sørland september 2013

Lappspurv (*Calcarius lapponicus*): To ind. Håheia 4.5 og 8.6-1982, 2 ind. Marka 5.5-1982, 2 ind. Sørland 6.7-1982 og 3 ind. Nordlandshagen 12.7-2020 er eneste funn utenom høsttrekket. Regelmessig, men fåtallig om høsten. Med unntak av 2015, registrert hver høst fra 2010 til 2021 i perioden 6.9 (2020) - 12.10 (2017). Totalt 43 observasjonsdager (av 239) i løpet av høsten. Årsforekomsten har variert fra 2 ind. (2019 og 2021) til 30-40 ind. (2016) og har normalt ligget på 10-15 ind. Største dagsantall 12 ind. 19.9-2016.



Figur 107 Lappspurv Nordland september 2019

Snøspurv (*Plectrophenax nivalis*): Oppgitt som mulig hekkefugl i Norsk Fugleatlas (1994). Skal være 'vanlig' på våren (GJO). Flere observasjoner våren 1982 i perioden 5.4 - 26.6. Blant annet 400 ind. 19.4-1982. Også 4 ind. Sørland 6.7-1982. Registrert i svært varierende antall om høsten og påvist hver høst fra 2011 - 2021 og loggført 77 dager (av 239 observasjonsdager) i perioden 16.9 (2018) - 15.10 (2017). Forekomsten per høst har variert fra ca. 15 ind. (2019) til 300-400 ind. (2013). Dagsantall vanligvis under 10 ind., men større flokker forekommer, blant annet 200 ind. 25 og 26-9-2013.




Figur 108 Snøspurv Nordland september 2013

Gulspurv (*Emberiza citrinella*): Eneste funn er 1 ind. 21.10-2017* og 1 ind. Svingen, Sørland 30.9-2019.

Dvergspurv (*Emberiza pusilla*): Totalt 5 funn. Et ind. Sørland 19.9-2014*, 1 ind. Marka 7.10-2015*, 1 ind. Sørland 23 og 24.9-2016*, 1 ind. Svingen, Nordland 23.9-2017*, 1 ind. Sørland 24.9* og 26.9-2017* og 1 ind. Marka 23.9-2021*.

Vierspurv (*Emberiza rustica*): Eneste funn er 1 ungfugl Svingen, Nordland 20 og 21.9-2019* og 1 ungfugl Sørland 17.10-2021*.



Figur 109 Vierspurv Nordland september 2019

Sivspurv (*Emberiza schoeniclus*): Syngende hann Torvvågen 13.6-2011, 1 ind. Buholman 2.6-2013, 6 ind. 25.5-2019 1 hann 3.6-2020 samt 1 ind. Gamleskogen 12.7-2020 og opptil 4 ind. Nordland primo juni 2021 kan være hekkefugl. Regelmessig i lite til moderat antall om høsten og loggført 128 dager fra 2011 til 2021 (av 239 observasjonsdager) i perioden 5.9 (2020) - 15.10 (2017). Nesten daglig i september. Vanligvis i dagsantall på under 10 ind., men 15 - 20 ind. ikke uvanlig og opp til flere dager hver høst. Mest tallrik i siste halvdel av september. Største dagsantall 60 ind. 20.9-2014.

Lundtrupial (*Icterus galbula*): En 1K hann Sørland 3-12.10-2015*. Dette var andre funnet av denne arten i Norge.

Observatørforkortelser:

(KSL) Karin Sofie Langbakk, (FCH) Frank Christensen, (GJO) Gudrun Johansen, (FGJ) Frode Gjedrem, (AES) Arild Espelien, (EDE) Even Dehli, (RBI) Raymond Birkelund, (ONO) Ola Norsteien, (GAO) Gøran André Olaussen, (KRØ) Kjetil Rønning, (MKR) May Kirsti Helmersen, (LGW) Lars Gunnar Westerman, (JGR) June Grønseth, (RS) Raphael Sanè, (BK) Bill Kunze, (DR) David Robchaud, (VT) Viktor Torstensen

Hekkefugler

På grunn av relativt dårlig feltdekning i hekkesesongen er der en viss usikker rundt hekkeforekomsten på Værøy. Noen form for skikkelig hekkefugl taksering har så vidt vites ikke blitt gjort etter NINAs Viltkartlegging i 2005. Kunnskapen er i stor grad basert på tilfeldige observasjoner publisert på artsobservasjoner.no. Nå er selvsagt artsdiversitet relatert til habitattyper og variasjon av disse. Typisk artsrike habitater som større våtmarker med åpne vannspeil samt større eller mindre løvskogsområder mangler i stor grad på Værøy så det er nok naturlig med en relativt begrenset artsrikdom. Store arealer på Værøy består også av samme type habitat, som selvsagt vil holde de samme artene. Totalt har det gjennom årenes løp blitt konstatert 51 hekkearter, 10 sannsynlige hekkearter og 13 mulige hekkearter på Værøy. En del arter har kommet til gjennom 2000-tallet, men noen arter har også forsvunnet siden Norsk Fugleatlas ble publisert i 1994. På 2000-tallet har en 42 konstaterte hekkearter, 12 sannsynlige hekkearter og 13 mulige hekkearter, - totalt 67 arter. I 1994 var der 34 konstaterte hekkearter, 6 sannsynlige hekkearter og 12 mulige hekkearter, - totalt 52 arter. Det er interessant å registrere at selv om en har hatt en brukbar økning av konstaterte hekkearter fra 1994 til 2020 er det bare 7 av de 18 sannsynlige eller mulige hekkeartene fra 1994 (toppskarv, sandlo, storspove, enkeltbekkasin, rødvingetrost, løvsanger og bergirisk) som har blitt konstatert hekkende. Økningen i antall arter skyldes nok i hovedsak en viss økning i feltaktivitet i sommermånedene. Enkelte arter, som for eksempel grågås, er nok genuin innvandrer og noen av spurvefuglene kan ha funnet egnete habitater som følge av skogplanting.

Selv om datagrunnlaget er relativt begrenset, er nok artslisten presentert i Tabell 1 noenlunde korrekt. Med økt feltsatsing kan nok et fåtall arter bli lagt til, men mer sannsynlig er det nok at en får konstatert hekking for arter som per i dag har status som sannsynlige eller mulige hekkearter.



Figur 110 Kjøttmeisen hekker på Værøy

Tabell 1 Hekkefugler på Værøy

Art	Norsk Fugleatlas (1994)	2000 - 2021	Kommentar
K = konstatert hekkefugl S = sannsynlig hekkefugl M = mulig hekkefugl			
Grågås		K	
Stokkand	K	K	
Snadderand	K		Ikke registrert etter 1989
Stjertand		K	
Brunnakke	K	M	Et vårfunn ultimo mai 2019
Krikkand	M	M	Sommerfunn 2018, 2020 og 2021
Knekkand	K		Ikke registrert etter 1980
Ærfugl	K	K	
Siland	K	K	
Havhest	K	K	
Havsvale		S	Flere ind fanget med hjelp av lyd i hekkesesong
Stormsvale	M	M	Ikke registrert etter 1985, men vanskelig å påvise
Havsule	K	K	
Storskarv	K	K	
Toppskarv	S	K	
Gråhegre	S	M	
Havørn	K	K	
Fjellvåk		M	Varslende fugl primo august 2021
Dvergalk		M	Få sommerobservasjoner
Vandrefalk	S	S	Få sommerobservasjoner
Tjeld	K	K	
Sandlo	M	K	
Vipe	K		Kun tre tilfeldige observasjoner på 2000-tallet
Steinvender	M		Ingen sommerfunn etter 1982
Rødstilk	K	S	
Storspove	M	K	
Enkeltbekkasin	M	K	Pulli observert juli 2020
Tyvjo	S	S	
Fiskemåke	K	K	
Gråmåke	K	K	
Sildemåke		M	
Svartbak	K	K	
Krykkje	K	K	
Makrellterne	M	M	Få sommerobservasjoner
Rødnebbterne	K	M	Få sommerobservasjoner
Lunde	K	K	
Teist	K	K	
Lomvi	K	K	
Polarlomvi	S		Ikke registrert etter 1999
Alke	K	K	
Gjøk		S	Flere sommerobservasjoner
Sanglerke	M		Kun få høstobservasjoner på 2000-tallet
Låvesvale	K	S	
Skjærpiplerke	K	K	
Heipiplerke	K	K	
Linerle	K	K	
Jernspurv		M	
Rødstrupe		S	
Blåstrupe		K	
Rødstjert		K	
Steinskvett	K	K	
Buskskvett		M	
Rødvingetrost	M	K	
Måltrost		M	
Gråtrost	K	S	
Svarttrost		S	
Ringtrost	K	K	
Sivsanger		K	
Løvsanger	M	K	
Gransanger		S	
Fuglekonge		M	
Gjerdesmett		K	
Svarthvit Fluesnapper		K	
Kjøttmeis		K	
Skjære	K	S	
Ravn	K	K	
Kråke	K	K	
Stær	K	K	
Gråspurv	K	K	
Bergirisk	S	K	Reirbygging sommer 2020
Gråsisik	M	S	
Grønnfink		K	
Sivspurv		K	
Snøspurv	M		Ingen sommerfunn etter 1982

Ringmerking

De første spede forsøk på ringmerking ble gjort i 2014. Plantefeltet nord i Marka ble valgt som lokalitet. Det første året ble det benyttet 5-6 nett og ringmerkingen foregikk i 5 dager. Det opprinnelige målet med fangsten var om mulig å få en bedre oversikt over forekomsten av gulbrynsanger, en art som var påvist i uvanlig store antall tidligere år. Av spesiell interesse var hvor store antall forekomsten dreide seg om, hvorvidt disse fuglene holdt seg over flere dager eller om de forlot øya raskt samt et ørlite håp om gjenfangst på andre lokaliteter. Nå kom nok fangsten i gang litt seint dette året og bare 4 gulbrynsangere ble ringmerket. Det totale antall fugl som ble ringmerket i 2014 var 99. Det gav imidlertid mersmak og i 2016 ble det rigget opp 10 nett allerede fra 17 september. Fangsten dette året foregikk i 8 dager (når været tillot) og resulterte i 329 ringmerkete fugler hvorav ikke mindre enn 97 gulbrynsangere. Potensialet var åpenbart og nettfangsten har fortsatt i 2017 (11 dager), 2018 (15 dager), 2019 (18 dager), 2020 (8 dager) og 2021 (15 dager) med mer eller mindre de samme 9-10 nettplasseringene. Fram til og med 2021 har det blitt ringmerket 3362 individer av 49 arter i Plantefeltet og ikke færre enn 353 gulbrynsangere. Det har og blitt benyttet lyd av enkelte arter med varierende resultat. Spesielt effektivt har dette vært for jernspurv (som har vist seg å forekomme i større antall enn tidligere antatt), rødvingetrost og gråsisik. Når det gjelder gulbrynsanger så har fangsteffekten med hjelp av lyd vært blandet og ikke åpenbar. Noen dager ser det ut til å fungere, mens andre dager er der ingen effekt. En annen art hvor lyd har vært effektiv er sibirpiplerke og så langt er 14 individer ringmerket (blant annet hele 7 ind. i 2019). Den tilfeldige fangsten av andre mer sjeldne/uvanlige arter har nok vært i underkant av forventningene, men har resultert i sibirtrost, gulltrost, einersanger, rosenfink, kjernebiter og vendevals.

Et fåtall fugler er også fanget inn på Nordland for sikker identifikasjon. Dette gjelder stripesanger og busksanger ved Barnberget og rørsanger ved 'Trerekka', Nordlandshagen.



Figur 111 Plantefeltet ringmerkingslokalitet

Forsøk på havsvalefangst er gjort ved Skiphalsen 5 kvelder/netter i 2016 (1), 2018 (1) og 2019 (3). Fangsten har foregått et par timer rundt midnatt og har resultert i 21 ringmerkete havsvaler. Parallelt

med Havsvale har vi og spilt av Stormsvale, uten at dette har gitt noe resultat. Det totale antall ringmerket fugl på Værøy er 3362 individer og er oppsummert i Tabell 2.



Figur 112 Totalt er 350 gulbrynsangere ringmerket på Værøy



Figur 113 Rødstjert hann fanget for ringmerking

Foreløpig har ringmerkingen kun gitt fem gjenfunn. En jernspurv merket 23.9-2014 ble funnet død Udenås, Sverige 29.3.2015 (1004 km) 187 dager etter merking. En sivspurv merket 23.9-2014 ble kontrollert på Lista, Norge (1105 km) 22 dager etter merking. En bjørkefink hann merket 22.9-2017 ble kontrollert i Drevdalen, Trysil 7.5-2018 (681 km) 227 dager etter merking. En gråsisik merket 24.9-2017 ble kontrollert i Neuwittenberg, Schleswig-Holstein, Tyskland 30.11-2017, (1485 km) 67 dager etter merking. En jernspurv merket 14.9-2021 ble kontrollert i Praha, Tsjekkia 21.11-2021 (1954 km)

68 dager. I tillegg ble en gransanger som var ringmerket på Skagen, Danmark 22.4-2019 kontrollert på Værøy 25.9-2020 (1108 km) 522 dager.

Tabell 2 Værøy ringmerkingsresultater

Art	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Ringmerkingsdager	5	8	11	15	18	8	15	80
Havsvale		1		7	13			21
Haukugle			1				1	2
Vendehals		1						1
Heipiplerke		2	1	5	4		36	48
Trepiplerke	1			1				2
Sibirpiplerke			3	4	7			14
Ringtrost	5	4	7	1	6	1	9	33
Svarttrost		1	2	7	3	2	10	25
Gråtrost		3		1	5		1	10
Rødvingetrost	2	37	11	73	105	32	73	333
T.i. coburni				1				1
Måltrost	1	2	2	6	8	3	7	29
Sibirtrost			1					1
Gulltrost						1		1
Rødstrupe		6	8	6	13	4	11	48
Rødstjert			1		2	1	2	6
Gjerdsmett	3	2	1	1	2		5	14
Fuglekonge	14	46	1	5	40	81	16	203
Einersanger							1	1
Gransanger	9	13	10	17	23	11	22	105
Løvsanger	7	6	5	5	19	3	22	67
Bøksanger				1			3	4
Gulbrynsanger	4	97	64	108	41	36	3	353
Hagesanger		5	4	3	4	2	3	21
Munk		4	1	10	13	2	9	39
Møller	1	2	1		4	1		9
Stripesanger		1						1
Rørsanger					1			1
Busksanger				1				1
Sivsanger		1						1
Svarthvitfluesnapper				3	7		7	17
Gråfluesnapper					1		1	2
Trekryper			1				2	3
Kjøttmeis	6	3	3	4	7	4	3	30
Svartmeis						1		1
Jernspurv	26	25	30	14	94	8	55	252
Gråsisik (flammea)	4	23	502	321	218	6	159	1233
A. f. rostrata				2		3	1	6
Brunsisik				2			5	7
Polarsisik (exilipes)					4		1	5
Polarsisik (homemanni)							2	2
Bergirisk	1	30			1		2	34
Grønnsisik			2					2
Bokfink	4	3	6	6	12	13	13	57
Bjørkefink	9	5	31	19	86	21	77	248
Grønnefink		2	1		13		2	18
Rosenfink			1		1			2
Kjemebiter						1		1
Dompap			1			1		2
Furukorsnebb			2		23			25
Grankorsnebb					1			1
Sivspurv	2	4	5	4	1		3	19
Total	99	329	709	638	782	238	567	3362
Dagsgj.snitt	20	41	64	43	43	30	38	42

Kilder

Data til denne oversikten kommer i hovedsak fra (listet etter viktighet)

- *Artsobservasjoner (AO)*. Totalt 1968 registreringer fra Værøy fra mai 1976 til ut 2021 er tilgjengelig. Dette utgjør mer enn 95 % av alle registrerte observasjoner.
- *Jon Olav Larsen* ha gitt meg tilgang til sin egen database over fugler på Værøy som også inneholder bidrag fra lokale fugleinteresserte spesielt Frank Christensen
- *Fugler.net* med ca. 50 registreringer (2000 – 2009).
- *Fugler i Lofoten rapporteringsside* (2008 – 2017)
- *LRSK Nordland rapporter*
- *NSKF rapporter*
- *Strann, K.B., Frivoll, V & Johnsen, T.V. 2006. Viltkartlegging. Værøy kommune - NINA Rapport 136: 25 s.* Her publiseres et begrenset antall observasjoner hovedsakelig sjøfugl og våtmarksfugl.
- *Anker-Nilssen, T. 2006. The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective. - NINA Rapport 201. 23 s.* Her publiseres et begrenset antall observasjoner hovedsakelig sjøfugl og nye takseringer av fuglefjellet
- <https://artskart.artsdatabanken>
- *Gjershaug, J. O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. og Byrkjeland, S. (red). 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 551 s.*
- *Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (red.). 2006. Norsk VinterfuglAtlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. 496 s.*
- *Facebook: Værøy, en perle i Lofoten.*
- *Brun, E. 1966. Hekkebestanden av Lunde (*Fratercula arctica*) i Norge. Sterna. Bind. 7, hefte 1, s. 1-17*
- *Brun, E. 1969. Utbredelse og hekkebestand av Lomvi (*Uria aalge*) i Norge. Sterna. Bind. 8, Hefte 5, s. 209-224*
- *Miljolare.no* (Vinterfugl og Hagefugl tellinger, 4 registreringsdager)
- *Shimmings, P. & Heggøy, O. 2017. Grågås i Nordland – Et estimat på hekkebestand i 2017. NOF-Rapport 2017-3 29s.*
- *eBird nettside*

Alle fotos med unntak av blåkinnbierter og sibirtrost (John Alsvik) Tore Berg.

