

## Sjeldne fugler i Buskerud 2021

*Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud*

ved Steinar Stueflotten

Året 2021 ble et godt år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble observert fire nye arter: **gulbeinsnipe**, **damsnipe**, **kuhegre** og **hvithodespurv**. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: **sabinemåke**, **rovterne**, **islom**, **gulnebbblom**, **steppehauk**, **sibirgransanger**, **hauksanger**, **sitronerle**, **dvergspurv** og **vierspurv**. Rapporten omfatter 1356 funn av 129 arter.

### Saksbehandling

Denne rapporten er basert på rekordmange 1356 registrerte funn av 129 arter, 5 underarter og 3 hybrider fra rapporteringsåret 2021. Dette er 7 % flere funn, men samme antall arter som i 2020. Rapporten inneholder kun en etterrapportering fra tidligere år (2020). Denne rapporten refererer til fylkes- og kommuneinndelinger etter regions- og kommunereformen i 2020. Dette innebærer at sammenligner med data fra tidligere år i mange tilfeller ikke er relevant da definisjonen av ansvarsområdet Buskerud nå er endret. De tidligere kommunene Røyken og Hurum er f.o.m. 2020 en del av Asker kommune, mens tidligere Svelvik kommune i Vestfold nå er en del av Drammen kommune. LRSKs ansvarsområde på saksbehandlingsverktøyet Artsobservasjoner (AO) er dessverre ennå ikke blitt oppdatert i samsvar med den nye kommuneinndelingen når det gjelder gamle Svelvik kommune som fortsatt administreres av LRSK Vestfold. Dette har komplisert saksbehandlingen og utarbeidelsen av denne rapporten.

LRSK har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 108 godkjenningssaker av 40 arter/underarter/hybrider (flere av disse sakene gjelder de samme funnene). Dette er 19 færre saker (-15 %) og 4 flere arter enn i 2020. Tre saker: svartkråke (1) og polarsisik (2) ble underkjent. I tillegg ble 3 observasjoner av hhv. lappspove (1), gulbrynsanger (1) og svartryggerle (1) ikke godkjent pga. ufullstendig rapportering. LRSK har i 2021 oversendt 7 av sakene til NSKF: hvithodespurv (1), kuhegre (1), gulbeinsnipe (2), damsnipe (1) og østsanger (2). Disse funnene ble godkjent med unntak av de to funnene av østsanger som begge ble underkjent. Totalt ble 8 funn ikke godkjent i 2021 (7 %).

LRSK har i 2021 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torggrim Breiehagen, Jon Ludvig Hals og Anders Hals. Anders Hals valgte å fratre LRSK ved årsskiftet etter 11 års innsats for komiteen og er blitt erstattet av Vegard Bang Fjeldheim. LRSKs oppgave er på vegne av Artsdatabanken å kvalitetssikre observasjoner av sjeldne og uvanlige fuglearter og -forekomster og publisere oversikter over alle godkjente funn i årlige rapporter. All saksbehandling i komiteen skjer fortløpende på Artsobservasjoner med supplerende diskusjoner via e-post om nødvendig. Derfor er det viktig at også alle observatører fortløpende rapporterer sine funn på AO og ikke venter for lenge med å sende inn sjeldenhetsrapporter til LRSK på arter som krever beskrivelse/dokumentasjon. Dette gjøres direkte i systemet fra valideringslista di som du finner ute til venstre på «Min startside». En oversikt over hvilke arter dette gjelder, finner du bakerst i denne rapporten. Du får også en direkte påminnelse om dette i form av en gul varseltrekant når du registrerer funn av arter som krever dokumentasjon med innsendelse av sjeldenhetsrapport til LRSK. Underkjente funn og funn av beskrivelsesarter med ufullstendig rapportering blir fjernet fra alle offisielle lister og allmenn visning på AO.

Det er godt å se at rapporteringen av både sjeldne og vanlige arter fortsatt holder seg høyt på AO. Totalt registrerte over 500 personer 59.352 observasjoner av 237 arter i den nye Buskerud-regionen i 2021. Dette er 10 % færre observasjoner og 2 flere arter enn i 2020. 2020 hadde rekordmange registrerte observasjoner delvis stimulert av koronapandemien som fikk mange folk ut på tur i naturen, spesielt våren 2020. LRSK takker alle rapportører som ved å registrere sine observasjoner på AO, har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne fuglers forekomst i Buskerud oppdatert. En ekstra takk til alle fotografene som har gitt sin tillatelse til å bruke bildene deres i denne rapporten.

### Noen hovedtrekk fra fugleåret 2021

Fugleåret 2021 ble et noe spesielt og svært godt år når det gjelder forekomst av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert hele fire nye arter for regionen: **gulbeinsnipe**, **damsnipe**, **kuhegre** og **hvithodespurv**. I tillegg ble det observert to nye rømte burfuglarter: nymfekakadu og hvitørebylbyl, sistnevnte ble egentlig observert på rømmen allerede året før, men først registrert i 2021. Antall godkjente arter i den nye Buskerud-regionen har dermed økt til 306 arter per 2021. I tillegg kommer 16 arter som ikke regnes som spontant forekommende som f.eks. snøgås, rapphøne og de to nevnte rømte burfuglene fra 2021, såkalte kategori D og E arter.

I tillegg til de fire nye artene bør følgende sjeldenheter fra 2021 nevnes spesielt: **stokkand x stjertand** (funn nr. 3), **kvinand x lappfiskand** (funn nr. 2), **berghøne** (funn nr. 3), **sabinemåke** (funn nr. 5), **rovterne** (funn nr. 8), **islom** (funn nr. 9), **gulnebbblom** (funn nr. 7-8), **steppehauk** (funn nr. 9), **sibirgransanger** (funn nr. 2-4), **hauksanger** (funn nr. 8), **sitronerle** (funn nr. 2), **dvergspurv** (funn nr. 5) og **vierspurv** (funn nr. 7). Verdt å nevne er også nye funn (antall funn i 2021 i parentes) av stripegås (8), taigasædgås (3), tundrasædgås (4), tundragås (3), mandarinand (3), amerikakrikkand (2), gråstruedykke (1), tundralo (6), lappspove (2), svarthalespove (6), steinvender (1), polarsnipe

(2), sotsnipe (7), dvergmåke (4), svartterne (1), fjelljo (1), egretthegre (2), hubro (2), lappugle (3), hærfulg (2), svartkråke (1), trelerke (1), busksanger (2), svartrødstjert (2), svartstrupe (2) og svartryggerle (3). Det var en ny invasjon av haukugler høsten 2020 som varte til ut i april 2021. Verdt å nevne er også hekkefunn av hvitkinngås, gravand, brunnakke, skogdue og hornugle, samt vinterfunn av stjertand, krikand, bergand, skogdue, toppdykker, horndykker, vipe, smålom, fjellvåk, musvåk, hornugle, tårnfalk, dvergfalk, vandrefalk, fjellerke, munk, måltrost, duetrost, vintererle og linerle.

## Været 2021


Året 2021 var som helhet ganske normalt med en årsmiddeltemperatur for Buskerud på 0,1 grader over normalen (1991-2020) målt som gjennomsnitt for Kongsberg og Drammen. Årsnedbøren endte opp på 93 % av normalen. Det ble i motsetning til 2020, en kald start på året med 3-4 grader under normalen i januar og februar og tilnærmet normalt med nedbør. Snøen i lavlandet lå til ut i slutten av mars som var mild og fin med 2 grader over normal temperatur. April var kjølig og tørr med bare 1/3-del av normal nedbør. Mai ble våtere og kaldere enn normalt med nesten 1 grad under normal temperatur og opptil 150-200 % av normal nedbør. Dette la en demper på vårtrekke og førte til at flere arter kom seinere enn de gjorde året før da starten på våren var mild og fin. Det våte og kalde mai-været kan også ha slått negativt ut for flere tidlighekkende arter som følge av næringssvikt. Juni og juli var varme og fine med 2 grader over normal temperatur og med mange sommerdager over +20 grader, selv om det var litt vått i juli med 150 % av normal nedbør flere steder i Buskerud. August hadde normal temperatur og svært lite nedbør (ca. 30 % av normalen), så sommeren sett under ett var ganske varm og fin. Høsten ble også mild og fin med helt opptil 2,7 grader over normalen i oktober og med lite nedbør i november. Slutten på året ble derimot kaldere enn normalt med -1,6 grader under normal temperatur i desember, men med bare halvparten av normal nedbør. Snøen la seg i lavlandet helt i slutten av november, og isen la seg på mange vann da kulda satte inn i månedsskiftet november/desember. Så til forskjell fra foregående år ble vintermånedene januar, februar og desember kaldere enn normalt i 2021. Vi hadde ingen kraftige høststormer eller ekstremvær i Buskerud dette året. Følgelig ble det et svakt år når det gjelder observasjoner av vinddrevne havfugler, men et lite innsig av krykkjer og lomvi ble registrert i slutten av oktober.

## Funnstatistikk per kommune

Kommuneoversikten nedenfor viser antall funn av sjeldne arter registrert på Artsobservasjoner per kommune de tre siste årene. Som følge av kommunereformen inkluderer Drammen kommune f.o.m. 2020 tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommuner, mens observasjoner i tidligere Røyken og Hurum kommuner, nå Asker kommune, ikke lenger inngår i denne rapporten. Av Drammens 73 funn er 26 gjort i gamle Drammen kommune, 27 i Nedre Eiker og 20 i Svelvik. Tallene for 2020 er oppdatert med noen mindre korrigeringer av funnmengden i to kommuner disse årene. Tallene for 2019 er eksklusivt funn av munkegribben «Brinzola» som krysset Buskerud to ganger dette året.

Tabell 1: Funnstatistikk per kommune (antall godkjente funn av sjeldne arter på Artsobservasjoner).

| Kommune       | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|------|------|
| Drammen*      | 13   | 62   | 73   |
| Flesberg      | 2    | 10   | 10   |
| Flå           | 6    | 12   | 10   |
| Gol           | 19   | 30   | 53   |
| Hemsedal      | 51   | 37   | 30   |
| Hol           | 104  | 109  | 116  |
| Hole          | 154  | 217  | 285  |
| Hurum         | 125  | -    | -    |
| Kongsberg     | 23   | 36   | 31   |
| Krødsherad    | 4    | 8    | 5    |
| Lier          | 107  | 93   | 152  |
| Modum         | 28   | 62   | 59   |
| Nedre Eiker   | 12   | -    | -    |
| Nesbyen       | 19   | 25   | 16   |
| Nore og Uvdal | 23   | 32   | 30   |
| Ringerike     | 137  | 236  | 275  |
| Rollag        | 4    | 8    | 4    |
| Røyken        | 36   | -    | -    |
| Sigdal        | 5    | 16   | 0    |
| Øvre Eiker    | 149  | 214  | 166  |
| Ål            | 43   | 58   | 41   |
| Sum Buskerud* | 1064 | 1265 | 1356 |



5x5 km ruter kodet etter antall sjeldne arter rapportert på Artsobservasjoner i 2020. Gule ruter 1-13 arter, de mørkeste røde rutene med > 40 arter.

\*) Definisjon av Drammen og Buskerud er ikke den samme i 2019 som i 2020 og 2021 pga. kommunereformen i 2020.







tidligere har vært vanlig å se på høsttrekket. De dårlige trekk tallene i 2021 kan skyldes at trekket dette året gikk lenger øst enn det som har vært vanlig tidligere år. Redusert rapportering av trekkende flokker kan også ha påvirket tallene negativt.

**tundrasædgås (*Anser serrirostris*):**

\* alle funn (9/11 - 4/13) LRSK

2021: 1 ind. Sandsæter, Busund bru, Norderhov og Storelva ved Rasarud, Ringerike 13.-23.3 \*(F) (Eli Bondlid, Marius von Glahn, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth mfl.). 1 ind. Bergsvingen og Spæren, Øvre Eiker 14.-15.4 (Steinar Stueflotten). 10 ind. rastende Øvre Svangtjørni, Hol 4.5 \*(F) (Per Furuseth). 1 ind. Skollerudmoen, Hallingby, Ringerike 1.-16.11 \*(F) (Terje Pettersen, Eli Bondlid, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo).

Tundrasædgås observeres fåtallig og sporadisk i Buskerud i trekk tidene vår (mars-april) og høst (oktober-november). Observasjonen av 10 ind. på Øvre Svangtjørni ved Dagali 4.5. er spesielt interessant da dette kan være fugler på vei til mulig hekkeplass på Hardangervidda, der arten har hekket tidligere.



Tundrasædgås Skollerudmoen, Hallingby, Ringerike 16.11.21. Foto: Kendt Myrmo

**tundragås, underarten *flavirostris* (*Anser albifrons flavirostris*):**

\* alle funn av tundragås (41/61- 3/17) inkl. underarter

\* alle underartsbestemte funn av ua. *flavirostris* (4/5 - 1/15) LRSK

2021: 15 ind. næringssøkende Vestre Holte, Nes i Ådal, Ringerike 11.11 \*(F) (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth).

Den grønlandske underarten *flavirostris* er en svært sjelden gjest i Buskerud med bare 4 tidligere godkjente funn, sist observert 1 ind. på Linnestranda, Lier i desember 2015. Observasjonen i Ådalen 11.11. var overraskende både når det gjelder antall individer (7 ad + 8 1K), lokalitet og tidspunkt. Trolig var dette den samme flokken med 7 ad + 8 1K som ble observert i Levanger, Trøndelag 12.-17.10. og på Skatval i Stjørdal, Trøndelag 26.10.-6.11. (ref. AO).

**tundragås, underarten *albifrons* (*Anser albifrons albifrons*):**

\* alle funn av tundragås (41/61- 3/17) inkl. underarter

\* alle underartsbestemte funn av ua. *albifrons* (15/26 - 2/2) LRSK

2021: 1 2K Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 29.4 \*(F) (\*Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Marius von Glahn, Richard Hals Gylseth). 1 adult rastende Svarstadvika, Sælabonn og Sandtangen, Onsaker, Hole 27.-28.9 \*(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten). 1 adult rastende Averøya, Ringerike 29.9 (Terje Pettersen).

Arten tundragås observeres nesten årlig i lite antall i trekketidene vår (mars-mai) og høst (september-november), hyppigst i Nordre Tyrifjorden. Nesten alle observerte tundragjess i Buskerud tilhører den østlige underarten *albifrons*. Individet på Averøya 29.9. er det samme som ble sett på Sandtangen, Onsaker 28.9.

**kanadagås x grågås (*Branta canadensis* x *Anser anser*):**

\* alle funn (29/33- 2/4)

2021: 3 ind. Stadum, Røyse, Hole 13.-14.3 (Terje Pettersen mfl.). 1 ind. Nordfjorden, Ringerike 25.3 (Terje Pettersen). 1 ind. Vik, Småøyene, Steinsvika og Bjørsludvika, Steinsfjorden, Hole 30.3-18.8 (Kendt Myrmo, Marius von Glahn, Terje Pettersen mfl.). 1 adult Averøya Strandsone, Nordfjorden, Ringerike 2.9 (Marius von Glahn). 1 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 3.9 (Terje Pettersen). 1 ind. Steinsvika og Steinssletta, Hole, Hole 13.9-18.10 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. Svensrudvika, Sælabonn, Hole 28.9 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Vegstein, Ringerike 27.-29.10 (Terje Pettersen, Steinar Stueflotten, Rune Zakariassen). 1 ind. Synneren, Ringerike 9.-19.11 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Steinar Stueflotten). 1 ind. Vik-Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 25.11-20.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Marius von Glahn).

En hybrid kanadagås x grågås har hatt fast tilhold i Nordre Tyrifjorden de siste årene, og alle observasjoner av dette ene individet, som oftest er sett sammen med en kanadagås, regnes som ett funn. De tre hybridene som ble observert ved Stadum 13.-14.3. antas å være andre individer. Tidligere var det bare fotodokumenterte funn som ble godkjent av LRSK, men fra 2021 er dette kravet fjernet for denne hyppig forekommende hybrid.

**sangsvane (*Cygnus cygnus*):**

\* hekkefunn (9), sommerfunn (11)

Hekkefunn 2021: 1 par reirbygging Fekjagranden, Ustedalsfjorden, Hol 18.4 (Trond Bølstad) og 1 ind. rugende Fekjagranden, Ustedalsfjorden, Hol 4.6 (Trond Bølstad). 1 par reirbygging Synstevann, Buvatn, Nesbyen 23.4 (Rolf E. Andersen). 1 par reirbygging Sygardslåtta, Hemsedal 1.5 (Per Furuseth). 1 hekking (5 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Miletjern, Drammen 1.5-31.8 (Bent Ellingsen, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand mfl.). 1 par rugende Råen, Fiskumvannet, Øvre Eiker 13.5-5.6 (Steinar Stueflotten, Lars Dolmen). 1 hekking (7 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Veslefjorden, Hol 19.5-22.6 (Trond Bølstad). 2 adult + 2 pulli Øvre Fesheimtjerne, Gol 15.6 (Rune Solvang). 1 par m/2 unger utenfor reir, ikke utvokste Raudtjern, Ål 17.6 (Jens Romslo). 1 par m/2+ unger utenfor reir, ikke utvokste Murmyrene, Hemsedal 17.6 (Heiko Liebel). Sommerfunn 2021: 1 par Tjernsvollen, Grønhojd, Nesbyen 4.6 (Pål Gisle). 5 ind. Sør-Hydalen, Hemsedal 5.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim). 1 ind. Ustedalsfjorden, Hol 13.6 (Trond Bølstad). 1 2K Murmyran N, Hemsedal 17.6 (Heiko Liebel). 2 ind. Eikredammen, Hemsedal 17.6 (Heiko Liebel). 3 adult Hammartjerne, Golsfjellet SØ, Gol 18.6 (Rune Solvang, Heiko Liebel). 6 ind. Tunnetjern, Golsfjellet S, Gol 25.6-10.7 (Jan Alsvik). 2 2K Holselva SV for Sveinhaugbrue, Strandafjorden, Ål 27.6 (Torggrim Breiehagen, Anne Mette Monclair). 1 ind. Hjarnes, Passebekk, Kongsberg 22.8 (Helge Midtgard, Bjørn Roar Skullestad). 2 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 28.8 (Andreas Hessvik-Trøite) og 1 adult Fiskumvannet, Øvre Eiker 30.8 (Steinar Stueflotten). 3 ind. overflygende Krakmyra, Flesberg 28.8 (Henning Anker Johansen).

Arten hekker fast på noen få lokaliteter bl.a. i Hemsedal, Hol, Nesbyen og Øvre Eiker. Sygardslåtta i Hemsedal, Veslefjorden i Hol, Miletjern i Drammen og Raudtjern i Ål er nye hekke-lokaliteter. Bestanden er i økning. Paret som oppholdt seg i Miletjern ved Mjøndalen med tydelig hekkeatferd i to måneder sommeren 2020, slo til med vellykket hekking med 5 pulli i 2021, hvorav 4 vokste opp til flygedyktig alder. Miletjern er et lite tjern nært opp til bebyggelse og med den sterkt trafikkerte E134 på sørsida og en mye brukt tursti langs vestsida av tjernet. Dette viser at sangsvane ikke lenger kan ansees som en sky villmarkfugl, men en art som nå begynner å konkurrere med knopp-svaner om hekkeplasser i kulturlandskapet. Knoppsvaneparene som tidligere hekket i Miletjern, ble jaget bort av sangsvaneparet i 2020. Siden sommerfunn av sangsvaner nå er blitt vanlige, vil slike funn ikke lenger bli referert i denne rapporten f.o.m. 2022.

**gravand (*Tadorna tadorna*):**

\* hekkefunn (4 par), vinterfunn des-15. feb (0)

2021: 2 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Linnestranda, Lier 4.4 (Jens Erik Nygård). 2 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Grunnane, Drammen 20.3 (Marius von Glahn). 1 par m/9 pulli Grunnane, Drammen 23.5.-4.6. (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm, Steinar Stueflotten). 5 ad. + 1 par m/8 pulli Grunnane, Drammen 15.6. (Steinar Stueflotten). 2 par m/7+5 store unger Grunnane, Drammen 5.7. (Steinar Stueflotten).

Fåtallig og heller sjelden hekkefugl. 2 territoriehevdende par med tydelig hekkeatferd holdt til på Linnestranda i hele april og mai, men vellykket hekking ble ikke påvist. På Grunnane ved Svelvik lyktes 2 par å få fram unger, mens flere andre par trolig mislyktes med hekkingen.



**[moskusand]** (*Cairina moschata domestica*):

\* alle funn (10/21 - 2/26)

2021: 12 ind. næringssøkende Berg, Bergsvingen, Øvre Eiker 24.5 (Steinar Stueflotten). 14 ind. Sagbakken, Drammen 16.11 (Steinar Stueflotten).

Moskusand (*Cairina moschata domestica*) er tamformen av arten knoppand. Arten er en vanlig holdt pryddand/tamand i Norge, og rømte/frittgående moskusender blir sett sporadisk i kulturlandskapet. Slike observasjoner er derfor plassert i kategori E (ikke spontan). Flokken på 12 ind. på et jorde nedenfor Semsveien på Berg var trolig på en liten luftetur fra gården på Torespæren like i nærheten. Det samme gjaldt flokken observert ute på et saubeite ved gården Sagbakken i Skoger. Disse hadde for øvrig følge med en hvit løpeand (tamand).

**mandarinand** (*Aix galericulata*):

\* alle funn (33/34 - 3/3)

2021: 1 hann rastende Nordfjorden, Ringerike 28.3 (Terje Pettersen mfl.). 1 hann Drammenselva i Drammen, Drammen 7.4 (Kenneth Larsen). 1 hann stasjonær Bacheparken, Landfalløya, Drammen 20.4-5.10 (Jostein Bærø Engdal, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Jorunn Villand, Bent Ellingsen mfl.). 1 adult hann Miletjern, Drammen 14.5 (Knut Arne Nygård).

Arten observeres normalt bare vår og høst i Buskerud og da nesten alltid som enslige hanner. Den ringmerkede hannen som oppholdt seg i Bacheparken i Drammen i over 5 måneder, er et unntak. Dette er den samme hannen som oversomret der i 2020. Trolig var det også samme hannen som ble sett i Drammenselva ved Bragernes 7.4. og i Elveparken 14.4., før den dukket opp på sitt favorittsted i Bacheparken 20.4. Hannen observert i Miletjern 14.5. kan muligens også ha vært den samme. Hannen i Bacheparken har blitt et populært fotoobjekt med flere innlegg på Facebook og oppslag i Drammens Tidende. Morten Lie, som ringmerket mandarinanda i mai 2020, melder i Drammens Tidende 01.02.22 at denne hannen nylig var blitt observert i Victoria Park, Nelson, Lancashire i England, 995 km fra Bacheparken i Drammen.



Mandarinand hann Bacheparken, Drammen 04.05.21. Foto: Melvin Åsum

**knekkand** (*Spatula querquedula*):

\* alle funn (- 4/8+)

2021: 1 hann Synneren, Ringerike 19.-22.4 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Jørn Lønner). 1 hann Juveren, Ringerike 24.-30.4 (Terje Pettersen, Ole Vignes, Jan Erik Haugen, Edna Mosand, Eli Bondlid mfl.). 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Fiskumvannet, Øvre Eiker 29.4-9.5 (\*Steinar Stueflotten, Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Jorunn Villand mfl.). 1 par Synneren, Ringerike 30.4 (\*Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten). 1 adult

hann Synneren, Ringerike 6.5 (Kendt Myrmo, Richard Hals Gylseth). 2 par i passende hekkebiotop Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.-30.5 (Lars Dolmen, Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Aleksander Solberg mfl.). 1 hann Eikredammen, Hemsedal 14.5 (Bent Fjeldheim). 1 ind. Sygardslåtta nedre, Hemsedal 17.5 (Stian Sannes). 1 hann observasjon i hekketid, passende biotop Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.-7.6 (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand). 7 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 28.6 (Steinar Stueflotten).

Arten observeres fåtallig, men regelmessig i sommerhalvåret, hyppigst om våren (april-mai). Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.4. ± 12 dager (40 år). Flere av observasjonene antas å gjelde samme individer. Hannen i Juveren 30.4. var sannsynligvis en annen enn den som ble sett sammen med en hunn i Synneren samme dag. Hannen på Sygardslåtta 17.5. antas å være den samme som i Eikredammen 14.5. 1 par med tydelig hekkeatferd hadde tilhold på Hegstadmyra, Fiskumvannet hele våren, i mai samtidig med et rivaliserende par på Måsnesmyra. Mange observasjoner i mai til primo juni tydet på hekking i sumpområdet ved utløpet av bekkegrøfta fra beitemarka på Hegstad. 7 små ender som fløy opp fra den blå borden her 28.6., ble antatt å være et kull med juvenile knekkender, noe som skulle bekrefte vellykket hekking her i 2021.

**skjeand** (*Spatula clypeata*):

\* alle funn (- 14/34)

2021: 1 par Synneren, Ringerike 19.4-11.5 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten mfl.). 1 par Lillesstranda, Lier 28.4 (Steinar Stueflotten). 1 par Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 1.5 (Terje Pettersen). 2 par Averøya, Ringerike 9.5 (Terje Pettersen). 2 par Synneren, Ringerike 11.-13.5 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 par Svensrudvika, Sælabonn, Hole 12.-13.5 (Terje Pettersen). 1 par Ulvenvannet N, Lier 18.5 (Bård Kyrkjedelen, Trym Kyrkjedelen). 3 hunnfarget Juveren, Ringerike 7.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 2 hunnfarget Nordfjorden, Ringerike 8.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn, Steinar Stueflotten). 2 hunnfarget Fiskumvannet, Øvre Eiker 15.9 (Steinar Stueflotten). 1 hunnfarget Synneren, Ringerike 21.9 (Terje Pettersen). 1 hunnfarget Juveren, Ringerike 23.9-4.10 (Richard Hals Gylseth, Terje Pettersen). 1 hunnfarget Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 24.-25.9 (Terje Pettersen, Knut Eie, Ann Torill Halvorsen). 4 hunnfarget Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 26.-27.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo). 2 hunnfarget Vassbonn, Bergsjø, Modum 28.9 (Steinar Stueflotten, Arild Gauteplass). 1 hunnfarget Synneren, Ringerike 1.10 (Terje Pettersen, Arild Gauteplass). 3 ind. Synneren, Ringerike 8.10 (Richard Hals Gylseth).

Arten observeres fåtallig, men regelmessig, spesielt i trekketidene vår (medio april – mai) og høst (medio august–oktober). Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.4. ± 10 dager (38 år). Det ble registrert 6 funn om våren og 8 funn om høsten. Noen av observasjonene dreier seg trolig om de samme individene. Kun en observasjon på Fiskumvannet, Øvre Eiker, var uvanlig.

**snadderand** (*Mareca strepera*):

\* alle funn (92/171 - 8/17)

2021: 2-5 ind. Synneren, Ringerike 22.-30.4 (Jørn Lønner, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Steinar Stueflotten, Kendt Myrmo mfl.). 1 par rastende Onsaker, Onsaker, Hole 23.4 (Eli Gates). 2 hann Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 25.4 (Kendt Myrmo, Eric Francois Roualet, Sigurd Iversen mfl.). 1 hann Hovsfjorden, Hol 26.-27.4 (Per Furuseth). 1 hann Svarstadvika, Sælabonn, Hole 27.-30.4 (Richard Hals Gylseth, Terje Pettersen mfl.). 1 par Sandtangen, Onsaker, Hole 29.4 (Kendt Myrmo). 1 par Røsholmstranda og Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 30.4-11.5 (Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten, Marius von Glahn, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth mfl.). 1 hann Juveren, Ringerike 1.-6.5 (Eirik Kristoffersen, Rolf E. Andersen, Svein Dale, Kendt Myrmo mfl.). 1-3 ind. Svarstadvika, Sælabonn, Hole 1.-6.5 (Terje Pettersen, Frode Nordang Bye, Kjell Isaksen, Didrik Løstegård Kristensen). 1 par Svensrudvika, Sælabonn, Hole 9.5 (Terje Pettersen). 1 hann Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 15.5 (Terje Pettersen). 1 par Lillesstranda, Lier 20.5 (Rolf E. Andersen, Hans Petter Rømme, Melvin Åsum, Jorunn Villand).

Arten er i seinere år observert årlig på vårtrekket (april-mai), gjennomsnittlig ankomstdato: 22.4. ± 11 dager (26 år), sjeldnere sommer og høst (sep.-okt.). Flere av individene observert på diverse lokaliteter i Nordre Tyrifjorden antas å være noen av de samme individene. Observasjoner i nordre deler av Buskerud, som det i Hovsfjorden, Hol 26.-27.4., er sjeldne.

**brunnakke** (*Mareca penelope*):

\* hekkefunn (2)

2021: 4 ind. (1 adult + 3 pulli) næringssøkende Torkjellsettjørni, Ål 15.7 (Torgrim Breiehagen). 6 ind. (1 adult hunn + 5 pulli) næringssøkende Fjellheim våtmark (Furuodden), Vatsfjorden, Ål 15.7 (Torgrim Breiehagen).

Fåtallig og heller sjelden hekkefugl i Buskerud. Arten er observert årlig i hekketida i Vatsfjorden, Ål, men dette er første gang at et kull med unger er observert her. Torkjellsettjørni i Ål er nyoppdaget hekke-lokalitet.



**[stjertand] (*Anas acuta*):**

\* hekkefunn (0), vinterfunn des-feb (14/14 - 1/1)

2021: 1 hann stasjonær Fjordparken og Bragernesløpet, Drammen By, Drammen 8.1-16.3 (Jostein Myre, Bjørn Harald Larsen, Leif Asbjørn Jørgensen, Steinar Stueflotten mfl.).

Fåttallig hekkefugl i nordfylket, men ingen registrerte hekkefunn i 2021. En ikke-spontan hann med lys blågrå plastring på venstre fot overvintret i Fjordparken, Drammen for tredje vinteren på rad 2020/2021, men dukket ikke opp igjen vinteren 2021/2022. F.o.m. 2022 vil alle funn av stjertand bli nevnt i årsrapporten.

**krikkand (*Anas crecca*):**

\* vinterfunn des-feb (- 1/1)

2021: 1 hunnfarget Viul nord, Ringerike 9.1 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo).

Vinterfunn av krikkand er sjeldne i Buskerud, derfor er slike funn tatt inn i LRSKs årsrapport f.o.m. 2021.

**amerikakrikkand (*Anas carolinensis*):**

\* alle funn (12/12 - 2/2) LRSK

2021: 1 hann næringssøkende Synneren, Ringerike 24.-26.4 \*(F) (\*Kjetil Johannessen, Øivind Syvertsen, Frode Nordang Bye, Eli Bondlid, Terje Pettersen mfl.). 1 hann Måsnesmyra, Fiskumvannet, Øvre Eiker 6.5 \*(F) (Hans Petter Rømme, Lars Dolmen).

Sjelden art fra Nord-Amerika, sist observert i Synneren, Ringerike 21.-25.4.2020. Siste gang arten ble observert på Fiskumvannet, var: 1 hann 31.3.-3.4.2016.

**taffelend (*Aythya ferina*):**

\* alle funn (- 3/5)

2021: 3 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 25.4 (Eric Francois Roualet, Pål-Hallstein Ous, Terje Pettersen). 1 hann Svarstadvika, Sælabonn, Hole 28.4 (Terje Pettersen, Didrik Løstegård Kristensen). 1 1K Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 10.8 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo).

Arten observeres tilnærmet årlig i lite antall på vårtrekket (april – mai) og høsttrekket (september – medio november), hyppigst på Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden, sjeldent ellers. Gjennomsnittlig ankomstdato: 18.4. ± 17 dager (36 år). Sommerfunn av juvenile taffelender som det i Steinsvika 10.8., er sjeldne.

**bergand (*Aythya marila*):**

\* hekkefunn (0), vinterfunn des-feb (- 1/1)

2021: 1 2K Herøysundet, Steinsvika og Høyenhallstranda, Steinsfjorden, Hole 2.-8.1 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo).

Sparsom hekkefugl i øvre deler av fylket, men ingen hekkefunn er registrert i 2021. Arten sees ellers årlig på vår- og høsttrekket. Vinterfunn er sjeldne.

**sjøorre (*Melanitta fusca*):**

\* hekkefunn (1), funn ≥ 20 ind.

Hekkefunn 2021: 1 adult hunn m/2 unger Nedre Oddetjørni 1060 moh., Ål 23.7 (Torgrim Breiehagen).

Store antall 2021: 21-46 ind. Grunnane, Drammen 6.5.-16.5. (Eli Gates, Frode Nordang Bye, Steinar Stueflotten mfl.). 120-180 ind. Grunnane, Drammen 4.6.-13.8. (Steinar Stueflotten, Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm), maks. 180 ind. 5.7. (Steinar Stueflotten). 20 ind. Grunnane, Drammen 22.8. (Steinar Stueflotten).

Sjøorren hekker spredt i indre fjellstrøk. Arten sees ellers sporadisk i lavlandet utenom hekketida og regelmessig langs kysten høst og vinter. Årlig raster det i perioden mai-august et stort antall sjøorrer på Grunnane ved Svelvik og i Vollebukta ved Verket (Asker). Årsaken til disse store antallene på > 100 ind. midtsommers både i 2020 og 2021, er ikke helt forstått, men slike sommerflokker langs kysten er et kjent fenomen fra tidligere og består trolig av umodne, ikke-hekkende fugler (Haftorn 1971, Båtvik 1994).

**svartand (*Melanitta nigra*):**

\* hekkefunn (2), funn ≥ 20 ind.

Hekkefunn 2021: 1 adult hunn m/7 unger utenfor reir, ikke utvokste Solheimstulen, Nore og Uvdal 21.7 (Lars Herman Næss). 1 hunn m/8 unger utenfor reir, ikke utvokste Falkenuttjenna, Nore og Uvdal 22.7 (Hans Erik Næss).

Store antall 2021: 32 ind. rastende Frognøya V, Tyrifjorden, Hole 28.5 (Terje Pettersen). 18 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 13.11 (Lars Dolmen).

Fåtallig hekkefugl i fjellet i nordre deler av Buskerud. Større flokker på  $\geq 20$  ind., er heller sjeldne, men sees av og til på vårtrekket i mai og på høsttrekket i oktober-november.

**havelle** (*Clangula hyemalis*):

\* alle funn (- 6/10)

2021: 1 par Linnesstranda og Drammensfjorden indre Ø, Lier 12.5 (\*Jostein Myre, Andreas Gullberg, Rolf E. Andersen, Steinar Stueflotten). 1-2 ind. Ånevatnet, Nore og Uvdal 5.-9.10 (Stig Johan Kalvatn, Bjørn Lauritzen). 2 ind. Ustedalsfjorden, Hol 30.10-1.11 (Trond Bølstad, Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 2 ind. Drammenselva v/Steinberg, Drammen 6.11 (Jens Tøndel Fossum, Geir Tøndel Fossum, Michelle Fossum). 1 adult hann Nordfjorden, Ringerike 9.11 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.11 (Steinar Stueflotten).

Sjelden hekkefugl i indre fjellstrøk, men ingen hekkefunn er registrert i 2021, ellers fåtallig og sporadisk observert i lavlandet på vårtrekket (april-mai) og høsttrekket (oktober-november), mer sjeldent i lavlandet om sommeren. Gjennomsnittlig ankomstdato: 3.5.  $\pm$  12 dager (25 år). Seineste observasjon i gjennomsnitt: 15.11.  $\pm$  19 dager (25 år), sjelden vintergjest.

**lappfiskand** (*Mergellus albellus*):

\* alle funn (- 5/7)

2021: 1 par Storelva ved Mælingen og Helgelandsmoen, Ringerike 26.3 (Marius von Glahn, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 par Juveren, Ringerike 31.3-4.4 (Marius von Glahn, Jens Tøndel Fossum, Terje Pettersen, Jens Erik Nygård, Jørn Lønner). 1 par Mælingen, Ringerike 3.-4.4 (Eli Bondlid, Vegard Bunes). 1 par Synneren, Ringerike 5.-19.4 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo mfl.). 1 hann Hellefossen, Øvre Eiker 14.4 (Anders Hals). 1 adult hunn Synneren, Ringerike 23.4 (Jan Olav Nybo, Ken Adelsten Jensen, Steinar Stueflotten). 1 hunnfarget Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 16.10 (\*Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 hunnfarget Juveren, Ringerike 25.10-16.11 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Steinar Stueflotten, Rune Zakariassen).

Arten opptrer årvisst i Buskerud i vinterhalvåret fra oktober til april. Hyppigst på vårtrekket ultimo mars - medio mai og på høsttrekket i oktober-november. Antall funn kan variere mye fra år til år. Observasjonene i Storelva ved Mælingen/Helgelandsmoen og i Juveren i perioden 26.3.-4.4., dreier seg trolig om det samme paret, og det kan godt også ha vært det samme paret som dukket opp i den nærliggende Synneren 5.4.



Lappfiskand hann Mælingen, Ringerike 03.04.21. Foto: Eli Bondlid

**stokkand x stjertand** (*Anas platyrhynchos* x *A. acuta*):

\* alle fotdokumenterte funn (2/2 - 1/1) LRSK

2021: 1 hann næringssøkende Synneren, Ringerike 16.4 \*(F) (Eli Bondlid).

Meget sjelden hybrid som kun er observert to ganger tidligere i Buskerud: 1 hann Steinsvika, Hole 13-28.4.1998 og 1 hann Steinsvika og Svarstadvika, Hole 29.3.-11.5.2020. Det er ikke usannsynlig at hannen i Synneren 16.4. kan ha vært den samme hannen som ble observert i Hole i 2020. Bildene som ble tatt av hybridene, kan tyde på det.



Stokkand x stjertand hann Synneren, Ringerike  
16.04.21. Foto Eli Bondlid



Kvinand x lappfiskand hann Mælingen, Ringerike  
28.03.21. Foto: Terje Pettersen

**kvinand x lappfiskand** (*Bucephala clangula* x *Mergellus albellus*):

\* alle funn (1/1 - 1/1) LRSK

2021: 1 hann Storelva meandersving, Mælingen, Ringerike 28.-31.3 \*(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Jens Tøndel Fossum). 1 hann Nordfjorden, Ringerike 29.4 (Terje Pettersen).

Sjelden andehybrid som observeres nesten årlig i Norge. Kun ett tidligere funn i Buskerud: 1 hunnf. ind. Busund, Ringerike oktober 2019. Hannen i Nordfjorden 29.4. ble oppgitt av observatøren å være samme individ som ble sett i Storelva en måned tidligere.

**ub. rype** (*Lagopus*):

\* funn på uvanlig lokalitet i nedre deler av Buskerud

2021: 1 ind. næringssøkende Konnerudkollen, Konnerud, Drammen 14.2 (Synøve Johannessen).

Funnet ble først registrert som fjellrype, men da det ikke foreligger verken beskrivelse eller fotodokumentasjon som kan bekrefte at det var en fjellrype og ikke en lirype som ble sett, er funnet korrigert til ubestemt rype. Funnet er uansett interessant da det er gjort på en uvanlig lokalitet for rype. Observasjoner av primært liryper i nedre deler av Buskerud forekommer år om annet, bla. ble det gjort flere slike observasjoner vinteren 2019/2020.

**vaktel** (*Coturnix coturnix*):

\* alle funn per kommune (- 22/24)

2021: DRAMMEN (2/2): 1 ind. sang/spill Unnelsrud sør, Skoger 29.-30.5 (Kjetil Johannessen, Edna Mosand). 1 ind. sang/spill Unnelsrud sør, Skoger 16.-19.6 (Steinar Stueflotten, Bent Ellingsen). HOLE (6/6): 1 ind. sang/spill Onsaker 21.6 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Selte, Steinssletta 1.7 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Lore, Steinssletta 10.7 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 ind. sang/spill Gomnes 12.7 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Stadum, Røyse 13.8 (Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Selte, Steinssletta 18.8 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). KONGSBERG (1/1): 1 ind. sang/spill Efteløt 29.6 (Bård Engelstad). LIER (1/1): 1 ind. sang/spill Eikenga, Lierbyen 17.7 (Noah Penk). MODUM (2/2): 1 ind. Svenskerud, Vikersund 4.6 (Eirik Kristoffersen). 1 ind. sang/spill Svarverud, Vikersund 8.7 (Eirik Kristoffersen). RINGERIKE (4/4): 1 ind. sang/spill Synneren 31.5 (Didrik Løstegård Kristensen, Terje Pettersen). 1 ind. sang/spill Ask nord, Ask 19.7 (Terje Pettersen mfl.). 1 ind. sang/spill Ask vest, Ask 21.7 (Richard Hals Gylseth). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Høystad, Snyta 25.7 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER (1/2): 1-2 ind. sang/spill Bergsvingen 4.6-8.8 (Steinar Stueflotten, Hans Petter Rømme, Melvin Åsum, Jorunn Villand mfl.). ÅL (5/6): 1 ind. sang/spill Lyavegen 100 11.7 (Terje O. Nordvik). 2 ind. sang/spill Åsetno 13.7 (Terje O. Nordvik). 1 ind. sang/spill Sørvest for Nystølan 16.7 (Terje O. Nordvik). 1 ind. sang/spill Hellebu 17.7 (Terje O. Nordvik). 1 ind. sang/spill Tormodset 18.7 (Terje O. Nordvik).



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Arten observeres årlig i nedre deler av Buskerud fra ultimo mai til ultimo august, mer sjeldent i øvre deler av Buskerud som observasjonene i seterregionen i Ål i juli 2021. Gjennomsnittlig ankomstdato: 29.5.  $\pm$  10 dager (30 år). Gode år med mange observasjoner i Buskerud de tre siste årene. Noen av observasjonene dreier seg trolig om de samme individene.

**[berghøne]** (*Alectoris chukar*):

\* alle funn (2/2 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. Nøste, Lier 3.5 \*(F) (Ove Brude Kolstad).

Berghøner som dette ansees å ha rømt fra et oppdrett eller lignende og regnes derfor som en ikke-spontan art i kategori E. Vi kjenner bare til to tidligere funn av rømte berghøner i Buskerud: 1 ind. i Flesberg 20.7.-11.8.1994 og 1 ind. Åssiden, Drammen 7.-10.10.2019. Berghøna på Nøste i Lier ble observert og fotografert av Ove Brude Kolstad i Villaveien 6. Funnet ble først publisert på Facebook-siden "Finnemarkas venner".

**nattravn** (*Caprimulgus europaeus*):

\* alle funn (- 13/26)

2021: 1-3 ind. sang/spill Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 21.5-19.6 (Steinar Stueflotten, Melvin Åsum). 3+ ind. sang/spill Skimtheia, Drammen 29.5 (Anders Kvammen). 1 ind. sang/spill Lauvbråten, Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 3.6 (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Sukkerertkollen, Svelvik, Drammen 15.6 (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Ebbestadkollen, Svelvik, Drammen 16.6 (Steinar Stueflotten). Til sammen 6 ind. sang/spill på tre lokaliteter Solbergelva øvre, Finnemarka (NE), Drammen 16.6 (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Øvre Isberget, Solbergelva, Drammen 16.6 (Steinar Stueflotten). 2 ind. sang/spill på 2 lokaliteter Nedre Isberget, Solbergelva, Drammen 16.-17.6 (Steinar Stueflotten). 2 ind. overflygende Ulevannsveien ved leirduebanen, Drammen 19.6 (Jon Ludvig Hals). 1 ind. sang/spill Lauvbråten, Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 4.7 (Steinar Stueflotten). 1 ind. sang/spill Storekleiv, Eikeren, Øvre Eiker 4.7 (Steinar Stueflotten). 1 adult hann næringssøkende Myrvoll, Skapertjernveien, Lier 17.7 (Noah Penk). 3 ind. Hovdebøfjellet, Kongsberg 24.7 (\*Fredrik Stige, Øystein Eide). 1 ind. Stormyr, Lier 8.8 (Rolf E. Andersen).

De fleste funn er gjort på tidligere kjente lokaliteter, de fleste ved Eikeren og i Finnemarka. Observasjoner de siste årene tyder på at det må være en god bestand av nattravn i de skrinne furuskogsområdene i sørenden av Finnemarka mellom Solbergelva, Tverken og Skimtheia. Gjennomsnittlig ankomstdato i Buskerud: 16.5.  $\pm$  11 dager (25 år). Noen av observasjonene langs Eikeren kan dreie seg om de samme individene.

**skogdue** (*Columba oenas*):

\* hekkefunn (1), vinterfunn des-feb (9/20 - 3/22); funn i øvre Buskerud (8/10 - 0) LRSK

2021: 20 ind. næringssøkende Norderhov, Ringerike 25.2 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 ind. overflygende Linnesstranda, Lier 26.2 (Rolf E. Andersen). 6 ind. næringssøkende Haugen og Bjørklund, Norderhov, Ringerike 27.2 (Terje Pettersen, Marius von Glahn). 1 ind. Averøyveien, Synneren, Ringerike 28.2-1.3 (Terje Pettersen). 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Helgelandsmoen, Hole 23.5 (Vegard Bunes).

Skogdua hekker fåtallig i nedre deler av Buskerud. Arten er sjelden å se i øvre deler. Det er gjort flere observasjoner av par og syngende individer i hekketiden i passene hekkebiotop, men uten at hekking er sikkert påvist. Vinterfunn er sjeldne. Observasjonene ultimo februar 2021 må regnes som individer på tidlig vårtrekk.

**tyrkerdue** (*Streptopelia decaocto*):

\* hekkefunn (2), alle funn  $\geq 5$  ind. (9)

Hekkefunn 2021: 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Fossgårdfeltet, Geilo, Hol 26.3 (Trond Bølstad). 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Helgelandsmoen, Hole 26.3 (Heidi Fauske).

**Funn  $\geq 5$  ind. 2021:** 11 ind. rastende Helgelandsmoen nord, Ringerike 2.-3.1 (Richard Hals Gylseth, Vegard Bunes, Ken Adelsten Jensen). 6 ind. Storelva, Helgelandsmoen, Ringerike 1.3 (Terje Pettersen). 5 ind. Storelva, Helgelandsmoen, Ringerike 18.3 (Terje Pettersen). 5 ind. Kirkevoll, Ål 14.8 (Jens Romslo). 7 ind. Bjørnstad gård, Steinssletta, Hole 16.8 (Terje Pettersen). 6 ind. Kirkevoll, Ål, Ål 10.9 (Jens Romslo). 7 ind. rastende Mo gård, Hole 17.9 (Aksel Olsson). Opptil 6-9 ind. ved fôring Fossgårdfeltet, Geilo, Hol 19.9-19.10 (Trond Bølstad). 6 ind. Olga Lundsvei, Gamlegrendåsen, Kongsberg 7.11 (Lars Støen Jacobsen).

Fåttallig og spredt hekkefugl i Buskerud. Bare hekkefunn og funn av flokker på fem eller flere individer refereres i denne rapporten. 9 funn av flokker på  $\geq 5$  ind. på 5 lokaliteter i 2021.

\* alle funn (-12/17)

[illegible]

**myrrikse** (*Porzana porzana*):

2021: 1 ind. sang/spill, ikke hekking Linnesstranda, Lier 28.5 (Long Nguyen). 1 ind. sang/spill Vestgardsbekken, Steinssletta, Hole 4.7 (Terje Pettersen). 2 ind. næringssøkende Linnesstranda, Lier 1.-16.9 (Steinar Stueflotten, Melvin Åsum, Jorunn Villand, Jens Erik Nygård, Hans Petter Rømme mfl.).

Arten er blitt observert fåtallig (1-2 ind.) nesten årlig i perioden mai-juli i nedre deler av Buskerud, sjeldnere i perioden august-medio oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.5.  $\pm$  13 dager (24 år). De to myrriksene som oppholdt seg på Linnestranda i Lier to uker i september, ble populære fotoobjekter. Det er ikke ofte en får så god anledning til å observere denne arten på nært hold over flere dager som i dette tilfellet.



*Myrrikse Linnesstranda, Lier 05.09.21. Foto: Steinar Stueflotten*

\* hekkefunn (2), vinterfunn des-feb (0)

Hekking ble påvist på to tidligere kjente hekkeplasser: Huseby V (Lier) og Andedammen, Marienlyst (Drammen). Det første reiret m/2+ egg i vanningsdammen på Huseby V endte i mislykket hekking. Men paret bygde nytt reir, la om og fikk fram 4 unger. I Andedammen vokste 4 av ungene opp til flygedyktig alder. Sivhøner ble observert i passende hekkebiotoper et par steder til, men uten at hekking ble påvist. Første observasjon våren 2021: 29.3., jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 15.4. ± 11 dager (38 år).

\* hekkefunn (9), vinterfunn des-feb (0)

Fåttallig hekkefugl i Buskerud, bestanden er økende. På Kolbergtjernmyra S i Øvre Eiker ble en rugende trane observert tidligere i mai (pers. medd. Tom Schandy). Sannsynligvis ble hekkingen her mislykket. Det er gjort flere andre observasjoner av traner i passende hekkebiotop i 2021, men bare observasjonene nevnt ovenfor med bekreftet hekking. Vinterfunn er lite sannsynlig i Buskerud.

\* alle funn per kommune (- 16/22)

2021: HOL (2/2): 1 ind. Hovsfjorden 20.2 (Per Furuseth). 1 ind. Hovsfjorden 13.4 (Per Furuseth). LIER (2/2): 1 ind. Linnesstranda 2.4 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). 1 ind. Linnesstranda 14.-15.11 (Jens Erik Nygård, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten). MODUM (1/1): 1 ind. Bergsjø 8.1 (Bjørn Harald Larsen). RINGERIKE (5/5): 1 ind. Randselva, Viul og Viul nord 9.1-5.3 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Eli Bondlid, Richard Hals Gylseth, Aksel Olsson). 1 ind. Storelva ved Busund 27.1 (Terje Pettersen). 1+ ind. Hovsenga 10.2 (Marius von Glahn). 1 ind. Juveren 2.-13.10 (Terje Pettersen, Eli Bondlid, Richard Hals Gylseth). 1 ind. Hovsenga 13.11-27.12 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Christian Dalen). ØVRE EIKER (6/12): 1 ind. Vestfosselva (Smørgrav-Berg), Bergsvingen 2.-3.1 (Eirik Kristoffersen, Lars Dolmen). 1 ind. Langebru, Hokksund 14.1-15.3 (Jorunn Villand, Lars Dolmen, Steinar Stueflotten). 1-4 ind. Vestfosselva (Smørgrav-Berg), Bergsvingen 13.3-14.4 (Eirik Kristoffersen, Aleksander Solberg, Steinar Stueflotten mfl.), derav maks. 4 ind. 30.-31.3. (Steinar Stueflotten). 2-3 ind. Fiskumvannet 28.9-7.10 (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten, Lars Dolmen mfl.). 1 ind. Langebru, Hokksund 22.10 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Fiskumvannet 7.11 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Langebru, Hokksund 14.11-31.12 (Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Jon Ludvig Hals, Morten Jagdum). 2 ind. Langebru, Hokksund 25.12 (Jon Ludvig Hals).

[illegible]

\* alle funn (16/17 - 1/1) LRSK

Sjelden gjest i Buskerud. Arten observeres helst i trekketidene vår (april-mai) og høst (oktober-november). Funnet ved Frognøya Ø er kun det andre kjente vinterfunnet i Buskerud. Det forrige ble gjort i Steinsvika (Hole) 6.1.1998. Det samme individet som ved Frognøya Ø ble muligens observert i det samme området også to dager seinere.

Hekkefunn 2021: HOLE (2/4 kull): 3 hekkinger (6 pulli) Steinsvika, Steinsfjorden 25.5-7.9 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Marius von Glahn). 5 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Kråkevika, Vik, Hole 9.6 (Marius von





**vipe** (*Vanellus vanellus*):

\* hekkefunn per kommune (18 med 41+ par), vinterfunn des-feb (7)

Hekkefunn 2021: DRAMMEN (3/6+ par): 2 ind. rugende av totalt 7 ind. Undelsrudlina 30.5 (Hans Petter Kristoffersen). 1 hunn m/2+ pulli Myre, Grunnane 4.6. (Steinar Stueflotten). 6 ad. engstelig atferd Knem S, Svelvik 4.6. (Steinar Stueflotten). GOL (1/1 par): 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Golsfjellet SØ 11.5 (Per Stensland). HOL (1/1 par): 2 adult + 1 1K Fløtagutu nord 21.6 (Trond Bølstad). HOLE (2/4+ par): 1 ind. rugende Mosenga, Røyse 4.5 (Didrik Løstegård Kristensen). 2 ind. engstelig adferd (3-5 par observert jevnlig i hekketida) Steinsvika, Steinsfjorden 8.-23.6 (Kendt Myrmo). LIER (4/17+ par): 6 hekkinger (4 pulli + 1 pulli) Jordhaugene, Linnesstranda 4.4.-4.7 (Jens Erik Nygård, Hans Petter Rømme, Rolf E. Andersen mfl.). 5 hekkinger (3 pulli) Gilhus, Linnesstranda 8.4.-5.6 (Hans Petter Rømme, Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten, Frode Nordang Bye, Rolf E. Andersen). 5 hekkinger (18 pulli) Huseby V, Huseby 10.5.-29.6 (Hans Petter Rømme, Steinar Stueflotten, Jens Erik Nygård). 10 ind. (6 ind. + 4 pulli) Vikar 14.5 (Hans Petter Rømme). 7 ind. (2 adult + 5 1K) Huseby 4.7 (Jens Erik Nygård). MODUM (1/1 par): 1 hekking (1 adult + 1 juv) Jaren 13.6 (Eirik Kristoffersen). RINGERIKE (3/3 par): 1 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Vf Norderhov kirke 22.4 (Marius von Glahn). 5 ind. (2 adult + 3 1K) Thoengata Øst 27.7 (Marius von Glahn). 5 ind. (1 adult + 4 1K) Averøya Strandsone, Nordfjorden 27.7 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER (3/8+ par): 4 ind. derav 1 ad. rugende Skjelbred 2.5 (Steinar Stueflotten). 5 hekkinger (5 par) rugende Hegstad, Fiskumvannet 2.5.-22.6 (Steinar Stueflotten mfl.). 2 hekkinger (2 par m/4+ unger) Hegstad beitemark, Fiskumvannet 7.5.-8.7 (Steinar Stueflotten mfl.). 1 par m/2+ unger Hegstadmyra N, Fiskumvannet 5.6 (Steinar Stueflotten).

Vinterfunn 2021: 1 ind. Sørumsmarka øst, Sørums, Ringerike 24.2 (Richard Hals Gylseth). 3 ind. overflygende Nedre Seltebekken, Steinssletta, Hole 26.2 (Marius von Glahn). 1 ind. Gilhus, Linnesstranda, Lier 26.-27.2 (Rolf E. Andersen, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Jens Erik Nygård). 1 ind. Kinn, Grunnane, Drammen 27.2. (Jens Erik Nygård). 9 ind. Veslemyra, Svarstad, Hole 27.2 (Terje Pettersen). 2 ind. Mælingen, Ringerike 27.2 (Terje Pettersen). 1 hann rastende Averøya, Ringerike 27.2 (Marius von Glahn).

Viper er observert mange steder i egnede hekkebiotoper, men bare de nevnte med bekreftet hekking/hekkforsøk. Hekkefunnene er gruppert kommunevis for bedre oversikt. Til sammen minst 41 hekkende par med 45 unger ble observert i løpet av hekketida, jf. 24 unger i 2020 og 33 unger i 2019, men uvisst hvor mange av disse som nådde flygedyktig alder. Økt søkelys på denne rødlista arten kan ha bidratt til noe av den økte forekomsten i 2021. 7 tidlige vårfunn i dagene 24.-27.2. teller her som vinterfunn.

**tundralo** (*Pluvialis squatarola*):

\* alle funn (46 - 6/10)

2021: 2 adult Svarstadvika, Sælabonn, Hole 11.5 (Hans Petter Rømme, Jostein Myre, Terje Pettersen, Rune Zakariassen mfl.). 3 adult Averøya, Ringerike 11.5 (Hans Petter Rømme, Richard Hals Gylseth). 1 ind. Averøya, Sandtangen og Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike og Hole 8.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn, Steinar Stueflotten). 2 ind. Sandtangen og Averøya, Nordfjorden, Hole og Ringerike 12.-25.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn). 1 ind. trekkende mot S Fiskumvannet, Øvre Eiker 15.9 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 16.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 ind. Linnesstranda, Lier 17.9 (Melvin Åsum, Bent Hammel, Steinar Stueflotten). 1 1K Linnesstranda, Lier 20.9 (Jorunn Villand). 1 1K Grunnane, Svelvik, Drammen 28.9.-2.10. (Kai Månsson, Steinar Stueflotten, Pål Gisle).

Arten opptrer forholdsvis regelmessig, men fåtallig på høsttrekket (august – medio oktober) i nedre deler av Buskerud, sjeldent ellers. Rekordmange observasjoner i 2021. Det normale er bare 1-2 funn i året. De 2+3 adulte individene observert på vårtrekket i Nordre Tyrifjorden 11.5. var mest sannsynlig forskjellige fugler. De 1-2 individene observert på diverse lokaliteter i Nordfjorden (Hole og Ringerike) i perioden 8.-25.9., dreier seg trolig om de samme individene. Det samme gjør sannsynligvis de to observasjonene på Linnesstranda 17. og 20.9.

**dverglo** (*Charadrius dubius*):

\* hekkefunn (5)

2021: 2 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Juveren, Ringerike 6.5 (Marius von Glahn). 1 hekking (1 par) rugende Gilhus, Linnesstranda, Lier 15.-21.5 (Jens Erik Nygård, Rolf E. Andersen). 2 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Lamyra S, Lamoen, Hole 9.6 (Terje Pettersen). 7 ind. (5 ad. + 2+ pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Bokerøya industriområde, Svelvik, Drammen 5.7. (Steinar Stueflotten). 3 ind. (1 adult + 2 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Averøya, Ringerike 27.7 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth).

Fåttallig hekkefugl i nedre deler av Buskerud. Flere observasjoner er gjort i hekketiden i passende biotop, men bare de nevnte med påvist/sannsynlig hekking. Ungfugler observert seinere på sommeren både ved Juveren (Ringerike) og på Linnesstranda (Lier), indikerer vellykkede hekkinger i disse områdene.

**boltit** (*Charadrius morinellus*):

\* alle funn (- 7/27)

2021: 3 ind. Sørum Vest, Steinssletta, Hole 16.5 (Terje Pettersen, Vegard Bunes). 1-2 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Halnekollen, Hol 29.5-9.6 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Jostein Myre, Hans Petter Rømme). 10-15+ ind. Øvre Storebotn, Hemsedal 6.-8.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim, Terje Lislevand mfl.). 1 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Eima, Hol 22.6 (Frode Falkenberg). 1 adult lokkelyd, øvrige lyder Flesebekkble, Flesberg 27.6 (Henning Anker Johansen). 4 ind. reir med egg eller unger v/Ravnås NØf Bøsetra, Krødsherad 27.6 (Jostein Vattøy) og 1 adult rugende i samme område, Krødsherad 29.6 (Morten Skår). 1 ind. trekkende mot SØ Albrektnuten, Nore og Uvdal 10.9 (Dag Amundsen).

Arten hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud. Ett bekreftet hekkefunn på Norefjell i Krødsherad ultimo juni er uvanlig. Sjelden art i lavlandet på vårtrekket i mai. Gjennomsnittlig ankomstdato:  $13.5 \pm 7$  dager (18 år).



Boltit Halnekollen N, Hol 05.06.21. Foto: Jostein Myre

**småspove** (*Numenius phaeopus*):

\* hekkefunn (2)

2021: 1 ind. reirbygging Skrykken, Nore og Uvdal 2.7 (Anders Musland). 1 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Olfisken S, Grønhovd, Nesbyen 24.7 (Pål Gisle).

Arten hekker spredt og fåtallig i indre, nordlige deler av Buskerud, sjelden i midtre deler. Ellers vanlig art i lavlandet på vårtrekket ultimo april - mai. Første observasjon i 2021: 5.5., jf. gjennomsnittlig ankomstdato:  $27.4 \pm 9$  dager (37år).

**storspove** (*Numenius arquata*):

\* hekkefunn (2)

2021: 1 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Lyseren Ø, Golsfjellet, Gol 14.6 (Rune Solvang). 1 par sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Klanten, Golsfjellet, Gol 14.6 (Rune Solvang). 1 ind. sang/spill og varsling i hekketid og passende hekkebiotop Vesle Lyseren Ø, Golsfjellet, Gol 18.6 (Rune Solvang, Heiko Liebel).

Storspova har gått mye tilbake som hekkefugl i Norge de siste 20 årene. I Buskerud har arten forsvunnet som hekkefugl i kulturlandskapet i lavlandet, men hekker fortsatt på myrer og slåtemark oppe på Golsfjellet. Trolig



hekket minst to par her i området Lyseren-Klanten i 2021. Arten ble også observert i hekketiden i passende hekkebiotop på et par andre lokaliteter på Golsfjellet i 2021 og en flokk på 8 ind., trolig ikke-hekkende fugler, ble sett på Kamben fellesbeite Øf Storefjell, Golsfjellet N 15.6. (Rune Solvang).

**lappspove** (*Limosa lapponica*):

\* alle funn (39 - 2/4) LRSK

2021: 3 ind. næringssøkende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 4.-5.8 \*(F) (\*Steinar Stueflotten, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K rastende Budalsløken, Hol 1.-3.9 \*(F) (Trond Bølstad).

Arten er sjelden i Buskerud, men observeres nesten årlig i lite antall på vårtrekket i april-mai og høsttrekket i august-september. Gjennomsnittlig ankomstdato: 30.4.  $\pm$  13 dager (17 år). De fleste funn er gjort på Linnesstranda, Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden. Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det ved Budalsløken i Hol, er sjeldne. Kun tre slike funn er kjent fra tidligere: 1 ind. 6.8.2014, 25.7.2016 og 26.8.2017, alle i Hol kommune.

**svarthalespove** (*Limosa limosa*):

\* alle funn (19/31 - 6/34) LRSK

2021: 1 3K+ rastende (ua. *limosa*) Linnesstranda, Lier 12.5 \*(F) (Andreas Gullberg, Steinar Stueflotten, Jostein Myre, Rolf E. Andersen). 1 ind. Huseby V, Lier 13.5 \*(F) (Jens Erik Nygård). 1 hann Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 14.5 (Melvin Åsum). 20 ind. Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 4.9 \*(F) (Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Aleksander Solberg). 3 ind. overflygende Svensrudvika, Sælabonn, Hole 5.9 \*(F) (Jon Are Myhrer, Mette Myhrer). 6 ind. Karlsrudtangen og Averøya, Ringerike 5.-9.9 \*(F) (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten mfl.). 1 1K Linnesstranda, Lier 7.9 \*(F) (\*Jorunn Villand, Steinar Stueflotten, Jens Magnussen). 6 ind. Svensrudvika og Svarstadvika, Sælabonn, Hole 11.-19.9 \*(F) (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Jens Tøndel Fossum). 5 ind. rastende Sandtangen, Onsaker, Hole 16.9 \*(F) (Terje Pettersen).

Arten sees sporadisk i trekketidene vår (medio april - mai) og høst (august - medio september), hyppigst i Nordre Tyrifjorden og Fiskumvannet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 4.5.  $\pm$  13 dager (14 år). Rekordforekomst i 2021. Normalt observeres bare 1-2 ind. per år, tidligere maks. 5 ind. så langt tilbake som i 1974 og 1975. En flokk på hele 20 ind. på Fiskumvannet 4.9. og 6 ind. i Nordre Tyrifjorden utover i september, er derfor uvanlig høye antall for denne arten. Mange store flokker ble også observert flere andre steder i Sør-Norge høsten 2021. Alle disse flokkene dreide seg trolig om individer av den islandske underarten *islandica*, mens individet som ble observert på Linnesstranda 12.5., tilhørte underarten *limosa*.



Svarthalespove 20 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 04.09.21. Foto: Jon Ludvig Hals

**steinvender** (*Arenaria interpres*):

\* alle funn (34 - 1/1)

2021: 1 ind. næringssøkende Sandtangen, Onsaker, Hole 25.8-6.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Jens Tøndel Fossum mfl.). 1 ind. rastende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 8.9 (Marius von Glahn).

Arten observeres kun sporadisk i Buskerud, hyppigst på vårtrekket i mai, men ikke årlig, sjeldnere på høsttrekket (ultimo juli - september). Flest observasjoner er gjort i Nordre Tyrifjorden. Det ansees som sannsynlig at individet på Karlsrudtangen 8.9., er det samme som ble observert på Sandtangen i dagene forut.

**polar snipe** (*Calidris canutus*):

\* alle funn (38 - 2/3)

2021: 2 ind. næringssøkende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 7.-8.9 (Terje Pettersen, Tore Westgård, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn). 1 ind. rastende Småøyene, Steinsfjorden, Hole 11.9 (Terje Pettersen).

Arten oppttrer normalt bare sporadisk og i lite antall på høsttrekket (medio juli – primo oktober), observasjoner på vårtrekket i mai er sjeldne. De fleste observasjoner er gjort i Nordre Tyrifjorden (Hole og Ringerike), på Linnesstranda (Lier) og Fiskumvannet (Øvre Eiker).

**temmincksnipe** (*Calidris temminckii*):

\* alle funn (- 13/29)

2021: 1-2 ind. Svarstadvika, Sælabonn, Hole 9.-10.5 (Didrik Løstegård Kristensen, Jostein Bærø Engdal). 2 ind. Synneren, Ringerike 11.5 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1-2 ind. Averøya, Ringerike 12.-19.5 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Aksel Olsson). 3 ind. Eikredammen, Hemsedal 13.5 (Olav Huso). 2+ ind. Huseby V, Lier 17. - 18.5 (Steinar Stueflotten, Hans Petter Rømme). 8 ind. rastende Linnesstranda, Lier 20.5 (Jorunn Villand). 1-3 ind. Vesle Ustevatnet, Hol 22.5-7.6 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Per Furuseth, Jostein Myre). 1-3 ind. Linnesstranda, Lier 22.5-6.6 (Hans Petter Rømme, Jens Erik Nygård, Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). 1 ind. med lokkelyd, øvrige lyder Halnekollen, Hol 30.6 (Steinar Stueflotten). 1 ind. Lia Ø av Hundsemvatn - Kjølén, Hemsedal 1.7 (Morten Bergan). 1 ind. overflygende Veslemyra, Svarstad, Hole 31.7 (Terje Pettersen). 1 ind. overflygende Bønsnes, Hole 15.8 (Terje Pettersen). 2 ind. Averøya, Ringerike 26.8 (Terje Pettersen). 1 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 26.8 (Terje Pettersen). 1-2 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 26.-29.8 (Marius von Glahn, Steinar Stueflotten). 1 ind. Averøya, Ringerike 8.-9.9 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Steinar Stueflotten). 1 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 11.9 (Terje Pettersen).

Arten hekker sparsomt i øvre deler av Buskerud, og observeres regelmessig på trekket i nedre deler, hyppigst på vårtrekket i mai, mer sporadisk på høsttrekket (medio august – september). De fleste trekkobservasjoner er gjort på Linnesstranda (Lier) og i Nordre Tyrifjorden (Ringerike og Hole). Gjennomsnittlig ankomstdato: 15.5. ± 6 dager (36 år). De 1-2 individene observert på diverse lokaliteter i Nordfjorden-området 26.-29.8., antas å dreie seg om de samme fuglene.

**fjæreplytt** (*Calidris maritima*):

\* alle funn (- 1/1)

2021: 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Halnekollen, Hol 5.-9.6 (Jostein Myre, Hans Petter Rømme).

Arten hekker spredt i indre fjellstrøk, men få hekkefunn blir rapportert. Meget sjelden å se på trekket i nedre deler av Buskerud. Arten overvintrer regelmessig på skjær i Oslofjorden fra november til medio april, men slike funn blir ikke lenger rapportert her.

**dvergsnipe** (*Calidris minuta*):

\* alle funn (- 3/7)

2021: 2 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 28.7 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth.). 2-3 ind. Linnesstranda, Lier 27.-29.8 (Hans Petter Rømme, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Bent Ellingsen mfl.). 1-2 ind. Sandtangen, Onsaker, Hole 29.8-2.9 (Steinar Stueflotten, Marius von Glahn). 1-2 ind. Averøya, Ringerike 2.-3.9 (Marius von Glahn, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 2 ind. Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 5.-6.9 (Terje Pettersen, Aksel Olsson, Vegard Bunes, Kendt Myrmo mfl.).

Arten observeres nesten årlig i lite antall på høsttrekket (august – september) i nedre deler av Buskerud, sjeldnere på vårtrekket (mai - primo juni). Nordfjorden (Ringerike) er sammen med Linnesstranda (Lier) de beste trekklokalitetene for arten i Buskerud. Det antas at det var de samme to individene som ble observert på diverse lokaliteter i Nordfjorden (Hole og Ringerike) i perioden 29.8.-6.9.

\* alle funn (- 6/7) LRSK

Arten observeres hyppigst på høsttrekket fra medio september til medio november. Mer sjeldent om vinteren og på vårtrekket i siste halvdel av april, gjennomsnittlig ankomstdato: 20.4.  $\pm$  14 dager (9). Fiskumvannet er nå den beste trekklokaliteten for arten i Buskerud. Den fuktige beitemarka på Hegstad har blitt en attraktiv rasteplass for både denne arten og andre bekkasiner på høsttrekket. Observasjonene ved Fiskumvannet 10.10. og 11.10. kan ha vært samme individ.



*Kvartbekkasin Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.11.21. Foto: Jon Ludvig Hals*

\* alle funn (- 17/41)

2021: 1 ind. sang/spill, ikke hekking Golsfjellet SØ, Gol 11.5 (Per Stensland). 1 ind. Solheimstulen, Nore og Uvdal 17.5 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. Fjellberg, Haugastøl, Hol 18.5 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass). 1 ind. Skurdalsfjorden innos, Hol 21.5 (Trond Bølstad). 1-2 ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Tuva-området, Hol 21.-22.6 (Frode Falkenberg, Jostein Myre). 7 hann sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop + 1 ind. Holværvatn-området, Hol 22.6 (Frode Falkenberg). 12+5+1 hann sang/spill i hekketid og passende hekkebiotoper på 3 lokaliteter i Eima-området, Hol 23.6 (Frode Falkenberg). 1 ind. Solheimstulen, Nore og Uvdal 19.7 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. Steinsvika og Hungerholt, Hole 10.8 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 ind. Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 14.-28.8 (Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Andreas Hessvik-Trøite). 1 ind. Steinsvika og Hungerholt, Hole 24.8 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. rastende Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 5.-7.9 (Terje Pettersen, Jon Are Myhrer, Mette Myhrer, Kendt Myrmo mfl.). 2 ind. rastende Røsholmstranda, Nordfjorden, Ringerike 16.9 (Terje Pettersen). 1 ind. Hungerholt, Steinssletta, Hole 20.9 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. Veslefjorden, Hol 21.10 (Trond Bølstad).

[illegible]



Arten hekker spredt i øvre deler av Buskerud og ses sporadisk på vårtrekket (mai) og høsttrekket (medio august - medio oktober) i nedre deler. Gjennomsnittlig ankomstdato: 9.5. ± 8 dager (30 år). Mange observasjoner på hekkeplasser i øvre deler av Buskerud i 2021. Nøyaktige hekkeplasser er skjernet.

**svømmesnipe** (*Phalaropus lobatus*):

\* alle funn (- 3/5)

2021: 1 ind. næringssøkende Hovsfjorden, Hol 23.5 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass). 3 ind. skjernet lokalitet, Hol 9.6 (Jostein Myre). 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop vann Vf Hovdestølen, Ål 28.6 (Håkon Brandt Fjeld).

Arten hekker fåtallig på enkelte lokaliteter i øvre deler av Buskerud, men sees sjeldent på trekket i lavlandet. Gjennomsnittlig ankomstdato: 23.5. ± 6 dager (31 år). Færre rapporterte funn i seinere år kan tyde på at arten er blitt sjeldnere i Buskerud.

**gulbeinsnipe** (*Tringa flavipes*):

\* alle funn (0 - 2/2) NSKF

2021: 1 ind. Linnestranda, Lier 9.5 \*(F) (Bård Kyrkjedelen). 1 adult næringssøkende Svarstadvika, Sælabonn, Hole 9.-10.5 \*(F) (\*Terje Pettersen, Didrik Løstegård Kristensen, Vegard Bunes, Andreas Gullberg mfl.).

(Gulbeinsnipa hekker i Alaska og Canada, og overvintrer fra sørlige USA til sørlige Sør-Amerika). Ny art for Buskerud og kun funn nr. 3 og 4 i Viken. Det foreligger 33 godkjente funn av arten i Norge (ref. Norgeslisten per 31.12.2021) og med en økende funnfrekvens de siste årene (Olsen 2021). Med en så sjelden art var det naturlig å tro at individet som ble oppdaget av Terje Pettersen i Svarstadvika (Hole) 9.5., var det samme som førstefunnet på Linnestranda (Lier) to timer tidligere samme dag. Men en nøyere studie av forskjeller i draktkarakterer, viste at det dreide seg om to forskjellige individer. Fuglen i Svarstadvika var i full sommerdrakt, mens den fra Linnestranda fremdeles var i delvis vinterdrakt (pers. medd. Tor Olsen, NSKF). Den 22.-23.5. ble det også observert en gulbeinsnipe på Årnestangen (Rælingen). Utseendet til den gulbeinsnipa lignet mer på fuglen fra Svarstadvika enn den fra Linnestranda, og kan derfor godt ha vært samme fugl.



Gulbeinsnipe Linnestranda, Lier 09.05.21.  
Foto: Bård Kyrkjedelen



Damsnipe Røsholmstranda, Ringerike 10.05.21.  
Foto: Terje Pettersen

**damsnipe** (*Tringa stagnatilis*):

\* alle funn (0 - 1/1) NSKF

2021: 1 adult næringssøkende Røsholmstranda og Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 10.5 (\*Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo mfl.).

(Damsnipa hekker i Øst-Europa og Sentral-Asia østover til NØ-Kina, og overvintrer i Afrika, India, SØ-Asia og Australia). Ny art for Buskerud og Viken! Det foreligger 35 godkjente funn av arten i Norge (ref. Norgeslisten per 31.12.2021). Dagen etter at gulbeinsniper ble observert både på Linnestranda i Lier og i Svarstadvika i Hole, dukket det utrolig nok opp nok en ny nasjonalt sjelden vader på Røsholmstranda i Ringerike - en damsnipe! Også denne gangen var det Terje Pettersen som oppdaget den sjeldne vaderen om morgenen den 10. mai. Mange fuglekikkere strømmet til utover dagen og fikk sett den sjeldne vaderen næringssøkende sammen med bla. gluttsniper ute på Karlsrudtangen (Ringerike). Tross grundig leting ble den ikke gjenfunnet neste dag.

**sotsnipe (*Tringa erythropus*):**

\* alle funn (87 - 7/12)

2021: 1 ind. trekkende mot N Fiskumvannet, Øvre Eiker 9.5 (Steinar Stueflotten). 3 ind. rastende Linnesstranda, Lier 9.5 (Rolf E. Andersen). 3 ind. Svarstadvika, Sælabonn, Hole 10.5 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten, Vegard Bunes, Andreas Gullberg mfl.). 1 ind. Averøya, Ringerike 10.-16.5 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Richard Hals Gylseth, Hans Petter Rømme, Christian Dalen). 2 adult Averøya, Ringerike 27.7 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1-2 adult Karlsrudtangen, Nordfjorden, Ringerike 27.-30.7 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 18.8 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. Linnesstranda, Lier 14.-15.11 (\*Jens Erik Nygård, Melvin Åsum, Steinar Stueflotten).

Arten observeres tilnærmet årlig i Buskerud i lite antall på vårtrekket (ultimo april - mai), ofte med en ny trekktopp i juni, og på høsttrekket i august-september. Gjennomsnittlig ankomstdato: 8.5. ± 7 dager (32 år). De 2 individene som ble observert på Karlsrudtangen 28. og 30.7., antas å være de samme som ble sett på Averøya 27.7. Dette var trolig to adulte fugler på tidlig returtrekk fra hekkeplassene i nord. Sotsnipa som ble observert på Linnesstranda i Lier 14.-15.11., er ett av de seineste funnene av denne arten i Norge noensinne.

**krykkje (*Rissa tridactyla*):**

\* alle funn (- 5/9)

2021: 1 1K Høyenhallstranda og Vik, Steinsfjorden, Hole 29.7-2.8 (Terje Pettersen, Jens Tøndel Fossum). 1 1K Linnesstranda, Lier 26.10 (Steinar Stueflotten, Hans Petter Rømme). 4 ind. (derav minst 1 ad.) trekkende mot S Skjærdalen, Tyristrand, Ringerike 28.10 (Steinar Stueflotten). 1-2 1K Steinsfjorden, Hole 29.10-2.11 (Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Aksel Olsson). 1 1K Nordfjorden, Ringerike 30.10 (Kendt Myrmo).

Arten forekommer relativt hyppig langs kysten av Hurumlandet i vinterhalvåret fra september til februar, spesielt i uværsperioder om høsten, mer sjeldent innover i Drammensfjorden. Flere innlandsfunn i Tyrifjords-området høsten 2021 er litt spesielt. Noen av de registrerte individene her kan dreie seg om de samme fuglene.

**sabinemåke (*Xema sabini*):**

\* alle funn (4/9 - 1/1) LRSK

2021: 1 2K Vik-Høyenhallstranda-Småøyene, Steinsfjorden, Hole 1.-7.8 (\*Terje Pettersen, Vegard Bunes, Richard Hals Gylseth, Didrik Løstegård Kristensen mfl.).

Meget sjelden gjest i Buskerud som kun er observert en gang tidligere i innlandet i Buskerud: 1 1K Nordfjorden, Ringerike 23.9.1997. Arten er i tillegg observert noen få ganger i Oslofjords-området i gamle Buskerud fylke i september 2004 og september 2007, sist ved Filtvet (nå i Asker) 28.10.2014. Sabinemåke i Steinsfjorden primo august 2021 ble funnet av Terje Pettersen. Den oppholdt seg i Steinsfjorden i flere dager, noe som gjorde at det kom mange fuglekikkere for å se den sjeldne fuglen. Hele 79 observasjoner dokumentert med 74 bilder ble registrert på AO i løpet av disse dagene. Et spesielt og sjeldent funn da det ikke er normalt å se 2K fugler i vår del av verden. Sommerfunn er også uvanlig for sabinemåke på Østlandet. Funnet ble omtalt i Vår fuglefauna (Winnem 2021 a).



Sabinemåke 2K Steinsfjorden, Hole 03.08.21. Foto: Terje Pettersen

**hettemåke** (*Chroicocephalus ridibundus*):

\* hekkefunn (2 med 24+ par) inkl. kolonier

2021: 34 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Småøyene, Steinsfjorden, Hole 6.5 (Kendt Myrmo). 39 ind. permanent revir Småøyene, Steinsfjorden, Hole 11.5 (Kendt Myrmo). 6 ind. rugende Drammen By, Drammen 19.5 (Steinar Stueflotten). 30 ind. mislykket hekking Småøyene, Steinsfjorden, Hole 25.5 (Kendt Myrmo). 6 ind. (5 adult + 1 1K) rastende Loretangen, Steinsfjorden, Hole 28.7 (Kendt Myrmo). 46 ind. (10 adult + 36 1K) Vik, Steinsfjorden, Hole 2.8 (Steinar Stueflotten). 52 ind. (12 2K+ + 40 1K) Vik, Steinsfjorden, Hole 3.8 (Askild Tomren, Asle Tomren). 19 ind. (4 adult + 15 1K) Vik, Steinsfjorden, Hole 5.8 (John Apeland, Brit Rennemo).

Den kritisk trua (CR) hettemåka har vært i sterk tilbakegang, og LRSK ønsker derfor at flest mulig hekkefunn blir rapportert på AO. Observasjonene ovenfor viser at en koloni på ca. 20 par gjorde hekkforsøk på Småøyene i Steinsfjorden (Hole) i mai 2021. Hekkingen ble trolig mislykket da hekkeplassen ble oversvømt under flom i slutten av mai (ref. Kendt Myrmo). Likevel dukket det opp mange årsunger ved Vik i Steinsfjorden de første dagene i august. Opptil 40 1K hettemåker ble da observert her sammen med flere adulte fugler. Hvorvidt disse kom fra en koloni i Tyrifjords-området, er derimot usikkert. I tillegg hekket minst 4 par på tak i Drammen sentrum dette året.

**dvergmåke** (*Hydrocoloeus minutus*):

\* alle funn (57/114 - 4/4) LRSK

2021: 1 1K næringssøkende Vik-Småøyene, Steinsfjorden, Hole 2.-7.8 \*(F) (Terje Pettersen, Vegard Bunes, Richard Hals Gylseth, Jens Tøndel Fossum mfl.). 1 1K overflygende Grantopp, Åsa, Ringerike 16.8 \*(F) (Terje Pettersen). 1 1K næringssøkende Fiskumvannet, Øvre Eiker 6.9 \*(F) (\*Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 1 1K rastende Nordfjorden Ø, Hole 3.11 \*(F) (Terje Pettersen).

Arten er blitt observert årlig i lite antall de siste årene. De fleste funnene blir gjort om høsten i august - medio oktober, mer sporadisk om vinteren, våren (mai) og sommeren.

**fiskemåke** (*Larus canus*):

\* hekkefunn per kommune (21 med 45+ par) inkl. kolonier

2021: DRAMMEN (6/7+ par): 1 ind. rugende Åssiden skole 8.5 (Steinar Stueflotten). 1 ind. rugende Drammen By 19.5 (Steinar Stueflotten). 2 par reir med egg eller unger Mjøndalen jernbanestasjon 21.5 (Janne Horn Erath). 1 par rugende Bacheparken, Landfalløya 25.5 og 1 unge samme sted 10.6 (Bent Ellingsen). 1 par rugende Andedammen, Marienlyst, Drammen By 27.5 og m/1 pull 21.6 (Bent Ellingsen). 1 så vidt flygedyktig på industriområdet Bokerøya Svelvik 5.7 (Steinar Stueflotten). HEMSEDAL (1/1 par): 1 ind. reir med 2 egg Tryteholone, Vannin 16.6 (Heiko Liebel, Rune Solvang). 1 par rugende Vannin 2.7 (Morten Bergan). HOL (1/1 par): 1 par rugende Veslefjorden 25.5 (Trond Bølstad). HOLE (2/2+ par): 2 adult engstelig adferd, indikasjon på hekking Kråkevika 9.6 (Marius von Glahn). 2 adult + 3 unger utenfor reir, ikke utvokste Helgelandsmoen 15.6 (Marius von Glahn). 4 1K nærings-søkende Steinsvika, Steinsfjorden 4.8 (Kendt Myrmo). 2 1K unger utenfor reir, ikke utvokste Vik, Steinsfjorden 5.8 (Brit Rennemo, John Apeland). KONGSBERG (1/10+ par): 10 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Gamlebrua, Kongsberg Sentrum 4.4 (Morten Jagdum). 12 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Nybrufoss, Kongsberg by 4.4 (Morten Jagdum). 2 ind. (15 adult + 5 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste Kongsberg Sentrum 5.7 (Kari Hedvig Raen, Knut Olav Raen). LIER (3/7 par): 2 par engstelig adferd, indikasjon på hekking Gullaughalvøya, Linnes-stranda 6.6 (Jens Erik Nygård). 7 adult + 3 unger utenfor reir, ikke utvokste Holmenvika, Drag 29.6 (Steinar Stueflotten). 1 par + 2 unger utenfor reir, ikke utvokste Gullaug 1.7 (Jorunn Villand). MODUM (2/2 par): 3 unger utenfor reir, ikke utvokste Sand båtforening, Vikersund 13.6 (Marius von Glahn, Frode Munkhaugen). 1 adult + 3 pulli reir med egg eller unger Sagveien, Vikersund 13.6 (Marius von Glahn, Frode Munkhaugen). RINGERIKE (2/10+ par): 1 pulli ringmerket Samløp av Randselva og Ådalselva i Hønefoss 11.6 (Marius von Glahn). 2 adult + 2 pulli reir med egg eller unger Elviktangen, Steinsfjorden 11.6 (Marius von Glahn). 43 ind. (6 1K) unger utenfor reir, ikke utvokste Storelva v/Schjongslunden, Hønefoss By 23.7 (Marius von Glahn). 8 ind. (2 1K) unger utenfor reir, ikke utvokste Storelva ved rådhuset, Hønefoss, Hønefoss By 23.7 (Marius von Glahn). 25 ind. (6 1K) unger utenfor reir, ikke utvokste Storelva ved Eikli, Hønefoss, Hønefoss By 23.7 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER (3/5 par): 1 par rugende Sandøra, Hokksund 20.5 (Steinar Stueflotten). 3 par reir med egg eller unger Hokksund jern-banestasjon 27.5 (Janne Horn Erath). 1 par rugende Bånepina, Eikeren 15.6 (Steinar Stueflotten).

Den rødlistede (VU) fiskemåka har vært i tilbakegang i seinere år, og LRSK ønsker derfor rapport flest mulig hekkefunn. Det var en markant økning i antall rapporterte hekkefunn i 2021.

**rovterne** (*Hydropogone caspia*):

\* alle funn (7/12 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. rastende Linnesstranda, Lier 2.6 \*(F) (Kenneth Larsen, Melvin Åsum).



Sjelden gjest i Buskerud som blir observert årlig i sommerhalvåret langs kysten av Sør-Norge. Alle tidligere godkjente funn i Buskerud er gjort i perioden mai-juni. Arten ble sist observert i Nordfjorden, Hole og Ringerike 4.6.2020.

**makrellterne** (*Sterna hirundo*):

\* hekkefunn (2 med 5 par); funn i øvre deler av Buskerud (0) LRSK

2021: 8 ind. paring/kurtise på mulig hekkeplass Østbråtaskjæret, Steinsfjorden, Ringerike 11.5 (Marius von Glahn). 1 ind. rugende Gilhus, Linnesstranda, Lier 24.5 (Jens Erik Nygård). 1 par paring/kurtise på mulig hekkeplass Linnesstranda, Lier 5.6 (Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten). 1 1K rastende Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 28.7 (Kendt Myrmo). 1 1K næringssøkende Linnesstranda, Lier 3.-5.8 (Jorunn Villand, Pål Gisle, Steinar Stueflotten).

Den rødlistede (EN) makrellterna har vist generell tilbakegang i Norge i seinere år. Noen få par hekker fortsatt i Steinsfjorden i Hole/Ringerike og på Gilhus i Lier. Observasjoner av flygedyktige unger på begge disse lokalitetene i månedsskiftet juli/ august, indikerer at minst to par lyktes med hekkingen i 2021.

**rødnebbterne** (*Sterna paradisaea*):

\* hekkefunn (0); funn i nedre Buskerud (- 1/1) LRSK

2021: 2 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Øvre Hein, Krækkjahalli, Nore og Uvdal 25.6 (Petter Osbak). 1 adult næringssøkende Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.8 (Steinar Stueflotten).

Arten hekker fåtallig i fjellet i øvre deler av Buskerud, noe observasjonen på Øvre Hein 25.6. er en god indikasjon på, men ingen sikre hekkefunn er rapportert fra fjellregionen de siste par årene. De fleste observasjonene av rødnebbterner i nedre deler av Buskerud blir gjort i trekktidene vår (mai-primo juni) og høst (august-oktober), men få slike funn er gjort de siste par årene. I sum kan dette tyde på at arten er blitt sjeldnere i Buskerud i seinere år.

**svarterterne** (*Chlidonias niger*):

\* alle funn (14/16 - 1/1) LRSK

2021: 1 1K næringssøkende Småøyene, Steinsfjorden, Hole 9.8 \*(F) (\*Terje Pettersen, Vegard Bunes, Kendt Myrmo mfl.). 1 1K Framdalsvika, Steinsfjorden, Ringerike 9.8 (Marius von Glahn).

Sjelden gjest i Buskerud som sist ble observert på Linnesstranda i Lier 2.10.2017. De fleste funn av svarterterne er gjort på Fiskumvannet og i Nordre Tyrifjorden fra medio mai til medio juni. Sommerfunn som det i Steinsfjorden 9.8.2021, er sjeldne. 1K svarterna i Steinsfjorden 9.8. oppholdt seg i området Småøyene-Herøya-Steinsvika det meste av dagen, men ble ikke sett i området neste dag. Det anses som sannsynlig at det var det samme individet som ble sett på en snartur gjennom Herøysundet nord til Framdalsvika i Steinsfjorden den samme dagen.



Svarterterne 1K Steinsfjorden, Hole 09.08.21.  
Foto: Terje Pettersen



Fjelljo Halnekollen, Hol 29.05.21.  
Foto: Arild Gauteplass

**fjelljo** (*Stercorarius longicaudus*):

\* alle funn (13 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. næringssøkende Halnekollen, Hol 29.5 \*(F) (\*Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass).

Arten hekker fåtallig i fjellet i Hol og Ål i gode smågnagerår og sees kun sjeldent på trekket vår og høst i nedre deler av Buskerud. De to siste godkjente observasjonene er: 2 ind. i Breiangen, Hurum 30.5.2014 (nå Asker kommune) og 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 3.6.2013.

**lomvi (*Uria aalge*):**

\* innlandsfunn (- 7/27)

2021: 1-2 ind. Frognøya, Tyrifjorden, Hole 5.-24.1 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 ind. Svarstadvika, Sælabonn, Hole 16.1 (Terje Pettersen). 9-10 ind. Frognøya V, Tyrifjorden, Hole 25.-26.1 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen mfl.). 3 ind. Gomnes båthavn, Gomnes, Hole 26.1 (Terje Pettersen mfl.). 4 ind. Tyrifjorden-Utøya-Utstranda, Utøya, Hole 8.2 (Terje Pettersen). 2-7 ind. Nordfjorden, Ringerike 18.-28.2 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn). 2-6 ind. Frognøya, Tyrifjorden, Hole 17.3-5.7 (Terje Pettersen mfl.). 1-4 ind. Nordfjorden, Ringerike 14.-30.4 (Richard Hals Gylseth, Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1-3 ind. Frognøya, Tyrifjorden, Hole 13.9-26.12 (Terje Pettersen). 1 ind. rastende Bybrua, Drammen By, Drammen 2.10 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). 1 ind. Fiskumvannet, Øvre Eiker 11.-27.10 (Melvin Åsum, Steinar Stueflotten). 1 ind. Nordfjorden, Ringerike 18.10.-13.12 (Richard Hals Gylseth, Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 1 ind. rastende Miletjern, Drammen 27.10 (Rolf E. Andersen). 1 ind. Damtjern, Ringerike 27.10 (Marius von Glahn, Terje Pettersen). 1-7 ind. Steinsfjorden, Hole 27.10-20.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Steinar Stueflotten). 1-3 ind. Åsa, Ringerike 30.10-3.11 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen). 2 ind. Nordfjorden Ø, Hole 3.11 (Terje Pettersen). 1 ind. Drammenselva ved Buskerud storsenter og Mjøndalsbrua, Drammen 3.11 (Jon Ludvig Hals, Morten Jagdum). 2 ind. Nakkerud, Ringerike 21.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo).

Sjelden art i innlandet. Som regel er slike observasjoner knyttet til større invasjoner med uvær og sterk vind på kysten. Enkelte lomvier kan da bli drevet inn over land og havne i vann og innsjøer som i Tyrifjorden. Uvanlig mange individer i Tyrifjorden på starten av året med opptil 10 ind. i januar, minst 7 ind. i februar-mars, 5-6 ind. i april og 3-5 ind. mai-juli. Også mange individer i 2. halvår med opptil 5 ind. i Tyrifjorden i september-november, 2-4 ind. i desember, og opptil 8 ind. i Steinsfjorden fra ultimo oktober til november, samt 3 ind. i desember. Det ble også observert 1 ind. i nedre deler av Drammenselva, Drammen og 1 ind. i Fiskumvannet, Øvre Eiker i oktober. Et innlandsfunn bør nevnes spesielt: 1 ind. Damtjern i Ringerike 453 moh. 27.10. Siden det har vært få individer i Tyrifjorden de siste årene, må dette bety et påfyll av nye individer vinteren 2020/2021 og på nytt i oktober 2021. Det er tidligere vist at lomvier som havner i Tyrifjorden i forbindelse med invasjoner i Oslofjorden, noen ganger kan oppholde seg i Tyrifjorden i et par år, gitt at fjorden ikke fryser helt til.

**smålom (*Gavia stellata*):**

\* hekkefunn (4), vinterfunn des-feb (2)

Hekkefunn 2021: 1 hekking (2 pulli) unger utenfor reir, ikke utvokste skjermet lokalitet, Skurdalen nord, Hol 6.6-4.8 (Jostein Myre). 1 par rugende skjermet lokalitet, Strekningen Haugastøl-Ustaoset, Hol 12.6 (Einar Leikanger). 1 hekking (1 pull) unger utenfor reir, ikke utvokste skjermet lokalitet, Sangeffjellet, Ål 17.6.-12.7 (Torgrim Breiehagen, Anne Mette Monclair). 2 unger utenfor reir, ikke utvokste skjermet lokalitet, Dagalifjellet, Nore og Uvdal 26.7 (Frode Nordang Bye).

Vinterfunn 2021: 1 2K Grunnane, Svelvik, Drammen 2.1. (Steinar Stueflotten). 1 ind. Nordfjorden, Ringerike 15.-20.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, John Apeland, Steinar Stueflotten, Jørn Lønner).

Arten hekker spredt i nordre og midtre deler av Buskerud og sees regelmessig på vårtrekket i Tyrifjorden, i indre Drammensfjorden og på Grunnane ved Svelvik, mer sporadisk i lavlandet ellers i nedre deler av Buskerud. Jevnlig opptil 11-33 ind. på Grunnane og opptil 10-34 ind. i Tyrifjorden medio mars - primo mai 2021. Nøyaktige hekke-lokaliteter er skjermet til 5x5 km ifølge regler fra Artsdatabanken. Første vårfunn 2021: 11 ind. Grunnane 8.3., jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 10.4. ± 15 dager (26 år). Sjelden vintergjest.

**storlom (*Gavia arctica*):**

\* hekkefunn (7), vinterfunn des-feb (0)

Hekkefunn 2021: 2 adult + 1 unge utenfor reir, ikke utvokst Solheimstulen, Nore og Uvdal 2.6.-16.8 (Bjørn Lauritzen). 1 par reir med 2 egg Raudtjern, Ål 17.6 (Jens Romslo). 1 par rugende Pålgardvatnet, Hol 30.6 (Steinar Stueflotten). Familie på 4 i passende hekkebiotop Langetjønne, Nore og Uvdal 1.7 (Anders Musland). 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Lauvsjøen, Golsfjellet NV, Gol 16.7 (Torgrim Breiehagen). 1 par m/1 unge utenfor reir, ikke utvokst Ørterstølen, Golsfjellet N, Gol 6.8 (Per Stensland). 1 par + 1 1K næringssøkende Kolbrekkvannet N, Øvre Eiker 15.8 (Steinar Stueflotten).

Vanlig, men spredt og heller fåtallig hekkefugl over det meste av Buskerud. Flere observasjoner er gjort i hekketiden i passende hekkebiotop, men bare de nevnte med bekreftet hekking. Meget sjelden vintergjest i Buskerud.

**islom (*Gavia immer*):**

\* alle funn (8/9 - 1/1) LRSK

2021: 1 2K næringssøkende Bønsnes og Frognøya, Tyrifjorden, Hole 5.-24.1 \*(F) (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth mfl.).

Sjelden gjest i Buskerud vår og høst. Dette er det første vinterfunnet av arten i Buskerud. Innlandsfunn som dette, er også sjeldne. Sist observert på Fiskumvannet, Øvre Eiker 4.5.2014.

**gulnebbblom** (*Gavia adamsii*):

\* alle funn (6/6 - 2/2) LRSK

2021: 1 adult rastende Linnesstranda, Lier 24.5 \*(F) (Jens Erik Nygård). 1 1K næringssøkende Nordfjorden og Tyrifjorden vest, Ringerike 15.-22.12 \*(F) (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, John Apeland, Richard Hals Gylseth).

Meget sjelden gjest i Buskerud. Dette er det første sikre funnet av gulnebbblom ved Linnesstranda, og det andre for Tyrifjorden. Det første her ble gjort våren 2014. Innlandsfunn er sjeldne i Norge og vil normalt dreie seg om observasjoner i store innsjøer som Tyrifjorden og Mjøsa.

**kuhegre** (*Bubulcus ibis*):

\* alle funn (0 - 1/1) NSKF

2021: 1 adult næringssøkende Steinsvika, Steinssletta og Hårum, Hole og Bråk og Tolpinrud, Ringerike 22.-26.4 \*(F) (\*Jan Fredrik Hornemann, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Vegard Bunes mfl.).

Meget sjelden art med kun 18 godkjente funn i Norge (ref. Norgeslisten per 31.12.2021). Ny art for Buskerud og Viken! Oppdaget av Jan Fredrik Hornemann på Stein gård 22.4., gjenfunnet av Vegard Bunes, Richard Hals Gylseth og Terje Pettersen samme kveld. Kuhegra overnattet i sivkanten ute i Steinsvika og drev næringssøk på diverse lokaliteter i Steinssletta-området i Hole kommune på dagtid. Den 23.4. ble den sett på Bråk Sf Norderhov i Ringerike kommune og de siste par dagene i perioden på jordene ved Tolpinrud i Ringerike. Sist observert ved Mo gård, Hole i 17-tida 26.4. Mange fuglekikkere strømmet til Steinsletta i disse april-dagene for å få med seg denne sjeldne hegra. Det ble registrert hele 82 observasjoner med 107 bilder av fuglen på AO. Det antas at dette var den samme kuhegra som ble sett i Bygland (Agder) 19.4. og i Tinn (Telemark) 20.4. Et par dager etter at den forsvant fra Steinsletta, dukket det opp en kuhegre ved Karlstad i Värmland, Sverige som godt kan ha vært det samme individet (Winnem 2021 b).



Kuhegre Steinssletta, Hole 23.04.21. Foto: Terje Pettersen

**gråhegre** (*Ardea cinerea*):

\* hekkefunn (2)

2021: 5 ind. besøker bebodd reir Rud skog, Rud, Øvre Eiker 29.3 (Per Øystein Klunderud). 6 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Snyta, Ringerike 1.4 (Terje Pettersen). 5 ind. besøker bebodd reir Rudsengene, Øvre Eiker 3.4 (Steinar Stueflotten).



Fåtallig hekkefugl i Buskerud, men konkrete reirfunn blir sjelden rapportert. Kolonien på Rudsengene/Rud skog i Øvre Eiker er kjent fra tidligere. Minst 4 reir var i bruk her i 2021. Gråhegrene på Snyta ble observert i granholtet der de har hekket tidligere, så mulig hekking også der i år. I juli ble det observert opptil 3 1K gråhegrer i Steinsvika, Hole, noe som kan indikere vellykket hekking et sted i Tyrifjords-området dette året.

#### **egrettheigre (*Ardea alba*):**

\* alle funn (26/28 - 2/15) LRSK

2021: 1 adult Juveren, Ringerike 29.4-1.5 \*(F) (\*Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Tore Westgård, Marius von Glahn, Richard Hals Gylseth mfl.). 1 adult Synneren, Ringerike 1.5 \*(F) (Terje Pettersen). 14 ind. rastende Svensrudvika, Sælabonn, Hole 4.9 \*(F) (\*Terje Pettersen, Vegard Bunes, Richard Hals Gylseth, Jens Tøndel Fossum mfl.). 7 ind. Svensrudvika, Sælabonn, Hole 5.9 \*(F) (Terje Pettersen, Jon Are Myhrer, Mette Myhrer, Rolf E. Andersen, Vegard Bunes, Frode Nordang Bye). 7 ind. rastende Svarstadvika, Sælabonn, Hole 5.9 \*(F) (Terje Pettersen, Didrik Løstegård Kristensen). 5 ind. Synneren, Ringerike 6.9 \*(F) (Per Furuseth). 1-4 ind. Sælabonn, Hole 7.9-1.10 \*(F) (Henning Larsen, Arvid Næss, Terje Pettersen, Jens Tøndel Fossum mfl.). 1 ind. Synneren, Ringerike 8.9 \*(F) (Steinar Stueflotten). 2-6 ind. Storøysundet, Hole 8.-9.9 (Kendt Myrmo, Tosten Tøfte). 1 ind. Røsholmstranda, Karlsrudtangen og Averøya, Ringerike 8.-13.9 \*(F) (Marius von Glahn, Steinar Stueflotten, Aksel Olsson, Terje Pettersen). 1-2 ind. Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 13.9-5.10 \*(F) (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Richard Hals Gylseth mfl.).

Egretthegrer er blitt observert årlig i Buskerud de åtte siste årene, hyppigst i perioden ultimo april til juni, mer sjeldent fra ultimo august til primo september. De fleste funnene er gjort i Nordre Tyrifjorden (Hole/Ringerike), Linnestranda (Lier) og Fiskumvannet (Øvre Eiker). I slutten av april 2020 ble det for første gang i Buskerud observert 2 ind. sammen. Det kom likevel som en stor overraskelse da det 4.9.2021 dukket opp en flokk på hele 14 ind. i Svensrudvika i Hole. Dette er det klart høyeste antallet egretthegrer som er observert på en lokalitet i Norge. Dagen etter hadde flokken delt seg i to, og i de påfølgende dagene fordelte individene seg på flere lokaliteter i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. I slutten av september var det fortsatt igjen 1-3 ind. i Sælabonn og 1-2 ind. i Steinsvika, der siste observasjon av 1 ind. ble gjort 5.10. Årets rekordforekomst var spesiell, ikke bare når det gjelder antall individer, men også at mange av egretthegrene oppholdt seg i Tyrifjords-området i en hel måned. Ved alle tidligere besøk av arten har det bare dreid seg om korte opphold på 1-4 dager. I løpet av september 2021 ble det også observert rekordmange 5-6 egretthegrer i Nordre Øyeren Naturreservat, Lillestrøm, så det må tydeligvis ha vært en stor invasjon av egretthegrer til Sør-Norge denne høsten.



14 egretthegrer (+1 gråhegre) Svensrudvika, Sælabonn, Hole 04.09.21. Foto: Terje Pettersen

#### **fiskeørn (*Pandion haliaetus*):**

\* hekkefunn (8), totalt 30 reir i bruk i det tidligere prosjektområdet Buskerud, Sande og Svelvik i 2021.

2021: 1 par reir med egg eller unger RO04a, Rollag 12.6 (Lars Sverdrup-Thygeson). 1 par reir med egg eller unger ÅL02a, Ål 17.6 (Jens Romslo). 1 par reir med egg eller unger KO07a, Kongsberg 23.6 (Morten Hunn). 1 ind. reir med egg eller unger ØE06a, Øvre Eiker 28.6 (Steinar Stueflotten). 1 ind. reir med egg eller unger LI04a, Lier 29.6



I 2021 ble det gjennomført et nytt fiskeørnprosjekt 5 år etter den forrige kartleggingen i det tidligere prosjektområdet som omfattet gamle Buskerud fylke samt gamle Svelvik og Sande kommuner i tidligere Vestfold fylke. Det ble påvist 30 reir i bruk i prosjektområdet, det samme som i 2016. 22 av disse (73 %) med antatt vellykket hekking. Av de 30 reirene som var i bruk i 2016, var bare 16 reir fortsatt i bruk i 2021. Ingen tidligere kjente eller nye reir var i bruk i tidligere Svelvik kommune (nå en del av Drammen). Av de 30 reirene, lå 4 i gamle Sande kommune, 2 i Røyken og 3 i Hurum (nå Asker kommune). De resterende 21 reirene i Buskerud fordelte seg som følger: Flesberg (2), Flå (2), Kongsberg (1), Krødsherad (1), Lier (1), Modum (1), Nesbyen (1), Ringerike (4), Rollag (3), Sigdal (2), Øvre Eiker (2) og Ål (1). Bare 8 av disse ble rapportert med hekking på AO. Andelen vellykkede hekkinger og ungeproduksjon var noe bedre i den sørlige delen av prosjektområdet enn i den nordlige. Årsaken til disse regionale forskjellene er ikke kjent, men kan ha noe med næringstilgang eller værforhold å gjøre (Stueflotten 2021 b). Første observasjon i 2021: 5.4. jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 14.4. ± 10 dager (44 år).

\* funn i nedre Buskerud (- 10/10)

**2021 (nedre deler):** HOLE (3/3): 1 hann trekkende mot N Steinssletta 10.4 (Steinar Stueflotten). 1 hunn Steinssletta og Steinsvika, Hole 26.-27.4 (Ole Jørgen Liodden, Terje Pettersen, Kendt Myrmo). 1 3K+ hunn Svarstadvika, Sælabonn 27.4 (Terje Pettersen). RINGERIKE (4/4): 1 adult hann Bjørke, Ask 9.4 (Terje Pettersen). 1 adult hann Synneren 9.4 (Richard Hals Gylseth). 1 hann Grønvolltjernet 2.5 (Marius von Glahn). 1 hunnfarget overflygende Hønen, Ringåsen, Norderhov 6.9 (Marius von Glahn). ØVRE EIKER (3/3): 1 adult hunn trekkende mot N Fiskumvannet 13.5 (Steinar Stueflotten). 1 1K Fiskumvannet 4.9 (Lars Dolmen mfl.). 1 hunnfarget Hegstad beitemark, Fiskumvannet 14.9 (Bent Andersen).

[illegible]

**steppehawk** (*Circus macrourus*):

2021: 1 1K Hegstad og Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 26.9 \*(F) (\*Jon Ludvig Hals, Andreas Hessvik-Trøite, Trude Hessvik-Trøite).

Sjelden gjest i Buskerud. Arten er blitt stadig vanligere å se i Norge i seinere år, så også i Buskerud. Dette er funn nr.3 i Øvre Eiker, sist observert ved Fiskumvannet 8.9.2018, også det var en 1K fugl. I Norge observeres arten hyppigst på høsttrekket medio august - september og på vårtrekket ultimo april - mai.



29

\* alle funn (- 1/1)

Kjerrhauken ble sett fra bil i fullt motlys, så den ble ikke sikkert artsbestemt, men sannsynligvis var det en sivhauk.

\* alle funn summarisk per kommune (- 46/46)

**2021:** DRAMMEN (1/1): 1 adult Buskerud storsenter 28.12 (Jon Ludvig Hals). FLÅ (1/1): 1 ind. Rud 25.1 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). GOL (1/1): 1 adult trekkende mot V Rotneim 9.11 (Torgrim Breiehagen). HOL (1/1): 1 adult Iungsdalshytta 25.7 (Kristoffer Bøhn). HOLE (10/10): 4 funn av 4 ind. i perioden 15.1.-17.4. og 6 funn av 6 ind. i perioden 10.11.-24.12. KONGSBERG (1/1): 1 ind. overflygende Øyen, Hostvedt 14.11 (Bjørn Roar Skullestad). LIER (3/3): 1 adult Gullaug og Linnesstranda 8.-9.1 (Bjørn Penk, Noah Penk, Steinar Stueflotten, Jens Erik Nygård). 1 ind. Linnesstranda 4.4 (Eirik Kristoffersen). 1 2K+ overflygende Linneslia 27.8 (Moisés Peregrina). MODUM (3/3): 1 adult overflygende Fure, Tyrifjorden 8.1 (Bjørn Harald Larsen). 1 adult overflygende Vikersund bru 2.3 (Jon Trygve Johnsen). 1 adult trekkende mot S Vikersund 25.12 (Jon Ludvig Hals). NESBYEN (1/1): 1 ind. Nesbyen 4.4 (Audun Skrindo). RINGERIKE (15/15): 9 funn av 9 ind. i perioden 12.1.-8.5. og 6 funn av 6 ind. i perioden 27.7.-22.12. ØVRE EIKER (6/6): 5 funn av 5 ind. i perioden 29.1.-14.5. deriblant 1 6K+ trafikkdrept Burud 29.1 (Anders Hals). 1 ind. overflygende Åssideveien Råen - Krekling 22.8 (Per Øystein Klunderud). ÅL (3/3): 1 adult S for Grandane, Strandafjorden 6.3 (Torgrim Breiehagen). 1 adult overflygende Grandane og Breiehagen, Strandafjorden 28.10-2.11 (Torgrim Breiehagen mfl.). 1 adult overflygende Strandafjorden øvre 20.11 (Torgrim Breiehagen).

[illegible]

Flest observasjoner er gjort langs hovedvassdragene i sørlige deler av Buskerud. 7 av 46 observasjoner er gjort i øvre deler av Buskerud i 2021. 54 % av observasjonene er gjort i 1. halvår og 46 % i 2. halvår. 2/3 av observasjonene er gjort i vinterhalvåret. Flere av observasjonene kan dreie seg om de samme individene.

\* vinterfunn des-feb (16/16 - 4/4)

2021: 1 2K Sonerud-Gilegata, Steinssletta, Hole og Ringerike 1.-8.1 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Eli Bondlid, Aksel Olsson mfl.). 1 2K Linnesstranda og Linnes, Lier 2.-3.1 (Hans Petter Rømme, Jens Erik Nygård, Steinar Stueflotten). 1 adult hann Vaker, Vegstein og Hønen, Ringerike 16.-24.12 (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth mfl.). 1 ind. Vikerholmen, Kjellstad, Lier 22.12 (Tore Gunnarsen). 1 hann Hårum, Steinsletta, Hole 25.12 (Marius von Glahn, Richard Hals Gylseth).

Sjelden vintergjest i Buskerud. Relativt mange funn de to siste vintrene. Hannen som ble observert ved Hårum i Hole 25.12. var samme individ som ble sett i området Vegstein-Vaker, Ringerike i dagene før jul.

\* vinterfunn des-feb per kommune (27/27 - 17/18)

**2021:** DRAMMEN: 1 ind. Gulliksrud og Kobbervikdalen 2.-6.1 (Steinar Stueflotten, Vidar Øverbye). 1 ind. Kobbervikdalen 24.1 (Kjetil Johannessen). HOLE: 1 ind. Hårum, Sonerud og Mo gård 1.-5.1 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Tore Westgård). 1 ind. Mo gård 9.2 (Marius von Glahn). KONGSBERG: 1 ind. overflygende Kongsgårdsmoen 3.1 (Aleksander Solberg). LIER: 1 ind. Reistad-Kjellstad 1.1.-3.2 (Svein Dale, Jorunn Villand, Jostein Myre mfl.). 1 ind. Reistad-Kjellstad 4.-27.12 (Jostein Myre, Ninne Aas Flydal, Svein Dale, Jan Erik Berglihn). RINGERIKE: 1 2K Gile, Steinssletta 3.-4.1 (Aksel Olsson, Terje Pettersen). 1 2K Busund, Juveren og Norderhov 9.1.-26.2 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn mfl.). 1 ind. Bærenga 25.1 (Tore Westgård). 1 ind. Storelva meandersving, Mælingen 25.1 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Nedre Tandberg og Hverven 14.-19.2 (Richard Hals Gylseth, Terje Pettersen). 1 ind. Juveren, Norderhov og Hønen 14.-26.12 (Terje Pettersen, Kendt Myrmo, Richard Hals Gylseth, Marius von Glahn). ØVRE EIKER: 2 ind. Fiskumvannet 3.1 (Lars Dolmen). 1 ind. Fiskumvannet, Darbu og Skjelbred 7.1-2.2 (Steinar Stueflotten, Jorunn Villand, Jon Ludvig Hals, Aleksander Solberg, Jostein Myre). 1 ind. Sem og Vålen 30.1-1.2 (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 1 ind. Hegstad og Skarra 20.-28.2 (Stig Johan Kalvatn, Jorunn Villand).

Sjelden vintergjest som er observert alle de fem siste vintrene i nedre deler av Buskerud med overraskende mange observasjoner vinteren 2020/2021. 15 av de 17 funnene ble gjort i januar-februar 2021 mot bare 2 funn i desember 2021, if. 6 funn i desember 2020. Flere av observasjonene dreier seg trolig om de samme individene.

\* alle funn summarisk per kommune (- 61/66), hekkefunn (1)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**hornugle** (*Asio otus*):

**Hekkefunn 2021:** 1 hekking (3 pulli) tiggelyder Hegstad, Fiskumvannet, Øvre Eiker 30.5.-5.7 (Andreas Hessvik-Trøite, Aleksander Solberg, Melvin Åsum, Lars Dolmen, Jon Ludvig Hals, Steinar Stueflotten, Trude Hessvik-Trøite). 1 1K tiggelyder Smiubakken, Hole 1.6 (Vegard Bunes). 1 hekking (3 1K) tiggelyder Søhol, Røyse, Hole 1.6.-2.7 (Vegard Bunes, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 hekking (2 pulli) tiggelyder Bryn, Hokksund, Øvre Eiker 4.-23.6 (Steinar Stueflotten, Rolf E. Andersen). 3 pulli tiggelyder Ådalselva naturreservat, Hallingby, Ringerike 12.6 (Terje Pettersen). 1 unge tiggelyder Nedberg, Drammen 23.6 (Steinar Stueflotten). 1 1K tiggelyder Nærstad, Modum 23.6 (via Rolf E. Andersen).

Arten hekker fåtallig i Buskerud, vanligst i gode smågnagerår. Normalt blir det gjort 1-4 hekkefunn i året. Både i 2020 og 2021 ble tiggende unger hørt på 7 forskjellige lokaliteter i nedre deler av Buskerud, noe som indikerer to gode hekkeår for arten. Vinterfunn er relativt sjeldne.

\* hekkefunn (1), vinterfunn des-feb (11 - 0)

I tillegg til dette ene sannsynlige hekkefunnet, ble jordugler også observert på et par andre mulige hekkeplasser i Nore og Uvdal og Hol, men uten at hekking ble påvist. Vinterfunn er sjeldne.

\* alle funn (- 2/2) LRSK

A Great Horned Owl is perched on a metal roof ridge. The owl has mottled brown and white feathers and large, bright orange eyes. The background is a solid dark blue, representing the night sky. The roof ridge is made of metal and has some moss or lichen growing on it.

Hubro Hårum, Steinssletta, Hole 04.11.21  
Foto: Ole Jørgen Liodden



Det gjøres kun et fåtall observasjoner av hubro i Buskerud, men nesten årlig og oftest i vinterhalvåret. Det antas at ca. 5 par fortsatt kan hekke i Buskerud. De to observasjonene våren 2021 er gjort på tilnærmet samme sted som en kjent gammel hekkelokalitet for hubro. I samme tidsperiode som det ble hørt et rop fra en hubro ved Synneren på Ringerike 12.11. (ikke aktuell hekkebiotop), skal det ha blitt sett en stor ugle i lyset fra en bil, sittende ute på et jorde ved Røsholmen ikke langt unna Synneren, mens den trolig spiste på noe (pers. medd. via Terje Pettersen). Det antas at disse observasjonene dreier seg om samme hubro som ble sett og fotografert på Steinssletta 4.11. Flere funn av hubro blir nok ikke rapportert på AO, men holdt hemmelig eller registrert i Rovbase som LRSK ikke har tilgang til.

**lappugle** (*Strix nebulosa*):

\* alle funn (25/32 - 3/3) LRSK

2021: 1 ind. næringssøkende Leinåsen, Røyse, Hole 28.1-19.2 \*(F) (\*Vinjar Guleng, Terje Pettersen, Vegard Bunes, Aksel Olsson mfl.). 1 adult Rustesvingen/Valdresvegen v/Rust, Gol 14.-15.5 \*(F) (Agnar Målsnes, Gunn Mjelde, Per Furuseth). 1 ind. reir med 1 unge skjermet lokalitet, Ringerike 8.7 \*(F) (Thor Erik Jelstad).

Sjelden art i Buskerud som oftest blir observert i vinterhalvåret fra september til mars. Lappugla som oppholdt seg på Leinåsen i Hole i tre uker vinteren 2021, var trolig et 2K individ ifølge Roar Solheim. Den var skadet i venstre vinge som hang litt ned ved flere observasjoner. Et lite sår i venstre vingeknoke kunne sees. Den kunne imidlertid fly greit og ble sett fange mus. Lappugla ble påvist hekkende for første gang på Ringerike i 2017, og hekket også på to steder i samme del av Buskerud i 2018. Dette var begge gode smågnagerår. Hekkefunnet 8.7.2021 ble gjort i samme område som ett av hekkefunnene i 2018.

**hærfugl** (*Upupa epops*):

\* alle funn (48 - 2/2)

2021: 1 ind. Nordre Haug gård, Ringerike 5.4 \*(F) (Anne Lise Eriksen via Henning Larsen). 1 ind. ved fôring Jutebrua, Vestfossen, Øvre Eiker 12.4 \*(F) (Monica Forsberg via Per Øystein Klunderud).

Arten observeres kun sporadisk i Buskerud, men er sett 1-3 ganger årlig siden 2015. De fleste funn blir gjort om våren (april – mai) og høsten (august - november). 5. april er tidligste observasjon i Buskerud til nå, jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 30.4. ± 11 dager (16 år). Siden dette er en art med særpreget utseende som mange legger merke til i kulturlandskapet, blir mange funn meldt inn av andre personer enn de mer aktive fuglekikkerne, noe som også var tilfellet med årets to funn.

**isfugl** (*Alcedo atthis*):

\* alle funn (109 - 9/11)

2021: 2 ind. Linnesstranda, Lier 4.1 (Jorunn Villand). 1 ind. Vikersund, Modum 27.1 (Tom Schandy). 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop TOV-E rute 608 Sørumsmarka, Ringerike 23.5 (Marius von Glahn). 1 adult hann Kloppfoss, Kongsberg 31.8 (Finn Gregersen). 1 ind. Drammenselva v/Burud, Øvre Eiker 29.9 (Odin Kirkemoen). 2 ind. Lågen v/Røysa/Gomsrud avfallsanlegg, Kongsberg 2.10 (Finn Gregersen). 1 ind. Linnesstranda, Lier 9.10 (Jens Erik Nygård). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Øyen-Lågen, Hostvedt, Kongsberg 17.10 (Helge Midtgard, Bjørn Roar Skullestad). 1 ind. Hovsenga, Ringerike 19.10 (Christian Dalen).

Mange observasjoner de siste årene. 2/3 av observasjonene i 2021 ble gjort i 2. halvår, flest i oktober. Få observasjoner på Linnesstranda i 2021 jamført 2020.

**tretåspett** (*Picoides tridactylus*):

\* hekkefunn (3)

2021: 1 par besøker bebodd reir Svartskurden, Øvre Eiker 29.4 (Steinar Stueflotten). 1 par reir, unger hørt bjørkeskog NØ for Langetjørni, Ål 17.6 (Torgrim Breiehagen). 2 ind. (1 adult hann + 1 1K) mat til unger Tørrbekk, Eikeren, Øvre Eiker 19.7 (Johs Edvardsen).

Spredt hekkefugl i Buskerud. F.o.m. 2021 er hekkefunn av arten inkludert i denne rapporten.

**dvergspett** (*Dryobates minor*):

\* hekkefunn (1)

2021: 1 par besøker bebodd reir Linnesstranda, Lier 27.5-19.6 (Steinar Stueflotten, Odd Rygh, Jens Erik Nygård).

Fåtallig hekkefugl i Buskerud. Det er gjort flere observasjoner av dvergspett i hekketida i passende hekkebiotop, men bare dette ene funnet på Linnesstranda med bekreftet hekking.

\* vinterfunn des-feb (12/13 - 6/6)

33

34

\* hekkefunn (2)

Arten hekker årlig i nedre deler av fylket, men sikre hekkefunn blir sjelden rapportert. De to angitt funnene er gode indikasjoner på hekking i disse områdene i 2021.

\* alle funn per kommune (- 17/35)

2021: DRAMMEN (1/1): 1 ind. Krokstadsenter 2.11 (Melvin Åsum). HOL (1/1): 1 adult ved fôring Nymoen, Hovet 10.-11.4 (Per Furuseth). HOLE (6/10): 1 adult Mo gård, Steinssletta 20.3 (Terje Pettersen). 4 adult Onsaker 21.3 (Terje Pettersen, Marius von Glahn, Richard Hals Gylseth). 1 2K Stadum, Røyse 27.3 (Terje Pettersen). 2 adult Gomnes 4.4 (Jørgen Lønø). 1 ind. Sandtangen og Stadum, Onsaker 24.-25.8 (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 ind. Selteveien 14.10 (Aksel Olsson). LIER (1/1): 1 ind. Huseby V 2.4 (Hans Petter Rømme). RINGERIKE (4/7): 4 ind. trekkende mot N Hverven 28.2 (Andreas Gullberg). 1 ind. Norderhov 21.3 (Stephan Koll). 1 ind. Bjørnerud 21.4 (Jerry Skogbeck). 1 ind. Røsholmen 20.8 (Richard Hals Gylseth, Eli Bondlid). ØVRE EIKER (4/15): 9 ind. Fossesholm, Vestfossen 14.10 (Jorunn Villand). 6 ind. Bogen N, Vestfossen 14.10 (Steinar Stueflotten). Maks. 10 ind. Bergsvingen 14.-24.10 (Steinar Stueflotten). 5 ind. Hegstadmyra og Skjelbred, Hegstad 14.10 (Jorunn Villand, Steinar Stueflotten). 1 1K Fiskumvannet 22.10 (Steinar Stueflotten). 2 ind. Ås, Øvre Eiker 6.11 (Aleksander Solberg). 2 1K Hegstad beitemark, Fiskumvannet 7.11 (Steinar Stueflotten).

[illegible]

Arten observeres årlig i Buskerud, primært i vinterhalvåret fra oktober til april, de fleste i trektidene vår (mars - april) og høst (oktober - november). Sommerobservasjoner som de på Røsholmen og Onsaker i slutten av august, er sjeldne. Normalt sees bare enkeltindivider eller noen få individer sammen og da ofte sammen med vanlige kråker. Maks. 10 ind. i en flokk i Bergsvingen (Øvre Eiker) 14.10. De fleste individene observert på forskjellige lokaliteter i Øvre Eiker i perioden 14.10-7.11., tilhørte trolig denne flokken. Også flere andre observasjoner kan dreie seg om de samme individene. Funnene er presentert kommunevis for bedre oversikt.

\* alle funn (13/13 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. ved fôring Eimå v.b 890 m.o.h, Hol 22.4 \*(F) (\*Arild Gautepllass, Hege Kvarstein Gautepllass). 1 ind. næringssøkende Juven, Hol 23.4 (Arild Gautepllass, Hege Kvarstein Gautepllass).

Sjelden art i Buskerud som oftest blir observert om våren i mars-april, mer sjeldent høst og vinter. Arten ble sist observert på Røsholmstranda, Ringerike 16.12.2017. Observasjonen på Juven 23.4. antas å være det samme individet som ble fotografert på Eimå v.b. dagen før.

\* alle funn (12/15 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. næringssøkende Tangane, Strandafjorden, Ål 18.4 \*(F) (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass).

Sjelden art i Buskerud som kun blir observert år om annet, hyppigst i trekketidene vår (april) og høst (september). Siste observasjon ble gjort i Lier på høsttrekket 9.9.2019. Årets funn ved Strandafjorden i Ål er det første av trelerke i øvre deler av Buskerud.

\* alle funn (- 8/20)

2021: 1 ind. overflygende Sørum, Ringerike 23.5 (Marius von Glahn). 1-4 ind. Halnekollen, Hol 29.5.-28.6 (Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Hans Petter Rømme). 2+ ind. sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Øvre Storebotnen, Hemsedal 6.-11.6 (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim mfl.). 1 adult hann observasjon i hekketid, passende biotop Sti til Heinseter, Krækkjahalli, Hol 24.6 (Petter Osbak). 2 ind. engstelig adferd, indikasjon på hekking Ustetind, Hol 25.6.-12.7 (Trond Bølstad, Rolf E. Andersen, Bjørn Lauritzen). 1 adult + 1 1K nærings-søkende Austre Volavatnet, Hol 25.7 (Kristoffer Bøhn). 6 1K observasjon i hekketid, passende biotop Lågaros, Nore og Uvdal 2.8 (Lars Herman Næss). 2 ind. næringsøkende Veslemyra, Svarstad, Hole 8.12 (Terje Pettersen).



Arten hekker spredt i høyfjellet i øvre deler av Buskerud og sees sporadisk i lavlandet på vårtrekket (april-mai), mer sjeldent på høsttrekket (ultimo september - november). Gjennomsnittlig ankomstdato: 27.4. ± 17 dager (19 år). Vinterfunn som det på Svarstad (Hole) 8.12., er sjeldne.

**[hvitørebylbyl]** (*Pycnonotus leucotis*):

\* alle funn (1/1 - 1/1) LRSK

2020: 1 ind. på fôring Bårud, Modum 23.7. \*(F) (Borgar Kolstad).

2021: 1 ind. rastende Hans Strøms v 3, Krokstadelva, Drammen 30.6 \*(F) (Hans Jørgen Nilsen).

Observasjoner av rømte burfugler som dette, har normalt lav prioritet hos LRSK, men det er interessant å følge med på hvilke arter i kategori E som forekommer, hvor og når. Dette er de første rapporterte tilfellene av rømte hvitørebylbyler i Buskerud. Arten hører hjemme i området fra Irak til India, og er en relativt vanlig burfugl i Norge. Fuglen i Krokstadelva var merket med en gul plastring på høyre fot, og må derfor ha vært et annet individ enn det som ble sett på Åmot året før. Årets rømning skal ha blitt sett av flere rundt om i Krokstadelva sommeren 2021 ifølge Hans Jørgen Nilsen. Det skal også ha blitt sett 1 ind. i en hage i Drammen 29.08.21 ifølge et innlegg på Facebook.

**gransanger, underarten tristis** (*Phylloscopus collybita tristis*):

\* alle funn (1/1 - 3/3) LRSK

2021: 1 ind. næringssøkende Linnesstranda, Lier 21.10 \*(F) (Jorunn Villand). 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 31.10 \*(F) (Steinar Stueflotten, Jon Ludvig Hals, Aleksander Solberg). 1 ind. nærings-søkende Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 15.11 \*(F) (Kendt Myrmo).

Sjelden underart av gransanger fra Sibir. Det foreligger bare ett tidligere godkjent funn av sibirgransanger i Buskerud: 1 ind. ringmerket på Averøya, Ringerike 27.4.1978. Lyst grålige gransangere (ua. *tristis/abietinus*) som kan ha tilhørt denne underarten, er imidlertid observert noen få ganger seint på høsten (ultimo september - primo november) i Buskerud. Gode bilder og helst også observert lokkelyd kreves for sikker underartsbestemmelse av sibirgransangere (ua. *tristis*). Det ble registrert rekordmange observasjoner av sibirgransangere i Sør-Norge på seinhøsten 2021, noe som indikerer en invasjon av underarten denne høsten.



Sibirgransanger (ua. *tristis*) Fiskumvannet, Øvre Eiker 31.10.21. Foto: Jon Ludvig Hals

**gransanger, underarten tristis/abietinus** (*Phylloscopus collybita tristis/abietinus*):

\* alle funn (3/3 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. Tårnet, Fiskumvannet, Øvre Eiker 10.11 (Steinar Stueflotten).

37

**hauksanger** (*Curruca nisoria*):

\* alle funn (7/7 - 1/1) LRSK

2021: 1 1K ringmerket Sørby, Bergsvingen, Øvre Eiker 29.8 \*(F) (Christoffer Mikalsen Nordahl, Anders Hals).

Meget sjelden art på høsttrekket i Buskerud (medio august - oktober). Alle åtte funn så langt har vært ungfugler (1K) på høsttrekket, sist sett i Fjordparken, Drammen 23.10.2019.

**måltrost** (*Turdus philomelos*):

\* vinterfunn des-feb (4/5 - 1/1)

2021: 1 ind. næringssøkende Hov alle, Hovsenga, Ringerike 14.12 (Terje Pettersen).

Meget sjelden vintergjest, sist observert på Gulsbogen i Drammen 29.12.2019.

**duetrost** (*Turdus viscivorus*):

\* vinterfunn des-feb (23/31 - 3/3)

2021: 1 ind. næringssøkende Sølfastøya, Drammen 25.2 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). 1 ind. overflygende Sutøya, Nesbyen 25.2 (Andreas Gullberg). 1 ind. Røsholmstranda, Nordfjorden, Ringerike 18.12 (Terje Pettersen, Frode Munkhaugen).

Duetroster har overvintret regelmessig i vertstrær med misteltein sør på Hurumlandet (Asker) i seinere år, men slike observasjoner rapporteres ikke lenger her, men er inkludert i summen av historiske funn fram til 2019. Andre vinterfunn er sjeldne i Buskerud. De to funnene fra 25.2. dreier seg trolig om tidlig vårtrekk.

**svartrødstjert** (*Phoenicurus ochruros*):

\* alle funn (37/40 - 2/2) LRSK

2021: 1 2K hann ringmerket Sørby, Bergsvingen, Øvre Eiker 12.4 \*(F) (Christoffer Mikalsen Nordahl, Anders Hals). 1 2K hann sang/spill i hekketid og passende hekkebiotop Totteskogen, Hemsedal 27.5.-2.6 \*(F) (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim).

Sjelden gjest i Buskerud, selv om arten er blitt observert årlig siden 2012 og med flere funn hvert år de siste årene. De fleste observasjonene blir gjort på vårtrekket i april-mai, mer sjeldent på høsttrekket medio september-primo november. Gjennomsnittlig ankomstdato: 21.4 ± 13 dager (21 år). Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det i Hemsedal, forekommer overaskende ofte. Faktisk er 45 % av alle funn av arten gjort i denne delen av Buskerud.



Svartrødstjert 2K hann ringmerket på Sørby, Øvre Eiker 12.04.21. Foto: Anders Hals

**svartstrupe** (*Saxicola rubicola*):

\* alle funn (25/25 - 2/2) LRSK

2021: 1 hann næringssøkende Mo gård, Steinssletta, Hole 15.3 \*(F) (Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth). 1 1K næringssøkende Steinsvika og Hungerholt, Hole 20.-26.9 \*(F) (Kendt Myrmo, Terje Pettersen, Richard Hals Gylseth, Aksel Olsson).

Sjelden gjest i Buskerud som oftest blir observert på vårtrekket i mars - april, mer sjeldent på høsttrekket i oktober. Gjennomsnittlig ankomstdato:  $25.3 \pm 19$  dager (12 år). Funnet av en ungfugl i tidlig overgang fra juvenil drakt ved Steinsvika i Hole i slutten av september, er spesielt. Dette er det tidligste høstfunnet som er gjort av svartstrupe i Buskerud. Man kan lure på hvor langt unna Hole hekkeområdet som denne ungfuglen kommer fra, ligger.

**sitrerle** (*Motacilla citreola*):

\* alle funn (1/1 - 1/1) LRSK

2021: 1 adult hann rastende Fiskumvannet, Øvre Eiker 16.5 (Johs Edvardsen).

Sitrerle er en østlig erleart med hovedutbredelse i Sibir og Sør-Russland. Arten blir nå observert årlig i Norge i lite antall, hyppigst i trekketidene vår og høst. Også den første observasjonen av arten i Buskerud og Øvre Eiker ble gjort ved Fiskumvannet den 10.05.20. I tillegg ble en adult sitrerle hann observert og fotografert på Kinn ved Grunnane den 19.4.2019, i den gangen gamle Svelvik kommune (Vestfold) nå Drammen kommune.

**vintererle** (*Motacilla cinerea*):

\* vinterfunn des-feb (7/7 - 1/1)

2021: 1 hann næringssøkende Vestre Vikersund, Modum 18.1 (Marius von Glahn).

Vintererle ankommer ofte tidlig (ultimo mars) og drar igjen seint (oktober), men er sjelden å se om vinteren.

**linerle** (*Motacilla alba*):

\* vinterfunn des-feb (- 1/1)

2021: 1 ind. Vikersund bru, Vikersund, Modum 2.1 (Elisabeth Josefine Sommer, Eirik Kristoffersen).

Vinterfunn av linerle i desember-februar forekommer sporadisk i milde vintre. Sist observert 1 ind. i Vikersund, Modum den 18.12.20 som godt kan ha vært samme individ som ble sett samme sted to uker seinere.

**svartryggerle** (*Motacilla alba yarrellii*):

\* alle funn (25/26 - 3/3) LRSK

2021: 1 hann Jordhaugene, Linnestranda, Lier 6.4 \*(F) (Hans Petter Rømme). 1 hann næringssøkende Høyenhallstranda, Steinsfjorden, Hole 19.4 \*(F) (Marius von Glahn). 1 hann Gretteberg/rv 7, Hol 29.5 (Rolf E. Andersen).

Den mørke underarten av vår egen linerle sees av og til på vårtrekket i april - medio mai, en sjelden gang også høst og vinter. Gjennomsnittlig ankomstdato:  $11.4 \pm 10$  dager (14 år). Observasjoner i øvre deler av Buskerud, som det på Gretteberg i Hol, er ikke uvanlig.

**skjærpiplerke** (*Anthus petrosus*):

\* alle funn (- 10/21), derav innlandsfunn (9/19)

2021: 1 ind. Sørums Vest, Steinssletta, Hole 24.3 (Marius von Glahn). 5 ind. Breiehagen, Strandafjorden, Ål 26.3 (Torgrim Breiehagen). 1 ind. Hovsfjorden, Hol 27.3 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Tangane, Strandafjorden, Ål 28.3 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 4 ind. Liabru, Sør-Skurdalen, Hol 1.4 (Per Furuseth). 3 ind. Gauteplass, Skurdalen, Hol 3.4 (Halvor Gauteplass). 2 ind. Tangane, Strandafjorden, Ål 7.4 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Utløpsterskel, Veslefjorden, Hol 18.4 (Trond Bølstad). 1 ind. Terskel, Ustedalsfjorden til Veslefjorden, Hol 19.4 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Eikredammen, Hemsedal 23.-25.4 (Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim). 2 ind. Grunnane, Drammen 28.9. (Kai Månsson).

Skjærpiplerker blir observert regelmessig på vårtrekket i mars-april på flere innlandslokaliteter bl.a. i øvre deler av Buskerud. Gjennomsnittlig ankomstdato:  $29.3 \pm 10$  dager (27 år). Rekordmange innlandsfunn våren 2021. Noen av funnene ved bl.a. Strandafjorden kan dreie seg om de samme individene. Observasjoner på høsttrekket er sjeldne.

**konglebit** (*Pinicola enucleator*):

\* alle funn summarisk per kommune (- 61/553)

2021: DRAMMEN: 1 ind. Korpåsen 11.11 (Audun Skrindo). FLÅ: 10 ind. Gulsviksetervegen 23.10 (Geir Mathiesen). 2 ind. Hansbråtan 4.12 (Geir Mathiesen). GOL: 3 ind. Ørterstølen, Golsfjellet N 15.6 (Rune Solvang).



7 funn av 73 ind. i perioden 24.10.-14.12. HEMSEDAL: 4 funn av 102 ind. i perioden 6.11.-2.12. derav 52 ind. ringmerket i perioden 6.-14.11. (Bent Fjeldheim). HOL: 1 hunn ved føring Markehaugen 31.3 (Wendy Slettemoen). 7 funn av 72 ind. i perioden 29.10.-31.12. HOLE: 17 funn av 100 ind. i perioden 26.10.-28.12. KONGSBERG: 15 ind. Hjarnes, Passebekk 31.10 (Odd Frydenlund Steen, Helge Midtgard, Bjørn Roar Skullestad). 1 hann Kongsberg Sentrum 13.12 (Morten Jagdum). LIER: 8 ind. Høgda, Tranby 1.11 (Klaus Meyer). MODUM: 1 ind. Langvann, Finnemarka V 24.11 (Eirik Kristoffersen). 2-34 ind. Vikersund 5.-28.12 (Jon Ludvig Hals mfl.). NESBYEN: 1 ind. Synstevann, Buvatn 29.8 (Rolf E. Andersen). 1 ind. Lyserstølen, Buvatn 24.10 (Rolf E. Andersen). 25 ind. Fremre Trytehølet 29.10 (Terje Pettersen). RINGERIKE: 10 funn av 76 ind. i perioden 24.10.-27.12. ROLLAG: 6-11 ind. Veggli 12.-13.11 (Terje Sande). ÅL: 2 ind. Liagardsvegen 166, Sata 29.-31.10 (Torgrim Breiehagen, Anne Mette Monclair mfl.). 14 ind. Bjørkeli V for Langetjørni 30.10 (Torgrim Breiehagen).

Konglebiten opptrer tidvis invasjonsartet i Norge. Både høsten 2019 og høsten 2021 hadde vi store invasjoner i Sør-Norge. I 2021 startet invasjonen medio oktober og varte til ut på nyåret 2022. Flest observasjoner ble gjort i månedsskiftet oktober/november. Noen av observasjonene kan dreie seg om de samme individene. Hele 52 ind. ble ringmerket av Bent Fjeldheim på Søre Finset i Hemsedal i dagene 6.-14.11. Ett interessant funn i hekketida ble gjort på Golsfjellet 15.6. Arten er tidligere påvist hekkende i gamle Oppland fylke, men er ennå ikke påvist hekkende i Buskerud.

2021: DRAMMEN: 1 ind. sang/spill Skogliveien, Gulslogen 23.-24.5 (Vidar Øverbye, Siw Hagstrøm). KONGSBERG: 1 hann sang/spill Hostvedt 20.5 (Morten Jagdum). 1 ind. sang/spill Skoli, Føske 17.6 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. sang/spill Røsholt, Passebekk 17.6 (Bjørn Lauritzen). LIER: 20 funn av 32 ind. i perioden 23.5.-8.7. MODUM: 17 funn av 40 ind. i perioden 24.5.-24.6. NORE OG UVDAL: 1 ind. Hallandsgrend 29.5 (Lina Westermann). 1 ind. sang/spill Kravikfjord stasjon 6.6 (Bjørn Lauritzen). RINGERIKE: 7 funn av 14 ind. i perioden 23.5.-13.7. ROLLAG: 1 ind. sang/spill Mykstu, Veggli 6.6 (Bjørn Lauritzen). 1 ind. sang/spill Rollag 6.6 (Bjørn Lauritzen). ØVRE EIKER: 6 funn av 12 ind. i perioden 19.5.-25.7.

Fåttallig hekkfugl i Buskerud. Rekordmange funn i 2021. Særlig god bestand langs Øst-Modumveien mellom Fure (Modum) og Drag (Lier). De fleste observasjoner blir gjort i perioden medio mai - primo juli. Mange observasjoner dreier seg om de samme fuglene. Første observasjon i 2021: 19.5. Hegstad, Øvre Eiker, jf. gjennomsnittlig ankomstdato: 19.5.  $\pm$  5 dager (41 år) og gjennomsnittlig 16.5. de 10 siste årene.

2021: 1 par reirbygging Gilhusodden, Linnestranda, Lier 19.5 (Rolf E. Andersen).

**brunsisik** (*Acanthis cabaret*):  
\* funn  $\geq 10$  ind. (1), hekkefunn (1)

Arten blir observert til alle årstider, men oftest i sommerhalvåret og antas å være vel så vanlig som gråsisik i lavlandet i hekketiden. Arten kan være vanskelig å skille fra gråsisik i felt. Brunsisiken hekker trolig både på Linnestranda og ved Fiskumvannet. Bare ett bekreftet hekkeforsøk (paring) og kun en flokk på minst 10 ind. er med i denne oversikten.

2021: 1-4 ind. ved fôring Øvre Reinsjøfjell, Flå 10.1.-18.4 (Jan Olav Nybo). 1 ind. overflygende Lysterstølen, Buvatn, Nesbyen 4.9 (Rolf E. Andersen). 1 adult hann Kvernahushaugen, Gol 3.11 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass).

Normalt en sjelden gjest i Buskerud som oftest blir observert i invasjonår slik vi hadde fra høsten 2019 til våren 2020. Arten er observert årlig i Buskerud siden 2013. Jamført 2019 og 2020 ble 2021 et bunnår på linje med det vi hadde i 2017 og 2018.

**lappspurv** (*Calcarius lapponicus*):

\* alle funn (- 6/9)

2021: 1 ind. Kulthaug, Hol 25.4 (Per-Kristian Ek). 1 hann Nygård, Hol 26.4 (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass). 1 ind. Golsfjellet SØ, Gol 11.5 (Per Stensland). 1 ind. observasjon i hekketid, passende biotop Bersjømråde, Ål 27.6 (Håkon Brandt Fjeld). 3 ind. Grotjtjønn, Nore og Uvdal 2.7 (Anders Musland). 2 ind. Rauhelleren, Nore og Uvdal 9.7 (Morten Urdal, Elin Floen).

Lappspurv ble valgt til Årets Fugl i 2020 pga. negativ bestandsutvikling de siste årene. Fordi lappspurven har blitt stadig sjeldnere, tas nå alle observasjoner i Buskerud med i denne rapporten.

**hvithodespurv** (*Emberiza leucocephalos*):

\* alle funn (0/0 - 1/1) NSKF

2021: 1 2K hann ved fôring Tislegård, Kongsberg Sentrum, Kongsberg 15.-24.1 \*(F) (\*Morten Jagdum mfl.).

Ny art for Buskerud! Hvithodespurven er en østlig art som hekker fra Uralfjellene i vest og østover gjennom Sibir til Kina. Den overvintrer hovedsakelig i Sentral- og Øst-Asia. I Norge observeres arten sporadisk i vinterhalvåret fra medio oktober til ultimo mars, ofte på fôringsplasser. Totalt 51 godkjente funn på Norgeslisten per 31.12.2021. Enkelte år kan hvithodespurven opptre invasjonsartet som høsten og vinteren 2016/2017 og på nytt vinteren 2021.



Hvithodespurv 2K hann Knut Hamsuns vei 3, Kongsberg Sentrum 18.01.21. Foto: Morten Jagdum

**dvergspurv** (*Emberiza pusilla*):

\* alle funn (4/4 - 1/1) LRSK

2021: 1 ind. ringmerket Sør-Hydalen, Hemsedal 29.8 \*(F) (Vegard Bang Fjeldheim, Bent Fjeldheim, Magnhild Finset Fjeldheim).

Meget sjelden art i Buskerud, sist observert på Tunehago ved Stradafjorden, Ål 20.11.2020. Verdt å nevne er at det også ble ringmerket en dvergspurv på Finset i Hemsedal 9.10.1987 (Bent Fjeldheim). Fire av de fem funnene er gjort i øvre deler av Buskerud. De fleste observasjoner i Norge blir gjort om høsten fra september til medio november.



**vierspurv** (*Emberiza rustica*):

\* alle funn (6/7 - 1/1) LRSK

2021: 1 hann ved fôring Eimå v.b 890 m.o.h, Hol 15.-28.5 \*(F) (\*Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass, Per Furuseth). 1 hann ved fôring Eimå v.b 890 m.o.h, Hol 15.-17.6 \*(F) (Arild Gauteplass, Hege Kvarstein Gauteplass).

Meget sjelden gjest i Buskerud, og en art som i noen drakter lett kan forveksles med sivspurv. Gode beskrivelser og helst fotodokumentasjon er derfor nødvendig for at funn skal kunne godkjennes. Seks av de sju godkjente funnene i Buskerud er gjort i perioden medio mai til medio juni, det sjuende i september. Fire av funnene er gjort oppe i fjellbjørkeregionen i øvre deler av Buskerud. Ut fra bildedokumentasjonen ansees det som sannsynlig at det var den samme hannen som dukket opp igjen på nytt på fôringsplassen hos Gauteplass på Eimå vb. medio juni - et par uker etter det første oppholdet dens der i mai.



Vierspurv hann Eimå vb., Hol 15.05.21. Foto: Per Furuseth

### Ikke godkjente funn

**Lappspove** *Limosa lapponica* LRSK – Hole 20.09.21 (ufullstendig rapportering)

**Svartkråke** *Corvus corone* LRSK – Modum 20.09.21 (underkjent)

**Gulbrynsanger** *Phylloscopus inornatus* LRSK – Ringerike 17.10.21 (ufullstendig rapportering)

**Østsanger** *Phylloscopus trochiloides* NSKF - Ringerike 01.06.21 (underkjent)

**Østsanger** *Phylloscopus trochiloides* NSKF – Modum 17.06.21 (underkjent)

**Svartryggerle** *Motacilla alba yarrellii* LRSK - Lier 10.04.21 (ufullstendig rapportering)

**Polarsisik** *Acanthis hornemanni* LRSK - Kongsberg 11.01.21 (underkjent)

**Polarsisik** *Acanthis hornemanni* LRSK - Kongsberg 21.01.21 (underkjent)

### Rettelser til LRSK-rapport 2020

Ingen rettelser

## Referanser

- Båtvik, J.I. 1994. Sjørørre *Melanitta fusca*, s. 98 i: Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S (red.). Norsk fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
- Gunnarsen, T. 2020. Vandrefalk i Buskerud 2019-20. Utbredelse og hekkestatus. Buskskvetten 36 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 16 s.
- Haftorn, S. 1971. Norges fugler. Universitetsforlaget, Oslo, 862 s.
- Olsen, T. 2021. Sjeldne fugler i Norge i 2020. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 2020. BirdLife Norge, s.4-67.
- Stueflotten, S. 2020. Sjeldne fugler i Buskerud 2019. Buskskvetten 36 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 38 s.
- Stueflotten, S. 2021 a. Sjeldne fugler i Buskerud 2020. Buskskvetten 37 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 45 s.
- Stueflotten, S. 2021 b. Fiskeørna i Buskerud, Sande og Svelvik 2021. Buskskvetten 37 (<http://www.nofbuskerud.net/buskskvetten.html>), 12 s.
- Winnem, A. 2021 a. Sabinemåke i Steinsfjorden. Vår Fuglefauna 44 (3), s.198.
- Winnem, A. 2021 b. Kuhegre på norgesbesøk. Vår Fuglefauna 44 (2), s.127.



# LRSKs innrapporteringsliste

Koder:

|   |                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | Observasjoner skal rapporteres til LRSK med utførlig beskrivelse/dokumentasjon for godkjenning. NSKF bak koden indikerer at NSKF skal godkjenne funnet. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I tillegg kommer alle arter som ikke tidligere er registrert i Buskerud og/eller Norge. Dette gjelder også vinterfunn av flere trekkfuglarter. Bare fotodokumenterte hybrider blir innlemmet i årsrapporten med unntak for gåsehybriden kanadagås x grågås.

Rapporteringslista er samordnet med rapporteringslista til NFKF.

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| x   | Observasjoner skal rapporteres til LRSK.                  |
| H   | Hekkefunn skal rapporteres til LRSK.                      |
| S   | Sommerfunn skal rapporteres til LRSK.                     |
| V   | Vinterfunn skal rapporteres til LRSK.                     |
| I   | Innlandsfunn skal rapporteres til LRSK.                   |
| N   | Funn fra nedre deler av Buskerud skal godkjennes av LRSK. |
| Ø   | Funn fra øvre deler av Buskerud skal godkjennes av LRSK.  |
| ≥ n | Flokker på ≥ n individer skal rapporteres til LRSK.       |
| *   | Gjelder artsparet russesvartstrupe og taigasvartstrupe.   |

Versjon 2022, gyldig fra 01.01.2022

|          |                             |        |                  |        |                        |         |                         |
|----------|-----------------------------|--------|------------------|--------|------------------------|---------|-------------------------|
| x        | Ringgås                     | H      | Dverglo          | H      | Storskarv              | X       | Gulbrynsanger           |
| X        | <i>Ringgås underarter</i>   | x      | Boltit           | X      | Toppskarv              | X NSKF  | Fuglekongesanger        |
| VH       | Hvitkinngås                 | H      | Småspove         | X NSKF | Bronseibis             | V       | Gransanger              |
| x        | Stripegås                   | H      | Storspove        | X NSKF | Skjestork              | X       | <i>Sibirgransanger</i>  |
| x        | Snøgås                      | X      | Lappspove        | X      | Rørdrum                | X NSKF  | Østsanger               |
| X        | Taigasædgås                 | X      | Svarthalespove   | X NSKF | Kuhegre                | X NSKF  | Trostesanger            |
| V, ≥1000 | Kortnebbgås                 | x      | Steinvender      | H      | Gråhegre               | x       | Sivsanger               |
| X        | Tundrasædgås                | x      | Polarsnipe       | X      | Egretthege             | X       | Busksanger              |
| x        | Tundragås                   | VH     | Brushane         | X      | Silkehegre             | x       | Myrsanger               |
| X        | <i>Tundragås underarter</i> | X      | Fjellmyrløper    | H      | Fiskeørn               | X       | Elvesanger              |
| X        | Svartsvane                  | X      | Tundrasnipe      | X NSKF | Munkegribb             | x       | Gresshoppesanger        |
| X        | Dvergsvane                  | x      | Temmincksnipe    | H      | Vepsevåk               | V       | Munk                    |
| H        | Sangsvane                   | x      | Sandløper        | X NSKF | Steppeørn              | X       | Hauksanger              |
| X NSKF   | Niland                      | V      | Myrsnipe         | N      | Kongeørn               | X       | Rødtoppfuglekonge       |
| VH       | Gravand                     | x      | Fjæreplytt       | H      | Hønsenhauk             | X       | Rosenstar               |
| X NSKF   | Rustand                     | x      | Dvergsnipe       | x      | Sivhauk                | V       | Måltrost                |
| x        | Knoppand/Moskusand          | X      | Alaskasnipe      | x      | Myrhauk                | V       | Duetrost                |
| X        | Brudeand                    | V      | Rugde            | X      | Steppehauk             | V       | Ringtrost               |
| x        | Mandarinand                 | x      | Kvartbekkasin    | X NSKF | Engenhauk              | X NSKF  | Svartstrupetrost        |
| x        | Knekkand                    | x      | Dobbeltbekkasin  | X      | Glente                 | x       | Nattergal               |
| X NSKF   | Blåvingeand                 | V      | Enkeltbekkasin   | X      | Svartglente            | X NSKF  | Sørmattergal            |
| x        | Skjeand                     | x      | Svømmesnipe      | X NSKF | Båndhavørn             | X       | Dvergfluesnapper        |
| x        | Snadderand                  | X      | Polarsvømmesnipe | x      | Havørn                 | X NSKF  | Halsbåndfluesnapper     |
| H        | Brunnakke                   | X NSKF | Gulbeinsnipe     | V      | Fjellvåk               | X       | Svartødstjert           |
| X NSKF   | Amerikablesand              | X NSKF | Damsnipe         | V      | Musvåk                 | X       | Svartstrupe             |
| X NSKF   | Rødfotand                   | x      | Sotsnipe         | x      | Haukugle               | X NSKF  | Asiasvartstrupe*        |
| x        | Stjertand                   | x      | Krykkje          | VH     | Hornugle               | X NSKF  | Ørkensteinskivett       |
| X        | Amerikakrikkand             | X      | Sabinemåke       | VH     | Jordugle               | X NSKF  | Svartstrupesteinskivett |
| X NSKF   | Rødhodeand                  | H      | Hettemåke        | X      | Snøugle                | V       | Jernspurv               |
| x        | Taffeland                   | X      | Dvergmåke        | X      | Hubro                  | X       | <i>Sørliq gulerle</i>   |
| VH       | Bergand                     | X      | Svartehavsmåke   | X      | Slagugle               | X       | <i>Engelsk gulerle</i>  |
| X        | Stellerand                  | H      | Fiskemåke        | X      | Lappugle               | X       | Sitronerle              |
| I        | Ærfugl                      | X      | Polarmåke        | x      | Hærfugl                | V       | Vintererle              |
| H, ≥ 20  | Sjørør                      | X      | Grønlandsmåke    | X NSKF | Blåråke                | V       | Linerle                 |
| H, ≥ 20  | Svartand                    | V      | Sildemåke        | x      | Isfugl                 | X       | <i>Svartryggerle</i>    |
| x        | Havelle                     | X      | Rovterne         | X      | Bieter                 | X       | Tartarpiplerke          |
| x        | Lappfiskand                 | X      | Splitterne       | H      | Tretåspett             | V       | Heipiplerke             |
| X NSKF   | Stivhaleand                 | X NSKF | Dvergterne       | H      | Dvergspett             | X       | Lappiplerke             |
| X        | Rapphøne                    | XØ/H   | Makrellterne     | X      | Hvittryggspett         | x       | Skjærpiplerke           |
| X        | Gullfasan                   | XN/H   | Rødnebbterne     | H      | Gråspett               | H       | Kjernebiter             |
| x        | Vaktel                      | X      | Svarterne        | V      | Tårnfalk               | x       | Konglebit               |
| X        | Rødhøne                     | X      | Storjo           | X      | Aftenfalk              | x       | Rosenfink               |
| X        | Berghøne                    | X      | Polarjo          | V      | Dvergfalk              | VH      | Bergirisk               |
| x        | Nattravn                    | X      | Tyvjo            | x      | Lerkefalk              | VH      | Tomirisk                |
| X NSKF   | Gråseiler                   | X      | Fjelljo          | x      | Jaktfalk               | H, ≥ 10 | Brunsisik               |
| X NSKF   | Steppehøne                  | I      | Alkekonge        | V      | Vandrefalk             | X       | Polarsisik              |
| VH/XØ    | Skogdue                     | X      | Polarlomvi       | H      | Tornskate              | H       | Furukorsnebb            |
| X        | Turteldue                   | I      | Lomvi            | X NSKF | Rødhalevarsler         | H       | Grankorsnebb            |
| H, ≥ 5   | Tyrkerdue                   | I      | Alke             | x      | Varsler                | x       | Båndkorsnebb            |
| x        | Vannrikse                   | x      | Teist            | X      | Pirol                  | H       | Stillits                |
| x        | Åkerrikse                   | x      | Lunde            | N      | Lavskrike              | X NSKF  | Gulirisk                |
| x        | Myrrikse                    | VH     | Smålom           | H      | Nøttekråke             | x       | Lappspurv               |
| VH       | Sivhøne                     | VH     | Storlom          | X      | <i>Sibirnøttekråke</i> | X NSKF  | Hvitthodespurv          |
| VH       | Trane                       | X      | Islom            | x      | Kornkråke              | X       | Hortulan                |
| x        | Dvergdykker                 | X      | Gulnebbblom      | X      | Svartkråke             | X       | Dvergspurv              |
| X        | Gråstrupedykker             | X NSKF | Svartbrynbatross | X      | Lappmeis               | X       | Vierspurv               |
| VH       | Toppsykker                  | X NSKF | Gråhodealbatross | XØ     | Løvmeis                | X NSKF  | Svarthodespurv          |
| VH       | Hornedykker                 | X      | Stormsval        | X      | Skjeggmeis             | V       | Sivspurv                |
| X NSKF   | Svarthalsdykker             | x      | Havhest          | X      | Trelerke               | X NSKF  | Lazulispurv             |
| V        | Tjeld                       | X      | Grålire          | V      | Sanglerke              | X       | Hybrider (fotodok.)     |
| X        | Avosett                     | X      | Havlire          | X NSKF | Topplerke              | x       | Kanadagås x grågås      |
| VH       | Vipe                        | X NSKF | Stork            | x      | Fjellerke              |         |                         |
| x        | Tundralo                    | x      | Havsule          | X      | Dverglerke             |         |                         |