



# BUSKSKVETTEN

Nr.1 \* 1984 \* 8.årg.

---



ORGAN FOR NORSK ORNITOLOGISK FORENING  
AVDELING BUSKERUD



# BUSSKVETTEN

Nr. 1 1984 8. årgang

ORGAN FOR NORSK ORNITOLOGISK FORENING  
AVDELING BUSKERUD

I REDAKSJONEN:

Tore Gunnarsen, Nøtteknekkeren 2, 3400 Lier  
Per Ole Syvertsen, Kirkeveien 114A, 0361 Oslo 3  
Øivind Syvertsen, Nesbruveien 19, 1312 Slepden

BUSSKVETTEN utkommer to ganger årlig, og sendes fritt til alle medlemmer av NOF's lokallag i Buskerud.  
Arsabonnement for ikke-medlemmer: Kr. 25,-

Fylkesforeningens adresse:

Norsk Ornitoligisk Forening,  
avdeling Buskerud  
Postboks 288  
3001 Drammen  
Postgirokonto: 3 35 84 88  
Bankgirokonto: 2200.27.39317

Adresse LRSK/NSKF:

LRSK Buskerud  
v/ Torgrim Breihagen  
Avd. for zoøkologi,  
Zool. Museum  
5014 Bergen-Univ.

Lokallagenes adresser:

NOF, Drammen lokallag  
Postboks 288  
3001 Drammen  
NOF, Ringerike lokallag  
Postboks 2058 Veien  
3501 Hønefoss

NOF, Hallingdal lokallag  
Postboks 79  
3570 Al  
NOF, Øvre Eiker lokallag  
Postboks 31  
3301 Høkksund

Post og innbetalinger til BUSSKVETTEN sendes fylkesforeningens adresse. Artikkelstoff og bilder/tegninger kan også sendes direkte til et av redaksjonsmedlemmene.  
Alle sjeldenhetsaker sendes LRSK-adressen.

Trykk : Offset Hurtigtrykk, Haugesgate 74, 3000 Drammen  
Opplag: 350 eks.

INNHOLD I DETTE NUMMER:

- Side 3: Redaksjonen har ordet  
" 4: Fiskumvannet. Rapport 1980-1983  
" 21: Pilfinken i Hallingdal  
" 23: Nattergalen i Buskerud 1979-1983  
" 26: LRSK-rapport 1976-1982  
" 44: Nytt lokallag på Ringerike  
" 45: Ornitolog på sporet  
" 47: Møtereferater  
" 50: Lokallagssaker  
" 54: Indeks for Buskskvetten 1977-1982  
" 67: Konkurranserefuglen  
" 68: Atlasprosjektets siste sesong


FORSIDEN: Rugende enkeltbekkasin ved Fiskumvannet i 1970.  
Foto: Arne Nævra.

## KJÆRE LESER!

Det har dessverre nesten blitt tradisjon at "Buskskvetten" ikke er i rute med sine utgivelser. Denne gangen skal vi ikke komme med noen forklaringer på misforholdet, bare slå fast det faktum at det bladet du nå sitter med i hendene skulle vært ute hos leserne allerede for et år siden! Vi beklager, men kan ikke love bot og bedring i den situasjon vi befinner oss. Dette nummeret går ut helt uten annonse-inntekter, men fra fylkeskommunens miljøvernnavdeling har vi på grunn av artikkelen om Fiskumvannet mottatt et betydelig trykketiddrag på kr. 1000,-.

Med sine 68 sider er dette det klart tykkeste nummeret i "Buskskvettens" historie. Hoveddelen av sidetallene utgjøres av de store oppsatsene om Fiskumvannet, LRSK-rapport og indekset for "Buskskvetten". Selv fratrukket de tretten sidene til indekset er dette nummeret for en gigant å regne. Vi håper dere vil få en hyggelig leseopplevelse i selskap med pilfinker, nattergaler og større og mindre sjeldenheter. Stoff fra lokallagene har det også blitt plass til. Redaksjonen har også måttet la noe stoff ligge over til seinere utgivelser.

Og i tråd med de siste årgangenes tradisjoner slår vi an en munter tone:



# FISKUMVANNET

## RAPPORT 1980 – 1983

Tom Schandy og Morten Winness

### INNLEDNING

Denne rapporten tar for seg det ornitologiske arbeidet ved Fiskumvannet i perioden 1980-1983 og bygger således på Nævra (1979) og Kolberg (1980). Det meste av materialet er fra årene 1982 og 1983. Fra årene 1980 og 1981 har vi kun fått inn observasjoner fra Anders Hals. Det har utvilsomt vært flere og observert ved vannet, men lite er notert og tatt vare på.

I 1982 og 1983 har NOF, Øvre Eiker lokallag hengt opp en observasjonsbok ved jernbanen i nordenden, og her har observatørene i stor grad notert ned sine observasjoner. Imidlertid er det også ønskelig at man i denne noterer ned mer vanlige arter.

### OBSERVASJONER

Vannet er forholdsvis godt dekket i 1982 og 1983. Best observasjonsdekning har det vært i trekktidene i april og mai om våren og august til oktober om høsten.

Det ble i 1982 registrert 3 nye arter for vannet, nemlig storskare, fjærelytt og trelerke.

I 1983 fikk artslista et tillegg på to arter, spurveugle og haukugle. Pr. 1/1 1984 er det dermed observert 195 arter ved Fiskumvannet.

### RINGMERKING

For første gang i Fiskumvannets historie ble det i 1983 drevet systematisk ringmerking av fugl med mistnett i vannets nordende.

Dette har gitt bedre kjennskap til spurvefuglenes trekk i området.

Drammen Ringmerkergruppe ved Morten Winness sendte 4/2-83 søknad til Miljøverndepartementet om dispensasjon fra fredningsbestemmelserne til å drive ringmerking. Denne tillatelsen ble gitt med betingelse at det ikke ble merket innen reservatet i hekketiden, dvs. perioden 1. mai til 15. juli. I denne periode kunne vi imidlertid merke utenfor reservatgrensene, noe som også ble gjort.

Det ble på våren ringmerket 676 fugl i løpet av 14 feltdager. Beste dagen var 8/5 da 143 fugl havnet i nettmaskene. Av andre gode dager kan nevnes 7/5 med 72 fugl og 12/5 med 101 fugl. Frem til 1. mai ble det brukt 15 mistnett. Etter denne dato ble det merket utenfor reservatgrensene, slik at nettantallet gikk ned til det halve.

På høsten ble det merket 1042 fugl på 21 feltdager med siste merkedag 13/10. Av gode merkedager kan nevnes 21/8 og 26/8 med henholdsvis 115 og 104 fugl. Ringmerkingen ble stort sett drevet i helgene. Mange av feltdagene er halve, og dessuten gikk mange helger bort i september på grunn av regn.

Tilsammen ble det ringmerket 1718 fugl fordelt på 55 arter. De to vanligste merkeartene var sivspurv (459 ind) og løvsanger (467 ind). Heipiplerke ble det merket 108 ind. av, og grønnsisik 77 ind. De resterende arter ble merket i antall under 50 ind.

Merkeantallet på Fiskumvannet er høyere enn det som noengang er oppnådd på Linnesstranda i Lier, til tross for mindre feltinnsats. Vi antar at det med større feltinnsats er mulig å merke det dobbelte antall.



TAKK

Vi vil få takke Bjørn Hofstad, NVE for at han skaffet oss husvære i form av ei praktisk brakke. Den har vært til uvurderlig nytte for oss. All ringmerking er blitt foretatt i den . I brakka er det soveplass til to stykker, så hvis noen er interessert i å benytte brakka, er det full anledning til det. Vi vil mer enn gjerne at Øvre Eiker og Drammen lokallags medlemmer benytter seg av dette tilbudet. Bare ta kontakt med oss!

Videre vil vi få takke Drammen Sparebank og Kredittkassen for henholdsvis kr. 500 og kr. 300 i støtte til innkjøp av nett, grunneierne Willy Tanberg , Kåre Hegstad og Henrik Hegstad for tillatelse til å drive ringmerking på deres grunn. En spesiell takk til Willy Tanberg som midt i travlest skuronn hjalp oss med å få brakka på plass.

Vi vil takke Miljøverndepartementet og Buskerud fylke ved Miljøvernavdelingen for tillatelse til å drive ringmerking i reservatet.

Vi vil takke Bjørn Nyhus, Asbjørn Værnes og Jan Landsverk for stor hjelp i ringmerkingsarbeidet.

En takk også til alle observatørene, og de er som følger:

Kjell Erik Andal, Hans Bjånes, Jan Trygve Bollerud, Åse Fredriksen, Morten Halmrast, Anders Hals, Deidra Hanan, Trond Histøl, Bjørn Hofstad, Stig Horsberg, Dagfinn Kolberg, Jan Landsverk, Bjørn Lauritzen, Per Klunderud Lilleås, Ole Herman Nyhus, Bjørn Vidar Nyhus, Arne Nævra, Erik Røncke, Magne Sjøblom, Knut Arne Solberg, Karl Øyvind Solum, Asbjørn Værnes og Kjell Værnes.

RINGMERKINGSOVERSIKT

ART	Vår-83	Høst-83	Totalt 1983
Enkeltbekkasin	3	2	5
Hornugle	-	1	1
Jordugle	1	1	2
Perleugle	-	1	1
Dvergspett	-	1	1
Sandsvale	10	-	10
Låvesvale	9	-	9
Trepiplerke	-	7	7
Heipiplerke	47	61	108
Gulerle	16	1	17
Linerle	15	-	15
Gjerdessmett	-	1	1
Jernspurv	6	9	16
Rødstrupe	18	34	52
Blåstrupe	10	24	34
Rødstjert	2	2	4
Buskskvett	14	13	27
Steinskvett	5	1	6
Gresshoppesanger	1	-	-
Sivsanger	3	4	7
Rørsanger	5	17	22
Møller	-	8	8
Tornsanger	2	16	18
Hagesanger	6	31	37
Munk	8	17	25
Gransanger	10	11	21
Løvsanger	184	283	467
Fuglekonge	-	2	2
Gråfluesnapper	2	1	3
Svarthvit fluesnapper	1	-	1
Svartrost	2	-	2
Grårost	11	15	26
Måltrost	7	3	10
Rødvingetrost	3	8	11
Stjertmeis	-	15	15
Grammeis	1	-	1
Blåmeis	-	43	43
Kjøttmeis	4	24	28
Tornskate	2	10	12
Nøtteskrike	-	1	1
Skjære	2	-	2
Kråke	1	-	1
Star	2	-	2
Pilfink	-	1	1
Bokfink	16	12	28
Bjørkefink	1	12	13
Grønnfink	1	21	22
Grønnsisik	66	11	77
Tornirisk	1	1	2
Bergirisk	7	-	7
Gråsisik	1	-	1
Rosenfink	8	-	8

Gulspurv	12	4	16
Lappspurv	2	1	3
Sivspurv	148	311	459
<b>55 arter</b>	<b>676</b>	<b>1042</b>	<b>1718</b>

**KONTROLLER AV FUGL MERKET ANDRE STEDER.**

**Heipiplerke (Anthus pratensis)**  
Bruxelles 1.472.587

1K 29.09.1981  
(51.01 N-03.57 E) Uitbergen,  
Belgia.  
v 16.04.1983 (Fou.) 1035 km.NNE.

**GJENFUNN**

Sivspurv (Emberiza schoeniclus)  
Stavanger 9748990

\* 1K hunn 23/8-83 (FOU)  
x 30/1-84 Loughton (Essex),  
England. Alderton Infant  
School (51,39 N - 0,03 E)  
1081 km SV-S.

**TEGNFORKLARINGER**

- 1K - Flyvedyktig fugl i sitt første kalenderår
- 1K+ - Fugl av ubestemt eller ubestemmelig alder, minst i første kalenderår
- 2K - Fugl i sitt andre kalenderår
- 2K+ - Fugl i sitt andre kalenderår eller eldre
- \* - Merket uten tilknytning til reiret, hjemsted ukjent
- pull - Merket i eller ved reiret
- + - Skutt eller på annen måte drept av mennesker
- x - Funnet død, syk eller skadet og senere død
- v - Kontrollert, dvs. fanget levende og sluppet med ring
- Fou - Fiskumvannet ornitologiske undersøkelser

FULLSTENDIG ARTSLISTE PR. 1/1-84.


Smålom	-Tjeld	Svartspett
-Storlom	Dverglo	Flaggspett
-Dvergdykker	-Sandlo	Hvitryggspett
-Horndykker	Boltit	-Dvergspett
-Toppdykker	-Heilo	Trelerke
Gråhodealbatross	Tundralo	-Sanglerke
-Storskárv	-Vipe	Fjellerke
-Gråhegre	Polarsnipe	-Sandsvale
-Knoppsvane	-Dvergsnipe	-Låvesvale
Dvergsvane	-Temmincksnipe	-Taksvale
-Sangsvane	Fjærelytt	-Trepiplerke
-Kortnebbgås	Tundrasnipe	-Heipiplerke
-Grágás	-Myrsnipe	-Gulerle
Snogás	-Brushane	M. flava flava
-Kanadagås	Kvartbekkasin	M. flava thunbergi
Hvitkinngås	-Enkeltbekkasin	M. fl. flavissima
-Gravand	-Dobbeltbekkasin	-Wintererle
-Brunnakke	Svarthalespove	-Linerle
Snadderand	Lappspove	Sidensvans
-Krikkand	-Småspove	Fossekall
-Stokkand	-Storspove	-Cjerdesmett
-St.jertand	Sotsnipe	-Jernspurv
-Knekkand	-Rødstilk	-Rødstruppe
-Skjeand	-Gluttsnipe	-Nattergal
-Taffeland	-Skogsnipe	-Blåstruppe
-Toppand	-Grønnstilk	-Rødstjert
-Bergand	-Strandsnipe	-Buskskrett
Erfugl	-Steinvender	-Steinskrett
Havelle	Svømmesnipe	-Ringtrost
-Svartand	Stercorarius sp.	-Svarttrost
Sjøorre	-Hettemåke	-Gråtrost
-Kvinand	-Fiskemåke	-Måltrost
-Siland	Sildemåke	-Rødvingetrost
-Laksand	-Gråmåke	-Duetrost
Vepsevåk	-Svartbak	-Gresshoppesanger
Sivhauk	Krykkje	-Sivsanger
-Myrhauk	Rovterne	-Myrsanger
-Hønsehauk	-Makrellterne	-Rørsanger
-Spurvehauk	-Svartterne	Gulsanger
-Musvåk	-Skogdue	-Møller
Fjellvåk	-Ringdue	-Tornsanger
Kongeørn	Tyrkerdue	-Hagesanger
-Fiskeørn	-Gjøk	-Munk
-Tårfalk	Haukugle	-Gransanger
-Dvergfalk	Spurveugle	-Løvsanger
Lerkfalk	-Kattugle	-Fuglekonge
Orrfugl	-Hornugle	-Gråfluesnapper
Rapphøne	-Jordugle	-Svarthvit fliesnapper
Vaktel	-Perleugle	-Stjertmeis
Fasan	Nattravn	Løvmeis
Vannrikse	-Tårnseiler	-Granmeis
-Myrrikse	Hærfugl	Toppmeis
-Sivhøne	-Vendehals	Svartmeis
-Sothøne	Gråspett	-Blåmeis
Trane	-Grønnspett	-Kjøttmeis

-Spettmeis  
Trekryper  
Pirol  
-Tornskate  
-Varsler  
-Nøtteskrike  
-Skjære  
-Kiae  
-Kornkråke  
-Kråke  
-Ravn  
-Stær

Gråspurv  
-Pilfink  
-Bokfink  
-Bjørkefink  
-Grønnfink  
-Stillits  
-Grønnsisik  
-Tornirisk  
-Bergirisk  
-Gråsisik  
Polarsisik

Grankorsnebb  
-Furukorsnebb  
-Rosenfink  
Konglebit  
-Dom pap  
Kjernebiter  
-Lappspurv  
-Snøspurv  
-Gulspurv  
Hortulan  
-Sivspurv

195 arter, derav 137 i 1983 (merket -).  
Dessuten 1 ubestemt art og 3 underarter.





Kråker, tegnet av Jon Bakkelund.

Målestokk ca. 1:36.000

Kartet er omtegnet etter  
Nævra 1979.

## FISKUM VANNET



Gresshoppesanger fanget ved Fiskumvannet.

Foto: Tom Schandy.

KOMMENTARER TIL ARTSLISTA

<u>Storlom</u>	1980: 1 eks. 10/5. 1982: Jevnlig observert i perioden 25/4-30/5 med maks. 6-7 eks. 2/5. 1983: 1 eks. 3/5 og 2 eks. 7/5.
<u>Dvergdykker</u>	1 eks. 23/10 1982 og 1 eks. 10/9 1983.
<u>Horndykker</u>	1982: 2 eks. 2-18/5, dessuten 1 eks. 14/9, 2 eks. 8/10 og 5 eks. 10/10. 1983: 1 eks. 15/10 og 2 eks. 4/11.
<u>Toppdykker</u>	1980: 1 eks. 10/5, 6/9, 2-3 eks. 21/9 og 5 eks. 5/10. 1981: 2 eks. 24/5. 1982: 2 eks. 22/5, 1 eks. 25/5 og 30/5. 1983: 1 eks. 12/5, 2 eks. 25/5, 3 eks. 30/5, 1 eks. 1/6.
<u>Storskjær</u>	Ny art for vannet: 5 eks. 26/9 1982. Også 1 eks. 22/5 1983.
<u>Gråheore</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 15/4 1982. Ny høstekstremum: 5 eks. 13/10 1983.
<u>Knoppsvane</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 26/3 1982.
<u>Sangsvane</u>	1982: 14 eks. 26/3, 1 eks. 6/5, 1 eks. 15/8, obs. jevnlig fra 2/10. 1983: 3 eks. 1/5, 1 eks. 25/5-6/6. Første høstobs., 6 eks. 22/10.
<u>Kortnebbgås</u>	1981: 1 eks. 10/5. 1982: 104 eks. 16/5, 4 eks. 25/9, 11 eks. 26/9, 1 eks. 27/9. 1983: 93 eks. 17/5 og 250 eks. 22/5.
<u>Grågås</u>	1980: 1 eks. 27/4. 1981: 3 eks. 14/4. 1982: 8 eks. 4/5, 2 eks. 7/5 og 11 eks. 22/9. 1983: 12 eks. 30/4, 7 eks. 21/10 og 22/10 og 1 eks. 12/11.
<u>Kanadagås</u>	1982: 2 eks. 1-9/5. 1983: 2 eks. 4/4.
<u>Gravand</u>	2 eks. 1/5 1980, 1 eks. 10/10 1982 og 2 eks. 2/5 1981
<u>Brunnakke</u>	Ny senekstremum om våren: flere eks. 24/5 1982.
<u>Snadderard</u>	1 hunn 21/9 1980.
<u>Stjertand</u>	1980: 1 par 27/4 1981: 1 eks. 23/4. 1982: 1-2 eks. i perioden 25/4-17/5. 1983: Ny tidligekstremum om våren: 2 eks. 3/4.
<u>Knekkand</u>	1980: 1 hann 24/5 1981: 1 hann 22/5. 1982: 1 eks. 26-27/4, 2 eks. 17/5, 1 par 25/5 og 29/5 1983: Ny tidligekstremum om våren: 1 eks. 25/4. Dessuten 2 eks. 30/4, 2 eks. 7/5, 5 eks. 12/5, 8 eks. 22/5, 2 eks. 25/5, 1 eks. 30/5 og 1 eks. 1/6.

<u>Skjeand</u>	1980: 1 par 4/5. 1982: Ny tidligekstremum om våren: 1 par 25/4-1/5. Dessuten 1 hann 7/5, 4 eks. 8/5, 2 eks. 9/5, 1 eks. 18/5 og 1 eks. 24/5. Høstobs: 1 eks. 10/10 og 1 eks. 22/10. 1983: 1 hunn 10/11.
<u>Taffeland</u>	1980: 4 eks. 18/10. 1982: 2 par 28/4, 1 par 17/5, 1 eks. 9/10, 5 hanner 10/10 og 7 eks. 22/10. 1983: 1 hann 10/11 og 8 eks. 12/11.
<u>Toppand</u>	Ny senekstremum om våren: 30/5 1983. Høyt antall: 52 eks. 18/10-80.
<u>Bergand</u>	1980: 1 eks. 5/10, 2 eks. 18/10. 1981: 4 eks. 18/10. 1982: 1 eks. 18/5, 13 eks. 24/5, ca. 25 eks. 22/10. 1983: 8 eks. 13/10 og 1 eks. 15/10.
<u>Havelle</u>	2. obs. i nyere tid: 1 hann 10/10 1982.
<u>Svartand</u>	Ny senekstremum om våren: 3 hanner 28/5 1983.
<u>Siland</u>	Ny senekstremum om høsten: 5 eks. 10/10 1982.
<u>Vepsevåk</u>	2. obs. ved vannet: 1 eks. 21/8 1982.
<u>Sivhauk</u>	1 eks. 17/5 og 24/5 1981, 1 hunn 11/5 1982 og 1 hann 17/5 1982.
<u>Myrhauk</u>	1980: 1 eks. 21/9. 1981: 1 eks. 29/4. 1982: 1 hann 14/9, 19/9 og 1 eks. 26/9. 1983: 1 hunn 12/5.
<u>Musvåk</u>	1982: Ny vårekstremum: 1 eks. 27/3.
<u>Fjellvåk</u>	1 eks. 9-10/10 1982.
<u>Tårnfalk</u>	Høstobs: 1 eks. 12/8, 1 eks. 24/9 og 2 eks. 10/10 1982.
<u>Dvergfalk</u>	Ny senekstremum om våren: 1 eks. 9/5 1982.
<u>Lerkefalk</u>	1 eks. 23/5-1/6 1981.
<u>Vannrikse</u>	1 syng. eks. 13/6-20/6 1982.
<u>Myrrikse</u>	1 syng. eks. i 1982 og 2 syng. eks. i 1983.
<u>Tjeld</u>	1980: 1 eks. 17/5. 1982: 1 eks. 9/5, 4 eks. 10/5 (nytt maks. tall), 2 eks. 17/5 og 1 eks. 24/5. 1983: 1 eks. 10/4.
<u>Dverglo</u>	1 eks. 11/5-80, 1 eks. 17/5-81 og 1 eks. 17/5-82.
<u>Sandlo</u>	Ny tidligekstremum om våren: 4 eks. 23/4 1981.
<u>Heilo</u>	Ny tidligekstremum om våren: 1 eks. 20/4 1982. Ny senekstremum om høsten: 10 eks. 24/9 1982. Stort antall: 104 eks. 8/5 1982. I perioden 30/4-9/5 1983 ble det obs. flokker på rundt 60 eks.
<u>Tundralo</u>	1 eks. 24/9 1982.
<u>Dvergsnipe</u>	1 eks. 12/9 1981 og 7 eks. 10/9 1983.

<u>Temmincksnipe</u>	1 eks. 10/5-81, 2 eks. 12/9-81 og 6 eks. 15/8-82.
<u>Fjæreplytt</u>	Ny art for vannet: 1 eks. 25/5 1982.
<u>Brushane</u>	Ny tidligekstremum om våren: 1 par 1/5 1983. Ny senekstremum om høsten: 1 eks. 24/9 1982.
<u>Kvartbekkasin</u>	1 eks. 18/10 1981 og 1 eks. 26/12 1982 (!).
<u>Dobbeltbekkasin</u>	1980: 2 eks. 24/5. 1982: 1 eks. 16-17/5 og 1 eks. 9/10. 1983: 1 eks. 9/5 og 15/5.
<u>Småspove</u>	Ny tidligekstremum om våren: 10 eks. 23/4 1983.
<u>Storspove</u>	Ny vårekstremum: 2 eks. 3/4 1982. Høye antall: 15 eks. 23/4 1982, 33 eks. 30/4 og 22 eks. 9/5 1983.
<u>Sotsnipe</u>	1 eks. 10-13/5 1982.
<u>Rødstilk</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 7/4 1982. Høyt antall: 50 eks. 8/5 1983.
<u>Gluttsnipe</u>	Ny senekstremum om våren: 2 eks. 1/6 1983. Ny tidligekstremum om høsten: 18 eks. 31/7 1983.
<u>Skogsnipe</u>	1 eks. 19/6 1983 er utenfor artens normale trekktid.
<u>Grønnstilk</u>	Ny tidligekstremum om våren: 2 eks. 12/4 1982.
<u>Strandsnipe</u>	Ny høstekstremum: 29/9 1982.
<u>Steinvender</u>	5. obs. ved vannet: 1 eks. 9/5 1983.
<u>Svømmesnipe</u>	3. obs. ved vannet: 2 eks. 10/5 1981.
<u>Stercorarius sp.</u>	1 juv. jo 19/9 1982.
<u>Hettemåke</u>	Ny vårekstremum: 6 eks. 4/4 1982. Ny høstekstremum: 5 eks. 22/10 1983.
<u>Rovterne</u>	3. obs. ved vannet: 2 eks. 22/5 1981.
<u>Makrellterne</u>	Ny vårekstremum: 4 eks. 4/5 1982. Ny høstekstremum: 1 eks. 15/10 1983.
<u>Svaratterne</u>	1 eks. 13/6 1983.
<u>Skogdue</u>	Høstobs: 2 eks. 21/9-80, 1 eks. 26/9-82 og 2 eks. 15/10 1983.
<u>Haukugle</u>	Ny art for vannet: 1 eks. 8/10, 7/11 og 13/11 1983.
<u>Spurveugle</u>	Ny art for vannet: 1 eks. januar 1983.
<u>Kattugle</u>	1 eks. 17/6 1983.
<u>Hornugle</u>	1 eks. 12/4-80, 1 eks. ringmerket 12/9 1983, 1 eks. fanget og mistet 22/9 1983.
<u>Jordugle</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 23/4 1983. Ny høstekstremum: 1 eks. 23/10 1983.
<u>Perleugle</u>	2. obs. ved vannet: 1 eks. merket 22/9 1983.
<u>Nattravn</u>	3. obs. ved vannet: 1 eks. i sørrenden i slutten av mai 1983.
<u>Vendehals</u>	Ny vårekstremum: 24/4 1983.
<u>Dvergspett</u>	1 eks. 24/5-81, 1 eks. 25/4 1982, 1 eks. merket 26/9 1983.

<u>Trelerke</u>	Ny art for vannet: 1 eks. 25/4 1982.
<u>Sandvane</u>	Ny høstekstremum: 4/9 1982.
<u>Låvesvale</u>	Ny høstekstremum: 2/10 1982.
<u>Trepiplerke</u>	Ny vårekstremum: 2 eks. 15/4 1982.
<u>Heipiplerke</u>	Ny høstekstremum: 1 eks. 23/10 1983.
<u>Gulerle</u>	4 eks. av den engelske rasen <u>M.f. flavissima</u> ble observert 17/5-82.
<u>Vintererle</u>	1982: 1 eks. 7/4 og 26/9. 1983: 1 eks. 9/4, 15/8 og 17/8.
<u>Linerle</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 4/4 1982.
<u>Gjerdeasmett</u>	1 eks. 5/10-80, 1 eks. 25/4-82 og 1 eks. merket 26/9 1983.
<u>Jernspurv</u>	Tidligere ikke obs. på høsten. I 1983 ble 9 eks. ringmerket i tiden 26/8-23/9.
<u>Nattergal</u>	I 1980 1 syng. eks, i 1981 2 syng. eks. I 1982 og 1983: 2 syng. eks.
<u>Blåstrupe</u>	Ny tidligekstremum om våren: 1 eks. 8/5 1983. Ny tidligekstremum im høsten: 1 eks. 14/8 1982.
<u>Rødstjert</u>	Ny senekstremum om våren: 1 eks. 18/5 1983. Tidligere kun 1 høstobs., i 1983 ble det ring- merket 1 eks. 23/8 og 9/9. Dessuten 1 eks. obs. 2/9.
<u>Buskskvett</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 23/4 1982. Ny høstekstremum: 1 eks. 15/9 1983.
<u>Steinskvett</u>	Ny høstekstremum: 16/10 1982.
<u>Ringrost</u>	1 hann 23/4-81, 1 eks. 2/5-82 og 1 eks. 22/4-83.
<u>Måltrost</u>	Ny høstekstremum: 1 eks. merket 22/9 1983.
<u>Duetrost</u>	1982: 6 obs. i tiden 12/4-8/5. 1983: 6 eks. 11/4, ca. 10 eks. 12/4, 8 eks. 15/4, sett også 22-23/4.

## Norsk Ornitolologisk Historie

Norsk Ornitolologisk Forening  
1957-1982

Jubileumsboka kan kjøpes gjennom NOF - salg, Innherredveien  
67A, 7000 Trondheim, postnr 5 45 90 00.

Bok med pappomslag, pris: kr 112.-  
Vi kan p.g.a. at trykkeslet har konkurrert en del ekstra bøker fortalt  
tilby en innbundet utgave i markantbrett bind og gulltrykt til pris: kr. 162.-

<u>Gresshoppesanger</u>	1 syng. eks. i 1981 og 1982, 2 syng. eks. i 1983.
<u>Sivsanger</u>	1981: 1 hann 24/5. 1983: Ringmerket 1 eks. 8/5, 21/5 og 23/5. To eks. hevdet territorium i nordenden. På høsten ble det merket 1 eks. 11/9, 15/9, 16/9 og 18/9.
<u>Myrsanger</u>	1980: 1 syng. eks. 31/5. 1981: 1 syng. eks. 31/5 og 14/6. 1982: 1 syng. eks. 13-18/6. 17/6 ble 2 eks. obs. 1983: 1 syng. eks. 9-20/6.
<u>Rørsanger</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 12/5 1982. Ny høstekstremum: 1 eks. merket 26/9 1983.
<u>Gulsanger</u>	1 eks. 24/5-81, 1 eks. 24/5-16/6 1983.
<u>Møller</u>	Tidligere få vårobs, i 1982 1 eks. 16/5 og 1 eks. 17/7. Ny høstekstremum: 15/9 1983.
<u>Tornsanger</u>	Ny vårekstremum: 1 eks. 8/5 1983. Ny høstekstremum: 1 eks. 18/9 1983.
<u>Hagesanger</u>	Ny vårekstremum: 4 eks. merket 21/5 1983.
<u>Munk</u>	Ny tidligekstremum om våren: 1 eks. merket 8/5-83. Ny tidligekstremum om høsten: 1 eks. 23/8-83. Ny senekstremum om høsten: 1 eks. 23/9 1983.
<u>Gransanger</u>	Siste høstobs: 2 eks. merket 3/10 1983.
<u>Løvsanger</u>	Ny høstekstremum: 1 eks. 26/9 1983. Høyt antall: 103 eks. merket 8/5 1983.
<u>Fuglekonge</u>	1 eks. fanget 20/8, 1 eks. 23/9 1983. Obs. av og til i meiseflokker, bl.a. 13/11-83.
<u>Gråfluesnapper</u>	Ny høstekstremum: 1 eks. merket 16/9 1983.
<u>Svartmeis</u>	2. obs: 2 eks. 2/5 1983.
<u>Spettmeis</u>	2. obs: 1 eks. hørt 16/9 1983.
<u>Trekryper</u>	2. obs: 1 eks. 10/10 1982.
<u>Pørnskate</u>	Ny høstekstremum: 1 eks. 8/9 1983.
<u>Kornkråke</u>	1981: 2 eks. 4/4 og 1 eks. 5/4. 1982: 3 eks. 9/4, 3 eks. 13/4, 2 eks. 24/4, 2 eks. 6/5. 1983: 6 eks. 5/4.
<u>Furukorsnebb</u>	10 eks. 13/10 1983.
<u>Rosenfink</u>	1981: 10-12 eks. jvorav minst 2-3 juv/hunn 22/5. 1982: Ankomm 18/5. 5 eks. obs. 30/5. 1983: 3 eks. merket 23/5 og 5 eks. merket 25/5.
<u>Lappspurv</u>	1982: 2 eks. 18/4, 1-200 eks. 23/4-24/4, 8 eks. 27/4, 1 eks. 28/4, 25-50 eks. 1/5 og 1 1 eks. 15/9+.
<u>Hortulan</u>	1980: 2 hanner 24/5, 1 hann 4/7, 1 eks. 6/9. 1981: 1 hann 17/5. Arten er ikke obs. i 1982 og 1983.
<u>Sivspurv</u>	Ny høstekstremum: 2 eks. 15/10 1982.

### LINJEFLATETAKSERING

For å få et innblikk i spurvefuglfaunaens kvantitative og kvalitative sammensetning langs jernbanen i Fiskumvannets nordende, ble det i perioden 31/5 - 3/6 1983 foretatt 5 såkalte linjeflatetakseringer. Et felt med bredde 100 meter og lengde 1000 meter ble taksert. Ruta strakk seg fra parkeringsplassen ved riksveien til Kongsberg og langs jernbanen til like bortenfor Måsnemyra.

Metoden er tidligere beskrevet av Bevanger (1978). Takseringsfeltet ble merket med bånd for hver 25 meter. Alle individer som hevder territorium blir observert på noenlunde samme sted ved hver taksering. Observasjonene ble plottet på rutenett som tilsvarte oppmerkingen. Alle plottene ble så ført over til artskart for hver art. Hver punktgruppe representerte ett territorium. Det kreves observasjon av territorieadferd ved minst to av takseringene for at individet skal representere et territorium.

Vanligvis velges takseringsfeltet tilfeldig innen et homogent landskap, slik at man senere kan estimere tetthet pr.  $\text{km}^2$  og sammenligne med andre biotoper. Takseringsfeltet ved Fiskumvannet er verken valgt tilfeldig eller er homogent, så det sier seg selv at resultatene har sine begrensninger. Resultatene må bare betraktes som en undersøkelse av spurvefuglenes sammensetning langs jernbanen og kan ikke benyttes til sammenligning med annet materiale eller andre biotoper.

Vegetasjonen langs jernbanen er preget av tett løvkratt med en bredde på 5-10 meter på hver side av jernbanen. Utenfor dette areal kommer i nord dyrket mark og i sør myr med spredt buskvegetasjon. Der elva Dørja krysser jernbanen finnes høyere løvtrær, bjørk, svartor og osp. På slutten av feltet er det bare spredte busker langs jernbanen med dyrket mark utenfor dette feltet på hver side.

## Resultater

Totalt ble det i det 0,1 km<sup>2</sup> store feltet registrert 19 territoriehevdende individer av 8 forskjellige arter. Det ble sett 10 tilfeldige arter i eller over feltet under takseringene. Disse hevdet ikke fast territorium i feltet.

Tabell 1 gir en oversikt over de registrerte arter og deres dominansforhold.

Art	Ant.	Dominans (%)
Hagesanger	6	31,5
Sivspurv	5	26,3
Bokfink	2	10,5
Rosenfink	2	10,5
Gulspurv	1	5,3
Buskskvett	1	5,3
Tornsanger	1	5,3
Rørsanger	1	5,3
Sum	19	100,0

Tilfeldig observerte arter i feltet:

Storspove, enkeltbekkasin, låvesvale, sandsvale, tårnseiler, stokkand, linerle, gråtrost, gråfluesnapper og sivsanger.

## Diskusjon


Hagesanger og sivspurv var klart dominante i feltet med henholdsvis 31,5 % og 26,3 %. Tilsammen utgjør disse to artene kvantitativt over halvparten av fuglefaunaen langs jernbanen.

Hagesangeren har klar preferanse for tette løvkratt som dominerer langs jernbelinja. Munk ble ikke påvist, noe som skyldes artens preferanse for mer høytvoksende løvskog. Den høye andel av sivspurv skyldes at myr grenser mot løvkrattene sør for linja, dvs. mellom jernbanen og vannet.

Bokfink ble kun påtreffet ved Dørja hvor det vokser høyere trær. To hevdende rosenfinker ble registrert. Den ene hadde tilhold på linja nær riksveien, mens den andre hadde tilhold ved Måsnemyra. Arten bruker ofte jernbaneledningen som sangpost.

Gulspurv, busksvett og tornsanger ble hver påvist med 1 par. Busksvett og tornsanger har noenlunde samme habitatvalg, litt åpent terreng med spredte busker. Tornsangeren ble registrert i slutten av feltet hvor slike terrenge dominerte.

Rørsanger hevdet territorium i Måsnemyra, like ved jernbanen. Senere på våren, utenfor takseringstiden, hevdet også myrrikse fast territorium i myra her. Sivsanger ble også hørt synge her under en taksering, og et annet sted ved jernbanen en annen gang under taksering. Men arten sang bare en gang på hvert sted, slik at den må utelates som fast territoriehevder.



Parti fra Dørjas utløp i nordenden av Fiskumvannet.  
Foto: Tom Schandy.

## SLUTTORD

Fiskumvannet har som kjent svært liten betydning som hekkeområde (Nævra 1979). Av våtmarkstilknyttede fuglearter som hekker ved Fiskumvannet, kan en regne enkeltbekkasin, myrrikse (?) rørsanger og sivspurv. Den sistnevnte er den eneste våtmarksarten som hekker ved vannet, som kan sies å være vanlig.

I 1984 har vi derfor planer om studere sivspurvens bruk av Fiskumvannet til hekking og trekk i mer detalj. Vi vil prøve å få en oversikt over hekkebestanden av sivspurv ved vannet og innsamle en del biometriske mål av arten under trekket. Ved siden av denne spesialundersøkelsen vil vi som i 1983 drive vanlig ringmerking og observasjonsvirksomhet.

Fra og med 1984 kaller vi virksomheten for "Fiskumvannet ornitologiske undersøkelser". Virksomheten vil dermed stå friere i sitt forhold til lokallagene. I 1983 var vi en liten kjerne som drev arbeidet ved Fiskumvannet. I år håper vi at enda flere av medlemmene vil komme og delta i arbeidet.

### Litteratur:

- Bevanger, K. 1978. Retningslinjer for ornitologiske feltmedarbeidere. Rapport fra Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk., Museet.
- Kolberg, D. 1980. Fiskumvannet - Rapport 1979.  
Buskvetten 4: s. 36-40.
- Nævra, A. 1979. Fiskumvannet Naturreservat - en presentasjon.  
Buskvetten 3: s. 44-65.

## PILFINKEN I HALLINGDAL

Geir Egil Roe

Pilfinken er kjent som en relativt vanlig hekkefugl i de sørøstlige deler av fylket, men artens forekomst i nordlige og vestlige trakter har vært helt ukjent inntil den for få år siden begynte å vise seg på foringsplassene rundt om i Gol.

Jeg skal her spesielt ta for meg pilfinkens opptreden og status innen Gol kommune, men først skal vi se litt på utbredelsen ellers i Hallingdal. Gulsvik er den nederste bygda i Hallingdal, og ligger ved nordenden av Krøderen. Her ble to reir med unger funnet i en gammel bygning ved jernbanestasjonen sommeren 1981. Det ene paret hadde funnet seg til rette i et gammelt taksvalereir, mens de andre hadde etablert seg under takstein. Senere har jeg sett som det er observert pilfink ved Krøderen, både sommer- og vinterstid. Videre har vi Flå og Nesbyen hvor jeg ikke kjenner til en eneste observasjon av arten. På Ål er den så vidt jeg vet heller ikke observert. Derimot på Geilo, langt vest i fylket, ble 2 ind. sett flere ganger vinteren 1979. Det er i de senere år også gjort observasjoner som tyder på at den hekker i Hemsedal, og senest i januar 1984 ble 6 ind. sett der.

Så står vi tilbake med Gol. Her ble den første gang observert i lite antall vinteren 1976. Før denne tid hadde jeg ikke hørt om noen pilfinkobservasjoner i Hallingdal, og overraskelsen var selvfølgelig stor da den dukket opp på fuglebrettet i hagen. I perioden 1977-81 ble den stadig vanligere vinterstid, og flokker på opptil 20 ind. ved foringsplassene var ingen sjeldenhets. Også i gråspurvflokkene ved reve- og minkfarmene rundt i bygda så man ofte pilfink. Men det første hekkefunnet lot vente på seg. Det var først sommeren 1982 vi fikk det konstatert, et reir med unger i en gammel kjøttmeisholk. Aret etter ble det gjort hele 4 funn, alle under takstein på hus i sentrum. Det kan også nevnes at 2 ind. ble sett akkurat på grensa mellom Gol og Ål i juli 1983.

Vinteren 1983/84 samlet det seg store mengder på foringsplassen hjemme, og ved siden av gråspurven og grønnfinken var pilfinken den klart dominerende arten. Maksimum ble nådd 9/1-84 da over 30 ind. var til stede samtidig.

Jeg er sikker på at pilfinken er en mye vanligere art rundt om i Hallingdal enn det denne artikkelen gir inntrykk av. Siden arten har økt så kraftig i antall på Gol, bare i løpet av få år, ville det være rart om den ikke også skulle ha ekspandert til de nærmeste kommunene. Det vil derfor forundre meg om den ikke i forbindelse med Atlasprosjektet blir funnet hekkende i flere kommuner.



Pilfink med tiggende unge, Østensjøvannet i Oslo ca 1970.  
Foto: Øivind Syvertsen.



## NATTERGALEN

/

### BUSKERUD

1979 – 1983

TOM SCHANDY

Denne artikkelen tar for seg nattergalens *Luscinia luscinia* opptreden i Buskerud i perioden 1979–1983. Artens forekomst i fylket i perioden 1972–1978 er tidligere beskrevet av Schandy (1979).

Observasjonene som blir presentert i denne artikkelen, er hovedsaklig fra de nedre deler av Buskerud, spesielt Eiker-kommunene, Drammen og Lier kommuner. I midlertid er det sannsynlig at arten også forekommer regulært i andre kommuner, men liten feltaktivitet og få NOF-medlemmer i disse områder bidrar til at eventuelle nattergalobservasjoner forblir ukjente. Det er å håpe at det nystartede lokallaget på Ringerike kan bidra med nye opplysninger om artens utbredelse i fylket.

#### NATTERGALOBSERVASJONER I FYLKET 1979–1983

Det er innkommet observasjoner fra kommunene Drammen, Lier, Røyken, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Ringerike. Antall syngende hanner har variert mellom 5 og 10. Øvre Eiker har en nokså konstant forekomst av 5–6 syngende nattergaler fra år til år. I de andre kommunene opptrer nattergalen mer irregulært og ofte på forskjellige steder fra år til år. Enkelte år kan de også helt utebli i andre kommuner. Antall observasjoner av syngende nattergaler i Buskerud 1972–1983 er vist på figur 1. Av denne ser man en klar oppadgående tendens for nattergalbestanden i Buskerud fra 2 individer i 1972 til 15 individer i 1978. Deretter har antallet gått noe tilbake med 10 syngende fugler som maksimumstall.

OBSERVASJONENE DE ENKELTE ÅRENE

1979 : LIER	- 1 eks. Romika-fabrikken	7/6 (T. Schandy)
	1 eks. Viveilstaddalen	7/6 (T. Schandy)
DRAMMEN	- 2 eks. Solumstranda	24/5 (Løver-Nilsen)
	1 eks. Solumstranda	31/5 (T. Schandy)
ØVRE EIKER	- 3 eks. Fiskumvannet	24/5 (D. Kolberg)
	1 eks. Haug Kirke	
	2 eks. Vestfosselva	
1980 : ØVRE EIKER	- 1 eks. Fiskumvannet	
	1 eks. Krekling	
	2 eks. Vestfosselva	
	1 eks. Hoen syd for Hellefoss	(M. Sjøblom)
1981 : RØYKEN	- 1 eks. Røyken sentrum kl 04.00	24/5
	(P.O. Syvertsen)	
NEDRE EIKER	- 1 eks. Miletjern på dagen	24/5 (NOF-eks.)
	1 eks. Miletjern	27/5 (T. Schandy)
ØVRE EIKER	- 1 eks. Fiskumvannet	
	1 eks. Haug Kirke	
	1 eks. Øvre Vestfosselva allerede	6/5.
	1 eks. Vestfosselva	(M. Sjøblom)
1982 : DRAMMEN	- 1 eks. Kleivene, Strømsø	24/5 (T. Schandy)
NEDRE EIKER	- 1 eks. Vinnes-krysset	24/5 (T. Schandy)
	1 eks. Miletjern	30/5 - 10/6 (K.A. Solberg)
	1 eks. rett vest for Mjøndalen	24/5 (T. Schandy og T. Histøl).
ØVRE EIKER	- 2 eks. Fiskumvannet	
	2 eks. Øvre Vestfosselva	
	2 eks. Haug Kirke	(M. Sjøblom)
1983 : LIER	- 1 eks. Gilhusodden	(T. Gunnarsen)
DRAMMEN	- 1 eks. Konnerud	(DT-BB kilde)
ØVRE EIKER	- 2 eks. Fiskumvannet	
	1 eks. Haug Kirke	
	2 eks. øvre Vestfosselva	
	1 eks. Langebru, Vestfossen	(M. Sjøblom)
RINGERIKE	- 1 eks. Ringerike	(DT-BB kilde)




Fig. 1. Antall observasjoner av syngende nattergal i  
Buskerud 1972 - 1983.

### Nattergal



LITTERATUR: Schandy, T. 1979. Nattergalens oppførsel i Buskerud.  
Buskskvettet 3: 23-29.

# LRSK - RAPPORT 1976 - 1982

Meddelelse nr. 6 fra LRSK Buskerud.

## GIVIND SYVERTSEN og TORGRIM BREIEHAGEN

Denne rapporten er den andre i sitt slag fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomitéen (LRSK) i Buskerud. Den første sto i *Sterna* nr. 3/76 og dekket årene til og med 1975 (Breiehagen 1976).

Rapporten er bygget opp på omtrent samme måte som sist. Antall individer er bare oppgitt når funnet dreier seg om mer enn en fugl. Endel arter er omtalt i mer generelle vendinger, dels fordi disse tidligere er behandlet i *Buskskvetten* i en eller annen form, dels fordi opplysningene som er kommet inn til LRSK er temmelig mangelfulle i forhold til hva som er kjent om forekomsten gjennom f.eks. atlasprosjektet. Under artsomtalene henvises til aktuelle artikler i *Buskskvetten* og andre steder. Endel eldre funn som ikke kom med i den første rapporten er inkludert.

Noen arter er helt utelatt i denne oversikten. Det dreier seg om såkalte "halvsjeldne" arter som ikke skal bedømmes av LRSK i Buskerud. Slike arter er det lett å miste oversikten over, siden mange ikke noterer og sender inn funnene, og LRSK har følgelig idag ikke full oversikt over mange av artene i denne gruppa. De sjeldneste funnene i perioden (de arter som skal behandles i Norsk sjeldenhetskomité for fugl, NSKF) ble publisert i LRSK-informasjonen i *Buskskvetten* nr. 2/83 (Breiehagen og Syvertsen 1983), og disse gjengis heller ikke her.

Mange av observasjonene fra Linnesstranda i Lier, Fiskumvannet i Øvre Eiker og Averøya i Ringerike er tidligere publisert i *Buskskvetten*. For referanser til disse, se Nygård (1979, 1980a, 1981) og Winness (1983) (Linnesstranda), Kolberg (1980b) og Nævra (1979a) (Fiskumvannet), og Anker-Nilssen (1979, 1981) (Averøya).

Smålom *Gavia stellata*

Hakavik, Eikeren, Ø. Eiker 30.4.77 (AHA).

Et hekkefunn i Ål kommune 1977, 2 ad med 2 pull 9.7 (LOO).

Dvergdykker *Tachybaptus ruficollis*

Funnet død Sylling, Lier våren 1952 (EM). Dette er funn nr. 2 i Buskerud, det første var i 1879 (Haftorn 1971). Fra slutten av 1960-årene og fram til i dag har arten vist seg å være en fåtallig overvintringsqjest i Vestfosselva, Ø. Eiker og i Drammenselva ved Vikersund, Modum. En rekke observasjoner foreligger fra disse lokalitetene i vinterhalvåret (TS m.fl., Nævra 1979b, Nyhus 1981).

Andre observasjoner: Drammenselva ved Solbergmoen, N. Eiker 18.1.76 (AN); Fiskumvannet, Ø. Eiker 7.-9.10.76 (AN); Rødbyvannet, Hurum 10.9.78 (OIM,UM); Gamledammen, Høvik, Røyken noen dager rundt månedsskiftet oktober/november 1978 (KL, Buskvetten 2: 88); Hallingdalselva ved Herad, Gol 10.11.79 (GER, Johnsen & Roe 1980).

Toppdykker *Podiceps cristatus*

Eldre funn fra Linnesstranda, Lier: 1. og 21.4.72, 4.9.73, 25.4.76, 2 ad 18.9. og 1 ex 29.10.76 (JEN m.fl.).

Første hekkefunn i fylket: ad med 2 pull Fiskumvannet, Ø. Eiker 12.8.80 (MS, Sjøblom 1980).

Horndykker *Podiceps auritus*

Strandefjorden, Ål 30.4-1.5 (JD) og 29.5.77 (WHG); Linnesstranda, Lier 1.5.78 (ØS); Fiskumvannet, Ø. Eiker 20.10.79 (AL, WHG).

Gråhegre *Ardea cinerea*

Vinterfunn: Ramtonholmen, Røyken 15.2.76 (POS); Vestfosselva, Ø. Eiker 18.2.76 (MS).

Knoppsvane *Cygnus olor*

Siden første hekkefunn i Buskerud i Fiskumvannet, Ø. Eiker i 1975 (Breiehagen 1976, Nævra 1979a,b, Nygård 1980b) har arten økt i antall og utvidet sitt hekkeområde i fylket.

Innvandringen til Buskerud er tidligere behandlet av Nygård (1980b), og disse observasjonene gjengis derfor ikke her.

Dvergsvane *Cygnus columbianus*

Ad Fiskumvannet, Ø. Eiker 12. (JLw) og 19.11.78 (JLw, MS).  
Tredje funn i Buskerud.

Sangsvane *Cygnus cygnus*

Tidlig høstobs.: Numedalslågen, Rollag 21.8.77 (JLw).

Sædgås *Anser fabalis*

4 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 3.4.82 (AHa).

Kortnebbgås *Anser brachyrhynchus*

I alt 1400-1700 ex fordelt på 7 flokker på direkte N-trekk i området Langvann/Nautskardfjell, Flå om kvelden 15.5.76, og ca 700 ex i 7 flokker samme sted morgen/formiddag 16.5.76 (EK); ca 35 ex Krekling, Ø. Eiker 19.9.76 (AHa); 3 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 23.9.76 (AHa, MS) og 1 ex 7.5.78 (AHa); 100-120 ex Rudskollen ved Sognevannet, Ringerike 12.5.78 (EK).



Morndykker, Strandefjorden i Al 29.5.1977.

Foto: Walter Henning Gundersen.

v.

#### *Grågåsslekten Anser*

Mange flokker av grå, ubestemte gjess er observert i trekk-tidene, særlig i Ø. Eiker. Det er grunn til å tro at flertallet av disse observasjonene dreier seg om kortnebbgjess, da tidspunktene for avreise/ankomst til vinterkvarterene i Danmark og Tyskland/Nederland stemmer vel overens med tidspunktene for observasjoner av trekkende gjess i Buskerud. Noen daterte obs.:

25 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 24.5.70 (AN); ca 200 ex Fiskumvannet 4.5 (MS) og ca 100 ex her 9.5.76 (MS,TGu,NOF-eksk.); i tida 18.-25.9.76 passerte ca 20 flokker i Ø. Eiker, i alt ca 1200 ex (AHa,KVa); i perioden 19.-25.9.77 trakk 12 flokker, i alt ca 1500-1600 ex, ut Lågendalen øst for Skrimfjell, Kongsberg og Ø. Eiker (Nævra 1979b); 4 flokker med i alt ca 500 ex trakk i retning mot Drammen ved Hokksund, Ø. Eiker 22.9.77 (AHa); 80-100 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 25.5.78 (EK).

Videre passerte totalt ca 2000 ex over Holtehøgda, Skotselv, Ø. Eiker ca 1970 om våren (en flokk besto av 400-500 ex) (KVa).

#### *Tundragås Anser fabalis*

2K Søndrelie pelsfarm, Gol 6.-8.5.80 (WHG); ad Steinsvika, Steinsfjorden, Hole 15. og 18.4.82 (AB). De første funn i Buskerud.

#### *Snøgås Anser caerulescens*

6 ex i en flokk på ca 100 grå gjess, trolig kortnebbgjess, på direkte N-trekk over Fiskumvannet, Ø. Eiker 9.5.76 (MS,TGu,NOF-eksk.). Første funn i fylket.

#### *Hvitkinngås Branta leucopsis*

2 ex Averøya, Ringerike 29.5 og 2.6.76 (TAN), begge var ringmerket på venstre bein, men ingen fargeringer (rømte parkgjess?); 16 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 3.-7.11.76 (AHa,AN,KVæ,MS m.fl.); Averøya, Ringerike 1982: 1 ex 25.-27.4 og 1.5, 2 ex 5.-6.5 og 4 ex 7.5, alle uten ring (AHa,TAN,TGi,ØP).

*Ringgås Branta bernicla*

3 juv (underarten *bernicla*) Thune, Strandefjorden, Ål 27.10.79 (LOO); 8 ex (underarten *hrota*) Veslefjorden, Geilo, Hol 19. og 25.4.81, 4 ex fortsatt tilstede 27.-28.4 (AG,BS,SG). Første funn av *hrota* i Buskerud.

*Gravand Tadorna tadorna*

Arten har vist seg å være en fåtallig, men regulær hekkefugl også i Buskeruds del av Oslofjorden, kfr. Breiehagen (1976) og Syvertsen & Syvertsen (1982).

*Brunnakke Anas penelope*

2 hekkefunn i Ål kommune 9.7.77: ♀ med 8 pull og ♂ med 7 pull (NN).

Sommerfunn: ♂ Økternvatna, Eggedalsfjella, Sønddal 23.6.75 (TEJ); ♂ Kroktjern, Holleia, Modum 27.5.77 (TEJ).

*Snadderand Anas strepera*

Juv ♀ skutt Fiskumvannet, Ø. Eiker høsten 1971 (OH medd. ØM). Funn nr. 2 i Buskerud.

*Stjertand Anas acuta*

Hekkefunn: ♂ med 6 pull i Hcl kommune 10.7.77 (NN), og ♀ med 2 pull Vesle Lyseren, Golsfjellet, Gol 21.7.81 (WHG, Gundersen 1981).

*Skjeand Anas clypeata*

Hekkefunn: reir med 7 egg Averøya, Ringerike 27.5.80, senere ødelagt pga flom (TAN, Anker-Nilssen 1981). Første hekkefunn i fylket.

*Taffeland Aythya ferina*

1975: 4 ♂ ved Hokksund, Ø. Eiker 10.4 (KVæ); 3 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 6.5 (AHa) og ♂ her 15.5 (AHa,KVæ).

1976: 3 ♂, 1 ♀ Linnesstranda, Lier 16.4 (JEN) og ♂ her 19. og 25.4 (JEN,SN); arten hadde høsten 1976 tilhold i Fiskumvannet i perioden 7. (♂) - 31.10 (4 ex) (AN,KVæ,MS).

1977: ♂ Linnesstranda 13.4 (JEN); ♂ Averøya, Ringerike 26.4 og ♂ her 29.4 (KJ,OWR,ØP); 2 ex Fiskumvannet 15.10 (MS).

1978: 6 ex Fiskumvannet 12.11 (JL, KVæ, MS) og 16 ex her  
19.11 (AN, JL, MS).  
1980: ♂ 1.5, 2 ♀♂, 1 ♀ 2.5, og ♀ 3.5, samtlige på Linnes-  
stranda (JEN, POS).  
Forut for dette var bare 3 funn kjent fra Buskerud (Haftorn  
1971, Gundersen & Nævra 1973, Breiehagen 1976).

Havelle *Clangula hyemalis*

Hekkefunn: reir med 8 egg i Hol kommune 13.7.77 (NN).

Erfugl *Somateria mollissima*

Arten har ekspandert som hekkefugl innover i Oslofjorden,  
og følgende hekkefunn er gjort i fylket innenfor Drøbak-  
sundet: ♀ med 2 pull Sundbyholmene, Røyken 30.6 og 20.7.81  
(ØS); reir med 5 egg Høvikskjæra, Røyken 27.5.82 (POS);  
2 reir, begge med 5 egg, Sundbyholmene 28.5.82 (POS).

Lappfiskand *Mergus albellus*

Averøya, Ringerike 6.10.76 (KJ, OWR); ♂ Nesbyen, Nes 30.4  
og 7.5.77 (DKV, GER, IJ m.fl., Johnsen 1978); ♀ Botntjern,  
Flå 6.6.77 (DL, OR); Linnesstranda, Lier 15.10.78 (JEN).  
Funn nr. 2-5 i Buskerud.

Siland *Mergus serrator*

Arten har vist seg å være en fåtallig, men regulær hekke-  
fugl på Oslofjorden og i flere større vann i nedre deler  
av Buskerud, kfr. Syvertsen & Syvertsen (1982) og Syvert-  
sen (1982). Dessuten reir med 6 egg i Hol kommune 13.7.77  
(NN).

Vepsevåk *Pernis apivorus*

Hekkefunn: reir i Flå kommune 1972 (RS). Se ellers Syvert-  
sen (1982) for nyere hekkeopplysninger.

Sivhauk *Circus aeruginosus*

♂ Torespåren, Vestfossen, Ø. Eiker 20.5.76 (MS); ♀ Fiskum-  
vannet, Ø. Eiker 21.5 (DK, POS, TGu, ØS, NOF-eksk.) og 26.5.78  
(JL); ♀ Averøya, Ringerike 20.5.80 (TAN) og 9.5.81 (AHA);  
Fiskumvannet 17. (AHA) og 24.5.81 (AHA, POS, NOF-eksk.),  
trolig samme fugl; ♂ Fiskumvannet 9. og 17.5.82 (AHA).

*Myrhauk Circus cyaneus*

2♂♂, 1 ♀ Golsfjellet, Gol 19.5.74 (GN, Johnsen & Roe 1980); ♀ Langvann, Flå 23.5.76 (EK); ♀-farget Averøya, Ringerike 2.5.77 (Anker-Nilssen 1979); ♂ Hellebu, Torpoåsen, Ål 12.7.77 (NN); ♀-farget Fiskumvannet, Ø. Eiker 12.9.77 (GA) og 2.10.78 (MS); ♀-farget Averøya 2.-3. og 7.10.78 (Anker-Nilssen 1979); ♀ Linnesstranda, Lier 13.5.79 (JEN); ♀-farget Averøya 15.5.79 (Anker-Nilssen 1979); ♀ Fiskumvannet 17.5.79 (AHA); ♀ Dagali, Nore & Uvdal 19.5.79 (TGU); ♂ Presttjern, Ål 26.6.79 (KEP); ♂ Fiskumvannet 20.10.79 (AL, WHG); ♀ Lyseren, Golsfjellet, Gol 18.5.80 (GER, Gundersen 1981).

*Kongeørn Aquila chrysaetos*

Et hekkefunn i fylket hvert av årene 1971, 1977 og 1978 innrapportert, forskjellige lokaliteter (NN). Paret i 1977 fikk én unge på vingene, og fra dette reiret fins supplerende opplysninger i atlasarkivet: ingen hekking i 1978 eller 1981, én unæ vokste opp i 1980 og 1983, hekking fant sted også i 1982 (resultat ukjent).

*Lerkefalk Falco subbuteo*

Averøya, Ringerike 27.5.76 (JT, TAN); Fiskumvannet, Ø. Eiker 22.9.76 (MS) og 24.8.77 (MS); ad Båtstø, Røyken 21.5.79 (KL); ad Fiskumvannet 23.5-1.6.81 (TS m.fl.).

*Jaktfalk Falco rusticolus*

Hekkefunn: et hekkefunn i fylket i 1977, 3 utfløyne unger (NN); en sannsynlig hekking i fylket i 1978 (NN). Andre funn: Veslefjell, Flå september 1969 (RS); 1 ex på hemmeligholdte lokaliteter 15.5.76 og 20.6.79 (NN); Averøya, Ringerike 3.10.81 (AHA).

*Vandrefalk Falco peregrinus*

Jondalen, Kongsberg sommeren 1969 (TOA); ad Averøya, Ringerike 25.10.80 (MB, PG, TAN).

*Ubestemt storfalk Falco*

Linnesstranda, Lier 15.9.79 (POS); Fiskumvannet, Ø. Eiker 2.5.82 (JTB).

Vaktel *Coturnix coturnix*

♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 1.-2.7.78 (MS); ♂ Nordhagen, Hemsedal ca 5.-12.7.81 (TGu).

Vannrikse *Rallus aquaticus*

♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 13.-20.6.82 (AHa, AV, BH, BN, KVæ, OHN).

Myrrikse *Porsana porsana*

♂ Gilhusodden, Linnesstranda, Lier 25.5.77 JEN); ♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker fra 25.6 og utover sommeren 1977 (AHa);

♂ Møysund, Linnesstranda, Lier 2.-12.6.78 (JEN, POS, TS, ØS), og en annen ♂ Linnesstranda 2.6.78 (JEN); ♂ Nordre Bårsruddam, Nærnes, Røyken en natt ultimo juni 1978 (NO medd. POS); ♂ Onsakervika Camping, Røyse, Hole ca 3 uker sommeren 1978 og igjen sommeren 1980 (familien Raaen medd. TAN); ♂ Hagadammen, Nærnes, Røyken 17.5-8.8.79, kan ha hekket idet unger muligens ble hørt 28.8 (NO, NO, POS, ØS); ♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 26.5 og 4.6.79 (DK) og 30.5-20.6.82 (AHa, AV, BN, DK, KVæ m.fl.).

Akerrikse *Crex crex*

Storsand, Hurum 14.6.75 (HCH); - ♂ N. Hoen, Hokksund, Ø. Eiker 23.5.76 (Louise B. Hoen medd. AN); ♂ Andorsrud, Skoger, Drammen 13.6.78 (JJ); ♂ Drammen Travbane, Åssiden, Drammen ca 10.-14.6.81 (JEN, TS, Schandy 1981).

Sothøne *Fulica atra*

Hekkefunn: 1 par med 6 pull + 1 par tilstede Miletjern, Mjøndalen, N. Eiker 22.7.78 (POS, ØS). Første hekkefunn i fylket, lokaliteten benyttes årvisst, men det er uvisst når etableringen fant sted (se Gundersen & Nævra 1973). Stort antall: ca 30 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 30.-31.10. 76 (AN, MS).

Polarsnipe *Calidris canutus*

Observasjoner i Buskerud er listet opp av Anker-Nilssen (1979), Nygård (1979) og Nævra (1979a).

Sandløper *Calidris alba*

Averøya, Ringerike 15.-16.5.76 (ACJ, EH, KAJ, OWR, ØP); Hellefossen, Hokksund, Ø. Eiker 12.9.78 (MS); 2 ex Averøya 16.9.80 (TAN), og 1 ex her 12.9 (POB, TAN, TGi, ØP) og 17.10. 81 (KAJ).

Tundrasnipe *Calidris ferruginea*

Eldre funn fra Linnesstranda, Lier: 3 ex 14.8.70 (JEN, SN), 1 ex 24.7.71 (JEN, SN), 3 ex 25.7.71 (JEN), 2 ex 28.7.71 (JEN), 4 ex 15.9.74 (SN).

Fiskumvannet, Ø. Eiker: ad 1.-2.8.71 (AN) og 1 ex 20.-23. 9.76 (MS).

Med tillegg bare for 1 ex Sundbyholmene, Røyken 14.9.74 (Breiehagen 1976) er dette samtlige kjente funn av arten i Buskerud.

Brushane *Philomachus pugnax*

5 hekkefunn i Ål og Hol kommuner 1977 (99 med ungekull, NN). Engstelig ♀ nær Djupamyrane, Hardangervidda, Nore & Uvdal 10.7.77 (EK).

Dobbeltbekkasin *Gallinago media*

3 hekkefunn i Hol kommune 1977 (NN).

Svarthalespove *Limosa limosa*

5 ex Averøya, Ringerike 20.4.75 og 1 ex 21.-22.4.75 (KJ, KK, TAN); 3 ex Buskerud Planteskole ved Sem, Hokksund, Ø. Eiker 18.8.82 (AHa).

Lappspove *Limosa lapponica*

Sundbyholmene, Røyken 25.9.76 (POS, ØS).

Småspove *Numenius phaeopus*

Hekkefunn: par med 3 pøll i Hol kommune 13.7.77 (NN).

Steinvender *Arenaria interpres*

2 ex Linnesstranda, Lier 29. (JEN) og 3 ex 30.7.72 (JEN, SN); ad Storskjær, Hurum 27.7.77 (ØS); ad Høvikskjæra, Røyken 10.8.77, 30.5.81 og 27.5.82 (POS); Mølen, Hurum 8. og/eller 9.9.79 (NOF-eksk., Buskavetten 4: 59).

Tyvjo *Stercorarius parasiticus*

Småskjær, Hurum/Frogn i Akershus 17.7.76 (HCW); 3 ex Storskjær, Hurum 12.9.76 (HCW, MHØ); juv Mølen, Hurum 8.9.79 (MW, POS, TS m.fl., Buskvetten 4: 60); ad Ertsvikskjær, Hurum 8.6.80 (ØS); juv Åverøya, Ringerike 13. og 18.9.82 (AHa, ØP).



Fjelljo på Hardangervidda.

Foto: Walter Henning Gundersen.

Fjelljo *Stercorarius longicaudus*

Et hekkefunn i Hol kommune 1974, 2 pull rinemerket 27.6 (JS).

Andre obs.: Syningen, Torpo, Ål 4.6.77 (JLwKAT); 1 ex sett i Hol kommune 11.7.77 (NN); 9 ex på direkte N-trekk ca 1 mil nord for Tunhovdfjorden, Nore & Uvdal 28.5.81 (BBP).

Tyv/fjelljo *Stercorarius parasiticus/longicaudus*  
Juv Fiskumvannet, Ø. Eiker 24.9.78 (JLw).

Dvergmåke *Larus minutus*

Ad Miletjern, Mjøndalen, N. Eiker 14.5.78 (ØS). Funn nr. 2 i fylket, det første var i 1904 (Haftorn 1971).

Sildemåke *Larus fuscus*

Tidlige hekkefunn: Høvikskjæra, Røyken 9.7.76, 1 null sett, tilstede til primo august (POS, ØS); reir med 3 egg Søndre Sundbyholme, Røyken 6.6.77, senere forlatt (ØS). Dette er de første konkrete hekkefunn i Buskerud innenfor Drøbak, men arten har utvilsomt hekket tidligere, og ytterligere hekkefunn har blitt gjort på flere lokaliteter senere (POS, ØS).

På øyene sør for Hurum hekker arten mer tallrikt, med kolonier på Ertsvikskjær og Vealøs. På Ertsvikskjær har arten hekket i alle fall siden 1974, med ca 20 par, og med ca 40-50 par 1980-82. Vealøskolonien ble "oppdaget" i 1980, vel 40 par. Det er uvisst når disse koloniene ble etablert (POS, ØS, Naturverninspektøren for Sør-Norge 1977).

Polarmåke *Larus hyperboreus*

2K+ Gilhusodden, Linnesstranda, Lier 30.4.78 (JEN). Første funn i fylket.

Svartbak *Larus marinus*

Det første konkrete hekkefunn i fylket: 1 reir funnet på Storskjær, Hurum 28.5.82, rugende fuql fortsatt sett 11.6 (POS m.fl.). Sannsynlig hekking av ett par også på Tofteholmen, Hurum 1981 og Vealøs, Hurum 1982 (POS). Arten har trolig hekket hist og her langs kysten av Hurumlandet i lengre tid, men svært fåtallig.

Rovterne *Sterna caspia*

2 ex Fiskumvannet, Ø. Eiker 22.6.77 (AHa). Funn nr. 2 i Buskerud.

Splitterne *Sterna sandvicensis*

2 ex Linnesstranda, Lier 20.5.78 (ØS); Høvikskjæra, Røyken 30.6.78 (KL, POS, TL, ØS). De to første funn i fylket.

Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Skaupsjøtjørnan, Hardangervidda, Nore & Uvdal 10.7.77  
(REA, ØS); 3 ex Geitvasstølen, Stolsvannsmagasinet, Ål  
9. og 14.7.79 (TB).

Svarterne *Chlidonias niger*

Miletjern, N. Eiker 2.7.78 (MS); Hallingdalselva 2 km SE  
for Nesbyen, Nes 26.5.79 (HK); Kolbergtjern, Ø. Eiker  
2.6.79 (DK, JTB, Kolberg 1980a). Funn nr. 2-4 i Buskerud,  
det første var i 1853 (Haftorn 1971).

Lomvi *Uria aalge*

Skutt Tofte, Hurum 8. eller 9.10.78 (UM), ifølge lokale  
jegere skytes hvert år "alker" ved Tofte; 3 observasjoner  
av 1-2 ex på strekningen Nærnes - Sundbyholmene, Røyken  
ultimo september - ultimo oktober 1981 (ØS), se ellers  
Syvertsen (1983) for nyere opplysninger om forekomst av  
alkefugl i Buskerud.

Teist *Cephus grylle*

1 ex ved Høvikvollen/Båtstø, Røyken ca 15.6.-15.7.75 (KL).  
Første funn i fylket.

Lunde *Fratercula arctica*

Tofte, Hurum en gang i vinterhalvåret mellom 1970 og 1975,  
funnet død i fjæra (UM). Første funn i Buskerud.

Turteldue *Streptopelia turtur*

Juv skutt Meheia, Kongsvinger 25.9.76 (E. Heia, verifisert  
Gunnar Lid). Fjerde funn i fylket.

Isfugl *Alcedo atthis*

Linnesstranda, Lier 28.7.74 (SN); Drammenselva, Mjøndalen,  
N. Eiker 25.10.75 (MHa); Lierelva, Lier sommeren  
1975 eller 1976 (AHO); 1-3 ex Vestfosselva, Ø. Eiker  
18.-27.1.76 (AN, KØS, MHa, MS); Åroselvas utløp, Åros,  
Røyken 28.2.76 (POS); Øra, Sætre, Hurum 13.3.76 (BBj, POS);  
2 ex Lierelva, Lier i perioden juni-august 1976 eller 1977  
(AHO); Vestfosselva, Ø. Eiker 27.11-15.12.76 (AHa, AN);

Averøya, Ringerike 21.5.77 (TAN); Linnesstranda, Lier 17.9-5.11.77 (JEN, POS, ØS m.fl.); Gamledammen, Høvik, Røyken 18.9.77 (KL, Syvertsen 1979); Aroselvas utløp, Åros, Røyken 7.-8.1.78 (KL, POS, ØS); Hallingdalselva ved Gol 26.4.80 (GER, Roe 1980).

Funn nr. 2 og 9-20 i Buskerud, det første var i 1950 (Haftorn 1971). Funn nr. 3-8 er presentert av Breiehagen (1976), og Syvertsen (1979) tar for seg samtlige funn i fylket til og med 1978.

#### Hærfugl *Upupa epops*

Kvarteig 2 km SØ for Nesbyen, Nes en dag i august 1976 PFK; Fiskumvannet, Ø. Eiker 26. og 28.10.77 (MS, SF); Pålgårdsvatnet, Skurdalen, Hol 31.5.79 (AN, BA); Rørvik, Hurum 3.5.81 (JTB). Funn nr. 4-7 i fylket.

#### Trelerke *Lullula arborea*

Fiskumvannet, Ø. Eiker 25.4.82 (BN, MS). Trolig første funn i fylket på bortimot 30 år; tidligere funn (Haftorn 1971) ikke tidsangitt.

#### Fjellerke *Eremophila alpestris*

Hekkefunn: 2 kull, hver med 4 pull i Hol kommune h.h.v. 29.6 og 2.7.74 (JS); minst 5-6 hekkefunn og flere syngende øj Hardangervidda, Nore & Uvdal 7.-11.7.77 (EK).

#### Lappiplerke *Anthus cervinus*

3 funn Averøya, Ringerike: 4.5.81 (AHA), 19.9.81 (ØP) og 21.5.82 (RL, TAN, ØP). De første funn i Buskerud.

#### Skjærpiplerke *Anthus spinolella*

Hekkefunn i 1976: par sett med mat i nebbet Storskjær, Hurum 9.7 og 2.8 (POS, ØS); nylig utflyyet ungekull Sundbyholmene, Røyken på sommeren (POS, ØS); arten sett også på Høvikskjæra, Røyken gjennom sommeren og høsten, men hekking ikke konstatert. Siste årsobs.: 1 ex 24.10 (POS, ØS). I 1977 var arten som hekkefugl borte fra Høvikskjæra og Sundbyholmene; et par viste hekkeadferd på Storskjær (POS, ØS). Arten må betegnes som en ustadic hekkefugl i vårt



Fjellerke på Hardangervidda.

Foto: Walter Henning Gundersen.

fylke, i det minste innenfor Filtvet, hvor den ikke er funnet hekkende etter 1977.

Et hekkekunns på Tofteholmen, Hurum i 1982, ad med mat i nebbet 28.5 (POS).

Sørliq qulerle *Motacilla flava flava*  
♂ Rud, Flå 6.6.77 (DL,OR).

Svartrødstjert *Phoenicurus ochruros*  
♂ Klokkarstua, Krokstadelva, N. Eiker "i lengre tid"  
forsommeren 1975 (A. Støa og G. Støa medd. AN); ♂ Usta-  
oset, Hol 21.6.77 (JLi); ♀-farget ringmerket Averøya,  
Ringerike 26.10.80 (TAN).

*Svartstrupe Saxicola torquata*

♂ Bergsvingen, Vestfossen - Hokksund, Ø. Eiker 22.3.77 (AHa).

*Gresshoppesanger Locustella naevia*

♂ Krekling, Ø. Eiker 21. og 23.6.77 (AHa, KØS); ♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 5.6.-7.7.78 (MS); ♂ Fiskumvannet 4.-14.6.82 (AHa, BH).

*Myrsanger Acrocephalus palustris*

♂ ved Lahellholmen, Røyken 6.-17.6.78 (POS, ØS, m.fl.); 1K ringmerket Linnesstranda, Lier 20.8.79 (JEN, POS); ♂ Sokna, Ringerike 21. og 28.6.81 (ØS); ♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 31.5-18.6.82 (AHa, BN, m.fl.).

*Gransanger Phylloscopus collybita*

1 ex av underarten *tristis* fanget og ringmerket Averøya, Ringerike 27.4.78 (TAN). Første funn av denne østlige underarten i fylket.

*Dvergfluesnapper Ficedula parva*

Ad ♂ Nærnes, Røyken 17.11.76 (ØS, Syvertsen 1978).  
Første funn i Buskerud.

*Spettmeis Sitta europaea*

1 ex 600 moh ved Svarttjern, Flesberg 14.8.77 (GA); ad Skardsætri, Flå (ca 750 moh) 6.7.82 (POS).

*Pirol Oriolus oriolus*

♂ Fiskumvannet, Ø. Eiker 12.6.76 (KVÆ); ♂ Uvdal, Nore & Uvdal 8.6.80 (TGU).

*Nøttekråke Nucifraga caryocatactes*

1 ex 600 moh ved Svarttjern, Flesberg 14.8.77 (GA).

*Polarsisik Carduelis hornemannii*

Averøya, Ringerike 10.10.75 (KJ, TAN); Eikli/Hoftun, Gol 19.1.80 (WHG); 2 ex Averøya, Ringerike 29.4.80 (TAN).

*Båndkorsnebb Loxia leucoptera*

2-3 ex Averøya, Ringerike 17.11.74 (JPC, OWR).

Kjernebiter *Coccothraustes coccothraustes*

Hekkefunn: Ad matet ungfugl på Krekling, Ø. Eiker 7.7.77, etter at arten var sett jevnlig (1 ex) fra 26.2 (Aila, Hals 1978); hekket i Drammen i 1980, hekkesuksess ukjent (TS, Schandy 1980).

Andre funn: Lierelvas munning, Lier våren 1971 (SN); Klokkarstua, Hurum 2.1.76 (UM); Fagerlibakken, Drammen 1.2.76 (John Dahl); Båtstø, Røyken 21.9.77 (KL); 2 ex Braqernes kirkegård, Drammen 11.4.79 (TS, Schandy 1990).

Vierspurv *Emberiza rustica*

♂ Mørekvam, Hemsedal 12.-13.6.77 (DL, OR); Averøy, Ringerike 5.-6.6.78 (TAN m.fl.). De første sikre funn i fylket.

OBSERVATØRFORKORTELSER

AB=Arild Brådalen, AG=Arild Gautepllass, AHa=Anders Hals,  
AHo=Audun Holmen, AJ=Alison C. Jensen, AL=Årild Larsen,  
AN=Arne Nævra, AV=Asbjørn Værnes, BA=Bertil Anderson,  
BBj=Bjørn Bjørnsrud, BBr=Bård Bredeesen, BH=Bjørn Hofstad,  
BN=Bjørn Nyhus, BS=Bill Sloan, DK=Dagfinn Kolbergs, DKV=  
Dag K. Vatle, DL=Dag Langfjær, EH=Erik Hegge, EK=Even  
Knutsen, EO=Elvind Østbye, GA=Geoffrey Acklam, GER=Geir  
Egil Roe, GN=Gunnar Numme, HCW=Hans Christian Waaler,  
HK=Helge Kvam, JB=Jon Bakkeland, JD=Jan Dalseide, JEN=  
Jens Erik Nygård, JJ=Jan Jensen, JLi=Jan Lifjeld, JLu=  
Jon Lurås, JS=John Stenersen, JT=Jørn Thomassen, JTB=  
Jan T. Bollerud, IJ=Ivar Johnsen, KAJ=Ken A. Jensen,  
KAT=Kjell Arne Tolpinrud, KEP=Karl Egil Plischewski,  
KJ=Kurt Jerstad, KK=Kåre Kastnes, KL=Kenneth Larsen,  
KVa=Kåre Vassengen, KVæ=Kjell Værnes, KØS=Karl Øyvind  
Solum, LOO=Lars Oluf Odden, MB=Morten Bergan, MHa=  
Morten Halmrast, MHø=Morten Høgberg, MO=Marit Olsen,  
MS=Magne Sjøblom, MW=Morten Winness, NN=anonym, NO=  
Normann Olsen, NR=Nils Rangbru, OH=Olav Hjeljord, OHN=  
Ole H. Nyhus, OIM=Odd Ivar Myhre, OR=Odd Rygh, OWR=  
Ole Wiggo Røstad, PG=Per Gylseth, PFK=Petter F. Kvartegå,  
POB=Per Ole Bjørnness, POS=Per Ole Syvertsen, REA=Rolf F.  
Andersen, PL=Rolf Lofstad, RS=Roar Selhoe, SF=Solveig  
Flesaker, SG=Svein Gautepllass, SN=Steinar Nilsen, TAN=  
Tycho Anker-Nilssen, TB=Torgrim Breiehagen, TEJ=Thor Erik  
Jelstad, TGi=Torunn Giskaas, TGu=Tore Gunnarsen, TL=  
Tommy Larsen, TOA=Tor Olav Aamodt, TS=Tom Schandy, UM=  
Ulf Myrvold, WHG=Walter Henning Gundersen, ØM=Øystein  
Mobråten, ØP=Øystein Pettersen, ØS=Øivind Syvertsen.

## REFERANSER

- Anker-Nilssen, T. 1979. Virksomheten ved Ringerike Feltstasjon, Averøya 1974-1979. *Buskvetten* 3: 84-128.
- Anker-Nilssen, T. 1981. Ringerike Feltstasjon, Averøya. Stasjonsrapport for 1980. *Buskvetten* 5: 4-19.
- Freiehaugen, T. 1976. Faunistisk rapport fra Buskerud til og med 1975. *Sterna* 15: 159-167.
- Breiehaugen, T. og Syvertsen, Ø. 1983. LRSK informerer. *Buskvetten* 7: 65-78.
- Cundersen, W.H. 1981. Fuglelivet ved Lyseren i Gøl. *Buskvetten* 5: 55-64.
- Gundersen, W.H. og Nævra, A. 1973. Nyere fugleobservasjoner fra Nedre Buskerud. *Fauna* 26: 269-274.
- Haftorn, S. 1971. *Norges fugler*. Universitetsforlaget.
- Hals, A. 1978. Kjernebiterens status på Krekling i Øvre Eiker. *Buskvetten* 2: 72-73.
- Johnsen, I. 1978. Lanpfiskand på Nesbyen. *Buskvetten* 2: 28.
- Johnsen, I. og Roe, G.E. 1980. Fuglelivet i Gøl kommune. *Buskvetten* 4: 16-20.
- Kolberg, D. 1980a. Noen spesielle observasjoner fra Kolbergtjern i Øvre Eiker. *Buskvetten* 4: 12-13.
- Kolberg, D. 1980b. Fiskumvannet - Rapport 1979. *Buskvetten* 4: 36-40.
- Naturverninspektøren for Sør-Norge 1977. *Verneplan for sjøfuglreservater*. Utkast delplan 1. 132 sider.
- Nygård, J.E. 1979. Linnesstranda. Rapport 1970-78. *Buskvetten* 3: 4-21.
- Nygård, J.E. 1980a. Linnesstranda - Rapport 1979. *Buskvetten* 4: 4-11.
- Nygård, J.E. 1980b. Knoppsvana i Buskerud. *Buskvetten* 4: 41-45.
- Nygård, J.E. 1981. Linnesstranda - Rapport 1980. *Buskvetten* 5: 36-43.
- Nyhus, B. 1981. En søndag i februar. *Buskvetten* 5: 21.
- Nævra, A. 1979a. Fiskumvannet Naturreservat - En presentasjon. Ornitologisk rapport fra ca. 1955 - 1.1.79. *Buskvetten* 3: 44-65.

- Nævra, A. 1979b. *Fuglefaunaen i Øvre Eiker med hovedvekt på Fiskumvannet*. 26 sider.
- Roe, G.E. 1980. Noen observasjoner fra Gol, våren 1980. *Buskvetten* 4: 15.
- Schandy, T. 1980. Reirfunn av kjernehitter i Drammen. *Buskvetten* 4: 48-49.
- Schandy, T. 1981. Stork og åkerrikse ved Drammen. *Buskvetten* 5: 44-46.
- Sjøblom, M. 1980. Toppdykkerhekking i Fiskumvannet. *Buskvetten* 4: 53.
- Syvertsen, P.O. 1982. Atlasprosjektet i Buskerud. Status 1982. *Buskvetten* 6: 47-95.
- Syvertsen, P.O. 1983. Sjøfuglhøsten 1983. *Buskvetten* 7: 91-93.
- Syvertsen, Ø. 1978. Sein dvergfluesnapper i Røyken. *Buskvetten* 2: 57.
- Syvertsen, Ø. 1979. 1970-årenes isfuglinvasjon. En sammenfatning av funnene i Buskerud. *Buskvetten* 3: 76-79.
- Syvertsen, P.O. og Syvertsen, Ø. 1982. Sjøfuglreservater i Buskerud. *Buskvetten* 6: 4-13.
- Winness, M.F. 1983. Linnesstranda. Rapport 1981 og 1982. *Buskvetten* 7: 10-17.



Vipe, tegnet av Ulf Myrvold.

## NYTT LOKALLAG PÅ RINGERIKE



Onsdag 18. januar 1984 ble det avholdt stiftelsesmøte for et nytt lokallag av NOF på Ringerike. Det møtte åtte personer som alle ble medlemmer. Et styre på fire ble valgt, med Olav Råd som formann og Kendt Myrmo som kasserer. Laget fikk navnet *Norsk Ornitologisk Forening, Ringerike lokallag*, og er det fjerde som opprettes i Buskerud. Den nye foreningens naturlige arbeidsdistrikt vil i første rekke omfatte kommunene Hole og Ringerike. Pr. 23.2.1984 hadde lokallaget 14 medlemmer, de fleste bosatt i Hønefoss.


Ringerike lokallag betyr en tilvekst til NOF's virksomhet i en tid hvor de fleste foreningsaktiviteter i de øvrige lokallagene i fylket ligger nede. Det er på denne bakgrunn ekstra gledelig at man har funnet grunnlag for å opprette en ornitologisk forening i dette distriktet, som jo har et betydelig befolkningstall og som kan oppvise fremragende naturkvaliteter med viktige fuglelokaliteter. Hele 5 av de 11 enkeltlokaliteter som er medtatt i verneplanen for våtmarksområder i Buskerud ligger i det nye lokallagets distrikt. De har også allerede det første virkeåret rukket å markere seg i de to pågående NOF-prosjektene, atlasprosjektet og vinterfugltellingene. For det sistnevnte prosjektet har Olav Råd vært fylkeskoordinator siden november 1983, og han var tidligere med i den sentrale landsledelsen av dette.

Vi hilser Ringerike lokallag velkommen, og ønsker alt vel for det framtidige foreningsarbeid. Lagets adresse står på side 2.

*Redaksjonen*

# ORNITOLOG PA SPORET





DANIEL

# MØTEREFERATER:

## DRAMMEN LOKALLAG


Tom Schandy

### HØSTEN 1983

- 15/9 : Denne kvelden ble viet naturen i Holleia idet den dyktige naturfotografen Børre Kind fra Vikersund kom og viste lysbilder under tittelen "I tiurskog på Holleia". Det ble skikkelig vårstemning i salen da Kind viste sine utmerkede bilder av tiur omkranset av over 10 røyer. Men det var ikke bare storfugl med i foredraget, men også mange andre interessante dyr og fugler fra Holleias skoger. 21 var tilstede.
- 20/10 : Den mangeårige NOF-veteranen Halvdan Møller fra Sandefjord gjestet oss og viste lysbilder fra Vestfolds mange fine fuglemarker. 22 tilstede.
- 17/11 : Dagfinn Kolberg fra Vestfossen tok forsamlingen med inn i den mystiske hønsehaukskogen ved hjelp av lyd og bilder. Dyktig fotograf som han er, hadde han klart å feste såvel hønsehauk som trane til filmstrimmelen. Det ble mange villmarksinntrykk denne kvelden. 23 tilstede.
- 15/12 : Vi avholdt årsmøte. Årsberetning og regnskap ble opplest og godkjent. Deretter var det valg, og det nye styret ble seende slik ut:  
Tom Schandy (förm.), Morten Winness (sekr.), Ole Bjørn Braathen (kass.), Per Sølverud og Knut Arne Solberg (styremedl.), Ole Edv. Bakken og Bjørn Rangbru (varamenn). Etter årsmøtet holdt professor Johan B. Steen fra Universitetet i Oslo et engasjert og morsomt foredrag om ryper. Hele 37 stykker hadde møtt frem, og etter foredraget ble det lang diskusjon om ryper og rypejakt.

VÅREN 1984

- 19/1 : Formannen og sekretæren viste lysbilder og fortalte fra ringmerkingsarbeidet ved Fiskumvannet i 1983. Alt i alt ble det merket 1700 fugl ved vannet.
- 16/2 : På dette møtet lanserte vi et nytt innslag, nemlig månedens fugler. Vi tok for oss dykkerne og snakket om artenes biologi og kjennetegn. Flere av medlemmene hadde tatt med bilder av artene.
- Deretter holdt Ulf Myrvold foredrag med lysbilder og film. Over 30 hadde møtt frem for å høre Ulf fortelle om "Dalen der tranene raster". Nok en vellykket villmarkskveld



Storspove, tegnet av Ulf Myrvold.

- 15/3 : På dette møtet ble vi med Agder-gutten Nils Høvik til svarteste Afrika, nærmere bestemt Zimbabwe. Her hadde han oppholdt seg i over et halvt år. I fine bilder møtte vi mange av Afrikas innvånere. 20 tilstede.
- 12/4 : vårt eget medlem gjennom mange år, Bjørn Huseby, viste naturbilder. Bjørn har i lengre tid jobbet med fluktopptak av småfugl ved hjelp av blits og fotocelle. På møtet ble det presentert opptak av såvel låvesvaler som meiser i lynkjapp flukt. 32 tilstede.
- 24/5 : Utemøte. Tur til Fiskumvannet. 10 medlemmer deltok. I nordenden av vannet kunne deltagerne observere 4 knekkender, 5 krikkender, to par toppdykkere, 1 par knoppsvane, 3 sothøner, gråhegre, enkeltbekkasin, 2 canada-gjess og 2 skogduer. Heilt på tampen av turen fant vi også en flott utfarget hann av rosenfink som satt og sang den kjente strofen fra en liten busk.

#### EKSKURSJONER

18/9-83:Tur til Fiskumvannet for å se på ringmerking. Hele 14 deltagere stilte opp, men dessverre var det lite fugl i nettene. Det mest interessante var en sivsanger.

13/5-84:Ekskursjon til Nodre Øyeren Naturreservat i Akershus. vi var 6 stykker som dro fra Drammen kl. 06. Først avla vi en visitt på Tuentangen hvor det var svært lite fugl, bare noen enkeltbekkasiner og storspover. Deretter dro vi til Årnestangen hvor vi traff tidligere formann i foreningen, Per Ole Syvertsen. Han kunne fortelle at mandarinand var observert i reservatet for en halvtime siden. Men anda var selvsagt totalt forsvunnet når vi ruslet utover den 3 km lange tangen. Nesten ytterst på tangen holdt det seg rundt 30 brushaner i praktdrakt og en hvitkinngås. Svarthalespoven som hadde vært reklamen i foreningens møteinnkallelse, hekket ikke før første gang på mange år. Blåstrupe ble observert på nært hold, og en tårnfalk ble sett. En dverglo holdt seg på tuppen av tangen, mens en flokk laksender boltret seg i vannet utenfor. Ett knekkamdpár flyø også over vannet. På tilbaketuren var vi innom Østensjøvannet.

# LOKALLAGSSAKER

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, DRAMMEN LOKALLAG

Arsberetning for året 1/12 1982-30/11 1983.

Foreningen har i beretningsåret sendt møteinnkallelser til 88 stykker. Av disse har imidlertid bare 67 betalt kontigent for 1983 mot 74 i 1982. Likevel er foreningens medlemsmasse i vekst. I 1983 har vi fått 11 nye medlemmer.

Styret har i 1983 hatt denne sammensetning:

Tom Schandy (formann), Ole Bjørn Braathen (kasserer), Trond Histøl (sekretær), Morten F. Winness og Per Sølverud (styremedlemmer) og med Ole Edv. Bakken og Knut Arne Solberg som varamenn. Revisor har vært Tore Gunnarsen. Gunnar A. Lindaas og Øivind Syvertsen har fungert som valgkomite med førstnevnte som formann.

Det har i beretningsåret blitt avholdt 9 medlemsmøter. Med unntak av maimøtet er de alle blitt avholdt i Musikkalen i Drammen Folkebibliotek.

Programmet på møtene har vært som følger:

Årsmøte 9/12-83: Årsberetning og regnskap ble opplest og godkjent, og styret for 1983 ble valgt. Etter årsmøtesakene holdt Peter Johan Schei fra Miljøverndepartementet foredrag om "Prosjekt Falk". 21 stykker tilstede.

27/1-83 : Ole Wiggo Røstad fra Universitetet i oslo holdt lysbildeforedrag om fuglefjellsfugler i Norge. 19 til stede.

17/2-83 : Johan Christian Frøstrup v/ Zoologisk Museum i Oslo kåserte og viste lysbilder fra knoppsvaneprosjektet i Norge. 16 til stede.

- 17/3-83 : Bjørn Tore Bækken holdt lysbildeforedrag under tittelen "Natur og fugleliv i Trysil". 20 stykker til stede.
- 21/4-83 : Dosent Lauritz Sømme v/ Universitetet i Oslo viste bilder fra norske og engelske Antarktis-ekspedisjoner. 22 tilstede.
- 19/5-83 : Utemøte i Bragernesåsen for å lytte på fuglesang.  
12 deltok.
- 15/9-83 : Børre Kind viste lysbilder under tittelen "I tiurskog på Holleia". 21 tilstede.
- 20/10-83: Halvdan Møller viste lysbilder fra Vestfolds fuglemarker.  
22 stykker tilstede.
- 17/11-83: Dagfinn Kolberg fra Eiker lokallag holdt foredrag under tittelen "I hønsehaukskogen". 23 tilstede.

Gjennomsnittelig har det deltatt 20 stykker på møtene. Dette er lavere fremmøtefrosent sammenlignet med 1982 hvor vi hadde møter med over 50 tilhørere. Faste poster utenom foredrag har vært "medlemmenes kvarter" og bokutlending.

Foreningen har i 1983 arrangert 4 ekskursjoner, fordelt med 3 i vårsemesteret og 1 i høstsemesteret.

- 6/2 : Ekskursjon til Grunnane og sandebukta. Det ble observert 31 sangsvaner, 49 knoppsvaner, 4 gråhegrer samt kvinand, laksand og stokkand. Kun 2 deltagere.
- 8/5 : Ekskursjon til Hellesjøvannet i Akershus. Det ble observert minimum 5 horndykkere, 1 snadderandhann, 20-30 taffelender, 1 bergand hunn, toppand, fiskeørn, grønnstilk m.fl.  
10 deltagere.
- 4/6 : Kvelds- og nattur til fiskumvannet for å lytte etter natt-sangere. Det ble hørt 1 myrrikse, 1 nattergal, 1 gresshoppe-sanger og 1 mekrende enkeltbekkasin. 8 deltagere.
- 18/9: Tur til Fiskumvannet for å se på ringmerking. Det ble imidlertid fanget svært få fugl. Den mest interessante fangsten ble gjort av en sivsanger. God opplsutning, hele 14 deltagere, inkludert noen medlemmer fra Øvre Eiker lokallag.

Foreningen sendte i vårsemesteret ut et spørreskjema for å undersøke medlemmene sine interesser for fugl og deres syn på driften av foreningen. 17 skjemaer kom inn. Styret hadde håpet på større opplutning, men de svararkene som kom inn, ga nyttige tips til styret.

Foreningen arrangerte i beretningsåret en utstilling i Avis-senteret, Børseren på Bragernes torg. Vi hadde utstilt plakater med informasjon om atlasprosjektet, våtmark- og sjøfuglreservater, hvorfor vi ringmerker med mer. En del fargefotografier og utstoppede fugler var også stilt ut. En mengde foldere om både lokalforening og hovedforening ble utdelt. Utstillingen fikk god pressedeckning i DT-BB og har også blitt omtalt i NOF-organet "Vår Fuglefauna". Noen skoleklasser besøkte utstillingen, og vi fikk også noen nye medlemmer.

Også i 1983 har flere av medlemmenene deltatt i atlasprosjektet og vinterfugltellingen. Gledelig nok ble det i beretningsåret blåst støv av tidsskriftet "Buskskvetten" som Drammen lokallag utgir i samarbeid med Øvre Eiker og Hallingdal lokallag. Det ble i 1983 gitt ut hele 4 numre, og i løpet av januar 1984 regner redaksjonen å være i rute igjen.

Foreningen har i beretningsåret fått bedre økonomi sammenlignet med 1982. Dette skyldes i første rekke god kommunal støtte. Styret så seg derfor råd til å støtte med kr. 100,- til "Aksjon Gunnar" som samler penger til et par minneplater til minne om den kjente ornitologen Gunnar Lid som omkom sist sommer.

Drammen, 14/12-83

Tom Schandy

(form.)

Norsk Ornitoligisk forening- Drammen lokallag  
Regnskap pr. 30/11-1983

Resultatkonto( Tap og vinning)

UTGIFTER	Utgifter	Inntekter
Porto	1475,25	
Bøker til utlodning	311,-	
Til foredragsholdere	780,80	
Annonser	194,45	
Lokalleie	240,-	
Bidrag til Aksjon Gunnar	100,-	
Diverse	95,-	
 INNTEKTER		
Medlemskontingent		1828,-
Utlodning av bøker		788,-
Tilskudd til lokalleie		100,-
Grunnstønad fra Drammen kommune		900,-
Renter fra postsparebank		115,-
Div.		31,-
	3196,50	3762,-
Overskudd	565,50	
	3762,-	3762,-

Balansekonto (status) pr. 30/11-83

Aktiva	Passiva
I kasse kr. 448,95	
I bank " 2408,-	
Postgiro " 219,30	
<u>kr.3076,25</u>	<u>Kapital:</u>
	Pr. 1/12-82 kr.2510,75
	Overskudd 1983 " 565,50
	<u>kr.3076,25</u>

4/12-1983

Ole Bjørn Brathen  
Kasserer

Tore Gunnarsson  
Revisor

# INDEKS FOR Buskhetten 1977-1982

Det publiseres mye nytt og spennende ornitologisk stoff i de lokale fugletidsskriftene. Det er imidlertid en lite attraktiv oppgave å gå gjennom disse bladene på søker etter de opplysninger en trenger, f.eks. for å lage artikler om arters forekomst, lokalt eller i landssammenheng. Jeg har derfor laget et indeks for de seks første årganger av *Buskvetten*. Idem er realisert også i andre norske lokaltidskrifter.

Ved utarbeidelsen er det lagt vekt på faunistiske opplysninger, og referanser til annonser, opprop og illustrasjoner m.m. er derfor som regel sløyfet. Opplysninger som ikke gjelder Buskerud er satt i skarpe klammer <>.

Indekset angir hovedsakelig arter, og den norske navngivingen følger fuglenavnlista i *Toppdykker'n*, Suppl. april 1981. I de tilfeller hvor ulike norske navn har vært alminnelig benyttet i seinere år, er begge oppført hvis forskjellene er store.

Av høyere taxa er bare slekter referert, men det gjøres oppmerksom på at tekstene ikke alltid gir klare holdepunkter for hvilke slekter som er ment. Jeg har henført disse opplysningene til de slekter som jeg finner mest sannsynlige; er usikkerheten stor er opplysningene kuttet ut (f.eks. betegnelser som and og kråkefugl).

Et spesielt problem representerer en 200 år gammel fugleliste. Så langt jeg mener å kunne identifisere arter og slekter ut fra tekstens beskrivelser, er også disse opplysningene med i indekset. Om det gamle navnet er svært ulikt dagens, er dette satt i parentes rett etter sidetallshenvisningen.

Per Ole Syvertsen

Alke 1978: 39	Bjørkefink 1977: 11
Alkekonge 1978: 39	1978: 40, 53, 61
Audouinmåke 1979: <67>	1979: 6, 20, 62, 91, 92, 99, 100,
Avosett 1978: <29>, <30>	102, 126
1980: <62>	1980: 6, 9, 11, 18, 38, <57>,
Berberfalk 1978: <29>	<58>, 72, 98
Berbersteinskvett 1978: <29>	1981: 4, 9, 10, 11, 18, 38, 41, 60
Bergand 1977: 10	1982: 25, 87
1978: 37, 60	Blåmeis 1977: 11
1979: 10, 50, 107	1978: 40, 61
1980: 8, 10, 37, 39, 74	1979: 6, 19, 62, 92, 98, 100,
1981: 15, 40, 42, <71>	101, 117
1982: 56	1980: 6, 7, 8, 18, 38, 48, 97
Bergirisk 1977: 11	1981: 6, 8, 10, 13, 17, 38, 39,
1978: 41	41, 66
1979: 20, 63, 99, 124	1982: 25, 83
1980: 9, 18, 38, <58>, 99	Blåråke 1978: 39
1981: 9, 17, 41, 58	Blåstrupe 1977: 8, 11
1982: 25, 34, 88	1978: 40
	1979: 6, 19, 62, 98, 102, 119

1980:	5,8,11,18,38, <58>,60,94	Dobbeltbekkasin	1978: 38,60 1979: 14,37,57
1981:	8,17,38,40,58, 60,64	1980:	8,17,19,37,39
1982:	25,76	1981:	5,16,40,56,59,63
Blåtrost	1979: <66>,<68>	1982:	25,64
Bokfink	1977: 11 1978: 40,58 1979: 6,20,62,91,92, 99,100,102,126	Dompap	1977: 11 1978: 41,58,82 1979: 6,20,64,92,93,99, 100,102,126
1980:	6,9,18,38,48, 72,98	1980:	6,9,11,18,38,<57>, <58>,101
1981:	9,10,11,18,38,41	1981:	9,10,18,38,41,43,60
1982:	25,30,31,87	1982:	25,52,90
Boltit	1978: 38 1980: 36,37,39,102 1982: 34,62	Duetrost	1978: 40,88 1979: 62,120
Bronseibis	1978: 37	1980:	18,38,103
Brunnakke	1977: 7,10 1978: 37 1979: 10,49,91,107 1980: 8,17,37 1981: 15,40,42,59 1982: 24,92	1981:	17,50,58
Brushane	1977: 10 1978: 38,60 1979: 12,55,<67>,75,113 1980: 8,17,37,39,102 1981: 5,16,40,42,56, 59,63 1982: 25,64	1982:	25,78
Buskskvett	1977: 3,8,11 1978: 40 1979: 5,18,61,98,119 1980: 5,8,18,38,93 1981: 8,17,37,40,43,60 1982: 25,76	Dvergdykker	1978: <15>,<30>,37, 50,88 1979: 48,<68> 1980: 17,19,37 1981: 21 1982: 24,31
Bydue (=klippedue)	1977: 11 1978: 39,<95> 1979: 15,113 1980: 8,103 1981: 16,40 1982: 67	Dvergfalk	1978: 37 1979: 52,109 1980: 17,37,39,59,76 1981: 15,58 1982: 24,59
Bøksanger	1978: 40 1979: 92,98,102,122 1980: 18,92 1981: 8,17 1982: 25,80	Dvergfluesnapper (=liten flue-snapper)	1978: 40,57
Båndkorsnebb	1978: 41 1979: 126 1981: 18	Dverghornugle	1979: <68>
Canadagås se kanadagås		Dverglerke	1979: <67>,<68>
Cettisanger	1979: <68>	Dverglo	1977: 10 1978: 38 1979: 11,54,<67>,92,111 1980: 8,11,37,39,102 1981: 5,16,40,70 1982: 62
Cistussanger	1979: <68>	Dvergmåke	1978: <30>,38,<77> 1979: <37>
Diademrødstjert	1978: <29>	Dvergsnipe	1977: 10,<34> 1978: <29>,38,<77> 1979: 12,54,112 1980: 8,37,<62> 1981: 5,16,40
		Dvergspett	1977: 11 1978: 39 1979: 5,15,58,92,97,101,116 1980: 5,8,11,17,37,85 1981: 7,16,37,40,58 1982: 25,72
		Dvergvane	1978: 37 1979: 49,104 1980: 37 1981: 15
		Dvergterne	1980: <62>

Egretthegre 1978: <21>	Flamingo 1978: <29>, <30>
Engelsk gulerle <i>se</i> gulerle	Fossekall 1978: 40
Enghauk 1979: <67>	1979: 60, 118
Enkeltbekkasin 1977: 10	1980: 18, 38, 89
1978: 38, 51, <61>, <93>	1981: 17, 21, 58
1979: 5, 6, 14, 57, <67>, 91,	1982: 25, 52, 75
97, 101, 112	Fuglekonge 1977: 11
1980: 5, 8, 15, 17, 37, <62>, 80	1978: 40, 61
1981: 6, 7, 10, 16, 37, 40, 56,	1979: 18, 61, 92, 98, 102, 122
59, 63	1980: 8, 18, 38, <57>, <58>, 92
1982: 25, 64	1981: 8, 17, 41, 60
	1982: 25, 81
Falkeslekten <i>Falco</i> 1978: 58	Furukorsnebb 1978: 41
1980: 4, 8, 11	1979: 126
1981: 40	1980: 18, 38, 100
1982: 24	1981: 18, 50
Fasan 1977: 10	1982: 25, 89
1978: <20>, 38	Gjerdesmett 1977: 11
1979: 11, <37>, 52, 110	1978: 40
1980: 8, 11, 37, 102	1979: 5, 17, 60, 98, 102, 119
1981: 15, 36, 37, 40	1980: 5, 8, 18, 38, <57>, <58>, 90
1982: 61	1981: 4, 8, 17, 37, 40
Fiskemåke 1977: 11, 23, 26, 27, 28	1982: 25, 75
1978: 38, 51	Gjøk 1977: 11
1979: 14, 57, 91, 92, 97, 113	1978: 39, 73
1980: 8, 12, 17, 20, 37, 81	1979: 15, 58, 97, 114
1981: 7, 16, 40, 60, 70	1980: 8, 17, 37, 40, 49, 82
1982: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 67	1981: 4, 7, 16, 40, 43, 60
Fiskemåkeslekten <i>Larus</i> 1978: 59	1982: 25, 68
Fiskeørn 1977: 10	Glente 1977: <35>
1978: 37, 58 (glente og	1978: <15>, <77>
fiskejon), 60, 78	1979: <37>
1979: 11, 50, <67>, 109	1980: <62>
1980: 8, 11, 17, 19, 21, 37, 74	Gluttnsipe 1977: 10
1981: 15, 40	1978: 38, <61>
1982: 24, 59	1979: 12, 55, 91, 97, 111
Fjellerke 1978: 39	1980: 8, 17, 24, 37, 39, 79
1979: 59	1981: 7, 16, 40, 56, 59, 63
1980: 18, 37, 103	1982: 25, 65
1982: 25, 72	Grankorsnebb 1978: 41
Fjelljo 1978: 38	1979: 64, 126
1982: 92	1980: 18, 38, 100
Fjellmyrløper 1978: 38	1981: 18, 50
Fjellrype 1978: 38	1982: 25, 89
1980: 17, 19, 76	Granmeis 1977: 11
1982: 24, 60	1978: 40, 82
Fjellvåk 1978: 37	1979: 6, 19, 62, 92, 98, 99, 101, 1.
1979: 52, 75, 91, 109	1980: 6, 8, 18, 38, 96
1980: 17, 37, 39, <58>, <61>, 75	1981: 8, 11, 17, 38, 41, 43, 60, 66
1981: 15, 58	1982: 25, 82
1982: 24, 59, 92	Gransanger 1977: 11
Fjærelytt 1978: 38	1978: 40
1980: 78	1979: 5, 18, 34, 61, 98, 102, 122
1982: 34, 63	1980: 5, 8, 18, 38, <57>, <58>, 91
Flaggspett 1977: 11	1981: 8, 17, 37, 41, 43
1978: 39, 58 (hakkespett), 80	1982: 25, 80
1979: 5, 15, 58, 92, 97, 100,	Gravand 1977: 10, 23, 28
101, 116	1978: 37
1980: 5, 8, 17, 37, 47, 84	1979: 9, 49, 106
1981: 7, 10, 16, 37, 40	1980: 8, 37, 39, 102
1982: 25, 71	

1981: 15, 40, 42, <71>	Gråmåke 1977: 10, 23, 28
1982: 7, 8, 9, 10, 12, <33>, 91	1978: 38, 51
Gresshoppesanger 1977: 8, 11	1979: 14, 57, 91, 93, 113
1978: 40	1980: 8, 37, 103
1979: 4, 5, 17, 60	1981: 16, 40, 43, 66, 67
1980: 5, 8, 38	1982: 7, 9, 10, 11, 12, 67
1981: 37, 40, 70	Gråsisik 1977: 11
1982: 92	1978: 41
Grønnfink 1977: 11	1979: 20, 63, 91, 99, 102, 124
1978: 40	1980: 6, 9, 11, 18, 38, <58>,
1979: 6, 20, 63, 92, 99, 100,	63, 100
102, 124	1981: 4, 6, 9, 10, 11, 18, 38, 41,
1980: 6, 7, 9, 18, 38, 48, 99	43, 60
1981: 9, 10, 11, 17, 38, 41,	1982: 25, <33>, 89
43, 66	Gråspett 1977: 11
1982: 25, 87	1978: 39
Grønnsik 1977: 11	1979: 15, 58, 115
1978: 41, 61	1980: 8, 17, 37, 84
1979: 6, 20, 63, 91, 92, 99,	1981: 16, 40
100, 102, 124	1982: 25, 29, 71
1980: 6, 9, 18, 38, 99	Gråspurv 1977: 11
1981: 5, 6, 9, 10, 17, 38, 39,	1978: 40, 59 (spurv)
41, 60, 66	1979: 6, 19, 62, 124
1982: 25, <33>, 88	1980: 6, 9, 18, 20, 38, 98
Grønnspett 1977: 11	1981: 17, 38, 41, 66, 67
1978: 39, 58 (hakkespett)	1982: 25, 86
1979: 15, 58, 92, 97, 101, 115	Gråtrost 1977: 11
1980: 8, 17, 37, 84	1978: 40, 57, 61, 72
1981: 7, 16, 40	1979: 6, 19, 62, 92, 93, 98, 100,
1982: 25, 29, 71	102, 120
Grønnstilk 1977: 10	1980: 6, 7, 8, 18, 38, 48, 55, 72, 94
1978: 38, 60	1981: 8, 10, 17, 38, 40, 49, 60
1979: 5, 12, 56, 97, 112	1982: 25, 52, 77
1980: 5, 8, 17, 37, 79	Gråtrostslechten <i>Turdus</i>
1981: 7, 16, 37, 40, 43, 56, 59, 63	1978: 58 (kramsfugl), 82
1982: 25, 66	Gulbrynsanger 1978: 40
Gråfluesnapper 1977: 11	1979: 98, 121
1978: 40	1980: <57>
1979: 5, 18, 61, 92, 98, 102, 122	1981: 8, 17
1980: 5, 8, 18, 38, 93	Gulerle (inkluderer underartens
1981: 8, 17, 37, 41, 43, 60	engelsk gulerle, iberisk gulerle,
1982: 25, 81	sørlig gulerle og særle)
Grågås 1978: 37, 54, <77>	1977: 11
1979: 48, 105	1978: 39
1980: 4, 5, 8, 10, 37	1979: 5, 16, 34, 59, <68>, 92,
1981: 15, 37, 40, 42	99, 123
Grågåsslekten <i>Anser</i> 1977: 12	1980: 5, 8, 18, 24, 25, 37, 87
1978: 58	1981: 9, 17, 37, 40, 43, 58, 60, 64
1979: 9, 48, 105	1982: 25, 74
1980: 17, 19	Gulirisk 1978: <29>, 40
1982: 24	1979: <68>
Gråhegre 1977: 10	Gulnebbliare 1979: <67>, <68>
1978: <30>, 37, 50, <61>	Gulsanger 1977: 11
1979: 8, 48, 104	1978: 40
1980: 8, 10, 17, 37, <58>	1979: 5, 18, 61, 92, 98, 102, 120
1981: 15, 40	1980: 5, 8, 18, 38, 90
1982: 24, 91	1981: 4, 8, 17, 37, 40
Gråhodealbatross 1978: 37	1982: 25, 79
1979: 45, 48	Gulspurv 1977: 11
1980: 37	1978: 41, 59 (spurv), 82
Grålire 1978: 37, <77>	1979: 6, 20, 64, 91, 92, 93, 99,
	100, 102, 127

1980: 6,9,18,38,101	1979: 5,15,37,58,92,97,
1981: 9,10,18,38,41,66	101,114
1982: 25,90	1980: 5,8,11,17,37,60,82
Hagebylbyl 1978: <29>	1981: 6,7,10,16,37,40
Hagefluesnapper <i>se</i>	1982: 25,69
svarthvit fluesnapper	Hortulan 1977: 11
Hagesanger 1977: 8,11	1978: 41,60
1978: 40	1979: 20,64,99,127
1979: 5,7,18,61,92,98,100,	1980: 9,38,40,103
102,121	1981: 9,18,41,70
1980: 5,8,18,38,90	1982: 91
1981: 4,6,8,10,17,37,40,	Hubro 1978: 4,39
43,60	1980: 17,20
1982: 25,80	1982: 25,92
Haukugle 1978: 39	Husspurv 1978: <29>
1981: 58	Hvitbrystlo 1979: <67>
Haukørn 1978: <29>	Hvitkinngås 1978: 37
Havelle 1977: 10	1979: 48,106
1978: 37	1980: 37
1979: 10,50	1981: 15
1980: 8,37,60	Hvitkinnsvarterne 1979: <67>
1981: 40,<71>	Hvitkronestenskvett 1978: <29>
1982: 92	Hvitryggspett 1977: 11
Havhest 1978: 37,<93>	1978: 39
1980: 60	1979: 15,58,97,116
Havlire 1978: <95>	1980: 8,17,20,37,103
Havlireslekten <i>Puffinus</i> 1980: 60	1981: 7,16,40
Havsole 1978: <93>,<94>,<95>	1982: 25,92
1980: 60	Hybrider
Havsvale 1978: <95>	Låvesvalextaksvale 1979: 97,116
Havørn 1980: <61>	1981: 7
Hegre <i>se</i> gråhegre	Hærfugl 1978: 39
Heilo 1977: 10	1979: 58,<68>
1978: 38,78,90,<95>	1980: 37
1979: 11,54,110	Hønsehauk 1977: 10
1980: 8,11,17,37,39,78	1978: 37,<77>
1981: 16,40,42,56,59	1979: 11,35,50,97,100,108
1982: 24,62	1980: 8,17,37,75
Heiloslekten <i>Pluvialis</i> 1978: 61	1981: 7,10,15,40,42
Heipiplerke 1977: 11	1982: 24,26,58,92
1978: 39,<93>	Hønsehaukslekten <i>Accipiter</i>
1979: 5,16,59,98,102,122	1978: 58
1980: 5,8,11,18,37,<58>,	1980: 72
<62>,87	1982: 52
1981: 9,17,37,40,43,60	Iberiatopplerke 1978: <29>
1982: 25,74	Iberisk gulerle <i>se</i> gulerle
Hekkspurv 1979: <68>	Isfugl 1977: 8,11
Hettemåke 1977: 10,23,26,27,28	1978: 39,51
1978: <20>,38,51	1979: 5,15,76,97,115
1979: 14,45,57,91,113	1980: 5,8,15,17,20
1980: 8,12,17,37,81	1981: 7,16,37,40
1981: 5,16,40,60,70	1982: 25
1982: 5,7,9,10,11,12,25,60	Jaktfalk 1978: <21>,37
Horndykker 1978: 37	1979: <37>
1979: 8,48	1982: 92
1980: 8,36,37,39	Jernspurv 1977: 8,11
1981: 40	1978: 40
Hornugle 1977: 11	1979: 5,6,17,60,92,98,102,122
1978: 39,61	1980: 5,8,18,38,<57>,90

		.71
	1981: 8,17,37,38,40,43,60	Knoppsvane 1977: 10,<19>
	1982: 25,75	1978: <19>,<27>,37,60,
Jerpe	1978: 38,58	<61>,78
	1980: 17,77	1979: 9,49,54,91,104
	1982: 24,29,60	1980: 8,10,37,39,41,102
Jordugle	1978: 19,39	1981: 15,39,40,42,70,<71>
	1979: 58,97,101,115	1982: <33>,34,55
	1980: 17,37,40,<62>,103	Kongeørn 1978: 37,59 (ørn)
	1981: 7,16,36,40,43,58	1979: 52
	1982: 25,69	1980: 17,19,37,71,102
Joslektens	<i>Stercorarius</i> 1979: 57	1982: 24,92
	1980: 37,60	Konglebit 1978: 41
Kaie	1977: 11	1979: 93,126
	1978: 40,58,61,78	1980: 18,38
	1979: 17,60,91,92,117	1981: 18
	1980: 9,11,18,38,40,103	1982: 25
	1981: 17,41	Kornkråke 1977: 11
	1982: 25,85	1978: <20>,<21>,40,<61>,78
Kamsothøne	1978: <29>	1979: 17,60,117
Kanadagås	1977: 7,10	1980: 9,18,38
	1978: 37	1981: 16,41
	1979: 9,48,106	1982: 25
	1980: 8,10,37,39,41,102	Korsnebbslekten <i>Loxia</i> 1979: 93,126
	1981: 15,40,42,70	Kortnebbgås 1978: 37
	1982: 55	1979: 48,91,105
Kattugle	1977: 11	1980: 37
	1978: 19,<20>,39	1981: 15,59,61
	1979: 15,58,69,97,114	1982: 24
	1980: 8,17,20,37,83	Krikkand 1977: 7,10
	1981: 7,16,40	1978: 37
	1982: 25,69	1979: 10,49,91,92,95,97,100,
Kjernebiter	1977: 11	101,107
	1978: <21>,41,72	1980: 8,10,17,37,73
	1979: 20,<37>,64	1981: 4,7,10,15,40,42,59,71
	1980: 9,38,48,103	1982: 24,55
	1981: 41	Krykkje 1978: 38,<93>
	1982: 92	1979: 57
Kjøttmeis	1977: 11	1980: 37,60
	1978: 40,59 (talgokse og	Kråke (inkluderer underarten
	talgitte),82	svartkråke) 1977: 11
	1979: 6,19,62,92,96,98,99,	1978: 40,58 (kraje)
	100,101,117	1979: 17,60,91,92,98,101,117
	1980: 6,8,18,38,48,<58>,97	1980: 8,18,89
	1981: 8,10,11,13,14,17,38,	1981: 7,16,41,60,66,67
	39,41,66	1982: 25,35,86
	1982: 25,<33>,83	Kuhegre 1978: <29>,<30>
Kjøttmeisslekten	<i>Parus</i>	Kvartbekkasin 1977: 8,10
	1978: 81,82	1978: 38
	1979: 93	1979: 5,14,57,<67>,97,112
	1980: 59	1980: 5,8,11,37
Klippedue	se bydue	1981: 7,16,37,40
Klippesvale	1979: <66>	Kvinand 1977: 7,10
Knekkand	1977: 10	1978: <19>,28,37,48,51
	1978: 37,50,60,78	1979: 10,50,91,92,93,96,97,
	1979: 10,37,49,97,106	101,107
	1980: 8,37,39	1980: 8,17,37,60,74
	1981: 7,15,40	1981: 4,7,13,15,40,42,59,71
	1982: 92	1982: 24,<33>,34,56

Laksand	1977: 7,10 1978: <19>,37 1979: 10,50,91,92,93,96, 97,108 1980: 8,10,17,37,74 1981: 7,13,15,40,42,56,59 1982: 24,57	Løvsanger	1977: 8,11 1978: 40 1979: 5,6,7,18,61,91,92,98, 99,100,102,121 1980: 4,5,6,7,8,18,38,63,92 1981: 5,8,10,11,17,37,38, 41,49,60
Lappfiskand	1978: <21>,28,37 1979: 10,<37>,108 1980: 8 1981: 15,40 1982: <33>	Låvesvale	1977: 11 1978: 39 1979: 5,16,59,92,97,116 1980: 5,8,18,37,<62>,86 1981: 7,16,37,40,43,60 1982: 25,73
Lappmeis	1978: 40	Makrellterne	1977: 11,23,26,27,28 1978: 39,51 1979: 14,57,92,113 1980: 8,17,37,81 1981: 5,16,40,60 1982: 5,7,9,10,11,12,25,67
Lappspove	1978: <21>,38,<61> 1979: 56,111 1980: 37 1981: 16	Makrellterneslekten	Sterna 1979: 113 1980: 17 1982: 25
Lappspurv	1978: 41 1979: 20,64,127 1980: 9,18,38,101 1981: 18,41,58 1982: 25,90	Markpiplerke	1979: <66>
Lavskrike	1978: 39 1980: 18,88 1981: 60 1982: 25,85	Munk	1977: 8,11 1978: 40 1979: 5,18,61,92,98,99,102,120 1980: 5,8,11,18,38,91 1981: 4,6,8,10,11,17,37,40,43 1982: 25,31,80
Leonorafalk	1979: <68>	Munkegribb	1979: <66>
Lerkefalk	1978: 37,<77> 1979: <37>,52,109 1980: 37 1981: 15,70 1982: 92	Musvåk	1977: <34>,<35> 1978: <15>,<21>,37,60,<77> 1979: 52,91,109 1980: 17,19,21,22,37,39, <61>,75 1982: 24,58,92
Lerke	se sanglerke	Myrhauk	1977: <34>,<35> 1978: <15>,<20>,37,<77> 1979: <37>,52,109 1980: 4,8,10,17,19,37,39 1981: 15,40,59,61 1982: 24,92
Linerle	1977: 11 1978: 39,58,<77> 1979: 5,6,17,34,59,92,99, 100,102,123 1980: 5,6,8,18,37,72,87 1981: 4,9,10,17,37,38,40,60 1982: 25,52,74	Myrrikse	1977: 8,10 1978: 38 1979: 4,5,11,52 1980: 5,8,37,39 1981: 37,40 1982: 92
Lirype	1978: 38,59 (rype) 1980: 17,76 1981: 59 1982: 24,60	Myrsanger	1977: 8 1978: 40,61 1979: 4,5,6,18,37 1980: 5,6,8,11,38,40,103 1981: 37,38,40 1982: 92
Liten fluesnapper	se dvergflue-snapper	Myrsnipe	1977: 10,<34>
Liten skrikeørn	se småskrikørn		
Lomslekten	Gavia 1978: 59 1979: 104		
Lomvi	1978: 39,<95>		
Lunde	1978: <93>,<94>		
Lys klippesvale	1978: <29>		
Løvmeis	1977: 11 1978: 40 1979: 6,19,62 1980: 6,8,38,96 1981: 38,41 1982: 25,82		

1978: <15>, <29>, 38, <61>, <77>	1982: 14, 15, 25, 29, 30, 70
1979: 12, 55, 91, 112	Pilfink 1977: 11
1980: 8, 11, 17, 37, <62>, 78	1978: 40
1981: 16, 40, 42, <71>	1979: 6, 19, 62, 124
1982: 25, 63	1980: 6, 9, 18, 20, 38, 98
Myrsnipeslekten <i>Calidris</i>	1981: 9, 17, 38, 39, 41
1979: 112	1982: 25, 87
1981: 42	Pirøl 1978: 39
Møller 1977: 11	1979: 59
1978: 40	1980: 37
1979: 5, 18, 61, 92, 98, 102, 121	Polarmåke 1979: 14
1980: 5, 8, 11, 18, 38, 91	1980: 8
1981: 8, 17, 37, 40, 43, 60	1981: 40
1982: 25, 79	Polarsisk 1978: 41
Måltrost 1977: 11	1979: 63, 99, 125
1978: 40	1980: 38
1979: 6, 19, 62, 92, 98, 100, 102, 120	1981: 9, 18
1980: 6, 8, 18, 38, <58>, 95	1982: 25
1981: 8, 10, 17, 38, 40, 49, 60	Polarsnipe 1977: 10, <34>
1982: 25, 78	1978: <29>, 38, <61>
Nattergal 1977: 8	1979: 12, 55, 112
1978: 40	1980: 8, 37, <62>
1979: 23, 61, 98, 102, 119	1981: 16, 40
1980: 38, 40, 103	Polarsvømnesnipe 1978: 38
1981: 8, 17, 70	Purpurhegre 1979: <67>
1982: 22, 34, 76	Rapphøne 1978: 38
Nattravn 1978: 39, 61	1979: 52
1979: 37, 58	1980: 37
1980: 21, 37, 103	Ravn 1977: 11
1982: 70	1978: <20>, <21>, 40, 59 (korp)
Nøttekråke 1977: 11	1979: 17, 60, 117
1978: 39, 74	1980: 9, 11, 18, 38, 47, 89
1979: 17, 117	1981: 16, 41, 43, 60, 67
1980: 9, 18, 103	1982: 25, 33, 86
1981: 17, 41	Ringdue 1977: 11
1982: 25, 85	1978: 39, 58 (due)
Nøtteskrike 1977: 11	1979: 15, 57, 91, 92, 97, 114
1978: 39, 59	1980: 8, 17, 37, <58>, 81
1979: 5, 17, 60, 71, 92, 98, 101, 117	1981: 6, 7, 10, 16, 18, 40, 60
1980: 5, 9, 11, 18, 38, 88	1982: 25, 29, 31, 68
1981: 8, 17, 37, 41	Ringgås 1977: <34>
1982: 25, 84	1978: <15>, 37
Orrfugl 1978: 38, 59 (urfugl og høns)	Ringtrost 1977: 11
1979: 52, 109	1978: 40
1980: 12, 17, 37, <58>, 77	1979: 19, 62, 119
1981: 15, 59	1980: 8, 18, 38, 94
1982: <16>, 24, 60	1981: 8, 17, 40, 49
Pallashavørn 1978: 37	1982: 25, 34, 77
Perleugle 1978: 14, 19, 39	Rosenfink 1978: 41, 60
1979: 36, 58, 69, 97, 99, 101, 115	1979: 37, 45, 63, 99, 102, 126, 131
1980: 17, 24, 25, 37, <58>, 83	1980: 18, 20, 38, 40, 100
1981: 7, 11, 16	1981: 9, 18, 36, 41, 43, 70
	1982: 25, 34, 89
	Rovterne 1978: <30>, 38
	1979: 45, 57
	1980: 37
	Rugde 1978: 38, 59 (myrsnipe)
	1979: 92, 97, 101, 112
	1980: 4, 8, 11, 17, 80
	1981: 6, 7, 10, 16, 40, 59

	1982: 25,64	Sandsvale 1977: 11
Rustand	1978: <29>	1978: 39
	1979: 9	1979: 5,15,59,98,117
	1980: 8	1980: 5,8,18,37,85
	1981: 40	1981: 7,16,37,40,43
Rødfalk	1978: <29>	1982: 25,73
Rødhodevarsler	1979: <68>	Sanglerke 1977: 11
Rødnebbterne	1978: 39,<95>	1978: 39,56,58 (lerke)
	1980: 103	1979: 16,59,92,116
	1982: 92	1980: 18,37,86
Rødstilk	1977: 10,23,27	1981: 16,40,60
	1978: <24>,<29>,38	1982: 25,31,<33>,72
	1979: 12,55,97,111	Sangsvane 1977: 7,10,<19>
	1980: 8,11,17,37,79	1978: <19>,<27>,37
	1981: 7,16,26,40,56,59	1979: 9,49,93,104
	1982: 8,9,25,65	1980: 8,10,17,19,37
Rødstjert	1977: 11	1981: 15,21,40,42
	1978: 40	1982: 24,30,<33>
	1979: 6,19,61,98,102,119	Sangsvaneslekten <i>Cygnus</i> 1977: <34>
	1980: 5,8,11,18,38,<58>,93	1978: <15>
	1981: 8,17,38,40,43,58	Sibirnøttekråke <i>se</i> nøttekråke
	1982: 25,76	Sidensvans 1977: 11
Rødstrupe	1977: 11	1978: 40
	1978: 40	1979: 17,60,93,123
	1979: 6,7,19,61,92,98,100,	1980: 8,18,38
	102,119	1981: 17,40,<71>
	1980: 5,6,7,8,18,38,48,	1982: 25,30
	<57>,<58>,94	Siland 1977: 10,27,28
	1981: 5,8,10,13,17,18,38,	1978: 37,60
	39,40,43,60	1979: 10,50,92,108
	1982: 25,75	1980: 8,37,102
Rødstrupesanger	1979: <67>	1981: 15,40,42,71
Rødtoppfuglekonge	1979: <68>	1982: 8,9,10,12,57
Rødvingetrost	1977: 8,11	Sildemåke 1977: 10,23,27
	1978: 40	1978: 38,51
	1979: 6,19,62,91,92,98,100,	1979: 14,57
	102,120	1980: 8,17,20,37,103
	1980: 6,8,18,38,48,<58>,95	1981: 40,<71>
	1981: 8,10,17,38,40,49,60	1982: 7,9,10,11,12,25,92
	1982: 25,31,34,78	Silkehegre 1978: <30>
Rørsanger	1977: 8,11	1979: <67>
	1978: 40,51	Sivhauk 1978: <20>,<30>,37,60,<77>
	1979: 4,5,7,18,61,98,102,	1979: 37,52,<67>
	120	1980: 37,39
	1980: 5,6,8,38,40,103	1981: 4,15,70
	1981: 8,17,37,38,40	Sivhøne 1977: 8,10
	1982: 79	1978: 38,48,51,60
Røy <i>se</i> storfugl		1979: 4,11,45,54,<68>,110
Sabinemåke	1978: <77>	1980: 8,11,37,102
Sandlo	1977: 10	1981: 16,40,70
	1978: 38	1982: 61
	1979: 11,54,91,110	Sivsanger 1977: 8,11
	1980: 8,11,37,<62>,102	1978: 40
	1981: 5,16,40	1979: 5,18,60,98,120
	1982: 62	1980: 5,8,38
Sandløper	1977: <34>	1981: 8,17,37,40,43
	1978: <15>,<29>,38	1982: 34,78
	1979: 112	Sivspurv 1977: 8,11
	1981: 16,<26>	1978: 41,52,88
		1979: 4,6,7,20,34,64,91,92,
		99,100,102,127

- 1980: 6, 7, 9, 18, 38, 40,  
       <57>, 101  
 1981: 4, 5, 9, 10, 11, 18, 38,  
       39, 41, 58, 60, 64, 70  
 1982: 25, <33>, 91  
**Sjøorre** 1978: 37  
 1979: 50, 107  
 1980: 37, 60, 102  
 1981: 15  
 1982: 57  
**Skjeand** 1977: 10  
 1978: <20>, 37, 50  
 1979: 10, <37>, 50, 107  
 1980: 8, 37, 102  
 1981: 5, 15, 40, 42  
 1982: 92  
**Skjestork** 1978: <30>  
**Skjære** 1977: 11  
 1978: 39, 59 (skade)  
 1979: 5, 17, 60, 92, 98, 117  
 1980: 5, 9, 18, 38, 89  
 1981: 8, 17, 37, 41, 66  
 1982: 25, 52, 85  
**Skjærpiplerke** 1977: 23, 27  
 1978: 39  
 1979: 99, 123  
 1980: 18, 20, 59  
 1981: 9, 17, 26  
 1982: 8, 9, 12, 25, 92  
**Skogdue** 1978: 39  
 1979: 15, 58, 92, 113  
 1980: 8, 11, 37, 82  
 1981: 16, 40, 43  
 1982: 68  
**Skogsnipe** 1977: 10  
 1978: 38, 51  
 1979: 12, 34, 56, 97, 101, 111  
 1980: 8, 17, 19, 37, 79  
 1981: 7, 16, 40, 58  
 1982: 25, 65  
**Slagugle** 1978: 39  
**Smålom** 1978: 37  
 1979: 47  
 1980: 37  
 1981: 59, 61, <71>  
 1982: 24, 91  
**Småskrikeørn** (= liten skrikeørn)  
 1977: <35>  
 1978: <15>, <77>  
 1980: <61>  
**Småspove** 1977: 10  
 1978: 38, <95>  
 1979: 12, 57, 91, 111  
 1980: 8, 17, 37, 103  
 1981: 16, 40, 42, 59  
 1982: 25, 92  
**Snadderand** 1978: <29>, 37  
 1979: 49  
 1980: 37  
**Snøgås** 1978: 37  
 1979: 48  
 1980: 37  
**Snøspurv** 1977: 11  
 1978: 41  
 1979: 20, 64, 91, 127  
 1980: 9, 18, 38, 102  
 1981: 18, 41  
 1982: 25, <33>, 34, 90  
**Snøugle** 1978: 39  
**Sothøne** 1977: 10  
 1978: <20>, 38, 48, 51, <61>  
 1979: 11, 45, 54, <68>, 110  
 1980: 8, 11, 37, 39, 102  
 1981: 16, 40, 42, 70  
 1982: 92  
**Sotsnipe** 1978: <29>, 38  
 1979: 12, 55, <67>, 111  
 1980: 8, 12, 37, 39  
 1981: 5, 16, 40, 42  
**Spettmeis** 1977: 11  
 1978: 40  
 1979: 19, 62, 98, 101, 118  
 1980: 9, 18, 38, 48, 97  
 1981: 8, 17, 41  
 1982: 25, 83  
**Splitterne** 1977: <34>  
 1978: <15>, <30>  
 1979: 14  
 1980: 8, <62>  
 1981: <26>, 40  
 1982: 11  
**Spurvehauk** 1977: 10, <34>, <35>  
 1978: <15>, 37, 56, 61, <77>  
 1979: 11, 50, 97, 100, 101, 109  
 1980: 8, 11, 17, 37, 39, <61>, 75  
 1981: 7, 10, 15, 40  
 1982: 24, 26, 33, 58  
**Spurveugle** 1978: 19, 39, 80  
 1979: 29, 97, 101, 114  
 1980: 17, 46, 83  
 1981: 7, 16  
 1982: 25, 29, 30, 69  
**Steinskvett** 1977: 11  
 1978: 40, 59 (stendulp)  
 1979: 18, 61, 98, 119  
 1980: 8, 18, 38, 93  
 1981: 8, 17, 18, 36, 37, 40, 43, 60  
 1982: 25, 77  
**Steinvender** 1977: 10  
 1978: <15>, <29>, 38  
 1979: 11, 54  
 1980: 8, 37, 59  
 1981: 40  
 1982: 11  
**Steppehauk** 1978: 37  
**Steppehøne** 1978: 39  
**Steppeørn** 1978: 37  
**Stillits** 1977: 11

1978: 41,59,<77>	1980: 5,8,17,37,<62>,80
1979: 6,20,63,124	1981: 7,16,37,40,56,60
1980: 6,9,18,38,60,103	1982: 25,66
1981: 17,38,41,<71>	Stylteløper 1978: <29>,<30>
1982: 25,88	1979: <67>
Stjertand 1977: 10	Stær 1977: 11
1978: <21>,37	1978: 39,59,<95>
1979: 10,<37>,49,75,107	1979: 5,17,60,91,92,99,
1980: 8,37	102,123
1981: 15,40,42,56,59,61	1980: 5,9,15,18,37,48,88
1982: 24,92	1981: 9,13,17,37,41,60
Stjertmeis 1977: 11	1982: 25,31,<33>,86
1978: 40	Svartand 1977: 10
1979: 19,62,92,98,101,118	1978: 37
1980: 4,6,8,11,18,38,95	1979: 10,50,75,107
1981: 8,17,38,41,43	1980: 8,17,37,39,60,102
1982: 25,82	1981: 15,40,59,<71>
Stokkand: 1977: 7,10,23,26,	1982: 24,57
27,28	Svartbak 1977: 11,23
1978: <19>,37,50	1978: 38
1979: 9,49,91,92,93,97,	1979: 14,57,113
106	1980: 8,37,40,103
1980: 8,17,37,73	1981: 16,40
1981: 7,15,40,56,58,59,71	1982: 9,12,92
1982: 7,8,9,24,56	Svarthalespove 1978: <30>,38
Storfugl 1978: 32,38,59	1979: 56,111
1979: 109	1980: 37
1980: 17,77	1981: 16
1981: 15,58	Svarthodesanger 1978: <29>
1982: 15,<16>,24,61	1979: <68>
Storjo 1978: <95>	Svarthvit fluesnapper (= hagefluesnapper) 1977: 11
Stork 1978: <30>,37	1978: 40
1979: <66>,<67>	1979: 5,18,61,92,96,98,-
1981: 44	102,122
Storlom 1977: 10	1980: 5,8,18,38,92
1978: 37,60	1981: 4,8,13,14,17,37,41,43
1979: 8,37,<47>,75,104	1982: 25,34,81
1980: 8,17,37,39,73	Svaratkrike <i>se</i> krake
1981: 15,40,42,59,61	Svarmeis 1978: 40
1982: 24,55	1979: 62,92,98,100,101,118
Stormsvale 1978: <95>	1980: 18,38,96
Stor piplerke <i>se</i> tartarpiplerke	1981: 8,10,13,17,36,41,43
Storskav 1978: 37,54	1982: 25,83
1979: 8,104	Svartrødstjert 1978: 40
1980: 8,10,<58>,60,<61>	1980: 18,20
1981: 4,15,40,<71>	1981: 5,8,17
Storskavslætten <i>Phalacrocorax</i>	1982: 25
1977: 12	Svarspett 1977: 11
1979: <68>,104	1978: 39,58 ( <i>gjertrudsfugl</i> )
Storspove 1977: 10	1979: 15,58,92,115
1978: <20>,38,51	1980: 8,11,18,37,85
1979: 12,56,91,111	1981: 16,40
1980: 8,11,17,19,37,103	1982: 25,34,71
1981: 16,40,56,59,63	Svarsteinskvett 1978: <29>
1982: 25,65	Svarstork 1979: <67>
Storspoveslekten <i>Numenius</i>	Svarstrupe (= svarstrupet buskskvett) 1978: <29>,40
1978: 59	1979: <66>
Strandsnipe 1977: 10	Svarterne 1978: 38
1978: <29>,38,51,59	1979: 45,57,<67>
1979: 5,12,56,92,97,101	1980: 12,37
112	

Svarrtrost	1977: 11 1978: 40, <93> 1979: 19, 62, 92, 98, 100, 102, 119 1980: 4, 6, 8, 11, 18, 38, 95 1981: 8, 10, 17, 38, 40, 49, 60 1982: 25, 29, 31, 34, 77	Toppdykkerslekten <i>Podiceps</i> 1977: 12 1979: 48 1980: 10
Svarvingelente	1978: <29>	Topplerke 1978: 39
Svømmesnipe	1978: 38 1979: 57 1980: 37, 80 1981: 66	Toppmeis 1978: 40 1979: 62, 92, 98, 101, 118 1980: 18, 38, 96 1981: 8, 17 1982: 25, 82
Sædgås	1978: <20>, <21>, 37 1979: <37>, 105 1981: 15	Tornirisk 1977: 11 1978: 41 1979: 6, 20, 63, 91, 92, 99, 102, 124, 131 1980: 6, 9, 18, 38, 99 1981: 9, 17, 38, 41 1982: 25, 88
Sørlig gulerle	se gulerle	Tornsanger 1977: 11 1978: 40 1979: 5, 18, 61, 98, 102, 121 1980: 5, 8, 18, 38, 91 1981: 8, 17, 37, 40 1982: 25, 79
Sørnattergal	1979: <24>, <67>	Tornskate 1977: 11 1978: 39, 90 1979: 5, 17, 59, 99, 123 1980: 5, 9, 18, 20, 37, 59, 88 1981: 9, 17, 37, 41, 43 1982: 25, 84
Særle	se gulerle	Trane 1977: 10 1978: <20>, <21>, 38, <77> 1979: 11, <39>, 52, 75, 91, 110 1980: 8, 12, 17, 19, 37, 39, 77 1981: 15, 40, 56, 59, 62 1982: 24, 61
Taffeland	1977: 7, 10 1978: <20>, 37 1979: 10, <37>, 50, 107 1980: 8, 37 1981: 15, 40, 42	Trekryper 1977: 11 1978: 40, 82, 87 1979: 19, 62, 92, 98, 102, 118 1980: 4, 6, 9, 11, 18, 38, 97 1981: 8, 17, 38, 41 1982: 25, 84
Taksvale	1977: 11 1978: 39, 90 1979: 16, 59, 97, 116 1980: 8, 18, 37, 55, <62>, 72, 86 1981: 4, 7, 16, 40, 60 1982: 25, 73	Trelerke 1978: 39 1980: <58>
Tamarisksanger	1979: <68>	Trepipplerke 1977: 11 1978: 39 1979: 5, 16, 59, 92, 98, 102, 123 1980: 5, 8, 11, 18, 37, 86 1981: 9, 17, 37, 40, 60 1982: 25, 73
Tartarpipplerke (= stor pipplerke)	1980: <57>	Tretåspett 1978: 39 1979: 116 1980: 18, 85 1981: 16 1982: 25, 72
Teist	1978: <95>	Trostesanger 1979: <68>
Temmincksnipe	1977: 10 1978: 38 1979: 12, 54, 112 1980: 8, 37, 39, <62>, 102 1981: 16, 40 1982: 63	Tundragås 1982: 24, 25
Tiur	se storfugl	Tundralo 1978: 38, <77> 1979: 11, 54, 110 1980: 8, 11, 17, 37, 39, 102 1981: 16, 40 1982: 7, 8, 9, 10, 12, 24, 92
Tjeld	1977: 10, 23, 26, 27, 28 1978: 38, <95> 1979: 11, 54, 110 1980: 8, 11, 17, 37, 39, 102 1981: 16, 40 1982: 7, 8, 9, 10, 12, 24, 92	Tundrasnipe 1977: 10
Toppand	1977: 7, 10, 26, 27, 28 1978: 37, 48, 50, 60 1979: 10, 45, 50, 107 1980: 8, 10, 17, 37, 63, 73 1981: 15, 26, 40, 42, 56, 58, 59, 61 1982: 7, 8, 24, 56	Tundragås 1982: 24, 25 Tundralo 1978: 38, <77> 1979: 11, 54, 110 1980: 8, 37, <62> 1981: 16, 40
Toppdykker	1977: 10 1978: <29>, 37, 60 1979: 8, 45, 48, 54, 104 1980: 8, 10, 37, 39, 53 1981: 15, 40, 42, 70 1982: 91	

- 1978: 38  
 1979: 12, 55  
 1980: 8, 37, 40  
**Turteldue** 1978: 39  
 1979: <67>  
**Tyrkerdue** 1977: 11  
 1978: 39, <93>  
 1979: 15, 34, 58  
 1980: 8, 15, 17, 37, 82  
 1981: 40, 43  
 1982: 25, 68  
**Tyvjo** 1978: 38, <95>  
 1980: 60  
 1982: 11  
**Tårnfalk** 1977: 10, <35>  
 1978: <15>, <21>, 37, <77>  
 1979: 11, 52, <67>, 92, 109  
 1980: 8, 11, 17, 37, 39, <58>, <61>, 76  
 1981: 15, 40, 42, 58  
 1982: 24, 59  
**Tårnseiler** (= tårnsvale)  
 1977: 11  
 1978: 39  
 1979: 5, 15, 58, 97, 115  
 1980: 5, 8, 17, 37, 83  
 1981: 7, 16, 37, 40, 43, 60  
 1982: 25, 70  
**Tårnsvale** se tårnseiler  
**Vaktel** 1978: 38  
 1979: 52  
 1980: 37  
 1982: 92  
**Vandrefalk** 1978: 37, <77>  
 1979: <37>, <67>  
 1981: 5, 15  
**Vannrike** 1978: <14>, 38  
 1979: 52  
 1980: 37  
**Varsler** 1977: 11  
 1978: 39  
 1979: 17, 59, 99, 102, 123  
 1980: 9, 18, 20, 37, 40, 103  
 1981: 9, 17, 41, <71>  
 1982: 25, 84  
**Vendehals** 1978: 39  
 1979: 15, 58, 92, 97, 101, 115  
 1980: 8, 18, 37, 84  
 1981: 7, 16, 40, 58  
 1982: 25, 70  
**Vepsevåk** 1977: <34>, <35>  
 1978: 37, 60  
 1979: 37, 50  
 1980: 17, 19, 37, <61>, 71, 102  
 1982: 24, 58, 92  
**Vierspurv** 1979: 99, 102, 127  
 1981: 9, 18  
 1982: 92  
**Vintererle** 1977: 11  
 1978: 39  
 1979: 17, 59, 123  
 1980: 8, 18, 37, 87  
 1981: 17, 40  
 1982: 22, 25, 52, 74  
**Vipe** 1977: 10  
 1978: 38  
 1979: 11, 54, 91, 92, 110  
 1980: 8, 17, 37, 39, 78  
 1981: 16, 40, 42, 56, 59  
 1982: 24, 31, 63  
**Ærfugl** 1977: 23, 27, 28  
 1978: 37  
 1980: 59, <61>  
 1981: <71>  
 1982: 8, 9, 10, 12, 92  
**Ørkendompap** 1978: <29>  
**Ørkenlerke** 1978: <29>  
**Ørkensteinskvett** 1978: <29>  
**Ørnvåk** 1978: <29>  
**Østsanger** 1982: 92  
**Akerrikse** 1978: 38  
 1981: 44  
 1982: 92



## KONKURRANSEFUGLEN

I "Buskvetten" nr. 1 og 2 for 1983 presenterte vi to fotografier av fugler og inviterte leserne til å sende inn forslag på hvilke arter de viste. Dessverre har responsen på denne spalten vært nøy så dårlig som overhode mulig, med bare ett innsendt svar. Dette var til gjengjeld riktig. Vi bringer nå løsningene på oppgavene, og lar det inntil videre være med dette.

Den første oppgaven gjaldt en ung sivhøne, og den var fotografert ved Østensjøvannet i Oslo av Øivind Syvertsen. Det dreier seg opplagt om en svømmefugl, og fuglen kan kanskje først og fremst tenkes forvekslet med ender. Den har imidlertid ikke andefuglenes avflatede nebb. Fuglen kan også minne om en øvergdykker, men denne arten har en mer "avstumpet" kropp med en pussig oppoverrettet hale. Kanskje noen var inne på tanken om en ung måke? Detaljene i fjærdraktens fargetegninger stemmer her ikke, og nebbet er for tjukt ved basis; de store måkeartene ville dessuten ha en tydelig "knekk" på undernebbet. Legg ellers merke til at de unge sivhønene mangler de eldre fuglenes hvite stripe langs kropssida, for å framheve en karakter som er tydelig på bildet. Vi gratulerer Bjørn Einar Sakseid med riktig bestemmelse.

Den neste oppgaven ble gitt av innsenderen, og her måtte redaksjonen selv gjennom "ildprøven". Vi fikk nok imidlertid en atskillig lettere oppgave enn dere, i og med at vi kunne studere et fargebilde, og vår avfotografering dessuten kom svært uheldig gjennom trykken. Fuglen er i alle fall en buskvetts hann, og bildet er hentet fra et postkort utgitt av Dansk Ornitoligisk Førenig. Når det gjelder spørsmålet om hvilken atlaskode situasjonen illustrerer kan dette vanskelig avgjøres ut fra den dårlige gjengivelsen i bladet. Fuglens nebb stritter på originalen imidlertid av insekter, og det var derfor koden D15 vi ville fram til. Denne lyder som kjent: "Voksen fugl med mat for unge eller ekskrementpose".

TIL:



## ATLASPROSJEKTETS SISTE SESONG...

Vi står nå foran innspurten i det store kartleggingsprosjektet over våre hekcefugler. Sesongen 1985 vil bli siste sjanse til å utføre feltregisteringer, så det er svært viktig at vi alle nå koncentrerer oss om å fylle ut så mange av hullene i materialet som råd er. Alle som har opplysninger som ikke tidligere er meddelt prosjektledelsen må snarest ta pennen fatt, utsett det ikke til høsten.

BUSKSKVETTIEN nr. 2 fra 1982 (atlasnummeret) anbefales fortsatt brukt. Ha det med deg i bilen eller ryggsekken under turer rundt i fylket, sjekk alltid om de hekkefunn og -indikasjoner du gjør er nytt eller ikke, og notér presist. I BUSKSKVETTIEN nr. 2 fra 1983, sidene 82-84, er det gitt en kort vurdering av dekningsgrad for de enkelte arter/artsgrupper og våre 150 atlasruter. Om du ikke har vært av de ivrigste atlassliterne tidligere, så stå gjerne på litt ekstra nå! Det trengs f.eks. bedre dekning av deler av Hardangervidda.

Henvendelser om atlasprosjektet rettes til Per Ole Syvertsen, Kirkeveien 114A, 0361 Oslo 3.