

 **POLARSVØMMESNIPE**
Phalaropus fulicarius



Forekommer relativt vanlig over det meste av øygruppa, unntatt på Nordaustlandet hvor den er mye mer fåtallig.

Forekommer mest tallrikt ved mindre vann og laguner på havslettene og i nedre del av dalførene. Er også vanlig på vegetasjonsdekte øyer med dammer - ofte sammen rødnebbternekolonier. Sees ofte enkeltvis eller parvis, men større flokker (>100) forekommer på gunstige steder i slutten av juni og i juli. Flere tusen par hekker.

Kjennetegn: 20-22 cm. Hunnene skifter til vinterdrakt relativt tidlig, slik at draktene for begge kjønn blir mer lik i juli eller senere. Ungfuglene mangler rødt. Ettåringer ligner på voksne i overgangsdrakt. I september kan enkelte være i full vinterdrakt. Et kort skarpt «kitt» høres ofte i flukt.

Hekking: Hekker vanligvis ved små tjern eller på fuktige steder med rik vegetasjon. Stor hekketetthet ofte på rikt vegeterte øyer med tjern, og uten tilhold av fjellrev. Hunnene forlater vanligvis hekkeområdet i juni, og kan da samle seg i større grupper på gunstige steder langs kysten.

Foto midten: Allerede i slutten av juli og tidlig august er de i overgangsdrakt. Nederste to bilder: Ungfugl.

Photo, middle: Already at the end of July and early August, the birds are in transitional plumage. Bottom two photos: Young bird.

Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Oktober	Nov	Des

Found over most of the archipelago, except the eastern part of Nordaustlandet where it is much rarer. Most common at small lakes and lagoons on plains along the coast and on flat ground in the large valleys. Also common on vegetated islands with pools and Arctic Tern colonies. Often seen singly or in pairs, but large flocks can appear at favourable sites in late June and the whole of July. Several thousand pairs breed.

Features: 20-22 cm. The females moult to winter plumage relatively early, so that the sexes are not so easy to distinguish in July and later. The young birds lack the red colour. One year old birds resemble the adults in transition plumage. In September some can be in full winter plumage. Often calls in flight, a short sharp «kitt».

Breeding: Breeds mainly by the side of small lakes or at damp sites with rich vegetation. Especially dense populations on islands with rich vegetation, and no Arctic Fox. The females leave the breeding grounds already in June, leaving the young ones to the male.

♀ er større og kraftigere farget enn ♂. Hos svømmesnipene er det hannen som tar seg av alt ungestellet.
♀ is larger and brighter colored than ♂. The male Phalarope takes full care of the kids.

 **GREY PHALAROPE**
Red Phalarope
Phalaropus fulicarius



Voksen sommer
Adult summer

Brede, hvite vingeband
Broad, white wing-bars

Ung svømmesnipe (next side).
Lengre og tynnere nebb.
Brede bånd på ryggen.

Young Red-necked Phalarope (next page).
Longer and thinner bill. Broad bars on back.

Ungfugl
Juvenile