



Av totalt 43 deltakere i året første runde av Fotonøtta står 23 igjen med full pott. Den unge svarthvit fluesnapperen som utgjorde 3-poengsbildet var overraskende vanskelig for mange av deltakerne, mens svartstrupa (1-poeng) ikke bød på de store utfordringene. Det er imidlertid tre runder og mange sjanser igjen i årets konkurranse, så bli med i kampen om kikkerten!

Konkurransereglene

1. I *Vår Fuglefauna* vil det bli presentert fuglebilder der artenes identitet ikke er oppgitt. Dersom du på grunnlag av bildet mener å kunne identifisere arten, kan du oppnå en viss poengsum pr. bilde.
2. Du kan sende inn besvarelse på begge bildene, men kun ett forslag pr. bilde! For hvert riktig svar oppnår du den poengsum som er angitt. Dersom besvarelsen er feil, får du like mange minuspoeng som du ville fått plusspoeng om besvarelsen hadde vært korrekt.
3. Besvarelsene for hver gang må være innsendt til VFs redaksjon innen angitt tidsfrist. I hvert hefte kommer nye spørsmål, sammen med svarene på forrige rundes bilder og navn på vinner.
4. Bildene i hvert hefte utgjør en egen konkurranseomgang, der premien er en bok/CD/DVD fra Natur og Fritid AS. Premien tilfaller den som har flest poeng i runden. Dersom flere innsendere har like poengsummer foretas loddtrekning blant disse.
5. Sender du inn besvarelser fra flere runder, vil poengsummene dine bli lagt sammen ved årets utgang. Den som har flest poeng totalt, vinner hovedpremien — som er en kostbar Swarovski kvalitetskikkert velegnet til fuglekikking! Dersom flere innsendere skulle stå med lik poengsum til slutt, vil det bli ekstrarunder med bilder på internett for de involverte helt til en vinner kan kåres.
6. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av NOF, med unntak av dem som av ulike årsaker er kjent med svarene på forhånd. Redaktørens vurdering av hvem dette måtte gjelde er eneveldig. Redaktøren og fotografen av det aktuelle bilde er konkurransens jury i tvilstilfeller.

Slik går du fram

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to bildene. Svarene ser du i neste nummer, og dine svar må sendes til oss innen **1. september 2007**. Du må gjerne svare via e-post til vf@birdlife.no.

Rundens bilder er begge av arter påtruffet i Vest-Palearktis — og du kan med rett svar sikre deg i alt 4 poeng. Oppgavene er ikke nødvendigvis svært vanskelige, men vær oppmerksom på at du også kan score minuspoeng (se reglene)! Derfor kan det kanskje svare seg å la være å foreslå noe til et bilde dersom du er usikker — du kan likevel svare på det andre bildet.

1 poeng: Av 43 deltakere i årets første runde av Fotonøtta klarte hele 39 deltakere den enkle av de to nøttene. Riktig svar var **svartstrupe** *Saxicola torquata*. Av bildet ser vi en relativt ensartet varmbrun fugl som har mørke og spinkle bein, en relativt kort mørk brun stjert, og mørkere brune vinger med lysere bremmer på vingedekkfjærene. Som de aller fleste innså var det ikke mange alternativer her, men to personer prøvde seg allikevel med et av de bedre alternativene, nemlig den nære slektningen buskskvett *Saxicola rubetra*. Denne kan utelukkes blant annet ved at stjerten ikke har de lyse feltene som buskskvett skal ha ved basis av de ytterste stjertfjærene. Et annet forslag var kongeblit *Pinicola enucleator*. Denne kraftige finkefuglen ville nok ha vist helt andre bein, kortere og kraftigere, samt tydeligere vingebånd. En siste deltaker unnlot å svare på denne nøtta. Fuglen er fotografert av Christian Tiller.


3 poeng: Som seg hør og bør var 3-poengeren hakket vanskeligere enn svartstrupen, og bare 25 deltakere hadde riktig svar. Bildet viser en juvenil



Kvalitetspremier også i 2007!

For året 2007 følger vi nok en gang opp med kikkerten Swarovski EL som førstepremie i Fotonøtta! Det er importøren av Swarovski – Design Optikk i Sandnes – som raust gir oss denne kvalitetskikkerten i premie.

Natur & Fritid AS deler ut en premie til en av dem som oppnår flest poeng pr. omgang. For konkurransen i Vår Fuglefauna 2-2007 er det *Albatrosses, Petrels and Shearwaters* som er premien!



svarthvit fluesnapper *Ficedula hypoleuca* som skjuler hodet bak vingen som den pusser. Vi ser her en svakt spraglet (juvenile kroppsfjær) grålig spurvefugl med mørk stjert som har en tydelig hvit kant på innerste halvdel av ytre stjertfjær. Vingen er mørkere, og den har et tydelig lyst vingebånd, samt lyse tegninger på utfanet av tertiærene. Overgumpen er mørkere enn ryggen, og undergumpen er tilsynelatende hvit. Her kom det inn en rekke forslag til hva det kunne være. Hele seks personer forsøkte seg med kjøttmeis *Parus major*. Til tross for at kjøttmeisa både har vingebånd og lyse kanter på tertiærene, så ville den ha vist en mer grønnlig rygg og gulere underside. Fuglens svarte lengste øvre stjertdekkere gjør også at kjøttmeis kan utelukkes. To personer svarte linerle *Motacilla alba*, en art som kan utelukkes ved at konkurransefuglen har for kort stjert, og at den mangler et tydelig andre vingebånd dannet av lyse kanter på mellomdekkene. Tornirisk *Carduelis cannabina* utgjorde også to svar. Denne arten kan ekskluderes som alternativ ved at vingen ville ha vist et lysere felt dannet av lyse bremmer på svingfjærene i motsetning til fluesnapperens vingebånd langs dekkfjærene og basis av håndsvingfjærene. Mestersanger *Sylvia hortensis* ble foreslått av en person, men denne har helt ensartet vinge uten vingebånd. Grå- og grønnsisk *Carduelis flammea* og *spinus*

fikk hver sin «stemme», men begge disse viser ikke svarte lengste øvre stjertdekkere, og ville i det hele tatt ha gitt et annet inntrykk på overgumpen. Bokfink *Fringilla coelebs* (et svar) kan også utelukkes på vingetegningene. Et mer kreativt svar var kirkeugle *Athene noctua*. Den kan egentlig utelukkes på det meste, men for ordens skyld nevner vi at den ikke har noen tegninger på vingene av typen som konkurransefuglen har. Et svar var gråfluesnapper *Muscicapa striata*. Den mangler også dette distinkte vingebåndet, og de viser ikke en tilsvarende kontrast mellom stjert og gump. Det siste svaret som kom inn var halsbåndfluesnapper *Ficedula albicollis*. I utgangspunktet er det uhyre vanskelig å skille unge

svarthvite fluesnapper og halsbåndfluesnapper, men av dette bildet som viser vingen så godt er det mulig. Hos en halsbåndfluesnapper ville man trolig sett mer utpregete bremmer på vingene. Selve nøkkelkarakteren er basene av håndsvingfjærene. På bildet ser vi at de innerste fjærene har lyse baser, men de er ikke brede nok og de strekker seg ikke langt nok ut mot den ytterste håndsvingfjæra. Bildet er tatt av Geir Rudolfsen.

Av 23 som svarte riktig på begge nøtter, ble **Thorstein Holtskog, Gvarv** trukket ut som vinner! Han får tilsendt *The Sound Approach to birding* fra Natur og Fritid AS. Vi gratulerer!

Frode Falkenberg

Forrige rundes fugler

